

Archiv für Molluskenkunde

Wilhelm Kobelt, Wilhelm Wenz, Amalie Kobelt,
Fritz Haas, Deutsche Malakozoologische Gesellschaft

Digitized by Google

Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft.

Fünfundzwanziger Jahrgang.

Redigirt
von
Dr. W. Kobelt.
in Schwanheim (Main).

FRANKFURT AM MAIN.
Verlag von MORITZ DIESTERWEG.
1893.

Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft.

Fünfundzwanziger Jahrgang.

R e d i g i r t
von
Dr. W. Kobelt.
in Schwanheim (Main).

FRANKFURT AM MAIN.
Verlag von MORITZ DIESTERWEG.
1893.

OX
.7N15
25-30

Inhalt.

	Seite
Möllendorff, Dr. O. von, Materialien zur Fauna der Philippinen.	
X. Die Gattung <i>Hemiglypta</i> v. Moell.	1
Rolle, H., Diagnosen neuer Landschnecken	33
Kobelt, Dr. W., Ihering, Morphologie und Systematik des Genitalapparates von <i>Helix</i>	35
Kobelt, Dr. W., Diagnosen neuer griechischer Arten	43
Neumann, E., Die Molluskenfauna des Königreichs Sachsen	47
Böttger, Prof. Dr. O., Die Verhältniszahlen der paläarktischen Najaden	65
Brusina, S., Drei <i>Eulima microstoma</i>	79
Kobelt, Dr. W., Pilsbry's neue Eintheilung von <i>Helix</i>	83
Goldfuss, O., Eine neue <i>Pomatia (moabitica)</i>	86
Rolle, H., Eine neue <i>Pseudoglossula (abetifiana)</i>	86
Kobelt, Dr. W., Die Verbreitung von <i>Helix arbustorum</i> L.	87
Böttger, Prof. Dr. O., Die marinen Mollusken der Philippinen.	
I. Die Rissoiden. II. Die Assimineiden	97
Westerlund, Dr. C. Ag., Spicilegium malacologicum IV.	116
Möllendorff, Dr. O., Ueber den Werth des Deckels für die Systematik	157
Naegele, G., Die Molluskenfauna des nördlichen Persiens	148
Kobelt, Dr. W., Diagnosen neuer palaearctischer Arten	150
Böttger, Prof. Dr. O., Die marinen Mollusken der Philippinen.	
II. Die Eulimiden	153
Quadras, J. F., et O. F. de Möllendorff, Diagnoses specierum novarum ex parte septentrionali insulae Luzon	169
Böttger, Prof. Dr. O., Die marinen Mollusken der Philippinen.	
I. Die Rissoiden (I. Nachtrag)	185
Böttger, Prof. Dr. O., Drei neue <i>Pneumonopomen</i> von Borneo .	194
Müller, Dr. E. G. O., <i>Limax Schwabii</i> in Deutschland	197
<hr/>	
Kleinere Mittheilungen	92. 133
Literaturbericht	30. 63. 93. 133. 168. 199



Druck von Peter Hartmann, Schwanheim a. M.

7 N 15
25

No. 1 u. 2.

Januar - Februar 1893.

Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft. Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Aeltere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Berittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Materialien zur Fauna der Philippinen.*)

X. Die Gattung *Hemiglypta* v. Mlldff.

von

Dr. O. von Moellendorff.

Hemiglypta v. Mlldff. gen. Naninidarum.

T. solida, plus minusve angulata aut carinata, anfractibus lente accrescentibus, superne striis transversis et lineis spiralibus granulata, subtus glabrata, nitens, peristoma obtusum, intus calloso labiatum.

Typ. *H. blainvilleana* Lea.

*) Anmerkung. Durch die fast gleichzeitige Veröffentlichung einiger Aufsätze im Jahre 1890 ist die Numerirung meiner philippinischen Studien in Verwirrung gerathen. Ich erlaube mir hier ein richtig gestelltes Verzeichniss der bisherigen Aufsätze zu geben:

Syn. *Hemiplecta* Albers (ps.)

Rhysota Semper (ps.)

Wenn auch die von Albers 1850 aufgestellte Sektion von Nanina, *Hemiplecta*, ungefähr derjenigen entspricht, die ich hier neu benenne, so ist der Name doch für dieselbe nicht verwendbar, nicht weil sie ausser den hierher gehörigen Arten auch *Hemitrichia*- und *Rhysota*-Arten enthält, sondern weil v. Martens in der 2. Auflage 1860 ausdrücklich *N. humphreysiana* Lea zum Typus erhoben hat, während die erste Auflage keinen Typus namhaft macht. Nun hat aber *N. humphreysiana* einmal deutliche Runzelung, ihre Unterseite ist nicht glatt und glänzend, sondern noch deutlich, wenn auch schwächer gestreift und gerunzelt; sie gehört deshalb unbedingt zu *Rhysota*. Da sie aber mit einigen verwandten Arten einen eigenen Formenkreis innerhalb *Rhysota* bildet, so kann der Name für dieselbe als Sektion von *Rhysota* stehen bleiben. Dagegen muss für unsere Arten ein neuer Name gegeben werden. Dass dieselben generisch, nicht bloss subgenerisch oder als Sektion zusammengehören, ist mir sowohl nach der Schale als nach den Weichtheilen zweifellos. Die erstere schliesst sich durch die regelmässige Gitterung der Oberseite, welche an der Peripherie scharf abschneidet, und die glatte glänzende Unterseite an *Hemitrichia* an, ist aber durch ihre Festigkeit, die kräftige Cutikula, die Abwesenheit von

-
- I. (Umgegend von Manila). J. D. M. G. XIV. 1887, p. 85—97.
 - II. Cebu. Ibid. p. 235—283.
 - III. Umgegend von Manila. Ibid. p. 292—305.
 - IV. Nachträge zu Cebu. Mal. Bl. N. F. X. p. 144—163.
 - V. Bulacan etc. N. Bl. D. M. G. 1888, p. 65—90, 97—109.
 - VI. Tayabas. N. Bl. D. M. G. 1889, p. 97—110.
 - VII. Cebu. Jahresb. Senek. N. G. 1890, p. 189—292.
 - VIII. *Hemitrichia* (nicht VII) N. Bl. D. M. G. 1890, p. 173—190.
 - IX. Siquijor (nicht VII). Ibid. 1891, p. 37—58.

Haaren, die starke Callosität des innern Mundsaums sehr verschieden. Von Rhysota scheidet sie die Abwesenheit von Runzeln, die langsame Aufwindung, der Gegensatz der Skulptur zwischen Ober- und Unterseite. Anatomisch scheint sie sich nach Semper Rhysota anzuschliessen, doch ist das Thier hell, schwarz und weisslich grau gesprenkelt, nur schwach gerunzelt, während das von Rhysota einfarbig braun oder schwarz und kräftig gerunzelt ist. Der Kiefer hat stets einen starken Mittelzahn, der von Rhysota nur einen stumpfen Höcker. In der Radula und den Geschlechtstheilen stimmen die Arten nach Semper und Pfeffer mit Rhysota überein; die Mantellappen sind dagegen noch nicht so stark reduziert wie bei letzterer Gattung, wodurch sich die Glätte der Unterseite erklärt.

Die Artunterscheidung bei diesen über ganz Luzon und einen Theil der südlichen Inseln verbreiteten Formen erscheint anfangs schwierig. Nach sorgfältiger Untersuchung eines nach Tausenden zählenden Materials von sehr zahlreichen Fundorten finde ich aber, dass auch hier — wie bei Hemitrichia — die Skulptur, die grössere oder geringere Feinheit des Korns in der Granulation der Oberseite ein sicheres Unterscheidungsmerkmal darbietet, welches bei den Exemplaren desselben Fundorts durchaus konstant bleibt, also nicht, wie Hidalgo anzudeuten beliebt, individueller, sondern Rassencharacter ist. Hiermit gehen Hand in Hand Verschiedenheiten der Färbung und Zeichnung, stärkere oder schwächere Wölbung der Windungen, schärfere oder stumpfere Kantung der Peripherie und verhältnissmässige Höhe der letzten Windung. Die geographische Verbreitung der einzelnen Rassen ergibt allerdings, dass sie sämmtlich Repräsentativformen eines Typus sind und bei einer sehr weiten Auffassung des Artbegriffs sich sämmtlich als Lokalvarietäten einer und derselben Art ansehen lassen würden. Nur müsste dieselbe

nicht bloss, wie Hidalgo will, die bisher als *semigranosa* Sow. zusammengeworfenen Formen, sondern auch noch *mayonensis* Hid., *semiglobosa* Pfr., *cuvieriana* Lea, kurz alle Hemiglypten des Archipels umfassen. Ich glaube aber nicht, dass die Aufstellung solcher Collektivarten für die Wissenschaft förderlich sein würde, halte es vielmehr für besser nach wie vor lokalisirte Rassen zunächst als Arten zu behandeln. Besondere Namen als Varietäten oder Subspecies müssten sie in jedem Falle erhalten.

An dieser Auffassung kann es meiner Ansicht nach nichts ändern, wenn sich auf den Grenzen der Verbreitungsgebiete der einzelnen Rassen Uebergangsformen finden, wie ich dies unten in einigen Fällen nachweisen kann. Allerdings fehlen uns noch Vertreter der Gattung grade von den meisten Grenzgebieten, wo Uebergänge zu erwarten sind.

Cuming scheint die meisten der hierher gehörigen Formen schon gesammelt zu haben und wahrscheinlich hat sie Sowerby sämmtlich unter seiner *Helix semigranosa* zusammengefasst. Sicher ist, dass Cuming sie alle unter dem Sowerby'schen Namen versandte, so dass mehrere derselben, weil von Cuming stammend, als Originalexemplare aufgefasst wurden und desshalb verschiedene Autoren den Sowerby'schen Typus sehr verschieden gedeutet haben. Pfeiffer unterschied zuerst 3 Arten; er nahm als Typus die grob gekörnelte Form von der Insel Luban, welche sicher *H. blainvilleana* Lea ist, und beschrieb zwei andere neu, *H. panayensis* (Brod.) und *semiglobosa*. Semper nahm nach einem „Originalexemplar“ von Cuming an, dass grade *panayensis* die echte *semigranosa* Sow. sei und restituirte ihr diesen Namen. Die Pfeiffer'sche *semigranosa* deren ganz richtigen Fundort Luban er bezweifelte, identificirte er mit einer von ihm im Nordwesten von Luzon gefundenen Art und benannte dieselbe als *Moussonii* neu. Hätte er mit dieser Identificirung Recht gehabt, so wäre sein

Name überflüssig, denn *semigranosa* Pfr. ist, wie oben erwähnt, zweifellos = *blainvilleana* Lea. Dass Lea diese Art, ebenso wie Cuming und später Quadras und ich, von der Insel Luban erhielt, wird schon dadurch wahrscheinlich, dass er sie gleichzeitig mit *Helix cepoides* beschreibt, welche ausschliesslich auf jener Insel vorkommt. Dieser scharf ausgeprägten Inselform steht die Art des Nordwestens von Luzon, welche ich zum Theil von denselben Fundorten besitze, von denen sie Semper angiebt, zwar nahe, ist aber doch recht gut von ihr verschieden, so dass sie unter dem Semper'schen Namen Artgültigkeit behält und nicht, wie Tryon und Hidalgo wollen, in die Synonymie von *blainvilleana* wandert.

Haben somit schon 3 Arten den Sowerby'schen Namen getragen, so kommt noch eine vierte hinzu, welche über fast das ganze Mittelluzon verbreitet ist und welche ich unter dem Namen „*semigranosa*“ von englischen Händlern als aus Cuming's Hand stammend erhalten habe. Hidalgo vermengt diese, welche ich unten als *H. connectens* beschreibe, mit *blainvilleana* und *moussoni*; sollte sie durchaus nicht Artgültigkeit behalten, so könnte sie nur mit *H. panayensis* (Brod.) Pfr. (= *semigranosa* Semper, Hidalgo) combinirt werden, da sie derselben entschieden am nächsten steht. Pfeiffer scheint dies auch schon erkannt zu haben, da ich in seiner *panayensis* var. B. meine Art vermuthe.

Hidalgo bestätigt zwar Semper's Annahme, dass *H. panayensis* Pfr. = *semigranosa* Sow. Typ. sei, führt aber nach Sowerby den Fundort Luban für dieselbe an. Da es nun nach meinen Erfahrungen über die Verbreitung dieser Arten absolut ausgeschlossen ist, dass beide Arten auf der kleinen Insel Luban leben, so geht aus dieser Fundortsangabe klar hervor, dass Sowerby seinen Namen mindestens auf zwei der fraglichen Arten und zwar grade die

beiden Extreme der Reihe bezogen hat. Aber wie schon erwähnt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er überhaupt alle gekörnelten Naninen des Archipels unter *H. semigranosa* zusammenfasste. Unter diesen Umständen halte ich es für eine unnötige und erfolglose Quälerei feststellen zu wollen, welcher Art der Sowerby'sche Name zukommt. Um alle Unklarheiten zu vermeiden, ziehe ich es daher vor denselben ganz zu unterdrücken und die Arten, soweit nicht sichere frühere Namen vorhanden sind, neu zu benennen.

Die in Folgendem beschriebenen 10 Arten lassen sich in erster Linie durch die Körnelung unterscheiden, welche ich in folgender Weise arithmetisch feststelle. In einen Papierstreifen wird eine quadratische Öffnung von 4 mm Länge und Breite geschnitten und der Streifen sodann auf den vorletzten Umgang so geklebt, dass die untere Seite des Quadrats die Peripherie berührt, die rechte von der oberen Mündungsecke senkrecht nach oben verläuft. In der dadurch abgegrenzten Fläche werden die Querstreifen und Spirallinien gezählt. Je nachdem die Zahl beider annähernd gleich oder verschieden ist, entstehen regelmässige oder unregelmässige (längliche) Körnchen; dieselben sind auch nach dem stärkeren oder geringeren Einschneiden der Linien verschieden ausgeprägt. Ich bemerke hier nochmals, dass ich von jedem Fundorte stets mehrere, meist zahlreiche Exemplare in dieser Weise untersucht habe und dass sich nur ganz geringe Schwankungen zeigen. Die verschiedenen Grade der Feinheit sind übrigens auch ohne Zählung ohne Weiteres ins Auge springend. Neben diesem Hauptkennzeichen kommen in Betracht die stärkere oder geringere Wölbung der Windungen, die verhältnissmässige Höhe der letzten, welche ich durch das Verhältniss des grössten Durchmessers zu ihr ($10 : x$) ausdrücke, ferner Färbung und Zeichnung. Weniger wichtig ist die Ausprägung der peripherischen Kante, welche gelegentlich bei derselben Rasse wech-

selt, und ganz unwichtig die Höhe des Gewindes, welche fast bei allen Arten stark schwankt.

1. *Hemiglypta blainvilleana* (Lea.)

T. semiobtecta perforata, depressa, angulata, solidula, superne et inferne pallide olivaceofusca, infra peripheria fascia angusta fusca ornata, lineis spiralibus valde impressis et striis transversis distincte et regulariter granulata — granulis 144 in 16 □ mm. —, basi laevigata, nitens, radiatim striatula, spira plus minusve conoidea. Anfr. 6½ lente accrescentes, supremi convexiusculi, ultimi convexi, ultimus antice vix dilatatus, brevissime ascendens, superne inflatus, inferne bene convexus. Apertura sat obliqua, angusta, peristoma rectum, obtusum, intus calloso — labiatum, margine columellari superne brevissime reflexo.

Diam. maj. 36, alt. 22,5, apert. lat. 20,5, alt. 10,5 mm.

" " 36, " 19,5, " " 20 " 11 "

" " 33, " 21 " " 19 " 10 "

Helix blainvilleana Lea Transact. Am. Phil. Soc. 2. ser.

VII, p. 463 t. XII f. 15. — *Helix semigranosa* Sowerby (ex parte) — Pfr. Mon. Hel. I, p. 74, Chemn. ed. II, Helix no. 184, S. 34, f. 1,2. — *Nanina (Hemiplecta) Blainvilleana* Tryon Man. Pulm. II, p. 44, t. XV, f. 1,2. — *Nanina Blainvilliana* Hidalgo Obr. 1890, p. 77 (ex parte), Atlas t. VIII, f. 7.

Hab. in insula Luban.

Diese ebenso geographisch wie conchyliologisch streng abgegrenzte Form steht durch die grobe Körnelung, die starkgewölbten Windungen und den vorn an der Mündung deutlich ansteigenden letzten Umgang allen andern gegenüber; nur die folgende Art hat nähere Beziehungen zu ihr, doch sollen die Unterschiede bei Beschreibung derselben erörtert werden.

2. *Hemiglypta moussoni* (Semper.)

T. plerumque imperforata, depresse subsemiglobosa, vix angulata, solida, superne olivaceo-brunnea, inferne pallidior, infra peripheriam taenia fusca angusta ornata, lineis spiralibus valde impressis et striis transversis subaeque distantibus subregulariter granulata — granulis ca. 200 in 16 □ mm —, basi laevigata, nitens; spira parum elata lateribus convexis, fere semiglobosa, apice obtuso. Anfr. 6 lente accrescentes, supremi convexiusculi, ultimi convexi, ultimus tumidus, antice paullum dilatatus, vix ascendens. Apertura sat obliqua, exciso-elliptica, peristoma normale.

- a) Diam. maj. 33, alt. 20, apert. lat. 19,5, alt. 13 mm.
- b) " " 35, " 20, " 20 " 13 "
- c) " " 35,5, " 21,5, " 21 " 13,5 "

Rhysota Moussoni Semper Phil. p. 75. — *Nanina Bleinvilliana* Hidalgo l. x. p. 77 (ex parte), non Lea.

Hab. Vigan (Semper), San Estevan, M. Tirac in provincia Jlocos Sur (Dr. Schadenberg), Benguet (Roebelen).

Die anscheinend auf den Nordwesten von Luzon beschränkte Rasse — ich lasse den Semper'schen Fundort Mariveles im westlichen Mittelluzon einstweilen beiseite, weil ich keine Exemplare von dort vergleichen kann — schliesst sich wie erwähnt am nächsten an die vorige Art an, mit welcher sie wiederholt zusammengeworfen worden ist. Sie ist ihr in der Skulptur ähnlich, indem sie auch ziemlich regelmässige und kräftige Körnelung zeigt, welche indessen etwas feiner ist. Ferner ist *H. blainvilleana* fast einfarbig hellolivenbraun mit kaum merklichem Unterschied zwischen Ober- und Unterseite, *H. moussoni* oben wesentlich dunkler; das Gewinde der ersteren ist mehr oder weniger konisch erhoben mit wenig konvexen Seiten, das der

letzteren sehr gewölbt, fast halbkuglich. Ein wichtiger, ganz konstanter Unterschied liegt endlich in dem letztem Umgang, der bei *blainvilleana* niedrig, vorn kaum merklich verbreitert und deutlich etwas ansteigend ist, bei *moussoni* sich an der Mündung etwas verbreitert, kaum ansteigt und eine verhältnissmässig viel grössere Höhe zeigt. Es stellt sich dass Verhältniss von Höhe des letzten Umgangs zum grössten Durchmesser bei *H. blainvilleana* wie 3,2 : 10 bei *moussoni* wie 3,7—3,9 : 10.

Die oben erwähnten Fundorte liegen sämmtlich im Nordwesten von Luzon; nach Süden bildet die grosse Ebene von Mittelluzon zunächst eine Grenze, wenigstens für die typische Art. Jenseits derselben in dem isolirten Berglande der Provinzen Tarlac, Zambales, Pampanga und Bataan treten Formen auf, welche, wie nach dem Fundorten zu erwarten, sich *H. connectens* m. nähern, aber noch zu *H. moussoni* als Varietäten zu stellen sind. Die östliche Grenze des Gebietes dieser Art scheint die grosse Cordillera Madre, welche durch Nordluzon nordsüdlich verläuft, zu bilden; wenigstens besitze ich aus dem Thal Quiangan am Ostabhang derselben schon typische *H. semperi* m. und Uebergangsformen von letzterer Art zu *H. moussoni* fehlen gänzlich.

Die folgenden Formen stelle ich als Varietäten zu der vorliegenden Art:

var. nana v. Mlldff. Differt a typo testa minore, tenuiore, paullo subtilius granulata — granulis ca. 260 in 16 □ mm — anfractu ultimo distinctius angulato, minus alto. Diam. maj. 25—27, alt. 14—15,5 mm.

Nanina blainvilliana var *C. Hidalgo* l.c. p. 77
(ex parte.)

Provinz La Union, Nordwestluzon (Quadras). Diese kleine Form schliesst sich geographisch an *H. moussoni*

an, da La Union nördlich an die Provinz Ilocos Sur, östlich an Benguet grenzt, und theilt mit ihr die kräftige, regelmässige Körnelung, welche nur etwas feiner ist, wohl der geringeren Grösse entsprechend. Die Höhe des letzten Umgangs ist etwas grösser, 3,4 : 10, aber immer noch höher als bei *H. blainvilleana* Lea, von der sie auch sonst durch die feinere Skulptur und die schärfere Kantung verschieden ist.

var. arayatensis v. Mlldff. Differt a typo testa paullo minore, paullo subtilius granulata, spira altiore, taenia infraperipherica latiore, subdiluta. Diam. maj. 29, alt. 19 mm.

Berg Arayat, Pampanga.

Der isolirte erloschene Vulkan Arayat in der Mitte der Luzon-Ebene beherbergt eine ziemlich kleine *Hemiglypta*, welche schon Semper erwähnt und zu seiner *H. moussonii* rechnet, welche ich aber als besondere Varietät abtrennen muss. Sie schliesst sich im Allgemeinen der voranstehenden Varietät an, ist aber nicht so scharf gekantet, das Gewinde ist etwas höher, die Binde unter der Peripherie breiter und nach unten nicht scharf begrenzt, sondern abblässend.

var. transitans v. Mlldff. Differt granulis paullo minoribus, spira magis depressa, taenia latiore. Diam. maj. 30, alt. 18,5 mm.

Berge bei Bamban, Grenze der Provinzen Tarlac und Pampanga, sowie letztere Provinz (ohne näheren Fundort, wahrscheinlich bei Porac).

Auch diese Form von den Bergen westlich gegenüber dem Arayat gehört nach der zwar etwas feineren, aber regelmässigen und tief eingeschnittenen Granulirung noch zu *H. moussonii*, ihre Beziehungen zu *H. connectens* sollen unten besprochen werden.

3. *H. semperi* v. Mlldff.

T. obtecte perforata, depresso-orbicularis, acute carinata, crassiuscula, superne griseo-fusca, striis transversis confertis — circa 20—24 in 4 mm — et lineis spiralibus parum impressis magis distantibus inaequaliter minute granulata, basi radiatim subtiliter striatula, nitidissima, olivaceo-virescens; spira depresso-conoidea. Anfr. 6—7 planulati, ultimus superne convexiusculus, infra carinam convexior, medio impressus. Apertura modice obliqua, angusta, angulato-lunaris, peristoma rectum, obtusum, in adultis intus callose labiatum, ad columellam expansum, reflexiusculum, marginibus callo tenui junctis.

Diam. maj. 54, alt. 25, apert. diam. 30, alt. 16 mm.
? *Helix panayensis* (Broderip) Pfr. P. Z. S. 1842, p. 46, Mon. Hel. I, p. 75 (excl. var.) Chenn. ed. II, Hel. no. 215, t. 30, f. 1—3. — *Nanina (Hemiplecta) panayensis* Tryon Man. Pulm. II, p. 44, t. 14, f. 96, 97. — *Helix semigranosa* Sowerby (ex parte). — *Rhysota semigranosa* Semper Phil. p. 74. — *Nanina semigranosa* Hidalgo Obras 1890, p. 78, Atlas t. VIII, f. 5, 6.

Luzon: Provinz Cagayan (Cuming teste Pfr.), Palanan, Cabo Engaño, Casiguran, Baler, an der Nord-Ostküste (Semper), Pena Blanca bei Tuguegarao Provinz Cagayan (Hennig), Quiangan in Nueva Vizcaya (Dr. Schadenberg).

Warum ich die Art, welche Semper für die echte *H. semigranosa* Sow. hält, neubenenne, habe ich oben schon angedeutet. Mag Sowerby auch diese Form als Typus seiner Sammelart angesehen haben, was aus seiner Beschreibung nicht hervorgeht; sicher ist, dass sein Name mehrere Arten einschliesst und nach dem von ihm angegebenen Fundort Luban auch *H. blainvilleana* Lea, also grade Pfeiffer's *semigranosa*. Um Verwirrung zu vermeiden,

halte ich es daher für besser den Sowerby'schen Namen ganz zu unterdrücken, so lange überhaupt mehr als eine Hemiglypta-Art von den Philippinen unterschieden werden soll. Den Broderip-Pfeiffer'schen Namen *H. panayensis* für die vorliegende Art des äussersten Nordostens zu verwenden, ist auch nicht möglich. Dass eine Hemiglypta auf der Insel Panay vorkommt, ist weder mit Sicherheit zu bestreiten noch zu behaupten; Quadras versichert allerdings, dass er todte Exemplare einer gekielten Hemiglypta in der Sammlung eines auf Panay stationirten Beamten gesehen habe; doch ist das bei der hiesigen Art zu sammeln kein Beweis, dass die Stücke wirklich von dieser Insel stammten. Nach der Verbreitung dieser Formen wäre weder das Fehlen noch das Vorkommen eines Repräsentanten der Gattung auf Panay besonders auffallend. Sie scheint auf Cebu, Negros und Mindoro gänzlich zu fehlen; hiernach sollte man auf Panay keine Art erwarten. Auf der andern Seite kommt eine Form auf der Insel Marinduque vor, und von Masbate, welche Insel sich zwischen Luzon und Panay einschiebt, wissen wir noch sehr wenig, sodass ein Vorkommen auf Panay sich durch eine alte Landverbindung mit Luzon, die später unterbrochen wurde als die der obigen Inseln, erklären liesse. Was aber nach der Ausbreitung der Rassen, wie wir sie bisher kennen, ganz unwahrscheinlich ist und was ich zunächst nicht glauben kann, ist das sprungweise Wiederauftreten der Art des Nordosten von Luzon auf der südlichen Insel, während im weiten dazwischen liegenden Gebiet ganz andere Formen vorkommen. Wenn daher wirklich eine Hemiglypta auf Panay vorkommt, so wird sie nicht mit *H. semperi* identisch sein; ich würde eher eine scharf gekielte niedrige Form von *H. semiglobosa* oder *mayonensis* dort vermuten. Keinesfalls möchte ich eine Art, welche mit Sicherheit nur von einem beschränkt-

ten Gebiet Luzons bekannt ist, mit dem Namen panayensis bezeichnen.

Was die Abgrenzung der Art anbelangt, so ist sie von der Rasse des Nordostens, *H. moussonii* Semp., durch feine und weniger tief eingeschnittene Granulirung, welche wegen des grösseren Abstandes der Spirallinien aus länglichen Knötchen besteht, den scharfen Kiel, die flachen Windungen, den sehr niedrigen letzten Umgang scharf geschieden. Übergänge aus dem centralen Berggebiet von Nordluzon fehlen noch gänzlich, sind auch wahrscheinlich nicht zu erwarten, da in Kiangan am Ostfuss der Centraleordillere schon typische *H. semperi* auftritt, während in Benguet und Lepanto, also nicht weit von der Westseite der Kette, echte *H. moussonii* gefunden wurde; wahrscheinlich ist das sehr alte Gebirge schon seit Urzeiten eine Grenzscheide gewesen und Übergänge zu den andern Rassen sind an der Ostseite von Luzon nach Süden zu suchen, wo an der Nordgrenze der Provinz Bulacan das Gebiet der folgenden Art beginnt. Von dem südlichsten Punkt, von wo Semper die ihm gewidmete Art angiebt, Baler an der Ostküste, bis zu dem nördlichsten uns bis jetzt bekannten Fundort von *H. connectens* m., Sibul in Bulacan, liegt eine beträchtliche Strecke Bergland, welches bis vor kurzem noch gänzlich unerforscht war; hier waren also von vornherein Übergangsformen zu erwarten. Es war deshalb keine Überraschung für mich als mir der unmüdliche Roebelen in diesem Sommer von Dingalan, Provinz Nueva Ecija, ebenfalls an der Ostküste, etwa 40 Kilometer südlich von Baler, einige Hemiglypten mitbrachte, welche zwar entschieden noch zu *H. semperi* gehören, aber in mancher Beziehung Übergänge zu der folgenden Art zeigen. Ich nenne sie.

var. *tumidula*. Differt spira altiore, anfractibus magis convexis. Diam. maj. 44—49, alt. 28—29, apert. lat. 27—29, alt. 15—16 mm.

Die Sculptur ist genau dieselbe wie beim Typus, auch das Verhältniss der Höhe des letzten Umgangs zum Diameter, 3,4 : 10, daher auch die Mündung verhältnissmässig eng. Das Gewinde ist etwas mehr erhoben, die Windungen aber erheblich gewölbter, etwa so stark wie bei folgender Art, an welche sie dadurch näher herantritt.

Dass *H. semperi* durch die folgende Art schliesslich auch mit *H. moussonii* verknüpft, werde ich bei Beschreibung der nächsten Form erörtern.

4.) *Hemiglypta connectens* v. Middff.

T. obiecte perforata, convexo-depressa aut depresso-globosa, solida, angulata aut obtuse carinata, superne olivaceo-fusca, striis transversis paullum rugulosis confertis — ca. 20—24 in mm — et lineis spiralibus parum impressis magis distantibus — 14—16 in 4 mm — inaequaliter minute granulata, basi radiatim subtiliter striatula, nitens, lacte olivaceo-virens; spira conoidea lateribus convexiusculis, plus minusve elevata. Anfr. 6, supremi convexiusculi, ultimi convexiores, ultimus tumidus, antice paullum dilatatus. Apertura parum obliqua, late elliptica, valde excisa, peristoma rectum obtusum, intus valde calloso-labiatum.

Diam. maj. 36, alt. 21, apert. diam. 20, alt. 12,5 mm.

"	"	40,5,	"	25,	"	23,5,	"	15,	"
"	"	42,	"	25,5,	"	23,5,	"	15,	"
"	"	42,	"	27,	"	24,	"	14,5,	"
"	"	44,	"	27,	"	25,5,	"	15,5,	"

f. conoidea. diam. 31,5—36, alt. 23—24.

var. *grandis* m.: testa major, persolida, peristoma valde callosum. Diam. 48—50, alt. 28—29.

?*Helix panayensis* var. B. Pfr. Mon. Hel. I, p. 75. — *Helix semigranosa* Sow. (ex parte). — *Nanina Blainvilliana* Hidalgo I. c. (ex parte).

Mittelluzon: Antipolo, Bosobosa, Montalban bei Manila; Norzagaray, Bayabas, Sibut in der Provinz Bulacan.

Hidalgo und ich selbst haben diese Rasse des östlichen Mittelluzons irrthümlich zu *H. blainvilleana* Lea gestellt, mit der sie indessen in keiner Weise verbunden werden kann. Dagegen bildet sie, wie schon erwähnt, ein Mittelglied zwischen *H. moussoni* und *semperi*. Mit ersterer theilt sie die verhältnissmässig grosse Höhe des letzten Umgangs (3, 8 : 10), unterscheidet sich aber durch bedeutendere Grösse, etwas weniger gewölbte Windungen und durch die Skulptur, welche einerseits bedeutend feiner, anderseits ungleichmässig ist, d. h. wegen des grösseren Abstandes der Spirallinien aus länglichen Knötchen besteht. Diesen letzteren Charakter theilt sie mit *H. semperi*, von der sie sich aber durch die Wölbung der Windungen, den schwächeren Kiel, die Höhe der letzten Windung unterscheidet. In der Kantung oder Kielung des letzten Umgangs steht sie etwa in der Mitte zwischen beiden, ebenso in der Grösse. Nimmt man als obersten Eintheilungsgrund die Skulptur, so stehen *H. semperi* und *connectens* der *H. moussoni* gegenüber, legt man Gewicht auf die Höhe des letzten Umgangs, so bilden *H. connectens* und *moussoni* ein Paar gegenüber der engmündigen *H. semperi*. Nach beiden Arten hin lassen sich Uebergänge denken und zum Theil sind sie, wie oben angedeutet, bereits gefunden. Die oben beschriebenen Varietäten von *H. moussoni* vom Arayat und dem isolirten Berglande des westlichen Mittelluzon lassen sich wohl als Uebergang zu *H. connectens* auffassen, da sie schon etwas feinere Körnelung und etwas deutlichere Kantung der Peripherie zeigen. Immerhin ist die Skulptur aber noch wesentlich gröber als die von *connectens* und die tiefere Einschneidung der sie bildenden Linien und ihre regelmässigen Abstände weisen auf *moussoni* hin. Es fehlen uns noch Vertreter der Gruppe aus den Provinzen Bataan

in Westmittelluzon und Batangas und Cavite südlich von der Bai von Manila, welche vielleicht weitere Uebergangsformen bieten werden. Nach Norden hin ist die oben erwähnte var. *tumidula* als Uebergang zu *semperi* zu betrachten, doch fehlt auch da noch ein wirkliches Verbindungsglied, welches ich in einer Form mit höherem letzten Umgang als *H. semperi*, niedrigerem als *connectens* finden würde. Auch hier sind aber noch geographische Lücken auszufüllen, die solche Formen noch bieten können. Wenn die Erforschung aller dieser Grenzgebiete wirklich weitere Uebergangsformen ergeben sollte, so würde schliesslich nichts dagegen einzuwenden sein, die 3 besprochenen Formen von Nord- und Mittelluzon als Varietäten einer Art aufzufassen. Es würden dann grade die beiden extremen Formen, welche Semper und z. Th. auch Hidalgo als verschiedene Arten betrachten, zusammenfallen. Selbst in solchem Falle würde ich der kombinirten Art *moussonis-connectens* — *semperi* die insulare *blainvilleana* als eigene Art gegenüberstellen. Einstweilen will ich aber hervorheben, dass am gleichen Fundorte nur geringe individuelle Schwankungen und diese fast nur in der Höhe des Gewindes, der Grösse und der Färbung bemerkbar sind und halte zunächst daran fest, die geographisch wie conchyliologisch fest umschriebenen Lokalrassen als Arten zu behandeln, bis uns die Ausfüllung der noch vorhandenen Lücken ein sicheres Urtheil ermöglicht.

5. *Hemiglypta mayonensis* Hidalgo.

T. obtecta perforata, semiglobosa, sat solida, superne striis transversis et lineis spiralibus impressis minutissime regulariter granulata — granulis ea. 625 in 16 [] mm —, olivaceo-fulva, subtus glabrata, nitens taenia lata castanea cincta, tum laete olivaceo-virens; spira sat elevata, lateribus bene convexis. Anfr. 6 con-

vexiusculi, ultimus bene convexus, carina obtusa sed sat exserta cinctus. Apertura sat obliqua, late elliptica, valde excisa, peristoma rectum, obtusum, intus calloso-labiatum.

Diam. maj. 35,5, alt, 23, apert. lat. 20, alt. 12 mm.

Nanina mayonensis Hidalgo J. de Conch. 1887 p. 5, 1888 t. V. f. 8. Obras 1890 p. 19, 79 (excl. var. B) Atlas t. V f. 1 (non f. 2). — *Nanina semiglobosa* v. Mart. Ostas. 1867 p. 94 (ex parte).

Südostluzon: Sorsogon und Berg Mayon (Quadras), Daraga (Jagor und einheimische Sammler), alle in der Provinz Albay.

Hidalgo hat seine Art einerseits nicht beschrieben, sondern nur kurz auf ihre Unterschiede von *H. fulvida* Pfr. aufmerksam gemacht, andererseits eine gänzlich verschiedene Form von der Insel Catanduanes, die ich unten als *H. microglypta* beschreibe, als Varietät mit ihr vermengt. Ich stimme Semper darin bei, dass *H. fulvida* Pfr. eine junge *semiglobosa* ist; ob Reeve's angebliche *fulvida* in der That = *mayonensis* Hidalgo ist, wie Letzterer angiebt, kann ich nicht feststellen. Zu vergleichen ist *H. mayonensis*, die ich für eine gute Art halte, mit *semiglobosa* Pfr. mit welcher sie auch v. Martens identificirt hat. Sie unterscheidet sich von ihr durch die regelmässige, dabei feinere Körnelung, den Unterschied zwischen der Färbung der Ober- und Unterseite, die breite Binde unter der Peripherie, den stumpferen aber dabei stärker abgesetzten Kiel. Im Habitus und der Färbung schliesst sie sich meiner *H. connectens* an und ist hauptsächlich durch die feinere Granulirung von ihr verschieden; sie bildet daher wie geographisch so auch durch die Schale einen Übergang zwischen den Rassen von Mittelluzon und der auf den südlichen Inseln heimischen *H. semiglobosa*. Wenn der von mir als hauptsächlichster

Scheidungsgrund der Hemiglypten angesehene Skulpturunterschied nicht als spezifischer Charakter gelten soll, so könnte die vorliegende Rasse ebenso gut an die etwa kombinirte Luzon-Rasse *moussonii-connectens-semperi* angeschlossen werden als an *semiglobosa*, und wir würden dann, wie oben schon erwähnt, auch *semiglobosa* nur als Varietät der einen philippinischen *Hemiglypta* anerkennen müssen. Da dies so lange wir überhaupt „Arten“ im bisherigen Sinne unterscheiden wollen, nicht angeht, so bleibt nichts übrig als alle unterscheidbaren Lokalrassen als Arten besonders zu benennen.

var. boacensis Hid, Differt a typo umbilico aperto, spira magis depressa, anfr. paullo convexioribus, colore pallidiore.

Nanina semiglobosa var. boacensis Hidalgo J. de Conch. 1887 p. 50, Obras 1890 p. 79, Atlas t. V f. 6.

Insel Marinduque (Quadras, Roebelen). Wenn *H. mayonensis* und *semiglobosa* überhaupt artlich getrennt werden sollen, so kann die der Insel Marinduque zwischen Luzon und Mindoro eigenthümliche Rasse nur zur ersteren gestellt werden, der sie sowohl in der Skulptur als auch in der Färbung nahe steht. Hauptunterschied ist der offene Nabel, der sie von allen andern Hemiglypten unterscheidet.

Eine weitere Varietät von Lupi, Provinz Camarines Sur (nordwestlich von der Provinz Albay), von welcher Quadras nur ein Stück besitzt, möchte ich noch nicht benennen. Die Skulptur ist noch feiner als bei *H. mayonensis*, je 36 Körnchen auf 4 mm, also über 1200 auf 16 □ mm, im übrigen schliesst sich die Form an *mayonensis* an; sie könnte als Uebergang von dieser zu *H. cuvieriana* aufgefasst werden. Grade aus dem Grenzgebiet, wo sich die Verbreitungsbezirke von *H. connectens*, *cuvieriana*, *mayonensis* mischen, den Provinzen Laguna, Tayabas, Camarines Norte und Sur, ist unser Material noch sehr spärlich.

Hidalgo führt die Form von Lupi als var. B. von H. blainvilleana auf, was nur bei gänzlicher Nichtachtung der Skulptur, also des einzigen durchgreifenden Artunterschiedes möglich war. Selbst wenn man statt blainvilleana meine connectens setzt, die Hidalgo mit jener zusammenwirft, so ist die Zuweisung jener Form nur denkbar, wenn man auch mayonensis und cuvieriana, kurz alle Heiniglypten in einen Topf wirft. Wer solche Skulpturunterschiede, die auch ohne Zählung und ohne Lupe ins Auge springen, nicht sieht, mit dem wird eine Verständigung allerdings kaum zu erreichen sein.

6. *Hemiglypta semiglobosa* Pfr.

T. semiobtecte perforata, semiglobosa aut depresso semiglobosa aut conoideoglobosa, lutescenti-cornea aut corneo-castanea, superne et inferne subaequaliter colorata, striis transversis confertis — ca. 21—24 in 4 mm — et lineis spiralibus impressis — ca. 17 in 4 mm — inaequaliter minute granulata; spira aut depressa aut conoidea-elevata. Anfr. 6 planulati sutura parum impressa discreti, ultimus plus minusve acute carinatus, infra carinam parum exsertam taenia brunnescente aut fusca angusta subtus diluta cinctus. Apertura sat obliqua, late elliptica, parum excisa, peristoma simplex, acutum, margine columellari late reflexo perforationem semitegente.

Diam. 47, alt. 26, apert. lat. 26, alt. 17 mm. (Leyte)

„	41,5	„	27	„	23	„	15	„	(„)
„	41	„	24	„	23	„	14	„	(Samar)
„	43	„	24	„	24	„	14,5	„	(Bohol)
„	49,5	„	32	„	28	„	18	„	(Siargao)
„	40	„	23	„	22	„	13,5	„	(Nord Mindanao)
„	41	„	25	„	22	„	14	„	(Ost „)
„	48	„	37	„	28	„	19	„	(Südost „)
„	51	„	25	„	22	„	13	„	(„ „ „)

Helix semiglobosa Pfr. P. Z. S. 1845, 38, Mon. Hel. I. p. 75 — *Rhysota semiglobosa* Semper Phil. p. 73, t. I. f. 2. — *Nanina semiglobosa* Hidalgo J. de Conch. 1887 p. 50, Obras p. 78 (excl. var.) Atlas t. V, f. 5.

Hab. Leyte (Cuming, Koch, Quadras) — Samar (Cuming, Semper, A. Gutmann) — Bohol (Semper, Koch) — Panaon bei Leyte (Semper) — Siargao (Micholitz) — Mindanao: (Semper), Dalacogon am oberen Agusan (Röbeln), Bislig (Koch), Davao (Röbeln) — Basilan (Semper).

Diese auf den südlichen Inseln weitverbreitete Art besitze ich von den meisten obenerwähnten Fundorten leider nur in wenigen Exemplaren, so dass ich die Grenzen ihrer Variabilität und das Verhältniss der einzelnen Inselrassen zu einander noch nicht mit Sicherheit feststellen kann. Die Formen der 3 Visayas-Inseln, Samar, Leyte und Bohol, sind durchschnittlich schärfster gekantet als die von Mindanao und bieten auch unter sich kleine Unterschiede in der Skulptur, Gestalt und Färbung, aber um Varietäten abzutrennen, ist mein Material von den einzelnen Fundorten noch zu schwach.

Ihre Verwandtschaft mit der voranstehenden Art ist schon hervorgehoben worden. In der Skulptur steht sie *H. connectens* m. nahe, doch ist die Granulirung durchschnittlich noch feiner und weniger tief eingeschnitten, auch etwas weniger unregelmässig, d. h. die Spirallinien sind etwas dichter. Im übrigen unterscheidet sie sich von *H. connectens* durch die dünnere Schale, den schärferen Kiel, die gleichmässige Färbung der Ober- und Unterseite, die sehr schmale Binde, die stets offene Durchbohrung, den verhältnismässig niedrigeren letzten Umgang. Trotz dieser zahlreichen Unterschiede kann ich nur wiederholen, dass bei Degradirung der vorangegangenen 5 Arten zu

Varietäten einer Art auch *H. semiglobosa* einer solchen Combination zum Opfer fallen müsste.

7. *Hemiglypta globosa* Semper.

T. omnino obiecte perforata, depresso-globosa, sat solidula, fulvo-castanea, striis transversis rugulosis — 20—24 in 4mm. — et lineis spiralibus parum impressis — 16—20 in 4 mm. — minute granulata, subnitens; spira globoso-conoidea. Anfr. 6, supremi convexiusculi, ultimi convexi, ultimus tumidus, carina parum distincta cinctus. Apertura sat obliqua, rotundato-elliptica, sat excisa, peristoma rectum, obtusum, intus vix callosum, margine columellari dilatato reflexo, perforationem omnino tegente.

Diam. 54,5, alt. 41, apert. lat. 31, alt. 21 mm.

Rhysota globosa Semper Phil., p. 75 t. II. f. 3a—c. — *Nanina (Hemiplecta) globosa* Tryon Man. Pulm. II 1886 p. 35, t. VII f. 13. — Hidalgo Obras 1890 p. 77, Atlas t. VII f. 4. —

Hab. Nord-Mindonao: Higaquit (Semper, Quadras), Placer (Quadras), Mainit (Quadras, Roebelen).

So wenig befriedigend Sempers Beschreibung und Abbildung seines sichtlich jungen und beschädigten Unikums ist, so hat Hidalgo doch unzweifelhaft Recht, wenn er die von Quadras am Originalfundort, sowie von ihm und Röbeln an mehreren andern Stellen von Nordost-Mindanao aufgefundenen *Hemiglypta* auf Sempers Art bezieht. Die Art steht indessen auf schwächeren Füßen als die von mir oben von Luzon unterschiedenen Rassen. Skulptur und Färbung sind fast dieselben wie bei *H. semiglobosa*; die Unterschiede sind der schwächere Kiel, die festere Schale, die stärker gewölbten Windungen, der geschlossene Nabel, der verhältnismässig höhere und aufgeblasene letzte Um-

gang und die dadurch rundere, der Kreisform sich nähernde Mündung. Verhältniss des Durchmessers zur Höhe des letzten Umgangs ist bei *H. semiglobosa* wie 10 : 3,4—3,6, bei *globosa* 10 : 3,9—4, also ein ähnlicher Unterschied wie zwischen *H. semperi* und *connectens*. Bemerkenswerth ist ferner noch, dass bei *H. globosa* die Spiralskulptur gelegentlich auf die Unterseite übergreift, eine etwa 3—4 mm breite Zone bildend, eine Eigenschaft, welche vom Gattungstypus etwas abweicht und welche bei der folgenden Art Regel ist.

Die Annäherung an *H. semiglobosa* wird noch verstärkt durch die folgende Varietät, welche sichtlich einen Übergang bildet:

var. *depressa* v. Mlldff. Differt spira minus elevata, anfractu ultimo distinctius carinato, minus tumido, antice paullulum ascendentē.

Diam. 50, alt. 28, apert. lat. 28,5, alt. 17 mm.

Jabonga, Nordost Mindanao (Quadras).

Der gedrücktere letzte Umgang und die deutlichere Richtung weisen sichtlich auf *H. semiglobosa* hin, während die Wölbung der Windungen immer noch wesentlich stärker ist, als bei dieser Art.

8. *Hemiglypta infrastriata* v. Mlldff.

T. fere obtecte perforata, depresso turbinata, solida, olivaceo-castanea, striis transversis valde obliquis et lineis spiralibus sat impressis subregulariter minutissime granulata, granulis ea. 441 in 16 □ mm, superne sericina; spira subregulariter conoidea, sat elevata. Anfr. 6 superiores planulati, penultimus convexiusculus, ultimus bene convexus, ad suturam peculiariter applanatus, ad peripheriam subacute carinatus, antice paullatim sat

ascendens, subtus fascia sat lata diluta fusca cinctus, usque ad medium basin lineis spiralibus valde confertis decussatus, circa umbilicum excavatus, glabratus, nitens. Apertura modice obliqua angulato-elliptica, valde excisa, peristoma rectum, obtusum, margine supero bene curvato, columellari albocalloso, superne dilatato, reflexo, perforationem fere obtegente.

Diam. maj. 57, alt. 33, apert. lat. 35, alt. 18 mm.

Hab. Bislig, Ostmindanao.

Diese schöne Form, die grösste der Gattung, verdanke ich Herrn O. Koch in Cebu. Sie schliesst sich den beiden vorangegangenen Arten an, namentlich der letzteren, hat aber durch die engerstehenden Spirallinien eine gleichmässige Körnelung, der letzte Umgang ist unverhältnissmässig stärker gewölbt als die oberen und dabei an der Naht eigenthümlich abgeflacht; er steigt nach der Mündung allmählich etwas an. Die Mündung ist sehr niedrig, das Verhältniss des Durchmessers zur Höhe des letzten Umgangs wie 10 : 3,16, der obere Mundsaum ist auffallend nach oben geschwungen. Die Spiralskulptur reicht auch auf die Unterseite und zwar etwa bis zum Unterrande der sehr viel breiteren Binde. Dieser Charakter, der hier regelmässig auftritt, während er schwächer auch bei einzelnen Stücken der vorigen Art zu beobachten ist, lässt sich als Vermittelung zwischen Hemiglypta und den eigentlichen Hemiplecta, d. h. den fein gerunzelten Rhysota-Arten wie *Rhysota humphreysiana* Lea, auffassen.

9. *Hemiglypta cuvieriana* (Lea)

T. semiobtecte perforata, convexo-depressa, tenuis, subacute carinata, striis transversis et lineis spiralibus parum impressis, maxime confertis minutissime granulata — granulis plus quam 1600 in 4 \square mm —.

olivaceo-lutea, infra carinam zona lata castanea cincta; spira depressa, convexo-conoidea. Anfr. $5\frac{1}{2}$ subplani, sutura impressa discreti, ultimus superne convexiusculus, inferne bene convexus, medio excavatus. Aertura parum obliqua, elliptica, sat excisa, peristoma rectum, obtusum, intus paullum albocallosum, margine columellari superne dilatato, breviter reflexo.

Diam. maj. 36,5, alt. 19, apert. lat. 22, alt. 12 mm.

Helix cuvieriana Lea Trans. Am. Phil. Soc. 2 ser. VII, p. 461, t. XII, f. 12. — Pfr. Mon. Hel. I, p. 77. — *Nanina (Hemiplecta) cuvieriana* Tryon Man. Pulm. II 1886, p. 38, t. XIII, f. 65, 66 (valde mediocres).

var. *brunnescens* v. Mlldff. t. brunneo-olivacea, anfractibus paullo convexioribus, area columellari castanea. Diam. 33,5 alt. 17, apert. lat. 19,5 alt. 12 mm.

var. *acutangula* v. Mlldff. t. majore, solidiore, acutius carinata, spira magis depressa. Diam. 43, alt. 20, apert. lat. 24,5, alt. 13,5 mm.

Nanina (Hemiplecta) curieriana Hidalgo Obras 1890, p. 79, Atlas t. VI, f. 6.

Den Typus dieser Art besitze ich von Majayjay, Provinz Laguna, die erste Varietät von der Insel Polillo, die zweite entdeckte Quadras auf der Insel Catanduanes. Die letztere hält Hidalgo für den Typus der Lea'schen Art; aber ein Blick auf Lea's Figur und Beschreibung zeigt, dass sie sehr beträchtlich abweicht und daher als Varietät abzutrennen ist. Dagegen stimmt meine Form von Majayjay recht gut zu der Beschreibung und Abbildung; ich glaube sogar, dass Lea's Original aus derselben, von Manila aus häufig besuchten Gegend stammte, da er eine Reihe von Arten wie Cohl. woodiana, alberti, dactylus, chloroleuca gleichzeitig beschreibt, die alle an den Hängen des Berges Banahan zu Hause sind.

H. cuvieriana bildet mit der folgenden Art eine etwas abweichende Gruppe, namentlich durch die ausnehmend feine Körnelung, die kaum noch zu zählen ist. Auch ist bei ihr die Skulptur, wenn auch schwächer, auf die Unterseite ausgedehnt. Ihr Verbreitungsgebiet wird die noch wenig erforschten Provinzen Tayabas und Camarines Norte einschliessen, während die beiden Küsteninseln Polillo und Catanduanes je eine Varietät beherbergen. Eine wahrscheinliche Uebergangsform zu *H. mayonensis* aus der Provinz Camarines Sur habe ich oben schon erwähnt. Nach Norden ist der Fundort nicht mehr weit von dem Gebiet der *H. connectens* entfernt; aber Mittelformen zwischen dieser festschaligen, viel stärker granulirten Rasse und *H. cuvieriana* sind kaum zu erwarten.

10. *Hemiglypta microglypta* v. Mlldff.

T. semiobtecte perforata, subgloboso-depressa aut depresso globosa, solidula, superne microscopice regulariter granulata, oleacino-sericina, olivaceo-brunnea, subtus subglabrata, nitens, zona lata castanea ornata, tum laete olivaceo-virens. Spira plus minusve conoideo-semiglobosa. Anfr. $5\frac{1}{2}$, supremi planulati, penultimus convexiusculus, ultimus bene convexus, subtus tumidus, ad peripheriam obtuse angulatus, linea angusta pallida cinctus. Apertura parum obliqua, rotundata, valde excisa, peristoma rectum, obtusum, intus paullum albocallosum, margine columellari superne dilatato, breviter reflexo.

Diam. maj. 30, alt. 16, apert. lat. 17,5 alt. 11,5 mm

" " 29 " 18 " " 17 " 11 "

" " 28,5 " 19 " " 16 " 11 "

Nanina mayonensis var. *B.* Hidalgo J. de Conch. 1887
p. 51, Obras 1890 p. 19, 79, Atlas t. V, f. 2.

Hab. Catanduanes (Quadras).

Trotz der Aehnlichkeit in der Färbung und Zeichnung, namentlich der Unterseite, mit *H. mayonensis* kann diese Form wegen des ausserordentlichen Unterschiedes in der Skulptur nicht zu dieser Art gestellt werden. Die Granulirung ist mit blossem Auge kaum sichtbar und auch mit der Lupe bin ich nicht im Stande die Körnchen zu zählen; sie sind sichtlich noch feiner als bei *H. cuvieriana*, während bei der echten *mayonensis*, die ich in Quadras Sammlung vergleichen konnte, die Körnelung mit blossem Auge sehr deutlich und mindestens dreifach so grob ist. Dagegen liesse sich die insulare Rasse eher an *H. cuvieriana* als Varietät anschliessen, der sie in der Skulptur nahe steht. Sie ist kleiner, nicht gekielt, sondern nur schwachkantig, das Gewinde halbkuglig, die Windungen gewölbter, namentlich die letzte, dieselbe auch verhältnissmässig höher, 3,8 : 10 statt 3,3 : 10 bei *cuvieriana*, die Färbung ist oben dunkler und wie erwähnt, die Skulptur noch feiner. Auch ist dieselbe auf der Unterseite viel mehr abgeschwächt, die Basis daher glänzender. Hiernach wird sie sich als Art halten lassen.

Die Unterschiede der vorstehenden Arten lassen sich in folgendem Schema zusammenfassen:

A. Körnelung grob, regelmässig

- a) Skulptur 12 : 12, Höhe der letzten Windung 3,2 : 10.
 1. *H. blainvilleana* Lea.
- b) Skulptur 14 : 14, Höhe der letzten Windung 3,7—2,9.
 2. *H. moussonii* Semp.

B. Körnelung mittel, unregelmässig.

- a) Skulptur 20—24 längs, 12—14 quer, scharf gekielt, Windungen fast flach, Höhe der letzten Windung 3,4.
 3. *H. semperi* v. Middff.

b) Skulptur 20—24 längs, 14—16 quer, mässig gekantet, Windungen gewölbt, Höhe der letzten 3,8.

4. *H. connectens* v. Mlldff.

C. Körnelung flach.

a) regelmässig, 25 : 25, Färbung unten heller, Peripheriebinde breit.

5. *H. mayonensis* Hid.

b) unregelmässig, Färbung oben und unten gleich, Binde schmal.

aa) Windungen wenig gewölbt, Skulptur 24 : 17, scharf gekantet.

6. *H. semiglobosa* Pfr.

bb) Windungen stark gewölbt, Skulptur 21—24 : 16—20.

7. *H. globosa* Semp.

D. Skulptur auf die Unterseite fortgesetzt.

a) bis zur Mitte der Basis, Körnelung 21 : 21.

8. *H. infrastriata* v. Mlldff.

b) bis zum Nabel, Körnelung mikroskopisch fein.

aa) gekielt, Höhe der letzten Windung 3,2.

9. *H. cuvieriana* Lea.

bb) stumpfkantig, Höhe der letzten Windung 3,8.

10. *H. microglypta* v. Mlldff.

Die geographische Vertheilung über den Archipel weist verschiedene Anomalien auf. Zunächst fehlt die Gruppe auf dem westlichen Theil der Visayas oder mittleren Inseln, nämlich Mindoro, Tablas, Romblon, Sibuyan, vielleicht auch Panay (vergl. oben), sicher Negros, Cebu und Siquijor. Zweifelhaft bleiben die zwischen den Visayas und Luzon gelegenen kleineren Inseln Masbate, Ticao und Burias. Es

ist dabei hervorzuheben, dass die Rhysota-Arten der engeren Gruppe von *Rhysota lamarckiana* Lea anscheinend auf die Inseln beschränkt sind, auf welchen *Hemiglypta* fehlt, während im bisher bekannten Verbreitungsgebiet von *Hemiglypta* keine Arten der *lamarckiana*-Gruppe gefunden worden sind. Dies dürfte darauf schliessen lassen, dass hier ein phylogenetischer Zusammenhang besteht und dass sich jene feingerunzelten Rhysota-Arten aus *Hemiglypta* entwickelt haben. Für die Verbreitung der bekannten *Hemiglypta*-Formen lässt sich im Allgemeinen das Prinzip aufstellen, dass die Entwicklung von Südosten nach Nordwesten fortschreitet und dass namentlich die Stärke der Skulptur in dieser Richtung zunimmt. Fangen wir mit den Arten von Mindanao, *H. infrastriata* und *globosa* an, so finden wir in diesen durch die theilweise Streifung der Unterseite einen gewissen Anklang an *Rhysota* (*Hemiplecta*); hieran schliesst sich theils auf Mindanao selbst, theils auf den nordnordwestlich gelegenen Inseln Bohol, Leyte und Samar *H. semiglobosa*. Auf der von Samar nur durch einen schmalen Kanal getrennten südöstlichen Halbinsel finden wir sodann die nächstverwandte *H. mayonensis*. Hier tritt nun zunächst eine Lücke auf, bis wir in den Bergen östlich von Manila auf *H. connectens* stossen. In dem dazwischen liegenden Gebiet müssten wir Zwischenglieder zwischen den beiden letztgenannten Arten erwarten: statt dessen schiebt sich hier, soweit die betreffenden Gegenden bekannt sind, *H. cuvieriana* ein, welche als eine Weiterentwicklung von *H. mayonensis* im gegentheiligen Sinne d. h. mit weiterer Abschwächung der Skulptur zu betrachten ist, während Uebergänge zu *H. connectens* noch fehlen. Trotzdem ist es leicht möglich, dass sich auch die letzteren im nordwestlichen Theile der bisher wenig gründlich erforschten Halbinsel noch finden. Wir würden dann von *H. mayonensis* zweierlei Abzweigungen annehmen

können: nach Nordwesten, wo das Klima trockener wird, Uebergang zu den festschaligen, gröber skulptirten Formen von Mittel- und Nordluzon, nach Norden und Nordosten, der sehr feuchten pacifischen Küste von Südostluzon und den Inseln Catanduanes und Polillo den Seitenast der sehr fein gekörnelten, dünnshaligen *H. cuvieriana* und *microglypta*. Eine ähnliche Bifurkation der Entwicklung geht von *H. connectens* aus; nach Norden schliesst sich ihr die Art des Nordostens *H. semperi* an, nach Westen und Nordwesten, durch Uebergangsformen verknüpft, *H. moussonii*. Auch hier ist noch, wie oben bereits erwähnt, eine Lücke, indem wir von dem südlich von der Manilabai gelegenen Theile der Insel (Cavite, Batangas) noch keine Vertreter kennen. Hier werden wir weitere Zwischenglieder zwischen *H. connectens* und *moussonii* zu erwarten haben. Den Schluss macht die am weitesten nach Westen vorgeschoßene und am stärksten granulirte *H. blainvilleana* der Insel Luban. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die verschiedene Entwicklung der Schalenstruktur aus klimatischen Gründen zu erklären ist. Je grösser die Gegensätze zwischen einer trocknen und feuchten Jahreshälfte, je nach dem herrschenden Monsun sind, desto mehr Bedürfniss ist zu einem besseren Schutze durch Verstärkung der Schale vorhanden, und in der That hat die Westhälfte von Luzon, während des Nordostmonsuns, der als trockner Landwind anlangt, einen ausgesprochenen trockenen Winter, während auf der schmalen südöstlichen Halbinsel und den südlichen Inseln beide Monsune Niederschläge bringen und theils nur geringe, theils gar keine Unterschiede der Jahreszeiten bewirken. So finden wir auf einer der feuchttesten Inseln des Archipels, Catanduanes, die Art mit am meisten abgeschwächter Skulptur, *H. microglypta*, in dem sehr trocknen Nordwesten von Luzon die grobgekörnelte, festschalige *H. moussonii* als andres Extrem.

Literaturbericht.

Dall, W. H., Instructions for collecting Mollusks and other useful Hints for the Conchologist. In Bull U. S. National Museum Nro 39, Part. G.

Eine sehr reichhaltige und vollständige Anweisung zum Sammeln von Mollusken, marinen wie extramarinen. Auf das Kapitel über Draken kommen wir, sobald es der Raum erlaubt, eingehender zurück.

Williamson, Mrs. M. Durton, an annotated List of the Shells of San Pedro Bay and vicinity. With a description of two new species by W. H. Dall. In Proc. U. S. National Museum XV. p. 179—219, With pl. XIX—XXIII.

Ein sehr dankenswerther Beitrag zu unserer Kenntniss der marinens Fauna von Californien. Zum erstenmal und sehr gut abgebildet sind: Mitromorpha filosa Carp., Halistylus pupoides Carp., Mitromorpha aspera Carp., Marginella Jewetti Carp., Olivella baetica Carp., Ol. intorta Carp., Calliostoma tricolor Gabb; Fusus luteo-pictus Dall, Ocinebra circumtexta Stearns var. brevis n., Ocinebra lurida var. munda Carp., Amphissa bicolor Dall, Marginella piriformis Carp., Astyris tuberosa Carp., Ocinebra lurida Midd., Amphissa undata Carp., Am. versicolor Dall, Ovula barbarensis Dall, Vitrinella Williamsoni Dall, Bittium quadrifilatum Carp., Calliostoma splendens Carp., Chlorostoma funebrale A. Ad., Chl. brunneum Phil.; — Calliostoma costatum Mart., annulatum Mart., gemmulatum Carp., Solariella cidaris A. Ad., Gall. gloriosum Dall, canaliculatum Mart.; — Pachypoma inaequale Mart., Cooperi Gabb., Lioconcha Newcomiana Gabb., Nassa insculpta Carp.

Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, les Mollusques marins du Roussillon. Tome II Fase. 6 u. 7.

Die beiden neu erschienenen Lieferungen dieses schönen Werks enthalten die Carditidae, Lasaeidae, Galeominiidae, Cardiidae, Chamidae und Isocardiidae. Sie schliessen sich den früheren Lieferungen würdig an; die Abbildungen, besonders der Cardien, sind ganz vorzüglich.

Archer, Francis, Supplementary Report upon the testaceous Mollusca of the L. M. B. C. District. In Transact. Biol. Soc. Liverpool vol. VI, p. 105—121.

Die neuen Forschungen haben 37 Arten den schon früher aus dem südlichen irischen Kanal bekannten hinzugefügt; einige der früher aufgeführten werden gestrichen oder unter die zweifelhaften gestellt.

Smith, Edgar A. on the shells of the Victoria Nyanza or Lake Ukerewe. In Ann. Mag. N. H. Aug. 1892, p. 121—128, pl. 12.

Es werden 28 Arten angeführt, einige Bourguignat'sche allerdings mit Zweifel. Neu sind: Viviparus, Victoriae p. 124, t. 12, fig. 8—10; — V. jucundus p. 124, t. 12, fig. 6; — V. cepoides p. 125, t. 12, fig. 4. Ferner werden zum erstenmal abgebildet: Viviparus jucundus Martens fig. 3; — Cleopatra Guillemei Bgt. fig. 5; — Unio Bakeri H. Ad. fig. 11; — U. acuminatus H. Ad. fig. 12; — U. Lourdeli Bgt. fig. 13—15 und Mutela Bourguignati Ancey fig. 16.

Smith, Edgar A., Further Additions to the known Marine Molluscan Fauna of St. Helena. Ibid. p. 129—135, pl. 12, fig. 1, 2, 7.

Sieben weitere Arten, davon Jeffreysia atlantica (fig. 7), Tellimya producta (fig. 2) und T. simillima (fig. 1) neu. Ferner werden sechs weitere, an Tangen angetriebene Arten aufgeführt, und 33, welche in beträchtlicher Höhe, circa 700' über dem Meer, in kleinen, wahrscheinlich durch den Sturm hinaufgetragenen Sandansammlungen gefunden wurden.

Eingegangene Zahlungen:

Metzger, M., 6 Mk., Seibert, E., 6 Mk., Salm-Salm, A., 6 Mk., Schmidt, W., 6 Mk., Riemenschneider, N., 6 Mk., Goldfuss, H., 6 Mk., Clessin, O., 6 Mk., Heise, N., 6 Mk., Kreglinger, K., 6 Mk., Fietz, St., 6 Mk., Riise, K., 6 Mk., Hesse, V., 6 Mk., Niglutsch, Fr., 6 Mk.

Anzeigen.

Zu beachten:

Die Fauna der innerhalb der Palaearctischen Region lebenden Binnenmollusken von Dr. G. A. Westerlund ist jetzt nur durch *R. Friedländer & Sohn* zu Berlin zu beziehen.

Verlag von R. Friedländer & Sohn
Berlin NW., Carlstrasse 11.

Nunmehr abgeschlossen:

Fauna
der in der
Palaearctischen Region

[Europa, Kaukasien, Sibirien, Turan, Persien, Kurdistan, Armenien, Mesopotamien, Kleinasien, Syrien, Arabien, Egypten, Tripolis, Tunesien, Algerien und Marocco]
lebenden

Binnenconchylien
von Dr. Carl Agardh Westerlund.

2 Bände in 7 Heften mit 2 Supplementheften. — 1886 — 1890.
2061 Seiten in Gross-Oktav.

Preis **Mark 67,50.**

Heft I: Familiae Testacellidae, Glandinidae, Vitrinidae,
et Leucocrohoidae. 1886. 95 pg. M. 3,50.
Heft II: Genus Helix. 1889. 473 u. 31 pg. M. 16.
Heft III: Genera Buliminus, Sesteria, Pupa, Stenogyra et
Cionella. Mit Beilage: Nachträge und Berichtigungen zum Heft I,
3—4. 1887. 198 u. 26 pg. M. 7,50.
Heft IV: Subfamilia Pupina. Genera Balea et Clausilia. 1885.
237 pg. M. 7,50.
Heft V: Familiae Succinidae, Auriculidae, Limnaeidae,
Cyclostomidae et Hydrocenidae. 1885. 157 pg. M. 5,50.
Heft VI: Familiae Ampullaridae, Paludinidae, Hydrobiidae,
Melanidae, Valvatidae et Neritidae. 1887. 156 pg. u. 13
pg. Register. M. 5,50.
Heft VII: Malacozoa Acephala. 1890. 913 pg. u. 31 pg. Register.
M. 11,50.

Supplement I. 1890. 179 pg. M. 6.

Supplement II. Allgemeines Register der in der Palaearktischen
Region lebenden Binnenconchylien. 1890. 137 pg. M. 4,50.

Das Werk kann auf Wunsch in einzelnen Heften und in beliebigen
Terminen bezogen werden.

Zugleich erschien desselben Verfassers:

**Katalog der in der Palaearctischen Region
lebenden Binnenconchylien.**

1890. 225 Seiten und 128 Seiten (Register) in Gross-Oktav.
Preis **Mark 12.**

Den dieser Nummer beiliegenden Katalog des Herrn
Hermann Rolle in Berlin empfehlen wir geneigter Beachtung.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Diagnosen neuer Landschnecken.

Von
H. Rolle.

Planispira Tietzeana m.

T. sat aperte sed semiobtecta umbilicata, depressa, orbicularis, tenuiuscula, pilis brevibus rudibus sat distanter dispositis undique obsita, irregulariter striatula, luteo-albida fasciis duabus angustis rufocastaneis, in anfractibus spirae haud conspicuis, praeterea zona fusca lata superiore distincta et altera diffusa basali ornata. Spira plana, anfractibus superis immersis, sutura profunda. Anfractus 5 convexi sat celeriter crescentes, ultimus major, antice crista vestigiis incrementi parallela insignis, dein contractus et deflexus. Apertura XXV.

ovato-rotundata, lunata, obliqua, alba, fasciis externis translucentibus et in peristome conspicuis; peristoma expansum reflexum, labio tenuissimo incrassatum, marginibus conniventibus, haud junctis, supero producto, basali arcuato, columellari rapide ascendentem, vix dilatato, umbilici dimidiata parte vix occultante.

Diam. maj. 24, mm 19.5, alt. 10.5 mm.

Hab. Halmahera.

Zunächst mit *Hel. surrecta* Bttg. et Str. und *flavidula* Mts. verwandt, durch die Behaarung und die scharfe Einschnürung hinter dem Mundsaum gut verschieden.

Amphidromus Kobelti m.

T. rimato-perforata, sinistrorsa, ovato-conica, oblique striatula, lutea, fasciis fuscis in spirae anfractibus duabus, supera suturali angustissima, altera mediana latiore, in ultimo tertia latiore infraperipherica ornata; spira albida apice parvo, submamillato. Anfractus 6 regulariter crescentes, convexiusculi, sutura linearis discreti, ultimus spirae altitudinem fere aequans, parum inflatus. Apertura perobliqua, angulatim ovato-semilunaris, faucibus lutescentibus; peristoma callosum, album, marginibus vix callo tenuissimo junctis, sinistro bene arcuato, reflexo, angulum cum columellari verticali calloso, supra dilatato, perforationem obtegente formante.

Alt. 32, diam. 20 mm.

Hab. — ?

Buliminus longulus m.

T. aperte perforata, elongato-turrita, oblique striatula, solida, nitida, rufo-grisea aperturam versus pallidior, obsolete saturatius strigata. Spira primum cylindrica, dein conica, apice obtusato. Anfractus $11\frac{1}{2}$ sutura leviter albosignata subimpressa discreti, superi

convexi, inferi vix convexiusculi, latitudine haud crescentes, ultimus $\frac{1}{3}$ altitudinis vix superans, descendens, pone aperturam subplanatus, basi circa perforationem compressus. Apertura parum obliqua, ovato-acuminata, basi paufula, intus lutescenti-albida; peristoma acutum, vix incrassatum, brevissime reflexum, intus distinete labiatum, labio subremoto, marginibus callo junctis, externo primum depresso, dein producto, columellari subverticali, parum reflexo, callo parietali ad modum plicae super insertionem columellae prominulo.

Alt. 30, diam. max. 7, alt. apert. 9 mm.

Hab. Palästina.

Eine auffallend lange, gethürmte Form, die sich nur etwa mit *Bul. graecus* Beck vergleichen lässt.

Ihering, H. von, Morphologie und Systematik des Genitalapparates von *Helix*. Sep.-Abz. aus Zeitschrift für wissensch. Zoologie LIV. Heft 1, 2 u. 3. Mit Taf. 18 u. 19. Leipzig, Engelmann 1892. 8°. (p. 386-520).

Die wichtige Arbeit unseres Mitgliedes erfordert einen genaueren Bericht. Sie sprengt die alte Gattung *Helix* endgültig auseinander. Der Autor erörtert in der ersten Abtheilung die Morphologie des Genitalapparates der Nephropneusten; er weist nach, dass der sogenannte Liebespfeil der Zonitiden mit dem Liebespfeil der Heliciden in keiner Weise vergleichbar ist. Der ächte Liebespfeil ist eine kalkige Cuticularbildung mit nur ganz geringer organischer Beimengung; der Pfeilsack hat keinen Retraktor und er ist ursprünglich stets doppelt vorhanden, der eine freilich oft verkümmert. Bei den Zonitiden ist dagegen der sogenannte Liebespfeil eine aus den verschiedenen histo-

logischen Elementen des Körpers zusammengesetzte, durchaus nicht immer und nicht ganz verkalkte Reizpapille, die nicht ausgestossen werden kann; sie ist durchbohrt für den Durchtritt des Sekretes einer anhängenden Drüse; entkalkt man sie, so bleibt die Form fast unverändert erhalten. Genau so ist es bei Vitrina. Ihering bezeichnet dieses Organ der Zonitiden im Gegensatz zum Liebespfeil als Liebesdolch, *pugio amatorius*, die damit versehenen Zonitidengattungen als *xiphogon* im Gegensatz zu den belogonen Helices mit Liebespfeil. Für die mit Liebesdolch versehenen Vitrinen wird der Name *Vitrinopugio* vorgeschlagen. Ob die Zonitiden ohne Liebesdolch denselben nie besessen oder durch Rückbildung verloren haben, ob sie haplogon oder metaxiphogon sind, muss in jedem einzelnen Falle die Entwicklungsgeschichte entscheiden.

Semper's Versuch, die Zonitiden und Vitriniden nach dem Besitz oder dem Fehlen einer Schwanzdrüse zu trennen, wird von Ihering völlig verworfen; *Limax stenurus*, *Hyalina cellaria* haben z. B. die Schwanzdrüse. Auch die Dreiteilung der Fusssohle ergibt keinen haltbaren Unterschied und das Horn, dem Semper so grosse Wichtigkeit beilegt, ist z. B. bei *Microcystis* bald vorhanden, bald fehlt es.

Die weiteren anatomischen Erörterungen der ersten Abtheilung sind eines Auszuges nicht wohl fähig. Für den Systematiker ist auch die zweite Abtheilung ungleich wichtiger, da sie sich ausschliesslich mit der Systematik von *Helix* auf Grund des bis jetzt vorhandenen *Materiale*s anatomischer Untersuchungen beschäftigt. Nach Ausscheidung der nordamerikanischen Arten, die Ihering als *Neohelix* zusammenfasst, erkennt er als anatomisch wie conchologisch wohl begründete Gattungen an: *Xerophila*, *Fruticicola*, *Helix s. str.*, *Campylaea*, *Gonostoma*, *Dorcasia* und *Cochlostyla*. Folgen wir dem Autor bei der genaueren Be trachtung derselben.

1. *Xerophila.*

T. umbilicata vel perforata, alba, plerumque multifasciata, (quasi) nunquam pilosa, anfr. 4—10; perist. acutum, intus labiatum. Maxilla costis 4—11 latis, subplanis, contiguis, raro distantibus; retractor penis ad dextram retr. tentaculi majoris dextri situs; sagittae 2, interdum 1 vel 0; glandulae mucosae plerumque numerosae; ductus receptaculi seminis sine diverticulo.

Die Gattung umfasst die gewöhnlich zu *Xerophila* gerechneten Formen, mit Ausschluss von *Hel. pisana* und wahrscheinlich *conspurcata*, ausserdem aber auch *Carthusiana*, die ja auch conchologisch durch *Hel. Martensiana* Tib. und Verwandte angeschlossen wird. Von den Fruticicolen scheidet sie, wie von allen anderen Heliciden, die Lage des Penisretraktors. Vielleicht schliessen sich auch die maderenenser *Ochtheephila* hier an. *Turricula* bildet eine gut umgrenzte Sektion von *Xerophila*; auch *Cochlicella* steht mit Recht bei den Xerophilen. *Carthusiana* lässt sich anatomisch nicht von *Xerophila* trennen, hat aber keinen Retraktor am Penis. *Nummulina* wird durch die anatomischen Verhältnisse als eine gekielte *Carthusiana* erwiesen; mit *Fruticicola* haben beide nichts zu thun.

2. *Fruticicola.*

T. umbilicata vel perforata, globosa vel depresso-globosula, interdum pilosa, anfr. 4½—8; peristoma acutum plerumque intus labiatum. — Maxilla costis numerosis latis, contiguis, raro distantibus, margine crenulato; receptaculum seminis sine diverticulo; penis flagello terminali et retractore haud terminali instructo; sagittae 2, interdum 1 vel 0. Glandulae mucosae plerumque numerosae. Retractor penis ad sinistram retractoris tentaculi majoris dextri situs.

Der Autor sieht in *Fruticicola* die Wurzel aller anderen Heliciden, vielleicht *Xerophila* ausgenommen. Als Typus nimmt er *Helix hispida* L., also die Sektion *Trichia*, die nach Ausscheidung von *Hel. umbrosa* eine gut umgrenzte Gruppe darstellt, zu der auch *cobresiana* und *villosa* gehören. Die Sektion *Monacha* umfasst die Arten mit nur einem Pfeilsack, die heute bei *Monacha* und *Zenobia* vertheilt sind, sowie *Petasia*; auch *Hel. rubiginosa* und *fusca* gehören hierher. Die Arten mit ganz verkümmertem Pfeilsack werden unter *Zenobia* zusammengefasst, doch deutet Ihering an, dass sie vielleicht nicht ontogenetisch zusammengehören, vielmehr *strigella*, *occidentalis* und *ciliata* von *Trichia*, *limbata* und *corsica* von *Monacha* abzuleiten sind. Die griechischen *Pseudocampyläen*, für welche Ihering den Namen *Metafruticicola* vorschlägt, schliessen sich anatomisch zunächst an *ciliata* an.

3. *Helix* s. str.

T. *globosa* vel *depressa*, saepe *quinquefasciata*; anfractus 4—6, ultimus ad aperturam descendens. Maxilla costis 3—9 validis, distantibus, margine dentato. Glandulae mucosae 2 simples (*Iberus*) vel saepius multifidae. Sagitta 1 valida, aciebus 4 simplicibus vel dichotomis, et corona plerumque costulato-crenulata instructa. Ductus receptaculi seminis diverticulo raro obsoleto munitus.

Die Gattung wird ungefähr im Umfang von *Pentataenia* Ad. Schm. genommen. Bei *Tachea* steht *Helix austriaca* durch die Zahl der Schläuche und den kleinen Pfeil etwas fremdartig trotz ihrer grossen Schalenähnlichkeit; *atrolabiata* scheint anatomisch noch nicht bekannt und dürfte ihr wohl gleichen. — *Macularia* umschliesst anatomisch nicht unerheblich verschiedene Verhältnisse, einerseits *lactea* mit *punctata*, *Codringtonii*, *vermiculata*, *Duponetiana*, anderer-

seits alonensis mit Raspailü Payr., balearica, Gualtieriana spiriplana und desertorum. Von Iberus sind erst wenige Arten bekannt, sie zeichnen sich durch die geringe Zahl der Glandulae mucosae aus. Hel. muralis schliesst sich im Genitalapparat eng an Campylaea; Helix pisana wird trotz des fehlenden Flagellums hierhergezogen, steht aber unserer Ansicht nach in Gehäuse und Lebensweise so fremdartig da, dass man wohl besser Euparypha als Sektion beibehält. — Pomatia bildet eine ganz gut begränzte Gruppe; für die Abtrennung von tristis oder adspera gibt die Anatomie keinen Anhalt, auch aperta gehört zu Pomatia; die centralamerikanische Hel. Humboldtiana hat dagegen mit Pomatia nichts zu thun. Helix axia Bgt., die Ihering hier nach Branesic erwähnt, hat mit den Pomatiens nichts zu thun, sondern ist eine Form der Helix lactea.

4. *Campylaea.*

T. globosa vel depressa, perforata vel umbilicata; anfr. 4—6, ultimus descendens: peristoma incrassatum, plerumque albolabiatum. — Maxilla costis validis 4—11 distantibus, margine dentato. Glandulae mucosae simplices, rarius paucipartitae. Sagitta 1 corona simplice medio incrassata biangulata. Ductus receptaculi seminis diverticulo raro obsoleto munitus.

Nach Ausscheidung von Taechocampylaea, die anatomisch zu Macularia gehört — was freilich testaceo-logisch kaum annehmbar ist — wird die Gattung so ziemlich in dem gewöhnlichen Umfang angenommen. Von Fruticico - Campylaea ist noch absolut nichts bekannt. Helix lapiida gehört zweifellos hierher, auch Helix Quimperiana trotz der ganz verschiedenen Glandulae mucosae. Ferner Helix personata, die mit den amerikanischen Tridopsis nichts zu thun hat, aber als eigene Sektion Isogonostoma Fitz, (mit Einschluss von holoserica) abge-

trennt werden muss. Eng an *Campylaea* schliesst sich *Helix arbustorum* und ebenso die kalifornischen Arten, welche man zu *Arionta*, *Aglaja*, *Glyptostoma* etc. gerechnet hat, *Hel. Humboldtiana*, die eine eigene Sektion *Humboldtiana* bilden muss, aber auch die südamerikanischen *Eurycampta*; doch sind sie von *arbustorum* durch die keulenförmigen Gl. mucosae etwas verschieden und müssen als Sektionen, für welche die Namen *Aglaja* und *Lysinoe* beibehalten werden, davon getrennt bleiben.

5. *Gonostoma*.

Diese Gattung wird nach Ausscheidung von *Hel. holoserica* im üblichen Sinne angenommen.

6. *Doreasia*.

Hier sind die Untersuchungen noch sehr ungenügend. Als Typus nimmt Ihering *Hel. similaris* Fer., *tourannensis* Soul. und *fodiens* Pfr., denen sich unsere *Hel. fruticum* unmittelbar anschliesst. *Cochlostyla* und *Chloraea* sind von *Doreasia* nur durch die Reduktion der Glandulae mucosae verschieden, auch *Helix peliomphala* scheint nicht sehr stark davon abzuweichen. Genauere Untersuchungen der ostasiatischen Arten sind noch sehr zu wünschen.

7. *Theba*.

Diese von mir aus Verlegenheit für *Vallonia* und *Acanthinula* vorgeschlagene Gruppe wird von Ihering vorläufig als Gattung beibehalten, da die kleinen Arten sich weder bei *Patula* noch bei einer anderen Gattung unterbringen lassen. *Helix aculeata* gehört indess nicht hierher, sondern eher neben *Pupa*.

8. *Neohelix* von Iher.

T. *globosa* vel *lentiformis*, *umbilicata* vel *perforata*, *anfractibus 5—8*, *peristome albolabiato*, *reflexo*,

incrassato, plerumque dentato, columella plerumque dentata. — Maxilla arcuata, costis elevatis prominentibus munita, margine dentato. — Radula dente centrali tridentato, dentibus lateralibus mesodonte simplice vel fisso et ectodonte simplice instructis, dentibus marginalibus mesodonte bipartito et ectodonte simplice vel partito munitis. — Apparatu genitali simplice.

Ihering fasst die sämmtlichen nordamerikanischen Helices, die Californier ausgenommen, also Polygyra, Stenotrema, Triodopsis und Mesodon, zu einer Gattung zusammen, die sich durch gerippten Kiefer und einfachen Genitalapparat unterscheidet. Von den Californiern gehört *Helix Townsendiana* Lea hierher. Die Gattung reicht nicht bis Südamerika; sie ist vielleicht als eine Weiterentwicklung von *Patula* anzusehen, und gehört dann nicht zu den Heliciden im engeren Sinne, kann aber auch möglicher Weise durch *Gonostoma* mit diesen zusammenhängen.

Sowenig wie die nordamerikanischen, scheinen auch die australischen und neuseeländischen *Helix* zu den ächten Heliciden zu gehören. Für die westindischen und südamerikanischen Arten mit einfacherem Genitalapparat und glattem Kiefer errichtet von Ihering eine weitere neue Gattung *Parahelix*.

An die Heliciden schliessen sich wahrscheinlich noch einige Gattungen an, die man jetzt weit abzustellen pflegt. *Xanthonyx* stimmt im Genitalapparat ganz mit *Arionta* und *Campylaea* und passt auch in der Verbreitung dazu. Auch *Binneyia* kann schon des gerippten Kiefers wegen nicht bei den Bulimuliden bleiben, bedarf aber genauerer Untersuchung. Ausserdem schliessen sich *Hemphillia* und *Prophysaon* hier an, und vielleicht auch *Ariolimax* und *Arion*. Man thäte vielleicht gut, alle diese Gattungen in der Familie Xanthonycidae zu vereinigen.

Ausserst interessant sind Ihering's Betrachtungen über die geographische Verbreitung der einzelnen Gattungen. Während *Helix* s. str. und *Xerophila* wesentlich paläarktisch sind, greift *Campylaea* nach dem westamerikanischen Gebiete über und reicht durch Zentralamerika bis nach Argentinien. Die Sektionen *Aglaja* und *Lysinoë* kommen schon in den Laramieschichten, also in der oberen Kreide, vor, und zwar mit *Triodopsis* zusammen; die scharfe Trennung zwischen Osten und Westen existierte also damals in den Vereinigten Staaten noch nicht. Vorfahren von *Neohelix* finden sich auch schon in den Laramieschichten, die *Parahelix* im Miocän von Florida. Diese sind nicht mit den miocänen, sondern mit den eocänen Formen Europa's verwandt. Das würde für die Existenz einer Atlantis zur Miocänzeit sprechen. Ihering nimmt aber noch eine in südlicheren Breiten gelegene Landverbindung an, für deren Rest er St. Helena ansieht und die er desshalb als *Helenis* bezeichnet. Für enge Beziehungen zwischen Westamerika und Asien sprechen nicht nur die Campyläen, sondern auch die Arioniden und ausserdem das Vorkommen von Flusskrebsen der Gattung *Astacus*, die den Vereinigten Staaten fehlt, und mancher Flussfischgattungen. Dagegen deutet das Fehlen von *Dorcasia* und *Fruticicola* in Kalifornien darauf, dass diese Gattungen in Ostasien erst nach dem Verschwinden dieser Landverbindung aufgetreten und somit dort nicht ursprünglich einheimisch sind.

In dem Schlusskapitel verfolgt Ihering noch einmal die einzelnen Organe und ihre Entwicklung durch die ganze Reihe der Pulmonaten und bringt neue Beweise dafür bei, dass eine Abtheilung *Pulmonata* nicht beibehalten werden kann, dass die Lunge der Basommatophora sich aus der Kiemenhöhle der Nudibranchien entwickelt hat, die der Stylommatophoren dagegen einer mit der Niere in Verbindung stehenden Ektoderm-Einstülpung ihre Ent-

stehung verdankt. Er hat die ersteren schon früher den Namen Branchiopneusten, die letzteren Nephropneusten genannt. Die Phylogenie der letzteren ist noch immer nicht genügend aufgeklärt; sie lassen sich nicht direkt von den Tectibranchien ableiten, aber auch nicht von den Nudibranchien, sie scheinen vielmehr mit diesen aus einer gemeinsamen Wurzel entsprungen zu sein. Dass wir die Stammform nicht mehr nachweisen können, ist kein Wunder, da wir die Nephropneusten schon im Carbon und selbst im Devon finden.

Kobelt.

Diagnosen neuer griechischer Arten.

Von

Dr. W. Kobelt.*)

1. *Helix (Macularia) pantocratoris* Brömm n.

T. magna aperte umbilicata, deppressa, spira convexa, apice magno, ruditer et irregulariter striatula, lineis spiralibus impressis sculpta, carneo-grisea, fasciis interruptis 5 parum conspicuis sculpta. Anfractus $4\frac{1}{2}$ convexit, sutura impressa discreti, sat regulariter crescentes, ultimus depresso rotundatus, basi haud planatus, antice deflexus, ad basin malleatus et cicatricibus impressis rugosus. Apertura perobliqua, magna, ovato-circularis, valde lunata; peristoma albolabiatum, marginibus callo tenui junctis, supero producto, expanso, parum arcuato, externo arcuato, expanso,

*) Die nachstehend beschriebenen Arten wurden mir meistens von meinem Freunde Dr. Chr. Broemme als neu mitgetheilt, mit kurzer deutscher Charakteristik und Namen; sein jäher Tod hat ihn verhindert, sie selbst zu veröffentlichen und ich thue es nun hier in seinem Namen. Einige Arten habe ich auch von Rolle erhalten.

basali arcuato reflexo, intus plica distincta munito,
ad insertionem umbilici tertiam partem obtegente.

Diam. maj. 42, min. 34, alt. 20 mm.

Cfr. Iconographie N. F. fig. 1033.

Hab. ad. summitates montis „Pantocrator“ dicti insulae
Corcyrae.

Diffr. ab *Helix crassa*, cui proxima umbilico minus
obtecto, testa tenuiore, anfractu ultimo compressiore, aper-
tura magis dilatata, columella minus callosa distincte plicata.

2. *Helix (Codringtoni var.) coracis* m.

T. late sed subobtecte umbilicata, depressula, leviter trans-
verse dilatata, solidula sed parum crassa, nitidula,
striatula, pallide carneo-fusca, corneo quinquefasciata,
fasciis tribus superis interruptis, quarta latiore distinc-
tiore saepe continua, quinta infima angusta saepe
obsoleta. Spira convexiuscula apice obtusato. Anfr.
 $4\frac{1}{2}$ convexit, sutura linearis discreti, celeriter sed re-
gulariter crescentes, ultimus dilatatus, basi vix planatus,
antice circa umbilicum inflatus, ad aperturam valde
deflexus. Apertura perobliqua, transverse ovata,
parum lunata, faucibus fuscescentibus; peristoma leviter
obtusatum, intus labio tenui albo incrassatum, margi-
nibus supero et basali subparallelis, demum leviter
conniventibus, callo tenui junctis, supero stricto, externo
et basali leviter reflexis, columellari ad insertionem
super umbilici dimidiata dilatato, plica distincta
longa stricta compressa intus munita.

Diam maj. 33, min. 27, alt. 18 mm.

Cfr. Jeonographie N. F. Fig. 1035.

Hab. in monte Korax dicto Graeciae.

3. *Campylaea (peritricha var.) erymanthia* n.

T. aperte et perspectiviter umbilicata, suborbicularis,
depressa spira convexo-conoidea parum elevata,

solidula, ruditer costulato-striata, corneo-virescens, in zona peripherica lata albida fascia lata castanea in antepenultimo quoque conspicua cincta. Anfractus $5\frac{1}{2}$ —6 leniter ac regulariter crescentes, sutura profunda albidomarginata discreti, ultimus aperturam versus dilatatus, subteres, antice breviter deflexus. Apertura obliqua, lunata, late ovato-rotundata, fasciis translucentibus; peristoma albidum, obtusum, vix incrassatum, marginibus conniventibus, vix callo tenuissimo junctis, bene rotundatis, columellari brevissime reflexo arcuatim ascende, ad insertionem dilatato et umbilici quartam partem vix obtegente.

Diam maj. 27,5, min. 23, alt. 14, diam. umbilici 5 mm.
Hab. in monte „Olenos“ dicto Moreae.

Differt a typo umbilico latiore, anfractus omnes exhibente, anfractu ultimo terete, magis inflato, cicatricibus pilorum nullis.

Von Herrn H. Rolle zur Beschreibung erhalten.

4. *Campylaea pterolakae* m.

T. mediocriter, sed aperte et pervie umbilicata, depressa, suborbicularis, solidula, striatula, nitida, albida, fascia supraperipherica distincta rufo-castanea, zonisque duabus (supera et infera) pallidioribus, infera basin versus diluta, ornata. Spira parum elevata apice corneo. Anfractus 5 convexiusculi, sutura linearis impressa discreti, leniter ac regulariter crescentes, ultimus parum dilatatus sed subinflatus, basi bene rotundatus, antice breviter deflexus. Apertura obliqua, ovato-circularis, valde lunata, intus fasciis translucentibus; peristoma acutum, intus labio albo incrassatum, marginibus conniventibus, vix callo tenuissimo junctis, supero recto, basali breviter reflexo, columellari arcuatim ascende, ad insertionem leviter dilatato.

Diam. maj. 23, min. 20, alt. 13,5 mm.

“ ” 21,5, min. 18,5, alt. 11,5 mm.

An Helix Langi Pfr. Mon. Hel. IV, p. 177, nec Rossm.?

Hab. ad rupes Pterolaka Parnassi. Comm. Rolle.

5. *Campylaea eliaca* n.

T. aperte et pervie umbilicata, depressa, tenuiuscula, ruditer striata, inter striae subtilissime granulosa, sub epidermide luteo-fusea fascia castanea alta ornata, pilis sat longis regulariter quincunciatim dispositis undique obsita. Spira depresso-conica, apice magno obtusato. Anfractus 5 convexiusculi, sutura impressa subirregulari discreti, celeriter crescentes, ultimus supra obtusissime subangulatus, basi convexior, subinflatus, subite in umbilicum abiens, antice descendens sed vix deflexus. Apertura obliqua, rotundato-ovata, parum lunata, intus carnea fascia translucente; peristoma acutum, tenuissime albolabiatum, marginibus conniventibus, vix callo tenuissimo junctis, supero recto, basali breviter reflexo, ad insertionem dilatato, umbilici marginem vix obtegente.

Diam. maj. 25, min. 22, alt. 12, diam umbil. 4 mm.

Hab. in peloponeso.

Hel. comephorae Bgt. proxima, differt umbilico latiore, aperio, anfractu ultimo supra subangulato, zona peripherica albida nulla.

Von einem Sammler des Herrn Prof. Krüper aus dem Berglande im nordwestlichen Pelopones eingebbracht, das abgebildete Exemplar von Herrn Krüper an Brömmel gegeben.

(Fortsetzung folgt.)

Die Molluskenfauna des Königreichs Sachsen.

Von

E. Neumann in Chemnitz.

Das Königreich Sachsen ist hinsichtlich seiner Molluskenfauna bereits vor mehr als einem halben Jahrhundert von Rossmässler und später mit ihm gleichzeitig, laut Mittheilungen über „die Mollusken des Königreichs Sachsen und ihre Fundorte“, veröffentlicht 1855 in der „allgemeinen deutschen naturhistorischen Zeitung“, auch von Reibisch einer eingehenderen Betrachtung unterzogen worden. Rossmässler, 1831—1850 Professor in Tharandt, gab durch seine meisterhafte Ikonographie, seinen ausgedehnten Briefwechsel und seine ausgezeichnete Behandlung des Gegenstandes eine starke und nachhaltige Anregung zum Studium der Conchylien. In der Ikonographie nennt er eine grössere Zahl der in Sachsen von ihm und anderen gefundenen Mollusken. — In den erwähnten Mittheilungen werden von Reibisch, gestützt auf Rossmässler, Schaufuss und andere seiner Zeit aufmerksame Sammler, viele Orte genannt, von denen sich die grössere Zahl auch jetzt noch als Fundpunkte für Conchylien bewähren wird; wenn auch nicht in Abrede gestellt werden kann, dass einige dieser Fundstätten ihre Giltigkeit verloren haben dürfen, wenn man erwägt, welchen Veränderungen in einem Zeitraum von ca. vierzig Jahren eine Gegend, und ganz besonders die Umgegend grosser, industriereicher Städte und Dörfer, durch Anlage neuer Strassen und Eisenbahnen, durch Neubauten und Umwandlung traulicher, schattiger und kühler Hecken und Dickichte in sogenannte Verschönerungsplätze ausgesetzt und unterworfen ist.

Im Königl. zoolog. Museum in Dresden findet sich neben einer grösseren reichhaltigen Conchyliensammlung eine separat placierte kleinere, welche nur Conchylien enthält,

welche in Sachsen gefunden wurden; doch ist diese letztere lückenhaft; auch fehlt bei den einzelnen Species die Angabe der Fundorte; sie ist deshalb zur Orientierung wenig geeignet: eine Sammlung, welche auf die Frage wo? nicht antwortet, hat ja immer eine nur untergeordnetere Bedeutung. — Dagegen hat Herr Steuerexpedient Kleindiens in Chemnitz in verschiedenen Gegenden Sachsens Mollusken gesammelt und mir darüber mit freundlichster Bereitwilligkeit Mittheilungen gegeben, von deren Richtigkeit ich mich persönlich überzeugt habe. — Sodann hat Herr Ortsrichter Weise in Ebersbach bei Löbau den Land- und Süßwasser-mollusken der Oberlausitz, besonders den in dem südlichen Teile dieser Provinz vorkommenden Species fleissige Aufmerksamkeit gewidmet und seine mir freundlichst zur Verfügung gestellten Beobachtungen sind von mir an geeigneter Stelle angeführt worden. — Auch ich habe Sachsen nach verschiedenen Richtungen durchwandert und dabei seit einer Reihe von Jahren auch den Conchylien ein aufmerksames Auge gewidmet. (In der Umgegend von Chemnitz habe ich 50 Species, incl. 4 Variet, in Sachsen überhaupt bis jetzt ca. 80 Spec. beobachtet und gesammelt).

Die folgenden Mittheilungen enthalten eine übersichtliche Zusammenfassung aller dieser Beobachtungen und Ergebnisse. Auf Grund derselben dürfte sich ein Gesamtbild der Molluskenfauna Sachsens gewinnen lassen.

Im Vergleich mit Bayern, Württemberg, Baden, Nassau, Preussen, ist die sächsische Molluskenfauna nicht besonders reich zu nennen. Abgesehen davon, dass ja die meisten dieser Länder grösser sind, so liegt auch der Hauptgrund jener Verschiedenheit in den geognostischen Verhältnissen des Landes. Gneis (Freiberg, Annaberg). Thonschiefer (= Phyllit), Glimmerschiefer (Erzgebirge), Porphyrr (Chemnitz, Rochlitz), Granulit (Rochsburg, Penig, Waldheim), Granit, Basalt,

Phonolith (Lausitz und Erzgebirge), Syenit (Meissen, Tharandt), Diabas (Lausitz), Grauwacke (Kamenz, Hainichen), Sandstein (Pirna, Schandau, Lausitz), loser Sand (nördliches Sachsen), bilden den „Grund und Boden“ des Landes; diese Gesteine sind aber bekanntlich kein allzugünstiger Boden für solche Thiere, welche in schönster Ausbildung ihres Gehäuses und am zahlreichsten auf Kalkgestein und kalkhaltigem Boden zu finden sind; beides, Kalkgestein und kalkhaltiger Boden, treten jedoch in Sachsen nur spärlich auf. Es machen sich deshalb für die Landconchylien nur eine grosse Anzahl von grösseren und kleineren schattigen Thälern, alte Mauern von einigen Ruinen (Oybin; Tharandt; Alte Zella; Frauenstein; Rauenstein) und Gebäuden (Schloss Lichtenwalde; Burg bei Leisnig; Schloss Rochsburg und Wolkenstein etc.) und kleine Schluchten als ergiebige Fundorte geltend. Günstiger sind bie Bedingungen für die Existenz der Wassermollusken. Grössere und kleinere Flüsse (Elbe mit den Nebenflüssen; die beiden Mulden und Elstern; die Zschopau; Flöha; Neisse; Spree) mit ihren Buchten; viele Bäche, grosse und kleine Teiche und Wassertümpel beherbergen eine grössere Zahl Species von Wasserschnecken, und es findet sich die eine und andere Art hinsichtlich der Individuenzahl oft in ausserordentlicher Menge.

1. *Tichogonia Chemnitzi* Rossm.

In der Elbe bei Dresden in einem Exemplare, welches an einer *Anod. piscinalis* festhaftete; Rei. *)

2. *Anodontia*,

a) *complanata* Zieg. Elbe bei Dresden, Elster bei Leipzig, Ro. Ostritz W.

b) *piscinalis* Nils. Elbe bei Riesa und Schandau N.

*) Abkürzung: Ro = Rossmässler; Rei = Reibisch; W = Weise; N = Neumann; K = Kleindienst.

Var: *ponderosa* C. Pfr. Elbe bei Schandau; Mockritzbach, in einem Teich bei Strehla Ro.; Elbe bei Riesa N.

Var: *rostrata* in Teichen bei Ebersbach (Lausitz) häufig. N.

- c) *anatina* L. Elbe bei Dresden; in einem Bache bei Meissen Ro.; Ebersbach, Ostritz W.
- d) *cellensis* Schroet. Grosses Gehege bei Dresd., Serkowitz bei Kötzschenbroda, Moritzburger Teich Ro.; Chemnitz (Schlossteich), Glösa und Siegmar bei Chemn. N.; Schönau bei Chemn. Kl.
- e) *cygnea* L. Trachenau bei Rötha, Döhlitz und Böhlitz bei Leipz. Ro.; Canitz bei Oschatz Rei.; Ebersbach W.; Helbersdorf bei Chemn. Kl. und N.; Elbe bei Riesa und Dresd. N.; Altendorf bei Cheinn. (hier in kolossaler Grösse), Höllenmühle bei Penig Kl.

3. Margaritana *margarifera* L.

In der Röder bei Grossenhain, Triebisch bei Grillenburg Ro.; Polenz bei Schandau Rei.; Pulsnitz bei Königsbrück Auerwald; in einem Waldbache bei Ebersbach W.; in der Chemnitz bei Helbersdorf und in der Flöha bei Olbernhau N. Eine sehr instructive Suite dieser Species, die Entwicklung der Schale vom Ei an, bis zum vollständigen Ausgewachsensein darstellend, enthält das Königl. sächs. zool. Mus. in Dresden aus der weissen Elster.

4. Unio.

- a) *tumidus* Nils. Elbe bei Riesa N.; — bei Dresden und Elster bei Leipz. Ro.
- b) *pictorum* L. Elbe bei Dresd. und Meissen, Elster bei Leipz., Ro.; Löbauer Wasser bei Weissenberg Rei.; Elblachen bei Meiss., Kl.; Elbe bei Riesa N.; Prossen am Lilienstein W.
- c) *batarus* Lam. In der Chemnitz bei Helbersdorf, Elbe bei Riesa N.; bei Dresden; in einem Bach bei Meiss.;

in der Neisse Ro.; in einem Bach zwischen Mutschen und Connewitz (Lehrer Haferkorn in Chemn.)

aa) Var. *crassus* Retz. Elbe bei Dresd.; Elster und Pleisse bei Leipz.; Ro.; Zwickauer Mulde bei Penig. Elbe bei Riesa N.

bb) Var. *ater* Nils. In der Zschopau bei Mittweida Ro.; in der Spree bei Sohland Rei.; in der Chemnitz bei Helbersdorf N., Kl.; ausserdem bei Sohland in der Spree, bei Marienthal in der Neisse, bei Zittau in der Mandau und bei Leutersdorf W.

5. Pisidium.

a) *annicum* Müll. Elbe bei Dresd., Bautzen Ro.; vor dem Dohnaischen Schlage bei Dresd. Rei.

b) *fontinalis* C. Pfr. = *fossarium* Cl. Grosser Garten bei Dresd.; Mockritzbach, Höllendorf, Klotscha, Meissen, Königswartha Rei.; Leipzig Ro.; Chemnitz, Helbersdorf und Lichtewalde bei Chemn. N.

c) *obtusale* C. Pfr. Tharandt Ro.

6. Cyclas.

a) *rivicola* Leach. Elbe bei Dresd., Leipzig Ro.; grosses Gehege bei Dresd.; Rei. Elbe bei Riesa N.

b) *cornea* L. Striessen; Milkel bei Bautzen; Königswartha Rei.; Leipzig Ro.; Chemnitz, Kötzschenbroda N.; Ebersbach, Taubenheim W.

aa) Var. *nucleus* Stud. Kötschenbroda, Chemnitz N.

c) *calyculata* Drp. Grosser Garten bei Dresd.; Königswartha; Canitz bei Oschatz Rei.; Leipzig Ro.; Kötzschenbroda N.; Ebersbach W.

d) *mamillana* West. Ebersbach W.

7. Neritina *fluvialis* L.

Schleussig bei Leipz. Ro.

8. *Bithynia tentaculata* L.

Zscheilagraben bei Meissen, Hellerteiche, Mutschen, Canitz bei Oschatz Rei.; grosses Gehege bei Dresden., Leipzig Ro., Kl.; Elbe bei Riesa und Rathen N.

9. *Valvata*.

- a) *piscinalis* Müll. Grosses Gehege bei Dresden., Canitz bei Oschatz Rei.
- b) *depressa* C. Pfr. Umgegend von Dresden Ro.
- c) *cristata* Müll. Teich bei Mockritz; Meissen Rei.; Leipzig (bot. Gart.) und in einem Wassergraben der Nonne bei Leipz. Ro.; Boppitz bei Riesa N.

10. *Vivipara*.

- a) *vera* Frfld. Grosses Gehege bei Dresden.; einige Gräben bei Leipz.; Ro.; Klix bei Bautzen Rei.; Königswartha Rei.; und W.; in der Parthe bei Leipz. W.; Connewitz bei Leipz. Kl.; in einem Teiche zwischen Niederau und Meissen N.
- b) *fasciata* Müll. Elbe bei Dresden.; Serkowitz; in der Elster und einigen Gräben bei Leipz.; Ro.; Elbe bei Riesa N.

11. *Ancylus*.

- a) *fluriatilis* Müll. Grosser Garten bei Dresden.; Teich bei Dippelsdf.; Plauenscher Grund Rei.; Ebersdorf, Kl.; und Helbersdorf bei Chemn. N.; Öderau Kl.; Ebersbach N.; und viele andere Orte der Lausitz W.
- b) *lacustris* L. Grosser Garten bei Dresden. Rei.; Leipzig Ro.; Altmittweida N.

12. *Aplexa hypnorum* L.

Umgegend von Dresden; Leipzig Ro.; Canitz Rei.; Helbersdorf bei Chemn. N.; Neu-Ruppersdorf W.

13. *Physa fontinalis* L.

Meissen, Leipzig Ro.; Zöschau bei Oschatz, Königswartha Rei.

14. Planorbis

- a) *corneus* L. Chemnitz; Furth und Draisdorf bei Chemn. (sehr klein und cariös); Kötzschenbroda (ausgezeichnet grosse Exemplare) N.; Wahren bei Leipz. Kl.; in Lachen der Neisse bei Zittau W.
- b) *Rossmaessleri* Auersw. Wiesengräben der Nonne bei Leipz. Auerswald.
- c) *complanatus* L. Rabenstein bei Chemn. N.
- d) *spirorbis* L. Schleussig bei Leipz. Ro.; Helbersdorf und Lichtewalde bei Chemn. N.; Glösa Kl.; Ebersbach W.
- e) *leucostoma* Mich. Reisewitz bei Dresd.; Jahna bei Riesa; Canitz Rei.; Tharandt, Leipzig Ro.; Boppitz bei Riesa N.
- f) *carinatus* Müll. Grosser Garten bei Dresd.; Canitz Rei.; Kaitzgrund bei Dresd.; bot. Garten in Leipzig Ro.
- g) *vortex* L. Leipzig Ro.; W.; Zöschau bei Oschatz, Baruth bei Bautzen Rei.; auch bei Mutschendorf und in der Umgegend von Dresd. Rei.
- h) *nitidus* Müll. Elbe bei Dresd.; Dippeldorf Rei.; Leipzig Ro.; Frankenberg, Glösa N.
- i) *albus* Müll. Grosses Gehege bei Dresd.; Dippeldorf, Arnsdorf Rei.; Dippoldiswalde; — Erdmannsdorf und Furth bei Chemn.; Frankenberg und Kunnersdorf; Altmittweida, Kötzschenbroda N.; Penig (Höllemühle) Kl.; Ebersbach N.; W.
- k) *cristatus* Drp. Grosser Garten bei Dresd.; Dippoldiswalde, Dippeldorf Rei.; Leipzig Ro.
- l) *contortus* L. Jahna bei Riesa Rei.; Leipzig Ro.; Frankenberg, Glösa und Furth bei Chemn. N.; Nimschütz bei Bautzen W.
- m) *marginatus* Drp. In Lachen der Neisse bei Zittau, Königswartha bei Bautzen W.

15. Amphipeplea *glutinosa* Müll.

Gross-Zschocher bei Leipzig Ro.; bei Leipzig auch W.

16. Limnaea.

- a) *stagnalis* L. Pulsnitz, Kötzschenbroda, Frankenberg, Chemnitz; Glösa, Helbersdorf und Draisdorf bei Chemn.; N., auch in der Lausitz überall häufig W.
Var: *subulata* West. Bei Riesa i. d. Elbe N. (cfr. Clessin, Deutsche Excursionsfauna p. 360.)
- b) *vulgaris* Rossm. = *lagotis* Schrk. Niederwiesa bei Chemn., Ebersbach N.
- c) *auricularia* L. Pulsnitz N., Ebersbach*) N., W., Mockritzer Teich, grosses Gehege bei Dresd., Leipzig Ro.; Ebersdorf und Lichtewalde bei Chemn. Kl.
Var: *ampla* Hartm. Ebersbach W.
- d) *orata* Drp. Umgegend von Dresden; — Leipzig Ro.; Milkel und Baruth bei Bautzen Rei.
Var: *ampullacea* Rossm. Furth bei Chemn. in einem Wiesenbache N.
- e) *minuta* Drp. = *truncatula* Müll. Loschwitz, Löbtau, Leipzig, Canitz Rei.; Tharandt Ro.; Chemnitz, Annaberg, Blasewitz, Riesa N. Ebersbach, Eibau, Kunnersdorf i. d. Lausitz W.
- f) *peregra* Müll. Chemnitz (Zeisig- und Kühwald), Furth, Erdmannsdorf, Einsiedel bei Chemn., Ebersbach, Pulsnitz, Riesa N. Lichtenwalde Kl. In einem alten Steinbrüche bei Ebersbach auffallend gross und dickschalig 22—24 mm hoch, 12—13 mm br.) W.
- g) *palustris* Müll. Hellerteiche, Dippeldorf, Königswartha, Milkel bei Bautzen, Rei.; Leipzig Ro.; Boppitz bei Riesa; Pulsnitz (sehr grosse Individuen) N., Temritz bei Bautzen W.

17. Carychium minimum Müll.

Mordgrund bei Dresden, Zschonen- und Plauensche Grund, Canitz Rei., Tharandt Ro.

*) Von auricul. finden sich bei Ebersbach häufig Exemplare von Gehäusen, deren Mundrand sich nach aussen umgelegt und zurückgebogen hat, so dass eine Art Rinne entstanden ist. N.

18. Succinea.

- a) *putris* L. Chemnitz (Sachsensruhe), Frankenberg (Fischerschenke), Döbeln, Wehlen, Schandau, Glösa bei Chemn. N.; Lichtewalde, Wolkenstein Kl.; Ebersbach, Bautzen und viele andere Orte der Lausitz W.
- b) *Pfeifferi* Rossm. Hinter dem Dohnaischen Schlage bei Dresden, Canitz Rei.; Schleussig, Stünz bei Leipzig und Leipzig Ro.; Pillnitz; — Ebersbach, Zittau W.
- c) *oblonga* Drp. Grosses Gehege und Strehlen bei Dresden, Rei.; Elbufer bei Wildberg Ro.; Glösa bei Chemn. N.; Ebersbach W.

19. Cionella.

- a) *lubrica* Müll. Chemnitz (Sachsensruhe), Furth bei Chemn. (sehr grosse und glänzende Individuen), Kötzschenbroda, Döbeln, Wolkenstein (unweit des Bades), Schandau N.; Ebersbach, Oybin, Zittau, Löbauer Berg W.; Markersd. bei Chemn.; Frauenstein im Erzgeb. Kl.
- b) *acicula* Müll. Wehlen, Cotta und Strehlen bei Dresden, Rei.; Kötzschenbroda N.

20. Buliminus.

- a) *montanus* Drp. Rochsburg (in der Umgebung des Schlosses), Lichtewalde, Wolkenstein N.; Stein bei Hartenstein, Lichtewalde Kl.
- b) *obscurus* Müll. Umgegend von Dresden, ein Exemplar von Rei bei Hartenstein unter Schutt gefunden.
- c) *tridens* Müll. Strehlen und Briesnitz bei Dresden, Rei; Cotta bei Dr. Ro.

21. Balea *fragilis* Drp.

Cottaer Spitzberg, Stolpen, Wolkenstein Rei. An den Mauern der Ruinen auf dem Oybin N., W.; am Kunnerstein bei Erdmannsdorf Kl. Bautzen W.

22. Clausilia.

- a) *laminata* Mont. Lichtewalde b. Chemn., Schandau,

- Wehlen, Kötzschenbroda, Tharandt N.; Cottaer Spitzberg, Loschwitz Kl.
- b) *biplicata* Mont. Schandau, Wehlen, Kötzschenbroda, auf dem Gottesacker von Penig und Bautzen, Riesa, Hartenstein und Stein (bei der Prinzenhöhle), Tharandt, Lichtewalde. Erdmannsdorf und Augustusburg bei Chemn., Rochsburg, Ebersbach, Oybin bei Zittau N.; Rabenauer Grund, Frauenstein, Waldenburg, Tharandt, Zella bei Nossen Kl.
- c) *plicata* Drp. Rochsburg, Tharandt, Lichtewalde, Oybin, Stein (Prinzenhöhle) N.; Löbauer Berg, Bautzen W.; Zella, Frauenstein Kl.
- d) *orthostoma* Mke. Planenscher Grund, Rochsburg, Tharandt Ro.; zwischen „edle Krone und Tharandt“ N.; Cottaer Spitzberg, Wildensels, Stein Rei.; bei Stein auch N.; Döben bei Grimma, Nossen, Rochsburg Kl.
- e) *ventricosa* Drp. Wildberg, Plauenscher Grund, Wolkenstein Ro.; Rabenborst bei Meiss., Rei.; Schandau, Schaufuss; Lichtewalde Kl.
- f) *parvula* Stud. Frauenstein Ro., Kl.; Ober-Reinsberg, Stein Rei.; Prinzenhöhle bei Stein N.; Oybin N., W.; Löbauer Berg W.
- g) *varians* Zgl. Geisingberg Ro., Kl., W.; da sie auch zwischen Geising und Bärenstein, ferner bei Eichwald in Böh., auf der südlichen Seite des Erzgebirges, gefunden wurde (W.), so scheint sie längs des Kammes des Erzgebirges vorzukommen.
- h) *nigricans* Pult. Oybin N.; Rochsburg N., Kl.; Frauenstein, Augustusburg Kl. Nach A. Schmidt, Kritische Gruppen etc. p. 48 findet sie sich auch bei Altschönfels (bei Zwickau), Nossen, Sachsenburg (bei Frankenberg) und im Liebethaler Grunde.
- i) *plicatula* Drp. Liebstadt, Hartenstein Rei.; Geisingberg, Freiberg Ro.; Rochsburg Kl.

Die kleine, bauchige Form, die Var. *curta-thuringia*
A. Schm. bei Rauenstein i. Flöhathal Kl. *)

- k) *vetusta* Zgl. var. *minor* Rossm. = *festiva* Kstr. Tharandt Ro.
l) *pumila* Zgl. Plauenscher Grund, Tharandt Ro.
m) *dubia* Drp. Annaberg (a. d. Mauer d. Kirche), Augustusburg, Lichtewalde, Wolkenstein, Hartenstein, Oybin N.; Lichtewalde, Frauenstein, Rochsburg Kl.
aa) Var; *obsoleta* A. Schm. Lichtewalde, Bad Ottenstein bei Schwarzenberg, Hartenstein N. Nossen (Schmidt Kr. Grupp. p. 44).
bb) Var: *gracilis* C. Pfr. Lichtewalde N.

Anmerkung: Cl. *filograna* ist bis jetzt im Königr. Sachsen nicht gefunden worden, obschon sie auf der Landeskrone bei Görlitz an der sächsisch-preuss. Grenze vorkommt und von W. gefunden wurde.

23. Pupa.

- a) *muscorum* L. Kötzschenbroda (häufig), Tharandt (unterhalb der Schlossruine sehr häufig) N.
b) *minutissima* Hartm. Wehlen, Pillnitz, Strehlen, Tharandt, Ro., N.; Kötzschenbroda N.
c) *pygmaea* Drp. Grosses Gehege bei Dresd.; Wehlen Rei.; Ebersbach (hier massenhaft unter Basaltstücken), Dittersdorf und Einsiedel bei Chemn., Wolkenstein N.
d) *pusilla* Müll. Mordgrund bei Dresd., Graupen Ro.; Wehlen, Stein Rei.

*) Nach Clessin, deutsche Excursionsfauna 2. Aufl. p. 327 soll sich diese Variet. auch „am Inselberge in Sachsen“ finden. Dies ist ein Irrthum; denn einen Berg dieses Namens giebt es weder im Königreich, noch in der preuss. Provinz Sachsen. Dieser Irrthum ist ohne Zweifel entstanden durch Übersehen des Wörterbuchs „und“ in dem Satze: „Kleine auffallend bauchige Formen (var. *curta*) finden sich am Inselberge und im Königreich Sachsen“ (A. Schmidt, Krit. Grupp. p. 26.) Schmidt meint den Inselsberg des Thür. Waldes.

- e) *antivertigo* Drp. = *septemdentata* Fer. Graupen, Mordgrund Rei.
f) *Venetzii* Chrp. = *angustior* Jeffr. Tharandt Ro.

Anm. *P. doliolum* Brug., obschon auf der Landeskrone an der sächs.-preuss. Grenze von W., ist jedoch noch nicht in Sachsen gefunden worden.

24. Helix.

- a) *pomatia* L. Lichtewalde, Chemnitz, Augustusburg, Dresden, Meissen, Bautzen (Taucherkirchhof), Schandau, Wehlen, Kötzschenbroda (ausgezeichnet grosse Exemplare, doch unter den Hunderten von Individuen noch nie ein linksgewundenes gefunden!) N.; Draisdorf bei Chemn.. Schwarzenberg Kl.; Löbau, Zittau, Herrnhut W.; in der Leipziger Umgegend soll sie sich nach Ro. und Rei. seltener finden.

- b) *nemoralis* L. Bautzen, Chemnitz, Ebersbach (an der Mauer des Gottesackers in sehr grossen und schön gefärbten Exemplaren), Markersdorf bei Chemn. N.; Lichtewalde, Draisdorf, Chemnitz (am Nikolaibahnhof) Kl.

Var: *roseolabiata* Kötzschenbroda und Lößnitz bei Dresden N.

- c) *hortensis* Müll. Kötzschenbroda, Ebersbach, Wolkenstein, Riesa, Schandau, Wehlen N. Mutschens (Lehrer Haferkorn in Ch.), Leisnig Kl. — Exemplare mit durchscheinenden Bändern bei Kötzschenbroda und Döbeln N.

Var: *fuscolabiata*: Kötzschenbroda, Cossebaude bei Meissen, Lichtewalde bei Chemn. N.

- d) *arbustorum* L. Kötzschenbroda (sehr schöne und grosse Exempl. auf dem Gottesacker), Löbauer Berg, Lausche, Lichtewalde (sehr dunkel gefärbte Exemplare) Wolkenstein, Schandau, Wehlen, Hartenstein, Augustusburg bei Chemn. N.; Kamenz, Rabenauer Grund, Leisnig Kl.

- e) *strigella* Drp. Loschwitz Ro.; Lössnitz, Kötzschenbroda, Tharandt, N.; Sohland a. Rothstein W.
- f) *fruticum* Müll. Lössnitz, Zschonen- und Plauenscher Grund Ro.; Rabenauer Grund Schaufuss; Lockwitz, Wehlen (N.); Alt-Zella Rei.; Rochsburg, Kötzschenbroda (Gehäuse mit verschiedener Färbung), Tharandt, Schandau, Draisdorf bei Chemn. (auch Kl.); N.; Leisnig, Lichtewalde Kl.
- g) *incarnata* Müll. Wolkenstein, Tharandt N.; Lichtewalde N., Kl.; Chemnitz (Sachsensruhe) N.; Rabenauer Grund, Draisdorf bei Chemn., Kl.; Löbauer Brg., Bautzen, Weinau bei Zittau W.
 - Var. *tecta* Pfr. Tharandt, Cossebaude bei Meissen, Augustusburg, Stein (Prinzenhöhle) N.
- h) *austriaca* Mhlf. Wehlen, Pillnitz, Wachwitz, Loschwitz, Hoflössnitz Ro.; Meissen Rei.; Kötzschenbroda N. (an all' diesen Orten die kleine, mehr kuglige Form).
- i) *lropicida* L. Wolkenstein N.; Lichtewalde, Augustusburg N., Kl.; Kötzschenbroda, Bautzen, Schandau, Wehlen N.; bei Lichtewalde 3 Exemplare Albinos Kl.; Oybin, Löbauer Berg W.
- k) *umbrosa* Psch. Lössnitz, Zschonen- und Plauensche Grund, Rabenauer Grund; (Kl.), Ober-Reinsberg, Hartenstein Rei.; Bärenstein, Sachsenburg (bei Frankenberg), Tharandt Ro.; Lichtewalde, Wehlen und Wehlener Grund, Kriebstein bei Waldheim, Wolkenstein N.; Stein Kl.; Bautzen W.
- l) *sericea* Drp. Mordgrund bei Dresd.; Hartenstein Rei.; Leipzig Ro.; Rathen an der Elbe N.; Markersdorf bei Chemn. Kl.
- m) *hispida* L. Lichtewalde, Annaberg (in der Nähe des Bahnhofs) N.; Kl.; Wolkenstein, Augustusburg, Schandau, Dittersdorf bei Chemn. N.; Frauenstein Kl.; Ebersbach; Bautzen (Stadtmauer) W.

- n) *holoserica* Stud. Plauenscher und Rabenauer Grund; Tharandt, Cottaer Spitzberg Rei.; Geisingberg Kl.
- o) *obvoluta* Müll. Döbeln N.; Draisdorf und Lichtewalde bei Chemn. N., Kl.; Höllemühle bei Penig Kl.; Löbauer Berg W.
- p) *personata* Lam. Sebnitz- und Plauenscher Grund, Tharandt Ro.; Rabenhorst bei Maxen, Ober-Reinsberg, Döben bei Grimma Rei.; Lichtewalde N., Kl.; Draisdorf, Rabenauer Grund, Höllemühle (Penig) Kl.; Frankenberg, Lausche N.; Löbauer Berg W.
- q) *unidentata* Drp. Tharandt, Leipzig Ro.; Rabenhorst Rei.
- r) *aculeata* Müll. Mordgrund bei Dresd.; Hainsberg bei Tharandt Ro.; Wehlen Schauf.
- s) *rotundata* Müll. Annaberg, Döbeln, Kötzschenbroda, Wolkenstein, Oybin N.; Augustusburg N., Kl.; Draisdorf Kl.; Ebersbach und viele andre Orte der Lausitz W.
- t) *ruderata* Stud. Nassau bei Frauenstein, Geisingberg Ro.; Oybin N., Schfs.
- u) *pulchella* Müll. Chemnitz, Tharandt, Wolkenstein, Kötzschenbroda, Schandau, Ebersbach (hier auch W), N.; Oybin W.
- v) *costata* Müll. Strehlen bei Dresd.; Altschönfels bei Zwick. Rei.; Wehlen, Mordgrund bei Dresd.; Leipzig Ro.; Kötzschenbroda N.; Sachsenburg Kl.
- w) *pygmaea* Drp. Mordgrund bei Dresd., Geisingberg Rei.; Kötzschenbroda, Wolkenstein (unweit des Bades) N.
- x) *bidens* Chtz. Stünz bei Leipz., Ro.; Jahna Rei.; Weinau bei Zittau W.

25. *Hyalina*.

- a) *cellaria* Müll. Mordgrund, Loschwitz, Gottleubathal, Lauenstein, Hoheneck bei Stollberg, Stein, Hartenstein, Ober-Reinsberg Rei.; Draisdorf und Euba bei Chemn.

- Kl.; Mittweida, Kötzschenbroda, Lichtewalde (Kl.),
Rochsburg, Ebersbach N.; Oybin, Löbauer Berg W.
- b) *glabra* Stud. Kötzschenbroda (in sehr schönen Exempl.
und häufig) N.
- c) *alliaria* Müll. Wehlen, Mordgrund, Loschwitz, Lößnitz
Ro.; Meissen, Altschönfels bei Zwick., Rei.; Rabenauer
Grund Schaufuss.
- d) *nitidula* Drp. Tharandt, Rosenthal bei Leipzig Ro.;
Einsiedel bei Chemn. N.
- e) *pura* Ald. = *nitidosa* Fér. Rabenhorst bei Maxen,
Tharandt Ro.; Hartenstein Rei.; Augustusburg, Döbeln
N.; Ebersbach, Weinau bei Zittau W.
- f) *hyalina* Fér. = *diaphana* Stud. Plauenscher und
Rabenauer Grund, Hartenstein Rei.; Tharandt Ro.;
Kötzschenbroda N.; Markersdorf und Draisdorf bei
Chemnitz Kl.
- g) *crystallina* Müll. Mordgrund, Geisingberg (Kl.), Rei.;
Lichtewalde und Draisdorf Kl.; Tharandt Ro.; Ebers-
bach, Weinau bei Zittau W.
- h) *fulva* Müll. Tharandt, Graupen Ro.; Mordgrund bei
Dresd., Rei.; Geisingberg und zwischen Geisingberg
und Bärenstein Schauf.
- i) *nitida* Müll. Sebnitzgrund, Tharandt, Leipzig Ro.;
Niederwartha, Canitz bei Oschatz Rei.; Annaberg,
Chemnitz, Furth und Neuhilbersdorf bei Chemnitz,
Schandau N.; Ebersbach W.
- k) *radiatula* Ald. Wolkenstein N.; Markersdorf, Rabenauer
Grund, Zöblitz Kl.

26. Vitrina.

- a) *pellucida* Müll. Trachenberge bei Dresden.; Zschonen-
und Plauensche Grund, Hartenstein, Stein, Altschönfels
bei Zwickau Rei.; Tharandt Ro.; Oybin, Wolkenstein,
Schandau, Annaberg, Lichtewalde und Furth bei Chemn.,

N.; Markersdorf und Draisdorf bei Chemn. Kl.; Ebersbach, Löbau, Weinau bei Zittau W.

- b) *diaphana* Drp. Dresden, Tharandt, Leipzig Ro.; Geisingberg, Jahna Rei.; Oybin, Annaberg, Furth N.; Weinau bei Zitt.; Ebersbach W.

Var: *Heynemanni* Koch. Ebersbach W.

- c) *elongata* Drp. Zschonen-, Rabenauer und Plauensche Grund, Tharandt Ro.; Bärenstein, Geisingberg, Hartenstein, Stein, Jahna Rei.; Lichtewalde und Hilbersdorf bei Chemn. N.; Draisdorf bei Chemn., Frauenstein Kl.

27. *Daudebardia*.

- a) *rufa* Fér. Tharandt Ro.; Mordgrund und Lössnitz bei Dresd., Schauf.; Lichtewalde Kl.
b) *brripes* Fér. Tharandt Ro.; bei Hosterwitz bei Dresden. auch von Reichenbach gefunden.

28. *Arion*.

- a) *empiricorum* Fér. Ebersbach, Wehlen, Augustusburg und vielen anderen Orten; die rothe Abart, *rufus* L. bei Chemnitz und dessen Umgegend, Kötzschenbroda, Tharandt N.
b) *hortensis* Fér. Umgegend von Dresden, Rei.; Tharandt Ro.

29. *Limax*.

- a) *variegatus* Drp. Chemnitz, Frankenberg, Tharandt, Ebersbach, Kötzschenbroda, Niederwartha bei Meiss. N.
b) *cinereus* List. Zschonengrund bei Dresden, Schandau Ro.; Hosterwitz Rei.
c) *cinereo-niger* Wlf. Kötzschenbroda, Ebersbach N.
d) *agrestis* L. Durch ganz Sachsen in Gärten, Wäldern, auf Äckern allenthalben anzutreffen; Ro., Rei., W., N.

Anm. In den sächsisch. Gebirgen soll sich auch *Amalia marginata* Drp. finden (Clessin p. 47); specielle Fundorte sind mir nicht bekannt.

Wenn vor vierzig Jahren die Zahl der im Königreich Sachsen aufgefundenen Weichthier-Species 117 (113 Species, 4 Varietäten) betrug, so können also gegenwärtig auf Grund dieser unserer Mittheilungen 120 Species und 15 Varietäten bestimmt nachgewiesen werden. Und wenn auch die schönen, interessanten Arten *Claus. lineolata* Drp., *Azeca Menkeana* C. Pfr., *Pupa frumentum* Drp. und *secale* Drp. in Sachsen wohl nie anzutreffen sein dürften, so würden sich doch zuversichtlich noch einige andere Species und Varietäten finden lassen, sowie sich auch die Zahl der Fundorte beträchtlich vergrössern würde, sobald die Durchforschung des Landes hinsichtlich der Molluskenfauna mehr als bisher viribus unitis geschieht.

Literaturbericht.

Westerlund, Dr. C. Agardh, Fundamenta malacologica. Regeln der Nomenclatur; Anleitung zum Sammeln; über die Zubereitung für die Sammlung; anatomische Präparate; die Zucht der Binnenmollusken; vom Artbegriff; Programm der Artbeschreibung; Terminologie. Lund 1892, 8°. 119 pp. Selbstverlag des Verfassers.

Wir empfehlen diese sehr nützliche und wichtige Arbeit, deren reicher Inhalt aus dem Titel zu ersehen ist, angelegentlichst unseren Mitgliedern.

The Conchologist. Vol. II, No. 3.

- p. 41. Cooke, A. H., on the origin of the Genera of Land and Fresh-water Mollusca.
- p. 49. Garstang, W., Notes on the structure and habits of *Jorunna Johnstonei*.
- p. 52. Herdman, W. A., an additional occurrence of *Pleurophyllidia loveni* in Britain.
- p. 53. Tye, G. Sheriff, on the Periostracum of *Helix arbustorum*.
- p. 55. Gain, W. A., some remarks on the colour-changes in *Arion intermedius* Normand.
- p. 56. Collinge, Walter E., a review of the Arionidae of the British Isles.

Annals and Magazine of Natural History. Ser. VI. Vol. X.
p. 380. Smith, Edgar A., Additions to the Shell Fauna of the Victoria
Nyanza or Lake Oukéréwé. — Neu Ampullaria nyanzae,
gordoni, Planorbis victoriae, Sphaerium nyanzae.

p. 465. Smith, Edgar A., Description of a new Slug from South-Africa
(Apera burnupi).

*Gredler, P. Vincenz, zur Conchylienfauna von China. XVII
Stück.* Wien 1892. Selbstverlag. 8°. 24 S.

Neu Patula atoma p. 2; — Acusta secusana p. 3; — vagoina var.
aloisii p. 4; — Fruticicola reformata p. 4; — franciscanorum
var. purpurea p. 5; — Buliminopsis cerasinus p. 6; — Opeas
nutans var. macra p. 7; — Clausilia oscariana p. 7; — Cl. hupeana
p. 8; — Cl. bulimina p. 9; — Cl. presbyteralis p. 10; — Cl.
(Phaedusa) lea p. 10; — Cl. filippina var. socia p. 12; — Cl.
cilsa p. 12; — Cl. frater-minor p. 13; — Cl. (Formosana)
kiangshiensis p. 14; — Tricula utaiensis p. 15. Ausserdem sind
eine Anzahl kritischer Bemerkungen und Berichtigungen beigefügt.

Hedley, C., on the Genus Perrieria. In Proc. Linn. Soc. N.
S. Wales (2) vol. VIII, p. 311.

Coeliasix australis ist bis auf die Windungsrichtung nicht von
Perrieria zu trennen; der Typus von Coeliasix ist nicht die
australische exigua, sondern die afrikanische C. Layardi; C. exigua
ist synonym mit Perrieria australis, die Gattung Coeliasix somit
auf Afrika beschränkt.

Eingegangene Zahlungen:

Prinzing U., 6 Mk., Merkel, B., 6 Mk., Pfeiffer, K., 6 Mk., Ponsonby,
L., 6 Mk., Tschapeck, W., 6 Mk., Michael, W., 6 Mk., Naturf. Gesell-
schaft, Görlitz, 6 Mk., Westerlund, R., 6 Mk., Simon, St., 6 Mk., v.
Martens, B., 6 Mk., Krimmel, R., 6 Mk., Scholvien, H., 6 Mk., Graf Otting,
M., 6 Mk., v. Heimburg, O., 6 Mk., Andreeae, H., 6 Mk., Arndt, B.,
6 Mk., Friedel, B., 6 Mk., Jetschien, P., 6 Mk., v. Koch, Br., 6 Mk.,
Konow, St., 6 Mk., Zoolog. Institut, Kiel, 6 Mk., Zoolog. Museum,
Berlin, 6 Mk., Schacko, B., 6 Mk., Schlüter, H., 6 Mk., v. Monsterberg,
B., 6 Mk., Arnold, N., 6 Mk., Wiegmann, J., 6 Mk., Schepman, R.,
6 Mk., Löbbecke, D., 6 Mk., Dallatorre, J., 6 Mk., Kohlmann, V., 6 Mk.,
Reinhardt, B., 6 Mk., Petersen, H., 6 Mk., Neumann, E., 12 Mk.,
Gysser, St., 6 Mk., Cleve, U., 6 Mk.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.,
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Fünfundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Aeltere Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Die Verhältnisszahlen der palaearktischen Najaden,
eine Ergänzung zu C. Agh. Westerlund's Fauna der Binnenconchylien
Heft VII.

Von Prof. Dr. O. Boettger.

Die Nothwendigkeit, bei der Bestimmung der Süsswassermuscheln Form und Grösse und deren gegenseitige Verhältnisse und Beziehungen zu Rathe zu ziehen, hat mich schon bald nach dem Erscheinen des schönen und so überaus nützlichen Westerlund'schen Werkes veranlasst, nach und nach einen grösseren Theil der darin für die einzelnen Formen gegebenen Maasse zu meinem Privatgebrauche auszurechnen. Ich glaube, dass es den zahlreichen Benutzern des Buches nicht unwillkommen sein wird, der eigenen Mühe, diese nothwendigen Rechnungen vorzunehmen,

enthoben zu sein, und ich habe mich deshalb entschlossen, meine Notizen zu Nutz und Frommen Aller nach und nach zu veröffentlichen. Es wird daher zweckmässig sein, dass jeder Besitzer des Westerlund'schen Buches sich diese Verhältnisszahlen bei den einzelnen Formen an den Rand schreibe.

Ueber den spezifischen Werth solcher Maassverhältnisse bei den Najaden lässt sich streiten. Eines aber ist sicher, dass nämlich in vielen Fällen bei der Bestimmung verwandter Formen oder Arten auch die Bauchigkeit, die besondere Höhe, oder auffallende Schalenlänge recht erheblich ins Gewicht fallen muss, und eine für alle Arten und Varietäten gleichartige Formel die Uebersicht in dieser schwierigen Gruppe ganz wesentlich erleichtern wird. Ob, wie manche glauben, männliche und weibliche Thiere bestimmter Arten sich durch die Bauchigkeit (Tiefe) ihrer Schalen besonders auszeichnen und ihre Verhältnisszahlen daher in weiten Gränzen schwanken, ändert an meiner Auffassung von dem Werthe solcher Formeln wenig, da vorläufig noch jede Handhabe, die uns geboten werden kann, um das Chaos der Najaden zu sichten und zu unterscheiden, mit Freuden begrüsst werden muss, wenn diese Zahlbeziehungen auch nicht in allen Fällen und für immer von ausschlaggebendem Nutzen sein dürfen.

Die im Folgenden aufgezählten Formeln $1 : x : y$ beziehen sich durchweg auf die Verhältnisse von grösster Tiefe (Dicke der Doppelschale) zu grösster Höhe zu grösster Länge der Schalen und schliessen sich in der Reihenfolge und in den benutzten Maassangaben eng an die Westerlund'sche Aufzählung an. Nur einzelne Angaben entstammen eigener Beobachtung, namentlich da, wo ich sichere Originalstücke meiner Sammlung in grösseren Reihen messen konnte. Die Tiefe (prof.) der Schalen messe ich stets mit dem Tasterzirkel und lese dann auf dem Maass-

stabe die gefundene Grösse in Millimetern ab, die ich dann den übrigen Ziffern gegenüber als Einheit betrachte; die Höhe (alt.) und die Länge (long.) dagegen nehme ich direkt von einem eisernen sogenannten Schustermaasse ab, das ebenfalls in Millimeter eingetheilt ist.

Ungenauigkeiten in den älteren Grössenangaben und Flüchtigkeitsfehler der neueren Messungen kommen natürlich in der folgenden Tabelle vielfach zum Ausdruck; solche bedenklichen Zahlen — theilweise schon von mir durch ein Fragezeichen bezeichnet — sollen besondere Veranlassung dazu geben, die Originale nochmals auf die Genauigkeit der Originalmessungen zu prüfen. In anderen Fällen geben uns diese Ziffern aber auch den Wink, dass die betreffende Form unmöglich in der Gruppe oder Abtheilung, in die sie Bourguignat, Drouët, Kobelt oder Westerlund gestellt haben, stehen bleiben darf, und in noch anderen Fällen können sie uns bestimmen, Vergleiche mit anderen Formen von ähnlicher Schalenformel anzustellen, die ihnen möglicherweise näher stehen, als es die Westerlund'sche Anordnung vermuten lässt.

Dass junge und alte Schalen (namentlich bei Pisidien, Sphaerien und Anodonten) ganz verschiedene Indices und Verhältniszahlen ergeben, ist mir durchaus nicht unbekannt. Im Allgemeinen gelten aber die folgenden Ziffernreihen nur für erwachsene Stücke und, so weit es eigene Angaben gilt, auch immer nur für Reihen von 4—6 Stücken, deren Durchschnittsverhältnisse dann von uns angegeben worden sind.

Da mir selbst bei der Determination — natürlich immer neben den Originalabbildungen — diese Verhältniszahlen von erheblichem Werth gewesen sind, so hoffe ich, dass die Mühe, die ich mir mit ihrer Berechnung gegeben habe, nicht umsonst gewesen ist, und dass die gefundenen Formeln auch Anderen von Interesse und Nutzen sein werden.

I. Gatt. **Unio** Retz. (Westerlund VII. pag. 41).

- (1) *U. auricularius* Spengl. 1 : 1,60 — 1,98 : 2,56 — 3,63.
(2) " *margaritanopsis* Loc. 1 : 1,88 : 3,47.
(3) " *litoralis* Cuv. 1 : 1,67 — 1,77 : 2,33 — 2,81.
 var. *elongata* Dup. 1 : 1,45 : 2,47.
 var. *subtetragona* Mich. 1 : 2,19 : 311.
 var. *bigorriensis* Mill. 1 : 2,50 : 3,75.
 var. *pianensis* Far. 1 : 2,00 : 3,33.
 var. *barraudei* Bonh. 1 : 1,48 : 2,28.
 var. *moulinsiana* Dup. 1 : 1,50 : 2,50.
 " *rathymus* Loc. 1 : 1,08 : 2,03.
(4) " *asterianus* Dup. 1 : 1,75 : 2,88.
 " *umbonatus* Rssm. 1 : 1,83 : 2,70.
 " *pacomei* Loc. 1 : 1,60 : 1,87.
 " *subreniformis* Bgt. 1 : 1,37 : 2,41.
 " *hispalensis* Kob. 1 : 1,35 : 2,26.
 " *gaudiensis* Drouët. 1 : 1,75 : 2,50.
 " *calderoni* Kob. 1 : 1,29 : 1,79.
(5) " *jolyi* Kob. 1 : 1,84 : 2,68.
 " *mauritanicus* Bgt. 1 : 1,47 : 2,02.
 " *zenaticus* Bgt. 1 : 1,74 : 3,04.
 " *rouirei* Bgt. 1 : 1,61 : 3,22.
 " *ksibianus* Mouss. 1 : 1,82 : 2,71.
(6) " *mac-carthyanus* Bgt. 1 : 1,76 : 2,94.
(7) " *medjerdae* Kob. 1 : 1,54 : 2,77.
 " *letourneuxi* Bgt. 1 : 1,53 : 3,02.
(8) " *acarnanicus* Kob. 1 : 1,96 : 2,87 (Kobelt)
 1 : 1,86 : 2,82 (aus dem Eurotas,
 Lakonien)(Boettger).
 var. *messenica* West. 1 : 1,50 : 3,00.
(9) " *rothi* Bgt. 1 : 1,57 : 2,34.
 var. *komarowi* Btlgr. 1 : 1,39 : 2,21.
 " *simonis* Tristr. 1 : 1,43 : 1,97.

- U. luynesi* Loc. 1 : 1,22 : 2,30.
„ *galilaei* Loc. 1 : 1,22 : 1,52.
„ *timius* Loc. 1 : 1,75 : 2,25.
„ *rhomboïdopsis* Loc. 1 : 1,64 : 2,14.
„ *emesaensis* Lea. 1 : 1,58 : 2,02.
(10) „ *episcopalis* Tristr. 1 : 1,60 : 2,80.
(11) „ *crassus* Retz. 1 : 1,42—1,46 : 2,39—2,69.
 var. *acuta* Rssm. 1 : 1,31 : 2,42.
„ *pseudolitoralis* Cless. 1 : 1,29 : 2,38.
„ *kochi* Kob. 1 : 1,28 : 2,38.
„ *hamburgiensis* Serv. 1 : 1,56 : 2,72.
(12) „ *oriliensis* Stab. 1 : 1,34 : 2,86.
„ *corrosus* Villa. 1 : 1,76 : 3,24.
„ *melas* Bgt. 1 : 1,68 : 3,10.
„ *crassatellus* Bgt. 1 : 1,43 : 2,48.
(13) „ *ater* Nilss. 1 : 1,36 : 3,04.
 var. *elegans* West. 1 : 1,13 : 2,87.
„ *savensis* Drouët. 1 : 1,48—1,70 : 2,83—3,25.
„ *sterenianus* Kryn. 1 : 1,40 : 2,63 (Drouët).
 1 : 1,80 : 2,75 (Kobelt).
„ *gontieri* Bgt. 1 : 1,44 : 2,89.
„ *brevierei* Loc. 1 : 1,53 : 2,98.
„ *melantatus* Loc. 1 : 1,42 : 2,88.
„ *balbignyanus* Loc. 1 : 1,52 : 2,90.
„ *scotinus* Loc. 1 : 1,73 : 2,97.
„ *stygnus* Loc. 1 : 1,79 : 3,05.
„ *occidentalis* Loc. 1 : 2,00 : 3,72.
(14) „ *penchinatianus* Bgt. 1 : 1,44 : 2,94.
„ *mongazonae* Serv. 1 : 1,35 : 2,65.
„ *sebinensis* Bgt. 1 : 1,45 : 2,40.
„ *opisodartos* Adami. 1 : 1,42 : 2,69.
„ *giberti* Loc. 1 : 1,45 : 2,80.
„ *baroni* Serv. 1 : 1,39 : 2,22.
(15) „ *dokici* Drouët. 1 : 1,33—1,48 : 2,42—2,96.

- U. vicarius* West. 1 : 1,50 : 2,83 (Westerlund).
1 : 1,53 : 2,76 (Boettger).
- , *heldreichi* Bttgr. 1 : 1,67 : 2,75.
- , *serbiclus* Drouët. 1 : 1,60 : 3,17.
- , *desectus* West. 1 : 1,48 : 3,16 (Westerlund).
1 : 1,41 : 2,69 (Boettger).
- , *mingrelicus* Drouët. 1 : 1,51 : 2,60.
- (16) , *batarus* Mat. Rack. 1 : 1,44 : 2,89.
var. *taunica* Kob. 1 : 1,25 : 2,42.
var. *ondovensis* Haz. 1 : 1,28 : 2,86.
var. *albensis* Haz. 1 : 1,42 : 2,48.
var. *droueti* Dup. 1 : 1,65 : 3,00.
var. *matronica* Bgt. 1 : 1,12 : 1,92.
var. *ryckholti* Malz. 1 : 1,44 : 2,64.
var. *andegarensis* Loc. 1 : 1,38 : 2,31.
var. *piscinalis* Rossm. 1 : 1,50 : 3,00.
- , *besnardianus* Loc. 1 : 1,48 : 2,52.
- , *risurginus* Serv. 1 : 1,45 : 2,71.
- , *vegesackensis* Serv. 1 : 1,69 : 3,06.
- , *squamosus* Charp. 1 : 1,21—1,33 : 2,25—2,67.
- , *stepanoffi* Drouët. 1 : 1,44 : 2,40.
- , *batavellus* Loc. 1 : 1,36 : 2,72.
- , *diptychus* Loc. 1 : 1,36 : 2,32.
- , *ingrandiensis* Loc. 1 : 1,57 : 2,76.
- , *materniacus* Loc. 1 : 1,41 : 2,29.
- , *surraulti* Serv. Loc. 1 : 1,67 : 2,67.
- , *financei* Loc. 1 : 1,48 : 2,34.
- , *caumonti* Loc. 1 : 1,83 : 2,33.
- (17) , *reniformis* Rossm. 1 : 1,40 : 2,52.
- , *heldi* Kstr. 1 : 1,71 : 2,89.
- , *gangraenosus* F. J. Schm. 1 : 1,26 : 2,15.
- , *duregicus* Serv. 1 : 2,00 : 3,29.
- , *carcasinus* Sourb. 1 : 1,38 : 2,52.
- , *catalaunicus* Loc. 1 : 1,60 : 2,70.

- U. pruinosus* F. J. Schm. 1 : 1,18 : 2,32 (Locard).
1 : 1,82 : 3,21 (Drouët).
- (18) „ *nicolloni* Loc. 1 : 0,94 : 2,94.
- (19) „ *lemotheuxi* Loc. 1 : 1,56 : 3,11.
„ *exauratus* Loc. 1 : 1,71 : 3,18.
- (20) „ *nanus* Lmk. 1 : 1,33 : 2,18.
„ *lagynsicus* Loc. 1 : 1,79 : 2,68.
„ *lemovicincae* Kstr. 1 : 1,67 : 2,80.
- (21) „ *rayi* Loc. 1 : 2,20 : 3,30.
„ *latinus* Bgt. 1 : 1,50 : 2,94.
„ *mancus* Lmk. 1 : 1,72 : 3,75.
var. *pilloti* Loc. 1 : 1,66 : 3,24.
- „ *manculus* Loc. 1 : 1,33 : 2,78.
„ *subtilis* Drouët. 1 : 1,48 : 2,65.
„ *jurianus* Loc. 1 : 1,64 : 2,79.
„ *aturicus* Loc. 1 : 1,67 : 3,00.
„ *dubisianus* Loc. 1 : 1,48 : 2,86.
var. *dubisianopsis* Loc. 1 : 1,50 : 2,38.
- (22) „ *brachyrhynchus* Drouët. 1 : 1,67 : 2,79.
„ *delpretei* Bgt. 1 : 1,67 : 3,07.
- (23) „ *badiellus* Drouët. 1 : 1,53 : 2,76.
„ *orbus* Loc. 1 : 1,95 : 3,53.
- (24) „ *amnicus* Rossm. 1 : 1,25—1,26 : 2,32—2,34.
„ *subamnicus* Loc. 1 : 1,33 : 2,50.
„ *glaucinus* Porro. 1 : 1,52 : 2,97.
„ *minutulus* Serv. 1 : 1,82 : 3,09.
„ *verbanicus* Bgt. 1 : 1,50 : 2,89.
- (25) „ *macrorhynchus* Loc. 1 : 1,38 : 2,88.
„ *neocomensis* Drouët. 1 : 1,40 : 2,88.
„ *decurratus* Rossm. 1 : 1,50 : 3,00.
„ *turicus* Serv. 1 : 1,57 : 2,61.
„ *tiguricus* Serv. 1 : 1,88 : 2,76.
„ *sandriopsis* Serv. 1 : 1,11 : 2,37.
„ *sandrii* Rossm. 1 : 1,65 : 2,89.

(33) *U. rostratus* Lmk. 1 : 1,27—1,37 : 3,33—3,41.

var. *quinqueannulata* Kstr. 1 : 1,36 : 3,09.

var. *episema* West. 1 : 1,43 : 3,14.

, *gaudioni* Drouët. 1 : 1,60 : 3,40.

, *macropisthus* Loc. 1 : 1,59 : 4,14.

, *siliquiformis* Loc. 1 : 1,69 : 3,88.

, *dubreili* Serv. 1 : 1,24 : 2,79.

, *balatonicus* Serv. 1 : 1,39 : 3,00.

, *subbalatonicus* Serv. 1 : 1,39 : 3,17.

, *lugdunicus* Loc. 1 : 1,35 : 3,40.

, *stephaninii* Adami. 1 : 1,50 : 3,15.

var. 1 : 1,50 : 3,04.

, *oberthurianus* Loc. 1 : 1,56 : 3,33.

, *ardusianus* Reyn. 1 : 1,67 : 3,54.

, *corbini* Bgt. 1 : 1,55 : 2,76.

, *danielis* Gass. 1 : 1,54 : 3,18.

, *royanus* Loc. 1 : 1,74 : 3,22.

, *subhispanus* Loc. 1 : 1,48 : 2,96.

, *triffoiricus* Loc. 1 : 1,61 : 3,46.

, *mucidulinus* Loc. 1 : 1,58 : 3,32.

, *asticus* Serv. 1 : 1,46 : 3,00.

, *eutrapelus* Serv. 1 : 1,47 : 2,60.

, *hammoniensis* Serv. 1 : 1,43 : 3,36.

, *nevesi* Silva. 1 : 1,58 : 3,54.

, *simoesi* Silva. 1 : 1,65 : 3,18.

, *mongolicus* Midd. 1 : 1,46 : 3,17.

, *middendorffi* West. 1 : 1,50 : 3,00.

var. *elatior* Schr. 1 : 1,30 : 2,57.

var. *ventricosa* Schr. 1 : 0,91 : 2,34.

(34) , *pallens* Rossm. 1 : 1,46 : 2,70.

, *klecaki* Drouët. 1 : 1,61 : 3,41.

, *viridiflavus* Kstr. 1 : 1,65 : 3,40.

, *petterianus* Kstr. 1 : 1,75 : 3,00.

- (39) *U. oesiacus* Loc. 1 : 1,50 : 2,94.
 „ *aegericus* Loc. 1 : 1,83 : 4,13 (?).
(40) „ *rousi* Dup. 1 : 1,50 : 3,33.
 „ *perroudi* Loc. 1 : 1,25 : 3,04.
 „ *cristulatus* Drouët. 1 : 1,59 : 3,21.
 „ *courquinianus* Bgt. 1 : 1,37 : 2,74.
 „ *atharsus* Loc. 1 : 1,52 : 3,05.
 „ *baudoni* Folin. 1 : 1,07 : 2,50.
 „ *lambottei* Malz. 1 : 1,48 : 3,04.
 „ *baudoni* Drouët & Kobelt. 1 : 1,29 : 2,86.
(41) „ *jacquemini* Dup. 1 : 1,03 : 2,69.
 „ *fabaeformis* Fagot. 1 : 1,35 : 2,53.
(42) „ *frayssianus* Loc. 1 : 1,35 : 2,69.
 „ *meyrannicus* Loc. 1 : 1,52 : 2,70.
 „ *ararisianus* Loc. 1 : 1,43 : 2,71.
(43) „ *callichrous* Bgt. 1 : 1,50 : 3,45.
 „ *blauneri* Kob. 1 : 1,40—1,50 : 3,27—3,33.
 „ *pornae* Bgt. 1 : 1,57 : 3,43.
 „ *d'anconae* Bgt. 1 : 1,72 : 3,50.
 „ *caficianus* Bgt. 1 : 1,79 : 3,68.
 „ *nitidus* Drouët. 1 : 1,70 : 3,50.
 „ *magistri* West. 1 : 1,48 : 3,39.
 „ *gestroianus* Bgt. 1 : 1,65 : 3,90.
 „ *vardonicus* Loc. 1 : 1,61 : 3,17.
 „ *aramonensis* Loc. 1 : 1,70 : 3,60.
 „ *charpyi* Drouët. 1 : 1,43 : 3,18.
(44) „ *mariae* Loc. 1 : 1,65 : 2,88.
 „ *caroliensis* Loc. 1 : 1,53 : 2,58.
 „ *passavanti* Loc. 1 : 1,55 : 2,71.
(45) „ *vulgaris* Stab. 1 : 1,28 : 2,74.
 „ *gredleri* Drouët. 1 : 1,53 : 2,71.
 „ *humerosus* West. 1 : 1,39 : 2,84.
 „ *limnaeus* West. 1 : 1,49 : 2,84.
 „ *cavarellus* Serv. 1 : 1,83 : 3,10.

- U. *strigatus* Serv. 1 : 1,54 : 2,77.
„ *padanus* Bgt. 1 : 1,61 : 3,17.
„ *strobeli* Bgt. 1 : 1,71 : 3,43.
„ *falsus* Loc. 1 : 2,00 : 3,53 (Locard).
 1 : 1,58 : 3,50 (Drouët).
„ *jourdeilhi* Loc. 1 : 2,11 : 3,33.
„ *talus* Loc. 1 : 1,56 : 3,06. —
„ *mucidellus* Loc. 1 : 1,53 : 3,42.
- (46) „ *hispanus* Rossm. 1 : 1,55 : 2,95.
„ *sevillensis* Kob. 1 : 1,27 : 2,50.
„ *baeticus* Kob. 1 : 1,37 : 2,37.
„ *graellsianus* Bgt. 1 : 1,50 : 2,89.
„ *valentinus* Rossm. 1 : 1,46 : 2,81.
„ *hyperephanus* Silva. 1 : 1,68 : 3,23.
- (47) „ *micelii* Kob. 1 : 1,41 : 2,88.
„ *moreleti* Desh. 1 : 1,38 : 2,84.
„ *ravoisieri* Desh. 1 : 1,41 : 2,79.
„ *durieui* Desh. 1 : 1,45 : 2,86.
„ *tafnanus* Kob. 1 : 1,40 : 2,80.
„ *doumeti* Bgt. 1 : 1,56 : 3,07.
„ *tetuanensis* Kob. 1 : 1,78 : 3,33.
- (48) „ *blanci* Bgt. 1 : 1,88 : 3,59.
„ *etruscus* Drouët. 1 : 1,72 : 3,19.
„ *romanus* Rig. 1 : 1,76 : 3,82.
„ *campanus* Bgt. 1 : 1,60 : 3,35.
„ *rusticus* Pini. 1 : 1,51 : 2,74.
„ *cusianus* Pini. 1 : 1,54 : 3,00.
„ *isseli* Bgt. 1 : 1,73 : 3,59.
„ *meridionalis* Drouët. 1 : 1,54 : 3,00.
„ *capigliolo* Payr. 1 : 1,56 : 3,75 (Rossmaessler).
 1 : 1,75 : 3,50—3,75 (Westerlund).
„ *moquinianus* Dup. 1 : 1,46 : 3,05.
- (49) „ *amblyus* Loc. 1 : 1,61 : 3,30.
- (50) „ *vittorioi* Bgt. 1 : 1,42 : 2,58.

- U. pisanus* Bgt. 1 : 1,63 : 3,05.
„ *adonus* Loc. 1 : 1,57 : 3,19.
„ *hattemani* Loe. 1 : 1,32 : 2,32.
„ *uziellii* Bgt. 1 : 1,37—1,46 : 2,62—2,67.
„ *larius* Drouët. 1 : 1,49 : 3,19.
„ *subrobustus* Serv. 1 : 1,33 : 2,43.
- (51) „ *pancici* Drouët. 1 : 1,66 : 3,29.
„ *bosnicus* Moell. 1 : 1,55 : 2,90.
„ *sierversi* Drouët. 1 : 1,61 : 2,94.
var. *kobelti* West. 1 : 1,35 : 2,70.
„ *truncatus* Drouët. 1 : 1,67 : 2,89.
„ *striolatus* Drouët. 1 : 1,28 : 2,60.
„ *rivalis* Drouët. 1 : 1,50 : 2,97.
„ *succineus* Drouët. 1 : 1,59 : 3,28.
- (52) „ *vescoi* Bgt. 1 : 1,46 : 2,74.
var. *conemenosi* Blan. 1 : 1,58 : 2,84.
„ *kotschyi* Kstr. 1 : 1,64 : 3,09.
„ *ionicus* Drouët. 1 : 1,67 : 3,12 (Drouët).
1 : 1,80 : 2,95 (Boettger).
- (53) „ *larderelianus* Pecch. 1 : 1,31 : 2,77.
„ *lawleyianus* Gent. 1 : 1,86 : 3,73.
„ *piccinellii* Adami. 1 : 1,58 : 3,81.
„ *pedemontanus* Bgt. 1 : 1,49 : 3,33.
„ *rhynchetinus* Bgt. 1 : 1,25 : 3,00.
„ *brebissoni* Loc. 1 : 2,69 : 3,56 (?).
„ *hopitali* Loc. 1 : 1,41 : 3,24.
- (54) „ *gargottae* Phil. 1 : 1,50 : 3,45.
„ *monterosatoi* Bgt. 1 : 1,67 : 3,29.
„ *aradasi* Bgt. 1 : 1,47 : 2,92.
„ *moltenii* Paul. 1 : 1,63 : 3,48.
„ *umbrius* Adami. 1 : 1,33 : 3,15.
„ *ruffoni* Adami. 1 : 1,49 : 3,07.
„ *siliquatus* Drouët. 1 : 1,57 : 3,54.
„ *gentiluomoi* Bgt. 1 : 1,52 : 3,64.

- U. cumanus* Kob. 1 : 1,46 : 3,39.
- (56) „ *turtoni* Payr. 1 : 1,82 : 3,48.
„ *forojuliensis* Béreng. 1 : 1,50 : 3,21.
„ *philippei* Dup. 1 : 1,47 : 3,02.
„ *brindosianus* Fol. Bér. 1 : 1,23 : 2,73.
„ *brindosopsis* Loc. 1 : 1,80 : 3,27.
„ *albanorum* Loc. 1 : 1,60 : 3,40.
„ *bayonnensis* Fol. Bér. 1 : 1,52 : 3,64.
„ *aleroni* Comp. Mass. 1 : 1,87 : 3,74.
- (57) „ *elongatus* C. Pfr. 1 : 1,86 : 4,00.
„ *idrinus* Drouët. 1 : 1,52 : 2,83—3,04.
„ *krueperi* Drouët. 1 : 1,54 : 2,97.
„ *ceratinus* Drouët. 1 : 2,15 : 4,44 (?).
„ *orthellus* Béreng. 1 : 1,56 : 3,44.
„ *orthus* Cout. 1 : 1,82 : 3,33.
- (58) „ *andeliacus* Loc. 1 : 1,81 : 3,24.
„ *vallericus* Loc. 1 : 1,17 : 2,17 (?).
„ *nubilus* Loc. 1 : 1,70 : 2,87.
- (59) „ *minusculus* Drouët. 1 : 1,38 : 2,35.
„ *benacinus* Drouët. 1 : 1,22 : 2,78.
- (60) „ *villae* Stab. 1 : 1,46 : 3,18—3,56.
„ *reillanensis* Loc. 1 : 1,28—1,60 : 2,80—3,50.
„ *christophori* Adami. 1 : 1,17—1,28 : 3,07—3,11.
„ *zoasthenus* Loc. 1 : 1,82 : 2,82.
„ *peracutus* Serv. 1 : 1,50 : 3,40.
„ *borcherdingi* Bgt. 1 : 1,33 : 2,92.
- (61) „ *raymondi* Loc. 1 : 1,49 : 2,98.
„ *pietri* Loc. 1 : 1,40 : 2,55.
„ *tristrami* Loc. 1 : 1,29 : 2,46.
- (62) „ *axiacus* Loc. 1 : 1,42 : 2,60.
„ *eucirrus* Bgt. 1 : 1,71 : 2,87 (Bourguignat).
1 : 1,67 : 3,08 (aus Syrien) (Boettger).
„ *hueti* Bgt. 1 : 1,57 : 3,24 (Bourguignat).
1 : 1,24 : 2,21 (v. Martens).

- (63) *U. ellipsoideus* Loc. 1 : 1,39 : 2,39.
„ *jordanicus* Bgt. 1 : 2,14 : 3,97.
„ *delesserti* Bgt. 1 : 1,88 : 2,88.
„ *bruguierianus* Bgt. 1 : 1,52 : 2,91.
„ *genezarethanus* Loc. 1 : 1,48 : 2,43.
„ *araxenus* Drouët. 1 : 1,80 : 3,33.
„ *bagdadensis* Bgt. 1 : 1,74 : 2,95.
„ *grelloisianus* Bgt. 1 : 1,20 : 2,00.
- (64) „ *lorteti* Loc. 1 : 1,48 : 2,78.
„ *tiberiadensis* Loc. 1 : 1,30 : 2,48.
„ *terminalis* Bgt. 1 : 1,31 : 2,29.
„ *prosacrus* Loc. 1 : 1,34 : 2,49.
„ *tigridis* Bgt. 1 : 1,21 : 2,47.
„ *subtigridis* Loc. 1 : 1,37 : 2,81.
„ *anemprostus* Loc. 1 : 1,27 : 2,42.
„ *chantrei* Loc. 1 : 1,35 : 2,42.
„ *jauberti* Loc. 1 : 1,42 : 2,68.
„ *antiochianus* Loc. 1 : 1,53 : 2,60.
„ *eucyphus* Bgt. 1 : 1,23 : 1,86.
- (65) „ *lunulifer* Bgt. 1 : 1,41 : 2,23.
„ *zabulonicus* Loc. 1 : 1,41 : 2,27.
- (67) „ *aegyptiacus* Desh. 1 : 1,31 : 1,90.
„ *niloticus* Caill. 1 : 1,30 : 1,96.
„ *rugifer* Kstr. 1 : 1,29 : 2,10.

Drei Eulima microstoma,
von
S. Brusina.

Im Jahre 1869 habe ich eine kleine, aber doch ausgezeichnete Eulima-Art beschrieben, welche ich sehr spärlich auf der Insel Grossa Nord-Dalmatiens und häufiger

aus der nächsten Umgebung von Ragusa gesammelt hatte. Diese Art wurde später mehrfach sowohl recent als fossil wiedergefunden.

Eulima microstoma ist zwar bis heute noch nicht abgebildet worden, aber wenn Forscher, welche das Glück haben, in grossen Cultur-Centren zu leben, doch leider zu oft keine Gelegenheit haben, Abbildungen zu liefern, so kann man es noch weniger von uns verlangen. — *Eulima microstoma* ist also heute eine allgemein anerkannte gute Art.

Mein hochverehrter Freund, Herr Marquis T. Allery von Monterosato hat in seiner Arbeit vom Jahre 1884, welche in der folgenden Synonymie citirt wird, die Ansicht ausgesprochen, dass *E. microstoma* vielleicht mit *E. brevis* Requien aus Corsica, welche im Jahre 1848 ganz kurz beschrieben wurde, ident sein könnte. Ich habe die Diagnose besagter Art durchgelesen, habe aber absolut keinen Anhaltspunkt gefunden, welcher uns zu dieser Annahme berechtigen könnte.

Im Jahre 1891 wurden nun zwei fossile *E. microstoma* veröffentlicht. Die eine wurde beschrieben und abgebildet, die andere einfach ohne Diagnose verzeichnet. Beide müssen also einen anderen Namen bekommen; und ich will es eben hier thun, um jeder weiteren Verwirrung vorzubeugen.

Ich habe mir die Mühe gegeben die Synonymie meiner *E. microstoma* zusammenzustellen, kann aber natürlich nicht dafür gutstehen, dass diese auch vollständig ist.

Hier folgt also die Synonymie der drei *Eulima microstoma*, mit der von mir für die zwei fossilen Arten vorgeschlagenen Namenänderung und Angabe der Fundorte nach der mir zugänglichen Litteratur.

Eulima microstoma Brusina.

1869. *Eulima microstoma* Brus. Journ. de Conch. XVII. p. 244.
1870. „ „ Brus. Viestnik nar. muzeja, p. 179.
1870. „ „ Jeffr. Mediterr. Moll. (Ann. Mag. of Nat. Hist.) (p. 16).
1872. „ „ Brus. Rad jugoslav. akadem. XIX, p. 151 (47).
1872. „ „ Monteros. Notizie Conch. foss. M. Pellegr. e Ficarazzi, p. 31.
1872. „ „ Monteros. Notizie Conch. Mediterr., p. 43.
1873. „ „ Weinkauff. Catal. europ. Meeres-Conch., p. 23.
1873. „ „ Jeffr. Some Remarks Moll. Mediterr. (Brit. Assoc. for the Advanc.) p. 114.
1873. „ „ Seguenza, Bollett. Comit. Geol. IV. p. 352.
1874. „ „ Stalio, Notizie stor. con Prospetti statis., p. 129, 151.
1874. „ „ Aradas e Benoit, Conch. viv. Sicilia, p. 229.
1875. „ „ Montero., Nuova Rivista Conch. Mediterr., p. 35.
1877. „ „ Monteros. Bollet Comit. Geol. VIII. p. 36 (11).
1877. „ „ Issel, Annali Mus. di Genova, IX, p. 404.
1877. „ „ Monteros. l. c., p. 422 (16).
1878. „ „ ? Issel, l. b. XI, p. 430.
1878. „ „ Monteros. Enun. e Sinonim. Conch. Mediterr., p. 35.
1880. „ „ M. Stossich, Bollett. Soc. Adriat. V, p. 182 (80).

1883. *Eulima microstoma* Paetel, Catal. Conch. Samml., p. 45.
1883. " " Marion, Annal. Musée d'Hist. Nat. Marseille, I, p. 78.
1883. " " Dautzenberg, Journ. de Conch. XXXI, p. 316 (28).
1884. " " Monter. Nomencl. Gener. e Specif. Conch. Mediterr., p. 100.
1886. " " Tryon, Manual of Conch., VIII, p. 278.
1886. " " Locard, Catal. Génér. Moll. viv. de France. Moll. mar., p. 208.
1886. " " Kobelt, Prodr. Faunae Moll. mar. europ. inhab., p. 115.
1887. " " Paetel, Catal. d. Conch. Samml., I, p. 275.
1890. " " Carus, Prodr. Faunae Mediterr. II, p. 287.
1892. " " Locard, Coquill. mar. de France. p. 133.

Adria. Dalmatien: Punte Bianche auf der Insel Grossa (Nord-Dalmatien's); Lapad bei Gravosa unweit Ragusa (Brusina).

Mittelmeer. Griechenland: ? Insel Elaphonisi (Isola dei Cervi) (Issel).

Italien: Insel Pantellaria (Monterosato, Aradas et Benoit) Magnisi, Ognina di Catania (Arad. et Ben.), Palermo (Monter.), Trapani (Monter., Brugnone), Rada di Cittavecchia (Montr.), Spezia (Doria).

Frankreich: Nice (Locard), Golf von Marseille (Marion).

Tunis: Sousse, Kerkennahs, Sfax, Gabés, Aghir, Zarziss, Lokalitäten im Golfe von Gabés (Dautzenberg).

Atl. Ocean: Canarische Inseln (M'Andrew).

Tertiär: Pliocen des Monte Pellegrino bei Palermo (Monter.);
Mergel von Genua (Issel).

Eulima Koeneni Brus. n. nom.

1899. *Eulima microstoma* Koen. (non Brus.) Nordeutsch.
Unterolig. u. seine Moll. Fauna
(Abhandl. Specialkar. v. Preussen,
X, Heft 3, p. 633—37, f.)

Tertiär. Deutschland:

Eulima Newtoni Brus. n. nom.

1891. *Eulima microstoma* Edwards (M. S.) (non Brus.) in
R. B. Newton, System. list of
Brit. Oligoc. a. Eoc. Moll., p. 183.

Tertiär. England: Eocen, London Clay. Highgate.

Sacco hat neuerlich eine tertiäre *Eulima parvofusula**) beschrieben, welche nach seiner Meinung an unsere *E. microstoma* erinnern soll. — Nach der Beschreibung und Abbildung beurtheilend, finde ich eine wohl nur unbedeutende Aehnlichkeit.

Pilsbry's neue Eintheilung von Helix.

In den Proc. Acad. Nat. Sciences Philadelphia 1892 p. 287 ff. gibt Pilsbry eine vorläufige Mittheilung über eine neue Auftheilung der alten Gattung *Helix* auf anatomischen Grundlagen; eine grössere, sie genauer begründende Arbeit soll in 1893 erscheinen. Die Eintheilung nach dem

*) Sacco Dr. F. J. Molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria. Parte XI. Torino 1892, S. 7, Taf. 1, Fig. 10.

Bau des Kiefers wird völlig aufgegeben. Pilsbry unterscheidet sechs Hauptgruppen:

I. Macroon, von allen anderen unterschieden durch die Grösse der Embryonalwindungen. Hierher die Gattungen *Acaous* und *Phania*, für welche wegen einer gleichnamigen Fliegengattung der Name *Pyrochilus* eingeführt wird, *Styloconta* und *Helicophanta*.

II. Arten mit kleinem Embryo.

a. Weiblicher Genitalapparat mit Pfeilsack und Schleimdrüse:

II. Belogona.

aa. Weiblicher Genitalapparat ohne Anhangsdrüsen, der männliche mit Flagellum und Appendix, aber ohne Epiphallum:

III. Teleophalla.

aaa. Weiblicher Genitalapparat ohne Anhänge, der männliche ohne Appendix, aber mit Epiphallum:

VI. Epiphallophora.

aaaa. Beide Genitalsysteme ohne Anhänge:

b. Kiefer aus einem Stück:

V. Haplogona.

bb. Kiefer zusammengesetzt:

VI. Polyplacognatha.

Unter Belogona werden alle mit Liebespfeil versehenen Arten zusammengefasst; die meisten europäischen, die ostasiatischen Heliceen und die westamerikanischen bleiben im Gegensatz zu Shering's Auffassung unter *Helix* vereinigt, nur *Gonostoma* erhält eine selbstständigere Stellung als Untergattung und *Leucocroa* und *Allognathus* werden als Gattungen anerkannt. Ferner gehören zu den Belogona als Gattungen *Cochlostyla*, *Polymita*, *Hemitrochus*, *Glyptostoma*;

auch *Acanthinula* und *Vallonia* werden als Gattungen aufgeführt. Von grossem Interesse ist, dass Pilsbry sehr energisch die Zugehörigkeit der tertiären europäischen *Helices* zu aussereuropäischen Gruppen bestreitet, wohin sie besonders Sandberger gestellt hat; er rechnet sie alle zu *Helix* im engeren Sinne. Ob er wohl auch für *Glandina* und die Deckelschnecken derselben Ansicht ist?

Zu den *Teleophalla* werden nur *Sagda* und *Cysticopsis*, sowie vielleicht *Pararhytida* Ancey gerechnet.

Dagegen umfassen die *Epiphallophora* die meisten grossen tropischen *Helix*; als Gattungen werden anerkannt *Caracolus* (= *Parahelix* Iher.) mit den Sektionen *Caracolus* s. str., *Lucerna*, *Dentellaria*, *Isomeria*, *Labyrinthus* *Euryceratera*, *Parthena*, *Polydentes*, *Thelidomus*, *Liochila* und vielleicht *Cepolis*; dann *Camaena* mit *Pseudobba*, *Phenicobius* und der auf Grund anatomischer Untersuchung für *Helix platyodon* neu errichteten Section *Camaenella*; *Obba*; *Chloritis* mit *Hadra*; *Papuina*; *Planispira*.

Die *Haplogona* entsprechen ungefähr den *Patulidae*; sie umfassen *Polygyra* = *Neohelix* Ihering, *Endodonta*, welche Gattung alle die kleinen polynesischen und australischen Formen einschliesst, *Patula*, *Trochomorpha* und *Anaglypta*. — *Punctum* und *Laoma* bilden die *Polyplacognatha*.

Völlig unsicher bezüglich ihrer Stellung bleiben *Strobilus*, für welche, da der Name präoccupirt, die neue Namensform *Strobilos* vorgeschlagen wird, *Ampelita*, *Pedinogyra*, *Polygyratia*, *Macrocyelis* und *Solaropsis*.

Die Nomenclatur lässt ein einheitliches Prinzip vermissen, aber die Eintheilung selbst erscheint naturgemäss und entspricht auch ungefähr der geographischen Verbreitung. Wir haben alle Ursache, der ausführlicheren Begründung mit grossem Interesse entgegenzusehen.

Kobelt.

Eine neue Pomatia.

Von
Dr. O. Goldfuss.

Helix (Pomatia) moabitica n.

Forma, magnitudine, colore peraffinis *H. asemni* Bgt. Asiae minoris incolae, sed testa discrepans crassa, solidissima, spira altiore, anfr. $5\frac{1}{4}$ nec $4\frac{3}{4}$ lentius accrescentibus, ultimo minus inflato, apertura minore faucibus albis, peristome crasselabiatum, labio albo, columella brevi, strictiuscula oblique descendente, media parte callosa ibique fere subtorta, angulum obtusum cum margine basali formante. Alt. $42\frac{1}{2}$, diam min. $36\frac{1}{2}$, maj. 40 mm; alt. apetr. $27\frac{1}{2}$, lat. apert. cum callo et perist. 25 (intus $16\frac{1}{2}$) mm.

Hab. Wadi Medjib, Moab, ad ora orientalia maris mortui.

Eine neue Pseudoglessula.

Von
Hermann Rolle.

Pseudoglessula abetifiana n. sp.

T. imperforata, elongata-ovata, tenuiuscula, subdiaphana, nitida, corneo-fusea, costellata, costellis aequalibus, rectis, prope suturam et peripheriam anfractus ultimi evanescentibus. Spira turrita apice obtusato. Anfractus 7—8 convexiusculi, sutura impressa crenulata discreti, leniter crescentes, ultimus spirae altitudinem haud aequans, basi rotundatus, infra medium laevigatus, striis subtilibus tantum sculptus. Apertura vix obliqua, irregulariter ovata, supra acuminata, infra truncata;

columella subtorta, obliqua, basi late truncata; labium externum tenue fragile.

Alt. 23, diam. max. 9,5—10, alt. apert. 9 mm.

Hab. Abetisi litoris auriferi Guineae.

Die Verbreitung von *Helix arbustorum* L.

Von

Dr. W. Kobelt.

Zu den eigenthümlichsten Erscheinungen in der europäischen Molluskenfauna nördlich der Alpen gehört die Sippschaft der *Helix arbustorum* L. Die typische Form steht unter den borealen Mollusken ganz isolirt, schliesst sich dagegen im Gehäuse so eng an zahlreiche kalifornische Arten an, dass z. B. Locard*) unbedenklich kalifornische Formen zu *Helix arbustorum* zieht. Durch die niedergedrückten, mehr oder minder genabelten Formen (*styriaca*, *repellini*, *camprodunica*, *corneoliformis*) wird allerdings auch testaceologisch eine Verbindung zwischen *Helix arbustorum* und den Campyläen (*schmidtii*, *hessei*) hergestellt und die anatomische Untersuchung gestattet uns, sie bei der Auftheilung der Gattung *Helix* L. unbedenklich zu Campyläa zu ziehen, aber es bleibt immerhin eine höchst eigenthümliche Erscheinung, dass ihre nächsten Verwandten in Kalifornien und Oregon leben, ohne dass es uns möglich wäre, eine Verbindung zwischen den beiden getrennten Verbreitungsgebieten herzustellen. Allerdings sind die Kalifornier anatomisch von *Hel. arbustorum* durch ihre keulig angeschwollenen *Glandulae mucosae* verschieden und können darum nicht zu *Arianta* gezogen werden; diese, die aus

*) Fauna malacologique des terrains quaternaires de Lyon, p. 55.

testaceologischen Gründen als Untergattung von *Campylaea* recht gut aufrecht erhalten werden kann, ist vielmehr auf *arbustorum* zu beschränken, während die Amerikaner, als Untergattungen *Aglaja*, *Lysinoe*, *Eurycampta* etc. sich unmittelbar anschliessen. Durch den engen Anschluss an *Campylaea* erscheint es uns auch trotz der reichen Entwicklung der Gattung in Amerika und ihrer Ausdehnung von Oregon bis in die Cordilleren von Argentinien naturgemäß, dass sie ihre Heimat in Europa hat und in Amerika als eingewandert angesehen werden muss. Steht ja doch die ganze Gruppe den übrigen amerikanischen Heliciden anatomisch völlig fremd gegenüber. Ausserdem ist sie allenthalben auf den Westabhang der Cordilleren beschränkt, also allem Anschein nach erst nach der Erhebung dieses Gebirges von Nordwesten her eingewandert. Wann und woher das geschehen, lässt sich eben noch nicht feststellen. Vor der Pliocänzeit kann es nicht geschehen sein, denn der ganze Westen jenseits der Felsengebirge ist erst seit der Zeit entstanden; aber auch nicht viel später, denn mit dem berühmten Schädel von Talaveras zusammen hat sich ein Exemplar von *Helix mormonum* gefunden; ihre Hauptverbreitung fällt jedenfalls in die Quaternärzeit, wie Cooper überzeugend nachgewiesen.

In Europa reicht *Helix arbustorum* zurück bis in das Oberpliocän, den Norwich-Crag. Als eine die Kälte nicht scheuende und die Feuchtigkeit geradezu liebende Schnecke, die heute noch bis an die Schneegrenze geht, hat sie die Eiszeit leicht überstanden und sich wahrscheinlich selbst in den nordischen Ländern an geschützten, nicht von dem grossen Landeis überdeckten Stellen selbst während der Kälteperiode erhalten. Ihre kleine, heute auf die Hochgebirge beschränkte Form (var. *alpicola*) ist ja geradezu das Leitfossil für den Löss und die verwandten intra- und postglazialen Bildungen. Heute noch geht sie so weit nördlich,

als Mollusken überhaupt gehen, in Norwegen bis über den Polarkreis hinaus. Wir finden sie auch auf den Shetland-Inseln und auf Island, aber nicht mehr auf Grönland, überhaupt nirgends auf dem amerikanischen Continent; ihre Heimat kann also nicht in dem arktischen Gebiete gesucht werden. Höchst eigenthümlich ist, dass sie in Sibirien und dem Ural, ja wahrscheinlich schon in der russischen Ebene überall fehlt. Weder von Moskau, noch von Kiew wird sie angeführt, und erst am Nordabhang der siebenbürgischen Gebirge finden wir sie wieder. Für diese Thatsache könnte man vielleicht Torrell's neue Eiszeittheorie anführen, nach welcher die Hauptmasse des grossen Landeises, wenigstens in der späteren Eiszeit, nicht auf den skandinavischen Gebirgen, sondern über der russischen Tiefebne gelagert habe, und zwar in solcher Mächtigkeit, dass das Eis über die skandinavischen Berge hinweg westwärts abfliessen konnte. Eine solche Eismasse wäre allerdings eine unüberschreitbare Schranke für Schnecken gewesen; wir müssen annehmen, dass *Helix arbustorum* also auch schon vor der Eiszeit ihr Hauptverbreitungszentrum in Mitteleuropa hatte; aber wo bleibt dann die Verbindung mit Oregon und Kalifornien?

Auch die Begrenzung des Verbreitungsgebietes nach Südwesten hin ist eine sehr eigenthümliche. Während *Helix arbustorum* durch Nord- und Mittelfrankreich überall verbreitet ist, fehlt sie in den Pyrenäen und jenseits derselben; die Angabe von Graëlls, dass sie in den höheren Theilen von Kastilien vorkomme, ist nach Hidalgo sicher falsch. Die Bucht der Gironde hat sich also als ein absolutes Hinderniss für ihre Ausbreitung erwiesen. Nur am Südostende derselben, wo die Einmündung der Bucht von Narbonne in's Mittelmeer offenbar schon früh durch Anschwemmungen geschlossen, vielleicht durch von den Pyrenäen herabsteigende Eismassen überbrückt wurde, sind Formen der *arbustorum* in die Pyrenäen gedrungen und

haben sich an den Abhängen des Canigou zu eigenthümlichen Formen (*xatarti*, *canigonensis*, *fagoti*) entwickelt. Eine hat sogar den Gebirgskamm überschritten und kommt auf der spanischen Seite vor (*camprodunica*), aber der Typus findet sich nirgends, und keine Form ist über die tiefe Einsenkung der Cerdagne hinüber vorgedrungen, welche, auf der französischen Seite vom Tet, auf der spanischen vom Segro durchströmt, die Pyrenées orientales vom Rest des Gebirges scharf trennt. Aus Catalonien ist keine Form dieser Gruppe bekannt.

Von den Pyrenäen aus folgt die Südgrenze des Verbreitungsgebietes den Abhängen der südfranzösischen Gebirge, immer in einem erheblichen Abstand von der Olivenregion und die höheren Lagen bevorzugend. Schon um Lyon ist sie lokal und wenig häufig, wird aber rasch häufiger, sobald man sich den Alpen nähert. In der Dauphiné und dem Departement Hautes-Alpes erreicht sie wieder eine sehr bedeutende Entwicklung und an den beiden Abhängen des Monte Viso finden wir wieder ebenso eigenthümliche Formen (*Repellini*, *corneoliformis*), wie am Canigou. Auch hier bezeichnet diese Ausbildung constanter Varietäten die Verbreitungsgrenze; südlich vom Monte Viso in den Seealpen finden wir *Helix arbustorum* nicht mehr vertreten. Am Südabhang der Alpen kommt sie zwar überall vor, aber sie beschränkt sich auf den oberen Theil der Thäler und dringt nirgends in die Ebene hinein vor. So im Val d'Oglio, im Val Camonica. Im Etschthal geht sie nur an wenigen Stellen, durch den Fluss verschleppt, über Bozen südwärts hinaus, im Apennin kommt sie sicher nicht vor, noch weniger südwärts davon oder gar in Sicilien; die Angaben aus der Emilia und der Umgebung von Bologna werden von Strobel energisch bestritten und beruhen wahrscheinlich auf einzelnen todteten Schalen, welche der Po bei Hochfluthen in die flachen Thäler hinein getragen hat.

Weiter östlich haben wir *Helix arbustorum* in Kärnthen und Krain in höheren Lagen überall, aber den Welebit überschreitet sie sicher nicht. Dalmatien wird zwar gewöhnlich als Fundort angeführt, aber ganz bestimmt mit Unrecht. Ebensowenig findet sich *Helix arbustorum* in der Herzegowina oder in Bosnien, ja schon in Croatién und Slavonien kommt sie, wie mir Brusina noch einmal brieflich bestätigt hat, nirgends vor. Wo hier ihre Verbreitungsgrenze liegt und warum sie bei anscheinend unveränderten Lebensbedingungen hier mitten in den Alpen auf einmal verschwindet, kann ich nicht sagen; vielleicht veranlassen diese Zeilen einen der österreichischen Conchologen zu genaueren Nachforschungen. Nur den nördlicheren Alpenfortsetzungen scheint sie durch Ungarn zu folgen; um Pest ist sie noch häufig, und wahrscheinlich hat sie auf diesem Wege und längs der Karpathen Siebenbürgen erreicht. Dort ist sie überall häufig und breitet sich auch an den Abhängen in die Bukowina, nach Podolien und selbst in die Moldau hinein aus; *Helix aethiops* und *Hessei* schliessen sich als eigenthümliche Formen an sie an, auch hier wieder die Grenze bezeichnend, denn in Südrussland findet sich *arbustorum* nicht, noch weniger in der Krim, obschon diese gewöhnlich unter den Fundorten angeführt wird.

Auch die nordöstliche Verbreitungsgrenze von *Helix arbustorum* ist nichts weniger als festgelegt. Schon östlich der Weichsel scheint sie nur noch lokal vorzukommen, aus Ostpreussen nennt sie Hensche noch von vereinzelten Fundorten, ob sie die russische Grenze überschreitet, ist mir nicht bekannt.

Ueberblicken wir das gesammte Verbreitungsgebiet von *Arianta*, so bildet es gewissermassen ein unregelmässiges Dreieck, dessen Basis vom Canigou in den Ostpyrenäen bis nach Siebenbürgen reicht, während seine Spitze im

höchsten Norden von Norwegen liegt. Von allen unseren grösseren Schnecken zeigt nur *Helix fruticum* eine annähernd ähnliche Verbreitung, während für *nemoralis*, *hortensis*, *pomatia* offenbar ganz andere Verhältnisse massgebend gewesen sind. Ich hoffe gelegentlich auf diese Verhältnisse genauer eingehen zu können.

Kleinere Mittheilungen.

Ein neues Verfahren, Mollusken, insbesondere Süßwassermollusken, ausgestreckt zu konserviren, gibt Plate in den Verhandlungen der deutschen Zoologischen Gesellschaft an. Man bringt die Thiere in Wasser, dem man 2--5 Theile einer fünfprozentigen Cochinlösung zugesetzt hat und lässt sie 10 -24 Stunden darin. Die Thiere werden dadurch förmlich narkotisirt und können in concentrirte Sublimatlösung oder starken Alkohol gebracht werden, ohne dass man ein Zurückziehen in die Schale zu befürchten hat. Das Mittel wirkt viel sicherer, als eine schwache Lösung von Choralhydrat.

Suter (in Journal de Conchyliologie 1892, Nr. 3) bekämpft entschieden Simroths Ansicht, dass die neuseeländischen Nacktschnecken nicht aus Europa importirt, sondern als eine Parallelenschöpfung anzusehen seien. Er weisst nach, dass weder *Hyalina* noch *Daudebardia* noch *Vitrina* auf Neuseeland vorkommen und mithin alle Formen fehlen, aus denen man die Limaciden ableiten könnte. Die beiden angeblichen *Hyalinen* gehören zu *Amphidoxa*, *Vitrina dimidiata* zu *Vitrinoidea*, *V. ultima* zu *Helicarion*. *Daudebardia novoseelandica* ist ein *Homalonyx*. (?)

Nach Musson (in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1890) sind folgende 19 europäische Arten in Australien und Neuseeland acclimatisirt:

Limnaea peregra Müll. (= *hobartensis* T. Woods) Tasman.

= *stagnalis* L. (= *tasmanica* T. Woods) Tasmanien, Neuseeland.

? *Planorbis spirorbis* Müll. Nordaustralien.

Xeritina fluviatilis L. Weikere, Neuseeland.

Arion ater L. Neuseeland.

= *fuscus* Müll. (= *incolumodus* Hutt.) Neuseeland.

= *hortensis* Müll. (= *Milax tasmanicus* Tate) Neuseeland, Neusüdwales, Victoria.

Limax agrestis L. (= *molestus* Hutt. = *Legrandi* Tate) Neuseeland.
Neusüdwales, Victoria.

- *maximus* L. Neuseeland, Neusüdwales, Tasmanien.
- *variegatus* Drp.

Hyalina cellaria Müll. (= *sydneyensis* Cox) Neuseeland, Neusüdwales,
Victoria, Tasmanien.

- *nitida* Müll. Auckland, Sydney.

Helix aspersa Müll. Neuseeland, Neusüdwales, Victoria, Tasmanien.

- *nemoralis* L. Auckland ?
- *virgata* da Costa Nordostaustralien.
- *caperata* Mtg. Victoria, Melbourne, Tasmanien.
- *pulchella* Müll. (= *Alexandrae* Cox.) Neusüdwales, Tasmanien.
- *acuta* Müll. Victoria, Melbourne.

Ausserdem ist *Helix similaris* Fer. mit Pflanzen von den Maskarenen in die Gärten von Sydney eingeführt worden.

Digitized by Google

Literaturbericht.

Scharff, R. E., Land- and Freshwater Shells, peculiar to the British Isles. In Nature, 23. June 1892.

Coutagne G. Mollusques terrestres des îles de la rade de Marseille. In Assoc. française pour l'avancement de Science 1891, pag. 546.

The Journal of Conchology Vol. VII, Nr. 3.

- p. 66. Cockerell T. D. A., a revised list of the British Slugs.
- p. 70. Smith Edg. A. Description of a new species of *Spondylus* (*powelli* von Madera) and a new *Helix* (*Geotrochus hedleyi*, wahrscheinlich von Neuguinea).
- p. 74. Ancey, C. F., Notice necrologique sur J. R. Bourguignat.
- p. 77. Adams, Lionel A., a contribution to the authenticated records of Derbyshire.
- p. 78. Chaster G. W., Shell hunting in Merionetshire.
- p. 81. Adams, Gerald W., Land- and Freshwater Shells at Karachi.
- p. 90. Ancey, C. F., on some shells from Eastern Bolivia and Western Brazil. (*Happia* nom. nov. für *Ammonoceras*) *daliana*, Bolivia, p. 90; *Guppyia anguina*, Santa Cruz de la Sierra, p. 91; *Systrophia alcidiana*, Matto Grosso, p. 91; *Bulinulus germaini*, Matto Grosso, p. 91; *B. poecilus* var. *icterica*, Matto Grosso, p.

92; *Odontostomus wagneri* var. *paraguayana*, Matto Grosso, p. 93; *Od. lemoinei* nebst var. *brevis*, Bolivia, p. 93; *Nenia orbignyi*, Matto Grosso, p. 94; *Cyclophorus orbignyi*, Bolivia, p. 94; *Helicina leucozonalis*, Matto Grosso, p. 95; *H. bourguignati*, Bolivia, p. 95; *H. lirifera*, Bolivia, p. 96; *H. sulfurea* p. 96.

Simpson, Charles T., Notes on the Unionidae of Florida and the Southeastern States. In Proc. U. S. National-Museum Vol. XV. p. 405—436 pl. 49—74.

Der Autor hat sich der dankenswerthen Mühe unterzogen, an der Hand eines sehr reichen Materials die Unionen von Florida einer Revision zu unterziehen, welche nicht auf die Abspaltung neuer Arten, sondern auf die Vereinigung des Zusammengehörigen ausgeht. Er beschreibt nur eine einzige neue Art, aber er zieht eine ganze Menge Arten ein. Die Unioniden der Vereinigten Staaten scheidet er faunistisch in drei Gruppen: das Mississippigebiet, an das sich Texas und Mexiko als Provinz anschliessen; das Küstenland von Louisiana bis Canada, in dem sich eine scharfe Grenze nicht ziehen lässt; und die pacifischen Staaten, welche in dieser Hinsicht zu dem palaearktischen Gebiet zu gehören scheinen. Die Alleghanies scheiden scharf, aber nördlich und südlich schmelzen die Faunen zusammen. Der Coosa-River mit seiner eigenartigen reichen Fauna wird auffallender Weise nicht besonders erwähnt. Im Gegensatz zu Lea scheidet Simpson die Unionen nach ihrem Gesamthabitus in kleine Gruppen. Eingezogen werden: *Kleinianus Lea* zu *intricatus Conrad*; *Moussonianus Lea* und *vestitus Lea* zu *forbesianus Lea*; *buxeus Lea* und *anthonyi Lea* zu *pusillus Lea*; *eximus*, *nigrinus*, *rutilans*, *subellipsis Lea* und *averilli Wright* zu *modioliformis Lea*, *dorei*, *simpsoni*, *dalli* und *oreuttii Wright* zu *buckleyi Lea*; *marshi* und *tryoni Wright* zu *jayanus Lea*; *fryanus Wright* zu *coruscus Gld.*; *tetricus Lea* zu *tortivus Lea*; *nolani Wright* zu *obnubilus Lea*; *blandingianus Lea*, *paludicolus Gld.*, *gewetti Lea*, *rivicola Conrad*, *websteri Wright* zu *obesus Lea*; *cacao Lea* zu *succissus Lea*; *floridensis Lea* zu *anodontoides Lea*; *Anodontia dunlapiana Lea* zu *couperiana Lea*. Als neu beschrieben wird *Unio subluridus* p. 432 pl. 73, fig. 3, 4. Die Abbildungen zeigen nur die Contouren, sind aber sehr charakteristisch.

The Journal of Conchology Vol. VII, Nr. 5, January 1893, p. 148. Adams, Lionel E., a theory as to the possible introduction of *Hydrobia (Paludestrina) Jenkinsi*.

- p. 151. Nelson, W. and R. Standen, Observations on the Misplacement of the names of type and variety in *Hyalina pura*. Alders Typus, der im Museum in Newcastle aufbewahrt wird, ist die durchsichtige Form, welche Jeffreys als var. *margaritacea* unterschieden hat.
- p. 154. Elgar, H. and H. Lamb, List of Land- and Freshwater Mollusca occurring in the Maidstone District.
- p. 157. Scharff, R. F., *Helix nemoralis* in the Pyrenees. Die weiss-lippige Form ist dort auffallend häufig.
- p. 159. Wotton, F. W., the life-history of *Arion ater* and its power of Self-Fertilisation.

Journal de Conchyliologie. 1893, No. 3.

- p. 229. Pelsener, P., à propos de l'asymmetrie des Mollusques univalves.
- p. 234. Fischer, P. et E. L. Bouvier, sur l'enroulement des Mollusques univalves.
- p. 244. — — , sur la coquille embryonnaire des Trochidae du genre *Calliostoma*.
- p. 245. Suter, Henri, Communications conchyliologiques des Antipodes.
1. Les Pitys de la Nouvelle Zélande. 2. Un *Ancylus* à la Nouvelle Zélande. 3. Les Limacidae et Arionidae de la Nouvelle Zélande.
- p. 256. Crosse, H. et Fischer, P., Note sur le genre *Holospira*, et sur la distribution géographique des espèces dont il se compose. (16 sp., keine neu).
- p. 279. Crosse, H. Etudes malacocologiques sur des genres nouveaux ou peu connus. (*Hungerfordia* Bedd., *Geothauma* Crosse n. für *Opisthopoma grandispinosum*, *Heudeia* Co., *Bathybembix* nom. nov. für *Bembia* Watson.) Die Typen sind sehr gut abgebildet.
- p. 292. Crosse, H. et P. Fischer, Note sur le *Neritina picta*. Der Name ist schon für eine fossile Art vergeben, die lebende erhält den Namen *N. usurpatrix*.
- p. 294. Crosse, H. et P. Fischer, P.; Diagnoses Molluscorum Reipublicae Mexicanae et Guatimalae incolarum. Neu *Unio usumاسintae*, *yzabalensis*, *Anodonta chapalensis*, *Neritina sargi*, *Bulinulus chaperi*.
- p. 297. Dautzenberg, Ph., Description d'un *Perideris* nouveau, provenant du Dahomey (P. lechatelier).
- p. 297. Fischer, H. et P., Diagnoses d'espèces nouvelles de Mollusques Cephalopodes, recueillis dans le cours de l'Expedition scientifique

du Talisman. (*Octopus sponsalis*, *ergasticus*, beide an der Saharaküste im Tiefwasser gedrakt).

Annales de la Sociedad española de Historia Natural.
Vol. XXI. (Ser. II, tomo 1).

- p. 381. Westerlund, C. A., *Faunula Molluseorum hispalensis*. Enthält die Aufzählung der um Sevilla seither beobachteten Mollusken, besonders nach den Sammlungen von Prof. Calderon. Als neu beschrieben werden: *Xerophila mutua* p. 385; — *X. pumila*, *horridula*, *embryonata* p. 386; — *Macularia leucochila*, *Mastus hispanicus* p. 387; — *Pupa retracta*, *Cionella virginea*, *Physa clathrata* p. 388; — *Melanopsis harpa*, *Neritina mixta* p. 389; — *Unio calderoni* var. *salvadori*, *hispanus* var. *sphenoides* p. 390.
- p. 391. Girard, Albert Cl. *Notice sur les Cephalopodes des Côtes de l'Espagne*. — Bis jetzt sind nur zwölf Arten bekannt, keine neu.

The Conchologist Vol. II, No. 4.

- p. 73. Sowerby, G. B., *Review of the Genus Pyrula* (Lam.), and description of a new species (*filosa* n. von Hongkong).
- p. 75. Smith, Edgar A., *Notice of an imperforate specimen of Haliotis*.
- p. 76. Collinge, Walter E., *a review of the Arionidae of the British Isles*.
- p. 83. Scharff, R. F., *on the affinities of the Genera Limax, Arion, and Helix*.
- p. 84. Cockerell, T. D. A., *the British Arionidae*.
- p. 85. Collinge, Walter E., *the British Arionidae; a reply*.

Scharff, R. F., the Irish Land- and Freshwater Mollusca.
Reprinted from the *Irish Naturalist*. Dublin 1892. 28 pp.

Gibt die Aufzählung sämmtlicher bis jetzt aus Irland bekannten Arten und ihre Verbreitung durch die zwölf irischen Districte, sowie die sonstige Verbreitung.

Eingegangene Zahlungen:

Rosen, A., 6 Mk., Retowski, Th., 6 Mk., Puppe, W., 6 Mk..
Miller, St., 6 Mk., Brömmel, T., 6 Mk., Naturhist. Museum Lübeck, 6 Mk..
Roos, F., 6 Mk., Pfeffer, H., 6 Mk., Borcherding, V., 6 Mk., Nägele, W.,
6 Mk., Liebe, G., 6 Mk., Kinkel, J., 6 Mk., Schirmer, W., 6 Mk.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Fünfundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Aeltere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Die marinen Mollusken der Philippinen,
nach den Sammlungen des Herrn José Florencio Quadras in Manila.
Von
Prof. Dr. O. Boettger in Frankfurt (Main).

I. Die Rissoiden.

Ich beabsichtige nach und nach die seit Hugh Cuming's Zeiten in der Literatur etwas vernachlässigte marine Fauna der Philippinen zu bearbeiten, und freue mich durch die reichen Unterstützungen an Material, die mir zu diesem Zwecke von Seiten meiner Freunde der Herren Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff in Manila und Otto Koch in Cebú, vor allem aber durch die Güte des grössten Kenners der Meeresfauna der Philippinen, des Herrn José

Florencio Quadras, Generalinspektors der Bergwerke in Manila, in der günstigen Lage zu sein, vielfache Ergänzungen zu bereits bekannten Arten, zahlreiche neue Fundorte und manche überraschende Novitäten vorlegen zu können.

Die Bearbeitung der Rissoiden in systematischer Beziehung ist durch die Werke von Schwartz von Mohrenstern, Weinkauff, Nevill und Tryon sehr erleichtert worden, wenn auch nicht in Abrede gestellt werden darf, dass namentlich Weinkauff's überaus dürftige Originalbilder und Tryon's Manier, möglichst viele nur einigermassen ähnliche Formen unter einen Namen zu bringen, das Studium dieser kleinen und schönen Schneckchen auch wiederum erschwert hat. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass Tryon trotz des umfangreichen Materials, das ihm bei Bearbeitung von *Rissoina* zu Gebote gestanden haben mag, kaum so viel Exemplare unter den Händen gehabt haben wird, wie ich, und ich muss mich sehr darüber wundern, wie er oft eine ganze Reihe notorisch gut unterschiedener und unterscheidbarer Formen unter einen Namen zwängt, ohne auch nur den Versuch zu machen, die heterogensten Dinge als Varietäten aufzufassen. Die $3\frac{1}{2}$ mm lange *Rissoina japonica* Wkff., die Tryon in die Synonymie seiner 15—23 mm langen *R. spirata* stellt, gibt dafür ein besonders drastisches Beispiel. Ein wahres Sammelsurium durchaus verschiedener Arten steckt er unter *Rissoina erythraea* Phil., unter *R. striata* Quoy u. s. w. Hat Tryon die unter diesen Namen abgehandelten Schnecken wirklich besessen und verglichen, so bin ich erstaunt, dass er die handgreiflichen Unterschiede dieser so mannigfaltig verschiedenen skulptierten Formen nicht fassen konnte; konnte er sie aber nicht in Originalen, so durfte er auch nicht seiner Lieblingsidee, alles zu generalisieren, in einer so bedenklich weitgehenden, die wahre Wissenschaft schädigenden Weise nachgeben.

Die bis jetzt von den Philippinen bekannten Rissoiden lassen sich in 6 Gattungen unterbringen:

Gen. I. *Cingula* Flem.

1. *Cingula sulcata* n. sp.

Char. T. parva late rimata, cylindrato-oblonga, solidula, vitrea; spira convexo-turrita; apex perobtusus subtruncatus, nitidus, summo minuto oblique involuto. Anfr. 4 convexiusculi rapide accrescentes, sutura impressa disjuncti, initialis laevissimus, caeteri cingulis angustis sed validis subaequalibus, secundus 4, penultimus 5, ultimus 8 cincti, penultimus $\frac{1}{3}$ altitudinis testae superans, ultimus ante aperturam lente ascendens, extus varice annulari modico cinctus, penultimo parum altior. Apert. parum obliqua ovalis, superne rotundato-angulata; perist. continuum, levissime reflexum, marginibus subincrassatis, sinistro appreso, dextro bene curvato. — Alt. $1\frac{2}{3}$, diam. max. $\frac{2}{3}$ mm; alt. apert. $\frac{3}{5}$, lat. apert. $\frac{1}{2}$ mm.

Fundort: Cebú (coll. Quadras No. 36), von Herrn J. Fl. Quadras entdeckt.

Bemerkungen: Nächstverwandt anscheinend der *Rissoa semicarinata* Fol. von Neukaledonien (de Folin, Fonds de la Mer Bd. 1 pag. 249, Taf. 21, Fig. 8), aber etwas grösser und mit weniger und kräfligeren Spiralkielen ausgestattet.

Gen. II. *Onoba* H. et A. Ad.

2. *Onoba bella* (A. Ad.).

Rissoa bella A. Adams, Proc. Zool. Soc. London 1851 pag. 267.

Philippinen. — Mir unbekannt.

3. *Onoba philippinica* n. sp.

Char. T. late rimata turrito-oblonga, aut corneo-slavescens aut albida, solidula, subpellucida; spira turrita

lateribus convexis; apex acutiusculus, summo plane involuto. Anfr. $6\frac{1}{2}$ —7 lente accrescentes convexiusculi, sutura profunde impressa disjuncti, spiraliter distincte denselineati, lineis ad suturam et ad basim anfractuum profundioribus, ultimus basi crista rimali callosa cinctus, ante aperturam lente ascendens, $\frac{1}{3}$ altitudinis testae non superans. Apert. recta ampla, exacte ovalis, superne leviter angulata; perist. continuum, marginibus levissime reflexiusculis, dextro valde curvato, protracto, extus varice collari valido in cristam rimalem transeunte aucto. — Alt. $5\frac{3}{4}$, diam. max. $2\frac{2}{5}$ — $2\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. 2 — $2\frac{1}{4}$, lat. apert. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ mm.

Fundort: Insel Galumangan bei Surigao (coll. Quadras No. 17) und Nord-Mindanao (No. 37), von Herrn J. Fl. Quadras entdeckt.

Bemerkungen: In Gestalt und Skulptur der allerdings kleineren *O. striata* (Mtg.) der nordeuropäischen Meere vergleichbar, aber wie anscheinend alle tropisch-indischen Arten der Gattung durch das Auftreten eines Nabelkieles und den kräftigeren Aussenwulst des Peristoms verschieden. Näher verwandte tropische Arten sind mir unbekannt.

4. *Onoba tenuilirata* n. sp.

Char. T. late rimata oblonga, corneo-flavescens, modice tenera, subpellucida; spira convexo-conica; apex acutiusculus sed summo plane involuto et hebeti. Anfr. $5\frac{1}{2}$ rapide crescentes satis convexit, sutura bene impressa disjuncti, spiraliter eleganter lirati, ante-penultimo liris 6, penultimo 8, ultimus 11 et lira cristiformi rimali instructi, liris striis incrementi satis distincte crispulis, penultimo reliquam spiram altitudine aquans, ultimus ante aperturam leviter ascendens, $\frac{2}{5}$ altitudinis testae aquans. Apert. recta ampla, exacte ovalis, superne vix angulata; perist.

continuum marginibus levissime reflexiuseculis, dextro extus varice collari modico in liram cristiformem rimalem transeunte cincto. — Alt. $3\frac{3}{5}$, diam. max. $1\frac{3}{5}$ mm; alt. apert. $1\frac{1}{2}$, lat. apert. 1 mm.

Fundort: Culion, Calamianes (coll. Quadras No. 2248a), nur in einem Stücke bekannt.

Bemerkungen: Ebenfalls von der Form der *Onoba striata* (Mtg.), aber wie die übrigen tropisch-indischen Verwandten durch ein stärkeres Nabelkielchen ausgezeichnet, das sich in den die Mündung aussen verstärkenden Ringwulst des Nackens fortsetzt.

Gen. III. *Alvania* Risso.

5. *Alvania elegans* (A. Ad.).

Rissoa elegans A. Adams, Proc. Zool. Soc. London 1851 pag. 267.

Philippinen. — Mir unbekannt.

6. *Alvania quadrasi* n. sp.

Char. T. subrimata conico-ovata, corneo-albida, solida, opaca; spira elate conica lateribus leviter convexiuseculis; apex acutiusculus submammillatus. Anfr. 5 convexi, superiores biangulati, sutura profunde impressa disjuncti, liris 2 spiralibus validis et costulis aequalibus obliquis ca. 20 in singulo anfractu cancellati, punctis intersectionis leviter granuliferis, interstitiis subquadratis, foveolatis, ultimus liris spiralibus 7 — prima suturali minus distincta — cinctus, ante aperturam levissime ascendens, $\frac{2}{5}$ altitudinis testae superans. Apert. recta regulariter ovalis, utrinque rotundata; perist. continuum, undique reflexiuseculum, margine columellari appresso, dextro calloso, sublabiatu, extus varice annulari modico, liris leviter crenato comitato. — Alt. 4, diam. max. $2\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. $1\frac{1}{2}$, lat. apert. $1\frac{1}{4}$ mm.

Fundort: Malabon bei Manila, Luzon (coll. Quadras No. 19), von Herrn J. Fl. Quadras in Anzahl gesammelt.

Bemerkungen: Erinnert an *A. (Acinopsis) cancellata* Da Costa der europäischen Meere, ist aber schlanker und ihr Varix nicht so tief durch die Spiralfurchen gekerbt. Die nächste Verwandte dürfte *A. venusta* Garr. von den Fidji-Inseln sein.

Gen. IV. *Rissoina* d'Orb.

Sect. 1. *Rissoina* Nev.

7. *Rissoina pyramidalis* A. Ad.

Insel Barclayon (Adams) und Insel Camiguin nördlich von Mindanao (Schwartz). — Mir unbekannt.

8. *Rissoina hanleyi* Schwartz.

Philippinen (Schwartz). — Mir unbekannt.

9. *Rissoina monilis* A. Ad.

Mindanao (Schwartz). — Mir unbekannt.

10. *Rissoina (Rissoina) bilabiata* n. sp.

Char. T. parva oblongo-turrita, gracilis, solidula, corneo-albida, pellucida; spira turrita lateribus convexiusculis; apex acutus mammillatus, oblique inclinatus, nitidus. Anfr. 7—7½ lente accrescentes convexi, sutura profunde impressa disjuncti, embryonales laeves, caeteri costulis ca. 25 regularibus obliquis sculpti, ultimus parum arctius costulatus quam penultimus sed costulis magis signoideis, basi dense spiraliter lineatus et obsolete suberistatus, ante aperturam lente ascendens, ⅓ altitudinis testae subaequans. Apert. perobliqua irregulariter ovata, utrimque angulata sed basi vix effusa; perist. continuum subduplicatum, margine columnellari superne subincrassato, dextro valde calloso et peculiariter planato vel potius plane excavato.

extus varice annulari aut obsoleto aut nullo; columella levissime concava. — Alt. $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{3}{5}$, diam. max. $1\frac{2}{5}$ — $1\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. $1\frac{2}{5}$, lat. apert. 1 mm.

Fundort: Taganaan, Nord-Mindanao (coll. Quadras No. 9), von Herrn J. Fl. Quadras in Anzahl gesammelt.

Bemerkungen: Die Rippchen auf dem letzten Umgang gehen bis auf den obsoleten Basalkiel herab, auf dem sie noch regelmässige, feine Fältchen bilden. Die Spiral-skulptur, die nur an der Basis des letzten Umgangs deutlich entwickelt ist, mag auch die Zwischenräume der Rippen an den oberen Umgängen ausfüllen, ist dann aber so fein, dass sie mit einer gewöhnlichen Lupe nicht erkannt werden kann. Die schlanke Gestalt, die convexen Umgänge und das zwischen der doppelten Aussenlippe plane oder gar ausgehöhlte Peristom unterscheiden die Art von allen beschriebenen.

11. *Rissoina micans* A. Ad.

Mindanao (Adams). — Mir unbekannt.

12. *Rissoina ambigua* Gould.

Ulugan auf Palawan (coll. Quadras No. 10), Badajoz auf Tablas (No. 10) und Guihulngna auf Negros (coll. Quadras).

var. *cincta* Dkr.

Insel Balabac zwischen Borneo und Palawan (coll. Quadras No. 10), Insel Bisucay, Calamianes (No. 12), Insel Luban (No. 48), Albay (No. 21) und Bagac, Prov. Bataan (No. 10 und 26) auf Luzon, Badajoz auf Tablas (No. 10), Insel Lugbon bei Romblon (No. 10), Siloetoe auf Cebú (No. 49) und Nord-Mindanao (No. 39).

13. *Rissoina costulatogranosa* Garr.

Badajoz auf Tablas (coll. Quadras No. 10a).

Sect. 2. *Rissolina* Gould.

14. *Rissoina distans* Anton.

Philippinen (Schwartz). — Mir unbekannt.

15. *Rissoina canaliculata* Schwartz.
Philippinen (Schwartz). — Mir unbekannt.

16. *Rissoina plicata* A. Ad.

Insel Bisucay, Calamianes (coll. Quadras), Insel Tablas (No. 27), Insel Lugbon bei Romblon (No. 4a und 1560), Insel Masbate (Adams), Insel Balagnan bei Nord-Mindanao (No. 53) und Nord-Mindanao (No. 40).

17. *Rissoina scalariana* A. Ad.

Insel Burias (Adams) und Magallanes auf Sibuyan (coll. Quadras No. 3).

18. *Rissoina subfirmata* Btlgr.

Rissoina subfirmata Boettger, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges. Bd. 14, 1887 pag. 126, Taf. 6. Fig. 1 (*Schwartziella*).

Insel Balabac südlich von Palawan (coll. Quadras No. 24) und Nord-Mindanao (No. 41). — Etwas schlanker als die chinesischen Stücke, ein Umgang mehr, $3\frac{1}{2}$ mm Länge.

19. *Rissoina obeliscus* Recluz.

Bagac, Prov. Bataan, auf Luzon (coll. Quadras No. 25), Badajoz auf Tablas (No. 4), Insel Lugbon bei Romblon (No. 4), Insel Calumangan bei Mindanao (No. 2255) und Nord-Mindanao (No. 42).

Sect. 3. *Pachyrissoina* n.

Char. T. compacta conico-ovata, anfr. 6—8 contubulatis, ultimo basi constricto vel planato; apert. maxima obliqua, semilunata, superne angulata, inferne angustata et valde effusa, canali subrecurvo; perist. incrassato et calloso, sed varice externo nullo aut obsoleto. — Für *Rissoina walkeri* E. A. Smith und die fossile *R. basteroti* Schwartz.

20. *Rissoina (Pachyrissoina) walkeri* E. A. Smith.

Rissoina walkeri E. A. Smith, Conchologist Bd. 2, 1893 pag. 98, Fig.

Char. T. magna ovato-conica, alba, solidula; spira exakte conica; apex acutiusculus. Anfr. ca. 8 spiraliter microscopice lineati, superi 4 planati, sutura vix impressa disjuncti, dense costulati, caeteri convexiusculi contabulati, sutura canaliculata, crenata separati, oblique valide costati, costis 14—15 angustis compressis, ultimus superne regulariter costatus, media parte lira spirali, sursum sulco inciso terminata, deorsum in discum basalem planatum transeunte angulatus, ad canalem constrictus, ante aperturam non ascendens. Apert. obliqua maxima, semiovata, superne angustius, basi latius canaliculata; perist. subcontinuum, margine columellari superne supra basim anfractus penultiimi protracto et appresso, dextro hebeti, reflexiusculo, extus callo angusto funiformi aucto; columella obliqua media parte vix concava. inferne subtruncata, canali subreflexo. — Alt. 10, diam. max. $5\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. 5, lat. apert. $2\frac{3}{4}$ mm.

Insel Burias (coll. Quadras No. 35) und Nord-Mindanao. — Die Originalstücke dieser erst vor zwei Monaten beschriebenen Art stammen von Baudin Island, N. W. Australien. — Nur mit der fossilen *R. basteroti* Schwartz näher verwandt, und durch die nach oben von einem scharfen Spiralwulst begränzte Basalscheibe des letzten Umganges von allen übrigen Arten auffallend verschieden.

Sect. 4. *Schwartziella* Nev.

21. *Rissoina tritcea* Pease.

Bagac, Prov. Bataan, auf Luzon (coll. Quadras No. 13) und Insel Tablas (No. 13).

22. *Rissoina buriasensis* Sow.

Insel Burias (Sowerby). — Mir unbekannt.

Sect. 5. *Phosinella* Moerch.

23. *Rissoina clathrata* A. Ad.

Insel Bohol (Adams). — Mir unbekannt.

24. *Rissoina deshayesi* Schwartz.

Insel Mindanao (Schwartz). — Mir unbekannt.
var. *minor* Nevill.

Insel Cebú (Nevill). — Mir unbekannt.

25. *Rissoina erythraea* Phil.

Insel Tablas (coll. Quadras No. 6 bis).

26. *Rissoina hungerfordiana* Nev.

Insel Lugbon bei Romblon (coll. Quadras No. 6a).

27. *Rissoina strigillata* Gould.

Insel Bisucay, Calamianes (coll. Quadras No. 44 und 46), Bagac, Prov. Bataan, auf Luzon (No. 6), Insel Tablas (No. 6), Insel Lugbon bei Romblon (No. 6, 32 und 1703), Magallanes auf Sibuyan (No. 6), Himalalud auf Negros (No. 28), Insel Balagnan bei Nord-Mindanao (No. 18) und Placer auf Mindanao (No. 6 und 8).

28. *Rissoina bellula* A. Ad.

Insel Mindoro (Schwartz) und Calapan auf Mindoro (Adams). — Mir unbekannt.

29. *Rissoina nitida* A. Ad.

Insel Camiguin bei Nord-Mindanao (Adams). — Mir unbekannt.

30. *Rissoina nodicincta* A. Ad.

Insel Capul (Adams). — Mir unbekannt.

31. *Rissoina granulosa* Pease.

== *Rissoina sculptilis* Garrett teste Tryon.

Insel Balabac zwischen Borneo und Palawan (coll. Quadras No. 11), Pto. Princesa auf Palawan (No. 20) und Insel Cebú (v. Moell. 1890).

32. *Rissoina cerithiiformis* Dkr.

== *Rissoina erythraea* Schwartz, non Phil.

Siloctoc auf Cebú (coll. Quadras No. 50). — Diese Art besitzt im erwachsenen Zustande Zahnfalten auf dem Innenrande der Aussenlippe, was bis jetzt übersehen worden zu sein scheint.

33. *Rissoina samoensis* Dkr.

Insel Balacobac zwischen Borneo und Palawan (coll. Quadras No. 22), Insel Bisucay, Calamianes (No. 44 a) und Insel Lugbon bei Romblon (No. 33).

Sect. 6. *Zebinella* Moerch.

34. *Rissoina striata* Quoy Gaim.

Badajoz auf Tablas (coll. Quadras No. 1), Inseln Cebú (v. Moell. 1890) und Siquijor (Adams).

35. *Rissoina (Zebinella) moellendorffi* n. sp.

Char. Affinis *R. extraneae* Eichw. — T. elongato-turrita, solida, alba; spira pergracilis; apex decollatus. Anfr. superstites $7\frac{1}{2}$ lente accrescentes, superi plani, sutura vix impressa disjuncti, inferi deorsum convexiusculi, sutura magis profunda separati, tenuiter costulati — costulis angustis, parum obliquis, 32 in anfr. penultimo — et insuper subtilissime spiraliter lineolati, ultimus inflatus sed basi compressus et angustatus, costulis fere duplo crebrioribus et lineis spiralibus ad basim distinctioribus et profundioribus reticulatus, ante aperturam ascendens et late campanulatus, $\frac{1}{3}$ altitudinis testae aequans. Apert. perobliqua subtriangularis, coaretata, utrinque effusa; perist. validissime calloso-incrassatum, media parte protractum, extus varice crasso reticulato cinctum; columella leviter concava. — Alt. (decoll.) $6\frac{1}{2}$, diam. max. $2\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. $2\frac{3}{4}$, lat. apert. $1\frac{1}{2}$ mm.

Fundort: Insel Balauan bei Mindanao (coll. Quadras No. 2257), nur in einem Stücke bekannt.

Bemerkungen: Kleiner und namentlich im Gewinde schlanker als die fossile *R. extranea* Eichw., steht sie dieser am nächsten. Es ist die zweitgrösste der von den Philippinen bekannten *Zebinella*-Arten und namentlich dadurch ausgezeichnet, dass die Rippchen der oberen wie der mittleren Umgänge gleichweit von einander entfernt sind, während nur auf dem letzten Umgang sich ihre Zahl verdoppelt.

36. *Rissoina elegantula* Angas.

Bagac, Prov. Bataan, auf Luzon (coll. Quadras No. 1567), Insel Lugbon bei Romblon (No. 29) und Placer auf Mindanao (No. 2248a). — Das einzelne von Bagac vorliegende Stück ist 6 mm lang bei 8 Umgängen. Die Querrippen seiner oberen Umgänge sind ziemlich kräftig entwickelt und weitläufig gestellt. Es stehen 19 Rippen auf dem drittletzten Umgang. Auf der vorletzten Windung werden sie um das doppelte feiner und zahlreicher und auf der Schlusswindung, auf deren Unterhälfte sie verschwinden, noch dünner und häufiger.

37. *Rissoina concinna* A. Ad.

Insel Burias (Schwartz) und Insel Cagayan südwestlich von Panay (Adams). — Mir unbekannt.

38. *Rissoina eranida* Nev.

Insel Lugbon bei Romblon (coll. Quadras No. 30), hier 3 mm lang.

Sect. 7. *Parazebinella* n.

Char. T. anfractibus media parte angulatis, superioribus costatis, ultimo ecostato, spiraliter striato; apert. maxima ampla, utrimque profunde canaliculata; perist. margine dextro extus striis validioribus, profundioribus peculiariter crenulatum; columella basi leviter nodulosa vel subtruncata. — Diese Section scheint einen Uebergang von *Moerchiella* Nev. zu *Stossichia* Brus.

zu bilden, zeichnet sich aber neben entschiedenem Rissoinenhabitus durch die tiefe kanalartige Ausbuchtung der oberen Munddecke vor beiden Sectionen aus. — Hierher nur die folgende Art:

39. *Rissoina (Parazebinella) crenilabris* n. sp.

Char. T. ovato-turrita, solidula, alba, opaca; spira gradato-turrita; apex cylindratus acutulus. Anfr. 7, initiales 2 laeves, sequentes media parte acutanguli, sutura profunda disjuncti, spiraliter lineolati et valide costati, costis rectis geniculatis, 13 in anfr. antepenultimo, 16 in penultimo, ultimus planoconvexus, basi constrictus, dorso non costatus, aequaliter dense spiraliter lineolatus, lineolis ante aperturam et in varice profundius impressis, superne subito ascendens, $\frac{3}{7}$ altitudinis testae aequans. Apert. magna ampla, obliqua, late semiovata. utrimque canaliculata; perist. continuum margine columellari appresso, dextro ad suturam recedente, quasi bilabiato, caeterum valde expanso, extus varice valido peculiariter et elegan- tissime crenulato cincto, intus calloso-labiato; columella basi leviter nodulosa et subtruncata, canali inferiore subrevoluto. — Alt. $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{3}{4}$, diam. max. $2\frac{1}{5}$ — $2\frac{3}{4}$ mm; alt. apert. $2\frac{3}{4}$, lat. apert. $1\frac{3}{5}$ min.

Fundort: Insel Lugbon bei Romblon (coll. Quadras No. 5) und Nord-Mindanao (No. 38), von Herrn J. Fl. Quadras in kleiner Anzahl gesammelt.

Bemerkungen: Diese Art scheint bis jetzt ganz isoliert zu stehen; bei der sonst ganz Rissoinenartigen Mundbildung ist die an gewisse Pleurotomiden erinnernde Einbuchtung des Mundsaums an der Naht besonders auffallend. Auch die in der Mitte gewinkelten oberen Umgänge sind bei *Rissoina* höchst ungewöhnlich und finden sich eher bei *Clathurella*, doch ist auch nicht die Spur eines pleurotomen Verlaufes der Anwachsstreifen zu beobachten.

Sect. 8. *Moerchiella* Nev.

40. *Rissoina gigantea* Desh.

= *Rissoina cumingi* H. et A. Adams, non Reeve.

Insel Ticao (H. et A. Adams). — Mir unbekannt.

41. *Rissoina spirata* Sow.

Philippinen (Cuming). — Mir unbekannt.

var. *striolata* A. Ad.

Insel Barclayon (Adams), Insel Catanduanes (coll. Quadras No. 52), Insel Tablas (No. 31), Insel Bohol (Schwartz) und Insel Siquijor (v. Moell. 1890).

42. *Rissoina (Moerchiella) detrita* n. sp.

Char. Maxime affinis *R. orbignyi* A. Ad., sed saepe fere quadruplo minor, spira breviore, lateribus magis convexis, anfr. solum 8—9 distinete convexioribus. apert. minus dextrorum protracta. — T. oblongo-turrita, solida, albida, nitidula; spira turrita lateribus distinete convexis; apex acutiusculus, submammillatus. Anfr. 8—9 convexiusculi regulariter accrescentes, sutura impressa, levissime canaliculata et deorsum saepe marginata disjuncti, usque ad antepenultimum aut penultimum costulis crebris (20—25) rotundatis, parum obliquis et omnes lirulis spiralibus tenuissimis, sat distantibus decussati, penultimus ultimusque praeterea indistincte microscopicce spiraliter striati, ultimus $\frac{2}{5}$ altitudinis testae adaequans. Apert. sat ampla parum obliqua, semiovata, superne acutata, basi subeffusa; perist. subcontinuum, margine dextro semicirculari, modice dilatato, minus dextrorum protracto, incrassato, extus vix varicoso; columella obliqua, media parte leviter concava. — Alt. $5\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$. diam. max. $2\frac{1}{4}$ —3 mm; alt. apert. $2\frac{1}{2}$ —3, lat. apert. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ mm.

Fundort: Insel Bisucay, Calamianes (coll. Quadras No. 47), mehrere Stücke von Herrn J. Fl. Quadras gesammelt.

Bemerkungen: Schliesst sich in Grösse an *R. orbignyi* A. Ad. var. *submarginata* Nevill von den Andamanen an, die aber $8\frac{1}{4}$ mm lang ist und eine relativ sehr kurze Schlusswindung und kräftigeren äusseren Ringwulst hinter dem Peristom zeigt.

43. *Rissoina orbignyi* A. Ad.

Insel Balabac zwischen Borneo und Palawan, Insel Palawan (coll. Quadras), Insel Luzon (Adams), Bagac. Prov. Bataan, auf Luzon (coll. Quadras), Insel Lugbon bei Romblon (No. 2) und Insel Sibuyan (coll. Quadras).

var. *deformis* Sow.

Insel Capul (Schwartz). — Mir unbekannt.

Sect. 9. *Zebina* H. et A. Ad.

44. *Rissoina tridentata* Mich.

Insel Negros (Schwartz). — Mir unbekannt.

var. *semiglabrata* A. Ad.

Delequete auf Cebú (Adams). — Mir unbekannt.

45. *Rissoina bidentata* Phil.

Insel Balauan bei Nord-Mindanao (coll. Quadras No. 43) und Placer auf Mindanao (No. 2253).

46. *Rissoina eulimoides* A. Ad.

Insel Capul (Adams). — Mir unbekannt.

Gen. V. *Stossichia* Brus.

47. *Stossichia mirabilis* (Dkr.).

Bagac, Prov. Bataan, auf Luzon (coll. Quadras No. 23), Insel Lugbon bei Romblon (No. 34), Insel Balauan bei Surigao (No. 16) und Placer auf Mindanao (No. 2248).

Gen. VI. Fairbankia Blfd.

48. *Fairbankia quadrasi* n. sp.

Char. T. breviter et anguste rimata, hydrobiiformis, oblongo-turrita, alba, epidermide corneo-olivacea breviter lanuginosa, ad suturas pilifera, opaca induta, solidula; spira turrita lateribus convexiusculis; apex acutus, albus, summo semper decollato. Anfr. superstites $8\frac{1}{2}$ lente accrescentes convexiusculi, sutura distincte impressa separati, subtiliter striatuli et spiraliter denseliratuli, lirulis inaequalibus, exilioribus saepe intercalatis, suturalibus setis brevibus fuscis hirtis, ultimus ad aperturam paulum ascendens, $\frac{1}{8}$ altitudinis testae aequans. Apert. substricta semiovalis, superne leviter angulata, basi subeffusa; perist. continuum, margine columellari appresso, dextro acuto, intus late albolabiato, extus varice modico cincto; columella media parte concava, deorsum strictiuscula, cum margine basali angulum efficiente magis minusve distinctum. — Alt. $6\frac{1}{2}$ —8, diam. max. $2\frac{3}{4}$ —3 mm; alt. apert. 3, lat. apert. 2 mm.

Fundort: Malabon bei Manila, Luzon (coll. Quadras No. 14), von Herrn J. Fl. Quadras in Anzahl gesammelt.

Bemerkungen: Scheint bis jetzt die einzige Art der Gattung zu sein, deren Epidermis eine feine wollige Behaarung trägt, die an der Naht sich zu steifen Börstchen verstärkt.

Dass die Rissoidenfauna der Philippinen mit dieser Artenzahl noch lange nicht erschöpft ist, beweisen die vielen Herrn Quadras und mir unbekannt gebliebenen Species und die erkleckliche Anzahl von 9 neuen unter 48 überhaupt von dort bekannten Arten dieser Familie.

II. Die Assimineiden.

Betreffs der Systematik dieser Familie brauche ich nur auf meine neuere Arbeit im Jahrb. d. d. Malakozool. Ges. Bd. 14, 1887 pag. 147—234, Taf. 6 part. zu verweisen, wo sich die Diagnosen und Citate der im folgenden abgehandelten Arten mit Ausnahme der beiden neu beschriebenen vorfinden.

Gen. I. Assiminea Flem.

1. *Assiminea hidalgoi* Gass.

Insel Catanduanes (coll. Quadras No. 2418).

2. *Assiminea nitida* Pease.

Insel Catanduanes (coll. Quadras No. 2453), hier mit starker Decollation, Insel Cebú (v. Moell. 1888, No. 245), Manapla auf Negros (coll. Quadras No. 60), Nord-Mindanao (No. 2620) und Gigaquit auf Mindanao (No. 54a).

3. *Assiminea vitiensis* Garr.

Manglares zwischen Bacó und Calapan auf Mindoro (Quadras), Visita de Victoria auf Negros (coll. Quadras No. 58) und Gigaquit (No. 54a) und Placer (No. 56) auf Mindanao.

4. *Assiminea (Euassiminea) crassitesta* n. sp.

Char. T. aut rimata aut perforata, perforatione carinula magis minusve distincta circumscripta, ovato-conica, solida, corneo-sucinacia vel corneo-fulvida unicolor, oleo nitens; spira conica lateribus leviter convexis; apex acutiusculus. Anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura distincte impressa disjuncti, oblique striatuli et obsoletissime spiraliter lineolati, infra suturam carinula exili unica cincti, ultimus tumidulus ad basim initio leviter angulatus, tum rotundatus, atne aperturam levissime coaretatus, $\frac{2}{6} - \frac{3}{7}$ altitudinis testae aequans.

Apert. parva perobliqua, ovata, superne magis quam inferne acuminata; perist. simplex acutum, intus sublabiatum, marginibus callo crassiusculo junctis, columellari brevi strictiuseulo, superne recedente et supra perforationem reflexo, basali angulatim subeffuso, dextro a sutura subdeclivi, media parte subretracto.
— Alt. $4\frac{1}{4}$ — $4\frac{1}{2}$, diam. max. $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm; alt. apert. 2, lat. apert. $1\frac{1}{2}$ mm.

Fundort: Placeer auf Mindanao (coll. Quadras No. 57), nicht selten, Insel Tinago bei Mindanao (No. 55) und Manapla auf Negros (No. 59), in kleinerer Anzahl, von Herrn J. Fl. Quadras entdeckt.

Bemerkungen: Steht in Gestalt und Grösse etwa zwischen *A. moussonii* Issel und *A. castanea* West., zeichnet sich aber vor beiden durch die bemerkenswerth feste Schale und die relativ kleine Mündung aus.

5. *Assiminea philippinica* Bttgr.

Assiminea philippinica Boettger, Jahrb. d. d. Malacoz. Ges. Bd. 14, 1887 pag. 197.

Manila auf Luzon (v. Moell. 1887), Insel Cebú (v. Moell. 1888, No. 245a), Insel Siquijor (v. Moell. 1892), Visita de Victoria auf Negros (Quadras) und Placeer (Quadras) und Cotabató (von Moell. 1887, No. 197) auf Mindanao.

var. *lirocincta* n.

Char. Praeter carinulam infrasuturalem in parte superiore anfractuum sulcis spiralibus 2—7 cincta.

Escalante auf Negros (coll. Quadras No. 63) und Gigaquit auf Nord-Mindanao (v. Moell. 1892).

6. *Assiminea brericula* Pfr.

San Lazaro und Malabon auf Luzon (v. Moell. 1887) und Insel Cebú (Nevill 1884 und B. Schmaeker 1887).

7. *Assiminea semilirata* n. sp.

Assiminea semilirata Boettger, Ber. Seckenberg. Nat., Ges. 1893 pag. 106 (ohne Diagnose), Taf. IV, Fig. 1, 1a—c.

Char. T. anguste umbilicata vel late perforata, ovata vel conico-globosa, solida, corneo-lutea unicolor aut corneo-fulvida media parte anfractuum brunneo parum distincte bifasciata, parum nitida; spira conico-convexa; apex acutus breviter mucronatus. Anfr. 5—6 superne convexiusculi, deorsum planati, sutura profunde impressa disjuncti, omnes striatuli, superi initialibus laevibus exceptis sulcis profundis — 9 in anfr. penultimo — cingulati, ultimus glabratus, indistincte solum spiraliter lineatus, basi subangulatus, juxta perforationem planatus, ad aperturam levissime coarctatus, spiram altitudine plerunque non aequans. Apert. parva obliqua, ovata, superne magis quam inferne acuminata; perist. simplex acutum, marginibus callo crassiusculo junctis, columellari calloso concavo, superne recedente, basali incrassato levissime effuso, dextro a sutura declivi, planeconvexo. — Alt. $3\frac{1}{2}$ —4, diam. max. $2\frac{3}{4}$ mm; alt. apert. $1\frac{3}{4}$, lat. apert. $1\frac{1}{4}$ mm.

Fundort: Magallanes auf Sibuyan (coll. Quadras No. 1674), Manapla auf Negros (No. 61), an letzterem Orte nur in Jugendstücken, die sich durch besonders kräftige Spiralskulptur auszeichnen, Insel Siquijor (v. Moell. 1890) und Insel Leyte (v. Moell. 1892). Zuerst von Herrn J. Fl. Quadras gesammelt.

Bemerkungen: Eine durch die grobe Spiralskulptur des Gewindes sehr ausgezeichnete Art aus der Gruppe der *A. microsculpta* und *theobaldiana* Nev.

Specilegium Malacologicum.

Neue Binnen-Conchylien aus der Paläarktischen Region.

Von

Dr. Carl Agardh Westerlund.

IV.*)

Genus **Vitrina** Drap.

Vitrina (Oligolimax) tarragonensis n. sp.

T. margine columellari superne reflexo oblique speciose perforata, in toto compressula, sed spira sat elevata et apice obtuso prominulo, irregulariter rugoso-plicata, virescenti-cornea; anfractus $3\frac{1}{2}$, convexi, celeriter accrescentes, sutura temui (nee marginata, nec impressa, nec striata) disjuncti, ultimus dilatatus, penultimo duplo major, compressus, medio plus minus, saepe distinctissime, obtuse angulatus, utrimque convexiusculus, angulo aperturam versus obsoleto; aperitura perobliqua, leviter excisa, subcircularis, magna, marginibus disjunctis, absque membrana, superiore pone basin anfractus affixo, columellari valde arcuato. Long. 4, lat. 3, alt. $2\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Spanien bei Albarracin. (Dr. B. Zapater).

Der *V. servainiana* St. Sim. nächstverwandt, reichlich aber als selbstständige Art durch Perforation, Farbe, Naht, letzten Umgang, Mündungsform, den nahe an der Mündungswand befestigten Aussenrand u. s. w. ausgezeichnet.

Vitrina (Oligolimax) zapateri n. sp.

T. perforata, globoso-conica, spira ovato-conica apice acuto, prominente, sat alta, viridescens, tenerima, sat striata; anfractus $3\frac{1}{2}$ —4, forte accrescentes,

*) In der Abth. III im Nachrichtenblatt 1892 ist an der Seite 191 der vorgeschlagene Name der Varietät von *Helix fleurati* Bgt. ausgelassen. Es wird Var. *allochroa* mh.

tumido-convexi, ultimus permagnus, rotundatus, forte altitudine accrescens, demum ascendens; sutura sat impressa; apertura perobliqua, magna, lunato-circularis, anfractu penultimo sat forte excisa, marginibus omnibus valde arcuatis, in pariete longe disjunctis, margine columellari superne dilatato et reflexo. Long. $6\frac{1}{2}$, lat. $5\frac{1}{2}$, alt. $4\frac{3}{4}$ mm.

Hab. Spanien bei Albarracin. (B. Zapater).

Vitrina striata Bgt., die vielleicht nächstverwandte, hat die Schale mit scharfen welligen weitläufigen Streifen, ein niedrigeres Gewinde, das schwach konisch ist, und eine halbeiförmige Mündung, mit den Rändern durch eine ziemlich starke Wulst auf der Wand verbunden.

Genus **Vitreä** Fitz.

Vitreä Goldfussi n. sp.

T. imperforata, regione umbilicali impressa, spira plana tenuissime striatula, nitida; anfractus 4, primi lente accrescentes, convexi, ad suturam plani, ultimus penultimo triplo latior, ad suturam planus, rectus, extus convexus, antice strictus; apertura late lunaris, pariete forte excisa, margine exteriore valde arcuato, medio producto, basali duplo longiore, extense areuato. Diam $2\frac{2}{3}$, alt. $1\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Partenkirchen Garmisch in den Bayer. Hochalpen.
(O. Goldfuss comm.)

Durch den breiten letzten Umgang ist diese Art am meisten gleich der *V. transsyriana*, bei welcher letzteren aber die Umgänge vom Anfang an schneller zunehmen und der vorletzte sich an der Mündung erweitert, der letzte doch relativ schmäler wird; besonders tritt doch die Verschiedenheit hervor dadurch dass bei *transsyriana* die Umgänge an der berandeten und gestreiften Naht sehr kurz, aber sehr deutlich hinaufsteigen, während sie bei unserer Schnecke ganz horizontal an ihrem Befestigungspunkte sind.

Genus **Hyalinia** Agass.

Hyalinia (Polita) heracleensis n. sp.

T. anguste umbilicata (paullisper anfractum omnium usque ad apicem in umbilico visibile), subcircularis, convexiuscula, nitida, supra irregulariter striato-costulata, rufobrunnea, infra laevigata, albescens; sutura impressiuscula, marginata; anfractus 6, sat convexi, lente accrescentes, ultimus ne minime dilatatus, compresso-rotundatus, antice strictus; spirula magna; apertura horizontalis, elliptico-lunata, sat excisa, intus ad basin margaritacea, marginibus leviter arcuatis, simplicibus. Diam. 11, alt. 5 mm.

Hab. Creta, Herakleon. (Th. Krüper).

Durch Grösse und Form der *Hyal. necessaria* var. *mülleri* Matr. ähnlich, aber durch ihren gänzlichen Mangel an Spiralskulptur von ihr und allen übrigen Retinellen verschieden und der Sektion *Polita* zugehörig. In dieser stellt sie sich zwanglos durch ihren fast kreisförmigen Umriss, langsam zunehmende Umgänge etc. in die *nitidula*-Gruppe, wo sie sich doch ziemlich isolirt findet in Folge ihrer Grösse und ihrer starken Skulptur.

Genus **Zonites** Mont.

Zonites labiosus n. sp.

T. sat anguste umbilicata (umbilicus vix $\frac{1}{8}$ diametri testae occupans), conico-convexa, nitida, obsolete irregulariterque striata, superne striis densissimis spiralibus densissime granulata, in anfractibus duobus ultinis striis spiralibus distantibus clathrata, supra rufobrunnea, infra flavescens, strigis (h. e. labiis aperaturee priscis) multis (11—12) latisque flavis signata; anfractus 6, supremi plani, caeteri convexiusculi, regulariter accrescentes, ultimus medio angulatus, angulo pone aperturam evanescente; apertura lunato-

rotundata, intus late lutescenti-labiata; peristoma rectum, acutum, margine columellari superne late reflexo. Diam. 25, alt. 16—17 mm.

Hab. Griechenland bei Olenos im Peloponesos. (Dr. Krüper).

Eine besonders durch ihre zweifache Skulptur auf der Oberseite und durch ihre zahlreichen Querbinden ausgezeichnete Form.

Genus **Helix** Lin.

Helix (Gonostoma) barbula (Ch.) Rossin.

Var. *chorista* mh.

T. distantius et fortius costulata (fere costata), convexior; anfractus convexit (nec vix convexiusculi), ultimus obtuse angulatus (nec acute subcarinatus), subitus convexior, antice non constrictus; apertura margine basi bidentato.

Hab. Spanien bei Valencia. (B. Zapater.)

Helix (Theba) theobaldi n. sp.

T. intus anguste umbilicata vel subperforata, ad aperturam duplo dilatata, subgloboso-depressa, obsolete irregulariter striatula, densissime et tenuissime, sed sub lente acuto distinete spiraliter lineata, lutescenti-albida, apice rufo; anfractus 6, regulariter accrescentes, convexiusculi, ultimus major, rotundatus, subitus convexior, ad aperturam plus quam duplo latior penultimo, non descendens; apertura circulari-lunata, parum excisa, intus albolabiata, limbo angusto rufo, margine exteriore recto, interiore patulo, columellari superne levissime dilatato Diam. 13, alt. 7 mm.

Hab. Creta, Herakleon. (Th. Krüper).

Hat vermutlich in *Helix dirphica* Bl. ihre nächste Verwandte, ist aber von ihr wie von den übrigen Thebaformen gänzlich verschieden besonders durch die Beschaffenheit ihres Nabels.

Genus **Pupa** Drp.

Pupa (Torquilla) brauni

Var. *conispira* inh.

T. usque a basi lata et subtransversa sursum sensim regulariterque elongato-conica, apice acuta, virescenti-albida; anfractus $8\frac{1}{2}$, lentissime accrescentes, dense regulariter costulati; apertura rotundata, omnino sub dimidiā exteriā basis posita, dente angulari minuto, plica parietali longa, dente columellari valido superne plicis palatalibus 4 ut in typo. Long. 6, diam. ad basin (cum apert.) 3 mm.

Hab. Spanien bei Albarracin (B. Zapater).

Pupa (Torquilla) rectraeta W.

Var. *semidens* mh.

T. fortius regulariter striata, anfractus 7, apertura dentibus palatalibus 4, longe et aequaliter a margine remotis, quarum 1. 2. 4. aequalibus, brevissimis, crassis, 3. paullo longiore, omnibus introsum in plicas breves attenuatis.

Hab. Spanien bei Albarracin (B. Zapater).

Pupa (Pupilla) muscorum Lin.

Var. *glis* mh.

T. perforato-rimata, ovato-cylindracea, dense striatula. rufescens; anfractus $6\frac{1}{2}$, convexiuseuli, sutura impressiuseula, marginata disjuncti, lente accrescentes, ultimus ascendens, ad aperturam descendens, antice callo albo postice late diffuso, sulco angusto a margine separato; apertura semicircularis, marginibus distantibus, intus forte labiata, plica parietali alta elongata et in palato pone marginem exteriorem dentibus duobus granuliformibus validis munita. Long. 3, diam. $1\frac{7}{8}$ mm.

Hab. England in Yorkshire. (J. Ponsonby).

Pupa (Pupilla) signata MSS.

Var. *cyclostoma* mh.

T. var. cristatae Mts. similis, sed alba, hyalina, dense regulariter striata, apertura circularis, peristoma lamina parietali alta continuum, anfractus perconvexi, sutura impressa disjuncti.

Hab. Persien bei Scharud. (O. Herz, comm. O. Boettger).

Var. *debilis* mh.

T. cornea, sublaevigata, anfractus convexiusculi: sutura tenuis, apertura marginibus longe disjunctis, sine ullo vestigio calli, dente minutissimo tuberculiformi profunde in palato, peristoma angustissime reflexum, anfractu ultimo antice valide albido-caloso, extus obsoletissime impresso, basi leviter cristato.

Hab. Kaukasus bei Krassnowordsk (O. Retowski).

Genus **Balea** Prid.

Balea perversa Lin.

Var. *illyrica* mh.

T. costulata, valde strigillata, anfractus 9—9½, convexitas sutura profunda, apertura quadratiformis, marginibus parallelis, callo tenuissimo junctis, tuberculo nullo vel rarius minimo. Long. 8, diam. 2 mm.

Hab. Fürst-Grafschaft Görz; „wurde von mir nur im Bacathale in der Ortschaft Podrdo auf altem Gemäuer gefunden“. (Prof. Fr. Erjavec).

Var. *pirostoma* mh.

T. rimato-perforata, striatula, raro-strigillata, anfractus 8, convexiusculi, apertura piriformis, subsoluta, marginibus continuis, dextro (columellari) peroblique (fere a basi) ad sinistrum producto, superne lamella supera brevissime sed sat forti (loco tuberculi aliarum species formarum) et sinulo distincto (instar Clausiliarum) praedita. Long. 7, diam. 1½ mm.

Hab. Schweden bei Frillesäs in Prov. Halland.

Genus **Clausilia** Drap.

Bemerkungen.

1. Obgleich genaue und mühsame Studien schon lange diesem Genus, besonders von deutschen Forschern (wie Rossmässler, v. Vest, A. Schmidt, Küster, Moellendorff, v. Martens, Kobelt, zuletzt und namentlich Boettger), gewidmet worden sind, blicken noch viele, auch schon längst bekannte Formen, welche den Forschern viel Kopfzerbrechen verursacht haben, wo im System sie ihren rechten Platz haben sollen, als unbeantwortete Fragen übrig. Wo man sie einzuschalten versucht, haben sie sich offenbar als Fremdlinge erwiesen, die die Hauptcharaktere der betreffenden Sectionen durch ihre Anwesenheit mehr oder weniger aufgehoben haben. Es verhält sich auch mit vielen dieser Sectionen so, dass sie nicht nur von ihren Polen, sondern von mehreren anderen Stellen Schösslinge in verschiedenen Richtungen gegen andere Sectionen hin ausschiessen, wodurch das System mitunter ein netzförmiges Aussehen bekommt. Dies geht wohl an, insoweit die Frage nur einem ideellen, sogar einem „streng natürlichen System“ gilt, wenn man aber zu gleicher Zeit wünscht, das System praktisch brauchbar zu machen, den Anfängern eine Hülfe, einen Leiter, einen Ariadnesfaden in den Labyrinthen zu liefern und doch die natürlichen Verwandten zusammen zu halten, so werden die Schwierigkeiten oft derart, dass sich der Satz oft bewahrheitet: Incidit in Scyllam qui vult evitare Charybdim.

Eine solche Schwierigkeit ist *Claus. denticulata* gewesen. Moellendorff hatte (Nachrbl. 1874) sie unter die Verwandten der *Cl. cana* (also in die Section *Strigillaria*) gestellt; v. Martens und Boettger rechnete sie zu der Sect. *Alinda*, und ich selbst habe in der Fauna ihr einen Platz unter *Pseudalinda* gegeben.

Endlich glaube ich einen deutlichen Wink über ihre systematische Stellung bekommen zu haben und zwar durch eine Monstrosität, wie gerade die Monstrositäten oft sowohl in der Thier- wie in der Pflanzenkunde in dieser Hinsicht Licht gebracht haben.

Unter vielen normalen Exemplaren der *Cl. denticulata* von der Insel Scio fand sich ein wahres Prachtexemplar, bei welchem keine Spur von einer Lunella zu bemerken ist, aber anstatt dieser finden sich vollkommen dorsal, d. h. ganz in der Mitte des Gaumens und durchscheinend auf dem höchsten Theil des Nackens, unter dem inneren Ende der langen Principalfalte, drei kürzere, ihr und unter sich parallele, starke Falten, von denen die zwei oberen sich nach aussen fast eben so weit wie die Principale fein verlängern.

Von diesem Funde eilte ich meinem Freunde, dem ausgezeichneten Clausilienkennner Prof. Dr. Boettger Nachricht zu geben. Ich würde glauben unrecht gegen das Publikum zu handeln, wenn ich seine sehr interessante Antwort für mich allein behielte, weshalb ich hier einen Auszug aus derselben gebe.

„Zahlreiche Gaumenfalten, abnorm statt einer Lunelle, hat Ad. Schmidt zuerst in Claus. System Cassel 1868 p. 136 bei *Cl. cana* nachgewiesen. Er erinnert mit Recht an die Aehnlichkeit dieser Bildung bei *Cl. cochininchensis*. Ich habe mich dieser Beobachtung schon früher bemächtigt und in den Claus.-Studien nachzuweisen versucht, dass die Mondfalte aus kleinen Palatalen entstanden sein muss und dass das Auftreten solcher Fältchen wie bei Schmidt's *cana* und ihrer *denticulata* als Rückschlag, Atavismus, aufzufassen ist.

„Dass *denticulata* und die apokryphe *semidenticulata*, die ich mir nie habe verschaffen können und die schliesslich doch nur eine Varietät von *denticulata* sein wird, nicht ganz passend bei *Alinda* (wie es meine Vorgänger thaten),

untergebracht ist, erkenne ich an. Ich habe das im System-Verzeichniß auch durch den — angedeutet. Jetzt gefällt mir die Stellung bei *Strigillaria* oder *Bulgarica* besser, doch wäre natürlich eine neue Subsection zu bilden. An *thesalonica* reicht sie namentlich die Stellung der Mondfalte, Bildung der Subcolumellare (und das Vaterland). Nach *cana* hin und ebenso gegen *Oligoptychia* (vor allem *commena* Ret.) verweisen auch die Palatalen Ihres abnormen Stückes; bei *commena* sind dieselben Regel. Alle Uebergänge zwischen Stücken mit durchlaufender Lunelle und solchen mit zahlreichen Palatalfältchen finden sich bei mehreren Arten der Subsection *Euphaedusa* in China und Japan.

„An fossilen Arten glaube ich den Nachweis geliefert zu haben, dass die Palatalen der ‚ursprüngliche‘ Zustand sind und die Lunelle erst spät entstand. Daher auch das Fehlen von *Delima*, *Albinaria* und namentlich *Papillifera* in tertiären Schichten. *Laminifera* nehme ich aus; es ist dies eine eigene mehr mit *Nenia* verwandte Gattung.“

Prof. Boettger ist hier meiner Ansicht beigetreten, dass *Cl. denticulata* ihren rechten Platz in der Section *Strigillaria* habe (was Moellendorff schon 1874 wollte) und das *Cl. thessalonica* unter ihre nächsten Verwandten zu rechnen sei. Diese Annahmen machen doch eine Umplacirung einiger anderer Arten im System nothwendig. Ausser dass *Idyla* und *Strigillaria* neben einander gestellt werden müssen, scheint es mir am richtigsten zu *Idyla* nur die Arten *paganus* und *rugicollis* mit ihren zahlreichen Varietäten zu rechnen dagegen aber mit *Strigillaria* einige Formen zu vereinen, welche jetzt in anderen Sectionen stehen. Dadurch würden die den beiden Sectionen gemeinsamen Kennzeichen die folgenden: *Anfractus ultimus basi forte cristatus*, *peristoma basi canaliculatum*, *lunella dorsalis*, *plica principalis longa*, *plica palat. supera I*, *extus lunellam nunc*

brevissima, sed distincta, nunc longa et in callum externum tenuem rubellum introrsum pliciforme productum transiens, plica infera distincta, saepe valida, lunellae conjuncta. — Die beiden Sectionen können so charakterisiert werden:

Idyla: Anfract. ultimus latere late impressus (unicristatus) vel profunde sulcatus (bicristatus); plica subcolumellaris immersa medio repanda, infra breve geniculato-curvata; clausilium extus superne longe et tenui exciso-cuspidatum. — *Cl. pagana, rugicollis, pygmaea, serbica, oboluta.*

Strigillaria: Anfr. ultimus unicristatus (v. obsolete bicristatus); plica subcol. immersa varia (sed non repanda nec geniculata); clausilium angustum, apice subtus inerassatum, lente attenuatum. † Plica subcolumn. ad canalem basalem, stricte extensa: *Cl. cana, vetusta, pancici.* ‡ Plica subcolumn. abbreviata, intra medium columellae occulta; *Cl. socialis, fraudigera, intricata, varnensis.* ‡ Plica subcolumn. arcuatim emersa: *Cl. thessalonica und denticulata.*

Clausilia (Strigillaria) mystica n. sp.

T. fusiformis, spira gracili attenuata, obscure vel pieeo-brunnea, grosse striata, striis spiralibus densis ut dense granulata, obsoletissime cinereostrigillata; anfractus 14, ultimus acute costulatus, infra attenuatus, basi unicristatus, latere sinistro leviter impressus; apertura rotundata, basi canaliculata, lamella infera regulariter arcuato-ascendens, intus tenuis et sat alta, antice fere ad marginem producta, subtus cum ramo parallelo marginali, interdum etiam retrorsum furcata; plica suturalis longa, tenuis, plicae palatales superiores 2, validae, principalis fortior, subparallelae, plica infera perbrevis, cum lunella dorsali conjuncta,

plica subcolumellaris ad basin supra canalem obsolete submersa; peristoma continuum, solutum. Long. 22—23, diam. 4½ mm.

Hab. auf der Insel Samothrake. (Th. Krüper).

Hier begegnen wir sogleich einer dieser oben erwähnten mystischen Formen (es ist doch nicht deswegen, dass diese Art ihr Nomen triviale bekommen hat!), deren systematische Stellung nicht klar ist. Durch ihre Mündungstheile, Lamellen, Falten und Clausilium ist sie eine echte *Strigillaria* und sogar in hohem Grade gleich der *fraudigera*, aber von allen ist sie sehr verschieden durch ihre Grösse, schwarzbraune Farbe, eigenthümliche Skulptur und Mangel an Strigillirung, deren gemeinses Vorkommen der Sektion den Namen gegeben hat. Und doch weiss ich keinen anderen Platz für diese Schnecke.

Clausilia (Herilla Subsectio?) peloponnesiaea n. sp.

T. fusiformis, apice sat tenui, laevigata, anfractu ultimo striata, lutescenti-cornea; anfractus 11, vix convexiusculi, ultimus basi obtuse cristatus; sutura dense crenulata; apertura ovali-piriformis, callo rufo tenui profundissimo praedita, peristomate continuo, connexo, alboinerassato; lamella supera marginalis, alta, lamellam spiralem longe praeteriens, lamella infera valida, emersa, stricta, humilis, subhorizontalis, simplex, interlamellari perlato laevique a supera sejuncta; lunella dorsalis, obliqua, stricta, infra in macula alba quadri-formi dilatata et ab illa supra rimam plicam transversalem et deorsum plicam inferam validam oblique in medium palati emittens, superne tenuis et cum plica palatali supera medio conjuncta; plica principalis longa, longe ultra lunellam producta, plica subcolumellaris ad basin extensa, arcuato-submersa;

clausilium apice semicirculare-excisum, labiis lateribus aequalibus, obtusis. Long. 14, diam. $4\frac{1}{2}$ mm.
Hab. Griechenland bei Psathopyrgos im Peloponnesus.
(Th. Krüper).

Subsectio:

Clausilium apice arcuato-excisum, lobis aequalibus obtusis (plica palatalis supera 2, principalis longa, plica infera valida, lunelle dorsalis, stricta).

Clausilia (Papillifera) praestans n. sp.

T. cylindrico-fusiformis, superne obsolete costulata, medio dense striatula, anfractu ultimo costulato-striata, costulis saepe bifurcatis, albido-coeruleo-sens, spira brevi sub-concaviusculo-attenuata; anfractus 10—11, superi convexi, caeteri planati, sutura albida, superne solummodo minutim crenulata disjuncti, ultimus basi obsolete gibbosus; apertura magna, rotundata, lamella supera sat brevis, non marginata, lam. infera sigmoidea, retrorsum tenue furcata, intus lata, subhorizontalis, extus stricte descendens, lamella parallela distinctissima, usque in sinulum producta, lamella spiralis perdistincta, longa; plicae suturales 2, laeves, pl. principalis tenuis, sat longa, lunellam attingens, plica palat. supera crassior, brevior, parallela, lunella fortis, omnino dorsalis, arcuata, basi brevissime calcarata, plica subcolumellaris intus extense geniculata, pone ad lamellam inferam stricte longeque usque in peristoma extensa; clausilium aegre in apertura conspicua. Long. 20—22, diam. 5 mm.

Hab. Griechenland auf der Ins. Xeronisi. (Th. Krüper).

Verwandt der *Cl. saxicola*, aber diese ist viel kleiner hat die Naht nicht papillirt, keine sichtbare Spirallamelle, keine Gaumenfalten, hat die Spindelfalte weit von der Columella getrennt, Mondfalte subdorsal, Clusilium in der Mündung gut sichtbar u. s. w.

Clausilia (Papillifera) subsuturalis n. sp.

T. fusiformis, apice brevi conica, levissime dense striatula, superne et ad suturam striata, anfractu ultimo confertim subcapillaceo-striato, rufescenti-brunnea; anfractus 10, superi convexi, caeteri vix convexiusculi, ultimus basi subgibbus; sutura tenuis, angustissime albida, infra fuscocmarginata; apertura rotundato-ovata, subpiriformis, sinulo parvulo, peristomate soluto, reflexo, forte albolabiato; lamella supera longa marginalis, infera profunda, sed valida, subhorizontali-ascendens, antice crassa, intus obsolete furcata; lunella subdorsalis, longa, suturam attingens, medio geniculata, inferne brevissime calcarata; plicae suturales 1-2, tenues, plica principalis in genu lunellae brevissima vel nulla, plica subcolumellaris geniculata, profunde imersa, sed a basi intuenti sat conspicua. Long. 19, diam. 4 mm.

Hab. Griechenland bei Kyllene Sura. (Th. Krüper).

Gleicht so ziemlich der *Cl. suturalis* K., ist aber im Ueberfluss verschieden durch die Farbe, die sehr schmal weisliche, dunkel berandete Naht, welche gar nicht gezähnelt oder papillirt ist, die oberen gewölbten Umgänge, ihr gelöstes, zurückgebogenes, stark weissgelipptes Peristom, quergestellte Unterlamelle, sublaterale feine Lunella, eingesenkte Subcolumellarfalte u. s. w.

Clausilia (Papillifera) symphyta n. sp.

T. cylindraceo-fusiformis, obsoletissime irregulariter striatula vel sublaevis, excepto anfractu ultimo costulato-striato, nitidissima, cerasino-cornea; anfractus 10, superi convexi, caeteri convexiusculi, sutura tenui albida fuscocmarginata discreti, apertura piriformis, peristomate continuo; lamella supera medioeris, flexuosa, infera antice stricta, ascendens, deinde hori-

zontalis, arcuato-ascendens, tenue furcata, lamella parallela distinctissima, longissima; lunella dorsalis, valida, longissima, valde geniculato-arcuata, ad suturam dilatata; plicae suturales 2 et pl. principalis mediocre, distinctae, aequales, parallelae, plica subcolumnellaris cum lunella conjuncta, e loco conjunctionis retrorsum intus plicam longam tenuem emittens, sub lamellam inferam emersa, sed intus abbreviata; apparatus claustral is in apertura bene conspicuus. Long. 17, diam. $3\frac{3}{4}$ mm.

Hab. Griechenland, Schimatari in Boeotien.

Am nächsten der *Claus. saxicola* A. S. verwandt.

Clausilia (Papillifera) saxicola A. Schm.

Var. *prusia* mh.

T. corneo-flavida, supra medium costulata, deinde striata, lamella spiralis et lamella parallela tenues, sed distinctae, longae, lamella infra valida, horizontali-subdeflexa, arcuata, altissima, plica principalis tenuis et brevis, sed distincta, subcolumnellaris lunellae conjuncta. sed ne minime calcarata. Long. $11\frac{1}{2}$ — $13\frac{1}{2}$, diam. $2\frac{1}{2}$ —3 mm.

Hab. Euboea. (G. Adami).

Clausilia (Papillifera) virgata Jan

Var. *barcinensis* mh.

T. dense oblique costulata, sutura impressa, brunneomarginata, papillifera, spatio inter costulas dense et forte transverse rugoso: callus palatalis pervalidus, lamella spiralis perdistincta, usque ad lamellam superam prolongata.

Hab. Spanien bei Barcelona.

Diese Form ist mir von Herrn Goldfuss in Halle als *Claus. catalonica* Fag. mitgetheilt worden.

Genus **Limnaea** (Brug.) Rang.

Limnaea (Lymnus) stagnalis Lin.

Var. *sophronia* mh.

T. omnino sua forma cum figura 175 varietatis ad Budapest Hungariae lecta in Iconographia Kobelti congrua, sed unicolor corneolutescens et ubique forte malleata.

Hab. Schweden in lacu Stogsjon provinciae Oester-gotland. (Dr. H. Nerén).

Limnaea (Gulnaria) auricularia Drap.

Var. *sinuosa* mh.

T. rimata, ovata, tenuis, sed firma, lutescenti-alba, pellucens, striatula, nitida; anfractus $4\frac{1}{2}$, super spiram perbrevem acutissimam formantes, supremi 2 minutissimi, penultimus parvus, antice tumido-convexus, ultimus validus, inflatus, postice perconvexus; aper-tura magna, ovata, pariete brevi, perconvexa, sinum profundum cum columella formante, columella longa (dimidiam testae superans), oblique substricte descendens, infra extus arcuata, margine exteriore superne breviter arcuato, medio forte arcuatim producto. Long. 15, lat. 10, apert. long. 11, lat. ad sinum colum. 5, pone basin 7 mm; vel resp. 19—12—15—7— $8\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Griechenland im Pheneus-See im Peloponesus. (Th. Krüper).

Limnaea (Gulnaria) peregra Müll.

Var. *petronia* mh.

T. rimata, ovata, solida, sed translucens, corneo-brunnea, passim coerulescens, obsolete obtuse striata et sub lente forti densissime minutissimeque spiraliter lineata adeoque nitida vel nitidissima; spira supra anfractum penultimum angusta, breve conica, forte contorta, acuta; anfractus 5, convexi, ultimus maximus,

tumido-pulchre convexus; apertura ovata, superne obtusa, marginibus callo tenui conjunctis, exteriore recto, acuto, intus levissime albo-labiata, superne breviter rotundato, deinde subverticali, basali rotundato, columellari late reflexo, albido-incrassatulo. Long. 15, lat. 8—9 mm. apert. $7\frac{1}{2}$ —9 mm. longa, 6 mm. lata.
Hab. Schweden ad Borghamn prope montem Omberg Ostrogothiae, (Dr. V. Lundberg).

Genus **Planorbis** Guett.

Planorbis (*Gyraulus*) *strömi* W.

Var. *spurius* mh.

T. minor, anfractu ultimo celeriter accrescente dilatato, forte complanato, medio carinato-angulato, aperturam versus utrimque aequaliter convexiuscula. Diam. $3\frac{1}{2}$ mm.
Hab. Dänemark in Farup Sö unweit Veile. (H. Lynge).

Planorbis (*Gyraulus*) *numidicus* Bourg.

Var. *biangulatus* mh.

T. corneo-rufescens, dense transversim striata; anfractus $3\frac{1}{2}$, celerrime accrescentes, ultimus dilatatus, penultimo triplo latior, supra quam subitus convexior, infra medium obsolete obtuse angulatus, antice paulo descendens; apertura obliqua, ovalis, pariete parum excisa, biangulata; peristoma basi callo continuo, marginibus subaequaliter arcuatis. Diam $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$, alt. 2 mm. — Variat frequenter anfractu ultimo antice omnino soluto.

Hab. Algerien bei Boursaria. (J. Joly).

Genus **Sphaerium** Scop.

Sphaerium (*Corneola*) *physale* n. sp.

Concha ovata, parum inaequilatera, obsolete striata, paleide citrina, nitida, valvulis superne ventricosis, semel vel bis ascisis, infra medium convexiusculis, ad margines compressis, margine anteriore regulariter rotun-

dato, posteriore latiore rotundato-truncato, inferiore levissime curvato; umbones tumidi, lati, humiles, rotundati. Long. 8, alt. $5\frac{1}{2}$, diam. $4\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Lapponia Rossica in Halbinsel Kola, Fluss Tulom. (Ch. Rabot), Norvegia Finnmarken, Paswig elv.

Genus **Pisidium** C. Pfr.

Pisidium (Fluminina) amnicum Müll.

Forma glacialis mh.

Concha brevior, latior, rotundior, margine ventrali forte arcuata, parte anteriore late rotundato. Long. 9, alt. 7, cr. $3\frac{3}{4}$ mm.

Hab. Finnländisches Lappland in der Nähe vom Eismeer um 69° N. Br., wie bei Ivalajökkki, Kamasjokki, Enare u. s. w.

Ganz unerwarteter Fund von Mr. Charles Rabot, da diese Muschel sonst nie in Norwegen, in Finland nur im See Saemen ($61-62^{\circ}$ N. Br.) angetroffen ist und in Schweden ihre Polargrenze zwischen $60^{\circ}-61^{\circ}$ N. Br. hat.

Pisidium (Fossarina) arcticum n. sp.

Concha inaequilatera, parte anteriore quam posteriore duplo longiore, oblique ovalis, superne vix ventriculosa, infra medium compressa, fusco-cornea, dense costulato-striata, subsulcata, locis tribus profundius incisa; pars anterior elongata, rotundato-angustata, posterior brevis, subtruncata; margo dorsalis et margo ventralis subaequaliter arcuatuli; margo posterior rectus, subverticalis vel levissime arcuatus; umbones humiles, apicibus minutis conniventibus. Long. 6, alt. $4\frac{1}{2}$, crass. $2\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Norwegen, Sydvaranger bei Bosijar, Paswig, $69^{\circ}-70^{\circ}$ N. L.

Kleinere Mittheilungen.

Dr. H. von Ihering hat einen Ruf als Zoologista da Comissão Geographica e Geologica de São Paulo und Director des dortigen zoologischen Museums angenommen. Sendungen an ihn oder das ihm unterstellt Museum gehen nach São Paulo, Brasilien, Caixa No. 190, während Packete etc. nach wie vor an Herren Deurer & Kaufmann, Alter Wall 20 in Hamburg zu richten sind. Dr. von Ihering ist mit einer Arbeit über die geographische Verbreitung der marinen Mollusken an der südbrasilischen Küste beauftragt und verspricht sich auch schöne Resultate von dem Studium der Land- und Süßwasseroconchylien von S. Paulo, da dieser Staat hierin viel günstiger bedacht ist, als Rio Grande do Sul.

Die grosse Conchyliensammlung unseres langjährigen Mitgliedes Dr. Fr. Ressmann-Malborgeth, ca. 3000 benannte und 1200 unbenannte Species enthaltend, steht zum Verkauf. Der Catalog und nähere Auskunft sind zu erhalten von Herrn Ed. Porasso, Adjunkt der oester. ungar. Bank-Filiale in Bozen, Tirol.

Literaturbericht.

The Journal of Conchology Vol. VII, Nr. 4.

- p. 98. Warren, Miss Amy, Contributions towards a List of the Marine Mollusca of Killala Bay, Ireland.
p. 108. Oldham, Charles, Additions to the South Devon List of Land and Freshwater Mollusca.
p. 110. Smith, Edgar A., Description of a new species of Nucula, and a List of the Species, belonging to the subgenus Acila. (N. [Acila] fultoni aus der Hugly-Mündung des Ganges).
p. 113. Mc. Murtrie, Rev. John, Eigg Shells: Notes on the Land- and Freshwater — Shells of the Island of Eigg.
p. 119. Adams, Lionel E., the Examples of Zonites cellarius in the Montague Collection at Exeter.
p. 120. Melvill, J. Cosmo, Notes upon Cypraea chrysalis and C. amphithales.

Proceedings of the Royal Physical Society of Edinburgh. Session 1891/92.

- p. 245. Bennie, James, the raised Sea-bottom of Fillyside. Researches in 1869--70 and 1878. Es werden 24 Arten Mollusken aufge-

führt; *Adeorbis subcarinatus*, zum erstenmal fossil in Schottland gefunden, wird abgebildet. Die Schichten sind sicher gehobener Meeresboden, keine Strandbildungen.

- p. 244. Goodchild, J. G., Notes on carboniferous Lamellibranchs. (Kurze Notiz über das Verhältniss von *Ctenodonta* und *Nucula*).

- p. 245. Goodchild, J. G., Notes on the Genus *Allorisma*, King.

Dall, W. H., Determination of the Dates of Publication of Conrad's „Fossils of the Tertiary Formation“ and „Medial Tertiary“. In Bull. Philos. Soc. Washington, Vol. XII. p. 218—240.

Der für die amerikanischen Geologen sehr wichtige Prioritätsstreit zwischen Lea und Conrad, welcher seiner Zeit sehr unangenehme Erörterungen und Spaltungen hervorrief, wird durch diese Arbeit, welche durch die Seltenheit der Originalausgaben sehr erschwert worden ist, endgültig entschieden.

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 1892.

- p. 488. Brusina, S., über die Gruppe der *Congeria triangularis*. Neu *C. Hoernesi* = *triangularis* M. Höernes ex parte; — *C. ornithopsis*, desgleichen.
- p. 500. Oppenheim, P., neue Fundpunkte von Binnenmollusken im Vicentinischen Eocän.

Sitzungsbericht der Gesellschaft naturf. Freunde Berlin 1892.

- p. 174. Martens, Ed. von, über die von Dr. Stuhlmann in Nordostafrika gesammelten Land- und Süßwassermollusken. Es wurden etwa 60 Arten erbeutet, darunter ein an die abessynischen und arabischen Formen sich anschliessender *Buliminus*. Als neu beschrieben werden: *Helix Karevia* p. 175, *Buliminus trapezoideus* p. 176, beide vom Ronsoro; -- *Achatina stuhlmanni* p. 176 vom oberen Ituri; -- *Subulina paucispira* p. 177 vom Ronsoro; -- *Hapalus conoideus* p. 177 von Butumbi; -- *Streptostele costulata* p. 178 von ebenda; -- *Ennea limbata*, *excavata*, *planidens*, (*Ptychotrema*) *runsorana* p. 178, 179; -- *Cyclophorus elatior*, (*Ditropis*) *papillaris* p. 180 beide von Butumbi; -- *Melania tornata* p. 181 aus dem Duki, westlich von dem Mwulan-See.
- p. 181. Martens, Ed. von, Beschreibung vier neuer afrikanischer Conchylienarten. (*Homorus pyramidella*, *Ennea conospira*, *Cyclophorus preussi* von Kamerun, *Ennea grossa* von Usambara.)

Drouët, Henri, Notice sur Arthur Morelet. Avec un portrait.
Extrait des Mémoires de l'Academie de Dijon (4) IV.
1893.

Enthält auch ein vollständiges Verzeichniss von Morelets conchyliologischen Arbeiten.

Krause, Dr. Aurel, Mollusken von Ostspitzbergen. Mit 3 Tafeln. In Zoolog. Jahrbücher Abth. für Systematik. Vol. 6, p. 339—376, Taf. 14—16.

76 Arten, neu *Pleuroleura walteri* p. 366 u. 14, Fig. 6—9. Die Bucciniden sind sehr gut abgebildet; von *B. glaciale* werden einige neue Varietäten unterschieden.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. VII.
p. 11. Dreger, Dr. Jul., Die Gastropoden von Häring bei Kirchbichl in Tirol. Das genaue Alter der durch ihre Verbindung mit Kohlenvorkommen wichtigen Schichten bleibt noch unentschieden. Als neu beschrieben werden *Dentalium haeringense*, *Emarginula kittlii*, *Turbo tuberculatus*, *T. demersus*, *Scalaria rodleri*, *Sc. subulata*, *Rostellaria haueri*, *Cassidaria haeringensis*, *Cassis fuchi*, *Tritonium haeringense*, *Fusus mittereri*, *Murex guembelis*, *Voluta stromboides*,? *Ancillaria olivaformis*, *Pleurotoma haeringensis*. Ausserdem zahlreiche, des schlechten Erhaltungszustandes wegen nicht mit Sicherheit zu bestimmende Formen.
p. 35. Kittl, Ernst, Die Gastropoden der Schichten von St. Cassian der südalpinen Trias II. Theil. Mit 5 Tafeln. Als neu beschrieben werden: *Neritina imitans*; *Palaeonarica* (n. gen.) *constricta*; *Scalaria?* *triadica*, *damesi*; *Turritella paedopsis*, *subtilestriata*, *fasciata*, *abbatis*; *Siliquaria?* *triadica*; *Delphinulopsis laubei*; *Purpurina vaceki*; *Pseudoscalites* (n. gen.) *elegantissimus* Klipstein mss.; *Naticella anomala*; *Naticopsis ladina*, *diana*, *zitteli*, *laubei*, *altoni*, *gaderana*, *kinkelini*, *uhligi*, *involuta*, *telleri*; *Natica berwerthi*, *transiens*, *argus*; *Ptychostoma stachei*, *wähneri*, *mojsisoviczi*, *fasciatum*; *Lacuna karreri*.

p. 148. Sturany, Dr. R., Mollusken aus der Umgebung von Bad Fluschn und Ferleiten in Salzburg. 36 sp., keine n. sp.

The Journal of Conchology Vol. VII. No. 6.

p. 161. Wotton, F. W., the life-history of *Arion ater* and its power of self-fertilisation (contin.).

p. 167. Oldham, Charles, Pisidia near Leicester.

p. 174. Horsley, Rev. J. W. *Helix nemoralis* in the Pyrenees.

- p. 174. Cooper, J. E., *Valvata piscinalis* monstr. sinistrorum at Hinstanton, West-Norfolk.
- p. 175. Byne, L. St. G., a contribution towards a list of the marine mollusca of Teignmouth.
- p. 188. Morris, G. H., *Valvata piscinalis* var. *albina* at Lewes, Sussex.
- p. 189. Mc. Murtrie, Rev. John, Eigg Shells, additional notes on the land- and freshwater Mollusca of the island of Eigg.
- p. 191. Morris, G. H., Albino Varieties at Lewes, Sussex.
- p. 192. Cockerell, T. D. A., *Arion occidentalis*, an apparently new species (von Pau in den Pyrenäen).

Melvill, James Cosmo, Description oft twenty-five new species of Marine shells, from Bombay, collected by Alexander Abercrombie, Esqr. — From Mem.-Proc. Manchester Literary and Philos. Soc. 1892/93 (IV, 7). With plate.

Es werden beschrieben: *Ocenebra bombayensis* fig. 1; — *Clavus praeclarus* fig. 2; — *Purpura blanfordi* fig. 3; — *Ricinula subnodulosa* fig. 6; — *R. konkanensis* fig. 5; — *R. xuthedra* fig. 4; — *Engina zea* fig. 7; — *Mitrella flavilinea* fig. 8; — *M. euterpe* fig. 9; — *Marginella mazagonica* fig. 10; — *Solarium delectabile* fig. 11; — *Amathis filia* fig. 14; — *Oscilla tornata* fig. 12; — *Pyrgulina callista* fig. 13; — *Rissoina appianata* fig. 16; — *Rissoa versicolora* fig. 15; — *Alvania mahimensis* fig. 17; — *Naticina pomatiella* fig. 18; — *Cerithiopsis bandorensis* fig. 19; — *Cyclostrema solariellum* fig. 20; — *Siphonaria basseimensis* fig. 21; — *Raeta abercrombiei* fig. 28; — *Tellina kolobana* fig. 23; — *T. lechriogramma* fig. 22; — *Thracia salsettensis* fig. 24.

Eingegangene Zahlungen:

Höcker, G., 6 Mk., Schmacker, S., 6.50 Mk., Krätzer, Dr. Fr. 6 Mk., Dohrn, St., 18 Mk., Brusina, A., 24 Mk., Krimmel, K., 30 Mk., Le Sourd, P., 28.28, Branczik, Fr., 17.41 Mk., Semper, W., 24 Mk.

Beiliegende Preisliste des Herrn **M. L. Fea**, Genua, über die bei Erforschung von Birma und den benachbarten Ländern gesammelten Mollusken empfehlen wir geneigter Beachtung.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M., Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Berittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Ueber den Werth des Deckels für die Systematik.

Von

Dr. O. von Moellendorff.

In seinem XVII. „Stück“ zur Conchylienfauna von China (Wien 1892) hat mich Herr Gredler in seiner beliebten gemüthlich polternden Weise mit einigen Ausfällen bedacht, die ich ohne ihm auf das Gebiet der persönlichen Auseinandersetzungen mehr als unumgänglich nöthig zu folgen, ihres sachlichen Interesses wegen nicht ohne Erwiderung lassen will. Mir ist diese subjektive Art der Polemik so unsympathisch als nur möglich; für die Wissenschaft, zu deren Förderung wir doch ausschliesslich die Feder ergreifen, ist es von geringer Wichtigkeit festzustellen,

ob dieser oder jener Autor ungenau beobachtet oder falsche Schlüsse gezogen hat, auf wessen Seite grössere „Böcke“ geschossen worden sind, es kommt vielmehr nur darauf an, welche Ansicht sich objektiv als die richtige erweisen lässt. Auch zu dem schweren Geschütz des Angriffs auf darwinistische Naturanschauung, mit welchem der gelehrte College ins Feld rückt, war in der vorliegenden einfachen systematischen Frage keine Veranlassung. Beiläufig will ich nur darauf hinweisen, dass das Bestreben der Evolutionstheorie grade die Vermeidung von „Sprüngen“ in der Entwicklung der Thierwelt und die Beseitigung von allem „Hokusokus“ in der Naturgeschichte ist; der schöne Ausdruck „darwinistische Bocksprünge“ ist daher eine *contradictio in adjecto*. In der vorliegenden Frage sehe ich keinerlei Grund darwinistische oder antidarwinistische Prinzipien zur Beweisführung zu verwenden. Es handelt sich vielmehr einfach darum, 1) ob die von Gredler ohne Kenntniss des Deckels zu *Paludomus* gestellte Art, *P. rusostoma* Gredl., welche mit *Rivularia globosa* Heude identisch ist, zu *Rivularia* gehört, 2) ob *Rivularia* als Gattung oder Unter-gattung der Paludiniden oder Melaniiden zu betrachten ist, 3) ob hierfür die Deckel ausschlaggebend sind.

Wenn mein Herr Kritikus die Ansicht, dass der Deckel den wichtigsten Eintheilungsgrund für die Gruppen und Gattungen der Deckelschnecken bildet, spöttelnd als eine persönliche Marotte meinerseits hinstellen möchte, so ist das keine Widerlegung derselben; die Bemerkung beweist nur, dass er sich noch etwas mehr um die Literatur der Operculaten kümmern muss, ehe er die Diskussion sachlich fördern kann. Jene Ansicht ist keine Erfindung oder Entdeckung von mir, sondern schon recht alt, Pfeiffers ganze Eintheilung der Pneumonopomen beruht in erster Linie auf dem Deckel und seitdem haben viele Andere, wie Benson, Blanford, v. Martens, in diesem Sinne weiter gearbeitet. Ich darf

mir höchstens als Verdienst anrechnen, durch jahrzehntelanges Spezialstudium der asiatischen Operculaten die Wichtigkeit des Deckels für die Systematik weiter nachgewiesen und die Richtigkeit jener Ansicht noch sicherer festgestellt zu haben. Das Beispiel, welches Gredler gegen mich anführt, nämlich, dass ich *Cyclotus (Platyrraphe)* *anthopoma* m. trotz des wunderbaren Deckels, auf dem nach Gredler ein „förmliches Wespennest“ aufgebaut ist, nicht einem „weiss der Himmel welchem“ andern Genus einverleibt, sondern bei *Cyclotus* belassen habe, also von meiner eigenen Theorie abgewichen sei, ist recht unglücklich gewählt. Gredler übersieht, dass der Deckel der Platyrraphe-Arten im Allgemeinen die Tendenz zu solchen abnormen Bildungen zeigt, wodurch sie sich *Cyathopoma* ebenso nähern wie durch die Schalenskulptur. Sie besitzen einen völlig normalen *Cyclotus*-Deckel, aber die Querstreifung der äusseren Kalklamelle verlängert sich oft zu membranartigen oder selbst kalkigen Plättchen, die sich in verschiedener Weise zusammenlegen und dann solche Röschen oder Knospen bilden. Nach Entfernung dieser leicht — oft schon während des Lebens des Thieres — abblätternden accidentellen Bildungen bleibt ein völlig typischer *Cyclotus*-Deckel. Nicht trotz, sondern eben wegen dieses Deckels habe ich die erwähnte Art als *Cyclotus* auffassen müssen und dieses Beispiel hätte Gredler gerade als Belehrung dafür dienen sollen, dass ich nicht auf nebенächliche Differenzirungen der Deckel generische Eintheilung begründe.

Jede auf ein einzelnes Kennzeichen gegründete Eintheilung läuft Gefahr zu einseitiger, künstlicher, daher unwissenschaftlicher Systematik zu führen, wir dürfen desshalb auch niemals *a priori* einem solchen durchschlagende Wichtigkeit beilegen, sondern müssen nach sorgfältiger Abwägung aller Merkmale bei sämtlichen Arten festzustellen suchen, welche derselben als wichtigste anzusehen sind.

Nach meiner Erfahrung bei den Landdeckelschnecken sind nun aber habituelle Differenzen, die Mundsaumbildung u. s. w. zur Abgrenzung von generischen Abtheilungen sehr wenig geeignet. Die allgemeine Gestalt wechselt bei sonst zweifellos nahe verwandten Typen von flachen zu kugligen und gethürmten Formen, womit dann die Nabelweite im Verhältniss steht. Bei einer Reihe von philippinischen und indischen *Cyclophorus*-Arten zeigt der Spindelrand des Mundsaums Neigung zur Verbreitung und entwickelt sich in extremen Fällen zu einer freien Platte (*C. appendiculatus* Pfr.), aber gerade bei dem mit der letzteren Art nahe verwandten, vielleicht nicht einmal spezifisch verschiedenen *C. woodianus* ist kaum eine Andeutung einer solchen Bildung zu bemerken. Die wunderbare Vervielfältigung der Mündung bei *Cyclophorus nicobaricus* und *leai*, *Leucoptychia tissotiana*, *Acroptychia metableta*, bei welchen eine Reihe von Mundsäumen wie Querrippen hintereinander stehen, könnte dazu verführen, eine Gattung zu begründen, welche von Madagascar auf die Nicobaren und von da nach Neu-Guinea überspränge, und doch sind die Arten von den Nicobaren — und zwar nicht bloss nach den Deckeln — unzweifelhafte *Cyclophorus*, *Acroptychia* gehört zu den Cyclostomatiden und *Leucoptychia* ist schwerlich mehr als eine schwache Section von *Leptopoma*. Die Betonung jener Mündungsbildung als generischen Charakters würde daher dieses Zusammenwerken gänzlich verschiedener Typen und das Zerreissen von natürlichen Verwandtschaften verursachen.

Eine Reihe von orientalischen Cyclophoriden weist an der Einmündung des oberen Mundsaumes eine leichte Ausbuchtung auf, welche sich oft zu einer flügelförmigen Verlängerung ausbildet. In weiterer Entwicklung schliesst sich dieses Ohrchen oder Flügelchen rinnenförmig zusammen und schliesslich bildet sich ein geschlossenes Röhrchen; in

extremen Fällen wird die Schale nach Schluss des Röhrchens noch weiter gebaut und an der Mündung bildet sich ein weiteres Ohrchen. Die verschiedenen Grade dieser Bildung finden sich nun bei nächstverwandten Arten, ja bei derselben Art in verschiedenen Altersstufen. So wurde *Opisthoporus hainanensis* H. Ad. als *Pterocyclus* beschrieben, weil die Exemplare, welche dem Autor vorlagen, trotz des bereits zurückgeschlagenen Mundsaums noch nicht erwachsen waren und daher nur ein Ohrchen zeigten; erst beim Weiterwachsen bildet sich die Nahtröhre. Von *Ptychopoma lienense* Gredl. besitzt Schmacker ein überbildetes Exemplar, welches statt des typischen rinnenförmig zusammengedrückten „Flügels“ ein geschlossenes Röhrchen aufweist. Eine Eintheilung auf Grund dieses Merkmals führt daher zur Auseinanderreissung von sichtlich — und wieder nicht bloss nach dem Deckel — zusammengehörigen Arten. Denn fassen wir alle mit Flügel am Mundsaum versehenen Arten als eine Gattung zusammen, so fallen *Myxostoma* Trosch., *Crossopoma* v. Mart., *Ptychopoma* v. Mölldff., *Eucyclotus* v. Mölldff., *Pterocyclus* Bens. in ihren Typen in dieselbe und es werden Arten generisch getrennt, über deren spezifische Verschiedenheit man noch zweifelhaft sein kann. So werden die chinesisch-hinterindischen Arten, die Fischer neuerdings als *Procyclotus* zusammenfasst, von denen einzelne schon eine schwache Verlängerung des oberen Mundsaums zeigen, durch den ganz schwach geührten *Cyclotus caroli* mit *Eucyclotus* (*variegatus* etc.) verknüpft und gehören sichtlich mit letztern in eine Gattung; nach dem obigen Prinzip würden sie generisch geschieden sein. Die chinesischen *Ptychopoma*-Arten bilden eine geschlossene Reihe, in welcher die ungeführten wie *Pt. chinense* m., *cycloteum* Gredl. durch Übergänge wie *Pt. expoliatum* Heude mit den entschieden geführten wie *Pt. linanum*, *hengsanense*, *lienense* verbunden

sind. Die letzteren zu *Pterocyclus* zu stellen, zerreißt die natürliche Verwandtschaft. Eine generische Scheidung auf Grund der Mundsaumbildung erscheint mir deshalb unmöglich; nur zu Sektionen innerhalb derselben Gattung ist dieselbe verwendbar.

Legt man ferner auf die Bildung eines Nahtröhrchen, welche wie erwähnt nur die Weiterentwicklung des Flügels ist, systematischen Werth, so fallen *Spiraculum*, *Opisthoporus* und *Rhiostoma* zusammen, während doch nach dem ganzen Habitus kein Zweifel darüber bestehen kann, dass *Opisthoporus* mit *Eucyclotus*, *Spiraculum* mit *Pterocyclus* näher verwandt sind als beide unter sich. Von *Rhiostoma* kenne ich eine Art von der Insel Samui (Golf von Siam), *Rh. asiphon* m., welche nur ein Ohr, keine Röhre besitzt, und doch würde Niemand daran denken, sie von den *Rhiostoma*-Arten Hinterindiens generisch zu trennen — auch ohne den charakteristischen Deckel!

Bei Sichtung nach dem Deckel kommen auch habituell verwandte Formen stets zusammen, und es ergiebt sich mit Sicherheit, dass der Deckel den obersten Eintheilungsgrund zu bilden hat. Allerdings ist hierzu eine genauere Scheidung der Deckelformen nötig als sie bisher gemacht worden ist. Ich unterscheide bei den asiatischen Cyclophoriden (mit Umgehung von *Lagochilus*, *Leptopoma* und einigen andern Gattungen, welche uns hier nicht näher angehen) folgende Deckeltypen:

1. Dünn, hornig, aussen konkav, innen konvex mit einer centralen Papille :
 - a) Naht der Windungen nicht oder schwach hervortretend: *Cyclophorus* s. str.,
 - b) Naht stärker, lamellenartig hervortretend: *Scabrina*, *Myxostoma*,
 - c) wie b), Lamellen gestreift, am Rande gefranzt: *Crossopoma*.

d) Naht in eine hohe quergefältelte Lamelle erhoben:
Ptychopoma.

2. Etwas dicker, oft knorplig oder fast kalkig, aussen stark konvex, innen tief ausgehöhlt, Naht in eine kräftige Lamelle verlängert: Pterocyclus, Spiraculum.

Zu diesem Deckeltypus gehört auch der hutförmige Deckel von Coelopoma (*Spirostoma* Heude), bei dem die Nahtlamelle nur etwas schwächer hervortritt.

3. Dick, fast kalkig, innen tief cylindrisch ausgehöhlt, aussen stark konvex, oben fast plan, Lamelle wie 2: Rhiostoma.
4. Innere hornige, äussere kalkige Lamelle, durch eine tiefe Randfurche getrennt, die Kalkplatte quergestreift oder gerippt, oft mit membranartigen Verlängerungen versehen: Cyclotus, Opisthoporus.

Wenn man die Gruppen hiernach ordnet, so gewinnen auch habituelle und Mundsaumcharaktere an Werth. Es ergiebt sich z. B., dass die Flügelbildung der echten Pterocyclus-Arten eine andre ist als die der fälschlich zu Pterocyclus gestellten geührten Formen. Einmal ist der Flügel stets stärker und länger rinnenförmig zusammengedrückt und dann zeigt auch der innere Mundsaum eine tiefe Buchung. Gredler nennt den Deckel seines „Pterocyclus“ hengsanensis kalkig, innen konkav, die Exemplare, die ich von P. K. Fuchs aus Heng-shan-hsien erhielt und welche mit Gredler's Abbildung völlig übereinstimmen, haben einen typischen Ptychopoma-Deckel, hornig, aussen (nach Entfernung der Nahtlamellen) konkav, innen konvex, doch so, dass zwischen dem gewölbten Raud und der konvexen Mitte mit deutlicher Papille eine leicht vertiefte Furche verläuft, eine Bildung, welche auch bei andern Ptychopoma-, Myxostoma- und Cyclophorus-Arten vorkommt und mit der gleichmässigen tiefen Aushöhlung des aussen gewölbten

Pterocyclus-Deckels nichts zu thun hat. Auch hier beschränkt sich die Oehrelung auf den äusseren Mundsaum.

Die Gruppierung nach dem Deckel einerseits, dem Mundsaum anderseits, ergiebt folgendes Schema:

Mund- saum	D e c k e l						
	Typ. I. a.	I. b.	I. c.	I. d.	II.	III.	IV.
einfach	Cyclophorus	Seabrina	—	Ptychopoma	Coelopoma	—	Platyrhaphe Procyclotus Pseudocyclophorus
geflügelt	—	Myxostoma	Grossopoma	Ptychopoma	Pterocyclus	Rhrostoma (asiphon)	Eucyclotus
Näht- röhre vor- handen	—	—	—	Ptychopoma	Spiraculum	Rhrostoma	Opisthoporus

Hieraus geht für den unbefangenen Beurtheiler klar hervor, dass der Deckel allerdings das „A und O“ der Gruppeneintheilung ist. Wählt man die senkrechten Reihen zur Gattungsbegrenzung, so kommen alle natürlichen Verwandtschaftsbeziehungen zur Geltung; wollte man die horizontalen Reihen zusammenfassen, so ergeben sich sehr unharmonische, künstlich zusammengewürfelte Gesellschaften. Eine weitere Frage, die aber für das vorliegende Thema nicht von Belang ist, wäre die, ob die verschiedenen sich ergebenden Abtheilungen Gattungs- oder Untergattungsrang verdienen. Bei den Cyclophorus nahe stehenden Gruppen würde ich jetzt mehr für Untergattung sein, da die Unterschiede der Nähtlamellen mehr gradueller Natur sind, während der Gesammttypus des Deckels derselbe bleibt. Spiraculum dürfte auch besser nur als Subgenus von Pterocyclus getrennt werden, ebenso Opisthoporus von Cyclotus. Alles dies zu entscheiden, wird uns die Anatomie

helfen müssen, doch fühle ich mich sicher, dass sie im Ganzen und Grossen die auf die Deckel basirte Eintheilung bestätigen wird.

Was nun die Frage anbelangt, ob dem Deckel auch bei den Süßwasserschnecken dieselbe systematische Bedeutung beizulegen ist, so muss ich von vornherein erklären, dass ich auf diesem Gebiet noch keine grosse Erfahrung besitze und mir ein sicheres Urtheil noch nicht erlaube. Soviel ich aber übersehen kann, hat auch hier die anatomische Untersuchung stets bestätigt, dass mit erheblichen Deckelunterschieden wichtige organische Verschiedenheiten Hand in Hand gehen. Vor allem ist mir kein Fall bekannt, dass Arten mit spiralem Deckel zu solchen mit konzentrischem Deckel nähere Beziehungen haben. Zu der ersten oben aufgeworfenen Frage, ob *Rivularia ovum* Heude und *Paludomus rusiostoma* Gredl. in dieselbe Gattung gehören, bedarf es meiner Ansicht nach freilich des Deckels nicht, wie es dazu auch keinerlei Phantasie, darwinistisch oder nicht, sondern nur einer objektiven Prüfung bedarf. Der Gesamthabitus, die Schalensubstanz, Färbung, Zeichnung mit drei braunen Binden, die sehr charakteristische Spindelbildung, der eigenthümliche Winkel oben an der Mündung mit deutlicher Rinnenbildung sind beiden Arten gemeinsam. Nur hat *rusiostoma* ein kürzeres Gewinde, etwas breitere Mündung und die ausgussartige Verlängerung des unteren Mundsaumes ist nur angedeutet, ohne ganz zu fehlen. Nun ist die Gredler'sche Art nach ihrem Autor ein „wahrer testaceologischer Typus von *Paludomus*“ und obwohl er selbst kaum zweifelt, dass der Deckel seines „*Paludomus*“ *rusiostoma* dem der Paludinen gleich ist, hält er daran fest, dass die Art, welche „testaceologisch“ mit Paludinen nahe verwandt ist und einen Paludinendeckel besitzt, doch ein *Paludomus* sei. Die Frage, wo dann die Grenzen für Gattungen beginnen und

aufhören, würde solchen systematischen Prinzipien gegenüber eher berechtigt sein, als Heude's und meiner Classification von *Rivularia rusiostoma* gegenüber. Am wenigsten kommt es Gredler, der sich nicht mehr erinnern kann, warum er *Rivularia auriculata* zu *Mecongia* gestellt hat, sich also einen systematischen „Bocksprung“ erlaubt hat, zu, meine wohl begründete Classification mit gröblichen Verstößen gegen die Elemente der Wissenschaft wie Stellung eines Käfers zu den Crustaceen zu vergleichen. Solche durch nichts gerechtfertigte Uebertreibungen fallen auf den Urheber zurück. Was ist nun aber „der testaceologische Typus von *Paludomus*“? Ich besitze eine ziemlich reichhaltige Sammlung dieser Gattung, finde aber keine Art, die eine besondere habituelle Aehnlichkeit mit *Rivularia rusiostoma* hätte. Auf der anderen Seite würde es aber auch schwer sein, ein bestimmtes „testaceologisches“ Merkmal nachhaft zu machen, wodurch ein *Paludomus* stets als solcher erkannt werden kann. In der Gattungsdiagnose (z. B. in Fischer's Manuel) heisst die Schale paludiniform, viele Arten sind zuerst als *Paludina* beschrieben worden und noch Troschel stellte die Gattung zu den Paludiniden. Auch umgekehrt sind echte Paludinen für *Paludomus* gehalten worden, z. B. *P. kmeriana* Morl. für *Paludomus conicus* Gray (J. de Conch. 1890, 119). Es wäre daher kein grosser Verstoss, wenn Gredler eine *Paludina* für einen *Paludomus* gehalten hat, und ich würde mich wohl hüten, ihm deshalb den Vorwurf gänzlicher Unwissenschaftlichkeit zu machen, wie er es im entgegengesetzten Falle, wenn auch, wie ich annehmen will, in scherhaft sein sollender Uebertreibung, thut. Ich habe auch keineswegs mit Bestimmtheit behauptet, dass die Gredler'sche Art kein *Paludomus* ist, wenn ich es auch stark bezweifle, sondern nur, dass sie mit *Rivularia ovum* Heude, also auch mit *Paludina auriculata* v. Mart. in eine und dieselbe Gattung gehört. Ist

die Bildung der Spindel, wie Gredler behauptet, typisch für *Paludomus*, so würde sich daraus ergeben, dass alle *Rivularia*-Arten zu *Paludomus* gehören. Jedenfalls würden wir vor einem grösseren Räthsel stehen, falls sich durch die anatomische Untersuchung und die Deckel ergeben sollte, dass die rein conchyliologisch nur spezifisch, nicht generisch zu trennenden Formen doch verschiedenen Gattungen, ja Familien angehören. Freilich gibt uns die Natur solche Räthsel öfters auf und eine rein conchyliologische Systematik ist eben unmöglich geworden. Einstweilen halte ich daran fest, dass „*Paludomus*“ *rusiostoma* wegen seiner nahen conchyliologischen Verwandtschaft eine *Rivularia* ist. Der Deckel der *Rivularia*-Arten, soweit er bekannt ist, unterscheidet sich von einem typischen *Paludina*-deckel nur durch die etwas mehr längliche Form und den mehr lateralen Nucleus, wodurch er sich *Campeloma* (= *Melanthe*) nähert. Nach v. Martens (Nov. Conch. IV, p. 155) hat Schacko die Zungenzähne von *R. auriculata* im wesentlichen mit denen von *Campeloma* übereinstimmend gefunden. Hiernach ist *Rivularia* als Untergattung von *Paludina* zu betrachten.

Die Gattung *Paludomus* fehlt übrigens in China nicht; wenigstens halte ich die übrigen von Gredler beschriebenen Arten, *P. futaii*, *hilberi*, *minutiusculus* in der That für echte *Paludomus*, da ich von einer Art aus Hunan nahe der Grenze von Gui-dshou, die mit *P. futaii* nahe verwandt ist, den Deckel gesehen habe. Derselbe ist bei jungen Stücken deutlich spiral, also melaniid; an den spiralen Nucleus setzen sich am Aussenrande pseudokonzentrische Streifen an. Auch Heude's „*Melania*“ *aristarcharum*, „*Melania*“ *rotundata* und vielleicht auch *M. dolium* halte ich für *Paludomus*-Arten.

Zur Molluskenfauna des nordwestlichen Persiens.

Da ich schon längere Zeit zu einem Missionär in Persien, der seinen Wohnsitz theils in Urmia, theils auf der nordwestlich davon gelegenen Hochebene Salmas hat, in Beziehung stehe, so bestimmte ich denselben der Molluskenfauna etwas seine Aufmerksamkeit zu schenken, obgleich er für die Naturwissenschaft nicht gerade reges Interesse hat. Er willfahrte meiner Bitte und machte sich unter grossen Schwierigkeiten, die ich hier nicht näher erörtern will, auf die Suche, die von einem Erfolge begleitet war. Bekanntlich ist Persien im allgemeinen wegen seines trockenen Klimas der Molluskenfauna nicht günstig. Dies gilt auch von der in Rede stehende Gegend. Salmas hat in der Regel strenge Winter mit viel Schnee und Eis und fällt die Temperatur nicht selten auf 20 — 25° C. Er beginnt mit heftigen Stürmen Anfangs November und dauert bis Mitte März und April. Regen und Stürme leiten unvermittelt den heißen Sommer ein, der in der Regel Monate lang ohne Regen und Thau ist, so dass die Vegetation bei zeitweiliger Wärme von 40 — 45° C. fast gänzlich erstirbt, wo nicht durch künstliche Bewässerung nachgeholfen werden kann. Die ziemlich zahlreichen Ortschaften haben gut unterhaltene Kanäle, die durch die Bergbäche gespeist werden und durch die ausgiebiger Getreide-, Obst- und Weinbau ermöglicht wird.

Bei solch strenger Kälte und intensiver Hitze ist die Entwicklung der Mollusken nur auf die kurze Uebergangszeit vom Winter zum Sommer und umgekehrt beschränkt. Was nun mein Sammler seit einigen Jahren aufgefunden, beschränkt sich auf folgende Arten:

Fruticicola arpatshaiana MSS., wurde meistens in todten Exemplaren in Anschwemmungen der Bergbäche gefunden.

Xerophila derbentina Kryn., findet sich in grosser Anzahl in verschiedenen Variationen.

Xeroph. crenimargo Kryn. var. *obtusior* MSS., wurde nur an einer Stelle in erheblicher Anzahl gefunden.

Lerantina urmiensis Naeg., die Dr. Kobelt als neue Art im Nachrichtenblatt 1889 pag. 138 des Nähern beschrieben hat.

Buliminus detritus Müll. Häufig, in der Grösse von 25 mm und einfärbig. Hiervon findet sich eine constante Varietät, die sich vom Typus durch braune Querstreifen, bauchigere Form und besonders durch ihre Kleinheit sehr unterscheidet und daher wohl eine eigne Benennung verdient:

Var. parrulus Naeg. a forma typica differt testa tumida, multo minore, striis obliquis coloris fusi ornata. Alt. 14 mm. lat. 8 mm.

Bul. tridens Müll., häufig.

Var. Kubanensis MSS., selten.

Bul. hoplites W., ziemlich häufig. Dr. Westerlund beschreibt diese Art als nov. spec. in seinem I. Supplementheft pag. 138. Dr. O. Boettger aber, dem ausreichendes Vergleichungsmaterial zu Gebote steht, ist der Ueberzeugung, dass vorstehende Art mit *B. Sieversi* MSS. identisch ist, wäre somit als neue Art zu streichen.

Bul. (Subzebrinus) purus W. als nov. Spec. von Dr. Westerlund beschrieben im I. Supplementheft pag. 139.

Dies ist nun alles, was bis jetzt aus jener Gegend bekannt wurde. Zwei bis drei Nova ausgenommen, stimmt unsere angezogene Fauna mit der transkaukasischen überein, — In den Bächen und Tümpeln wurden noch keine Schnecken entdeckt, wohl desshalb weil die Bäche in Folge ihres raschen Laufes viel Geschiebe mit sich führen, und die Tümpel zeitweilig trocken liegen. Auch in der Ebene selbst wurde noch nichts gefunden. Die genannten Arten stammen alle von den benachbarten Bergen. Ob diesen Sommer von dort etwas zu erwarten ist, ist sehr zweifelhaft, da auch in Nordpersien in diesem Jahre die Frühjahrsregen fast gänzlich ausgeblieben sind.

Diagnosen neuer palaearetischer Arten.

Von

Dr. W. Kobelt.

1. *Buliminus trojanus* n.

T. brevissime rimata, elongata, subfusiformis, nitida, subtranslucida, laeviuscula, sub lente subtilissime striatula, lutescenti-cornea. Spira elongata, apice conico obtusato. Anfractus 10—11 lentissime crescentes, sutura linearis discreti, superi convexiusculi, inferi fere plani, ultimus leviter attenuatus, basi compressus, pone labrum planatus. Apertura obliqua, ovata, ad dextrum producta; peristoma subincurvatum, albolabiatum, vix brevissime expansum, margine externo medio incrassato, columellari multo breviore appresso, cum externo vix coniuncto.

Alt. 14, diam. max. $3\frac{3}{4}$ mm.

Cfr. Iconographie N. F. fig. 1100.

Hab. Troas (Coll. Ponsonby).

2. *Buliminus priamus* n.

T. rimato-perforata, sinistrorsa, perelongata, fere cylindrica, ad apicem breviter conico-attenuata, apice obtusato, corneo-albida, laeviuscula, sub lente oblique et arcuatim striatula, nitida. Anfractus 12 lentissime crescentes, sutura linearis leviter albdomarginata discreti, convexiusculi, ultimus $\frac{1}{4}$ altitudinis parum superans, basi vix compressus, pone labrum leviter planatus. Apertura obliqua, anguste et subirregulariter ovata, obsolete et profunde tridentata: dente parietali lamelliformi compresso intrante, altero ad medium marginis externi minimo, tertio ad basin columellae truncaturam simulante. Peristoma rectum, acutum, labio albo

incrassatum, marginibus distantibus, vix callo tenuissimo junctis, columellari multo breviore dilatato, arcuatim ascende, quasi truncato.

Alt. 13, 5, diam. $4\frac{3}{4}$ mm.

Cfr. Iconographie N. F. fig. 1101.

Hab. cum praecedente (Coll. Posonby).

3. *Bulininus goldfussi* n.

T. late et profunde rimata, sinistrorsa, cylindrica, apice breviter conica, solida, subtiliter irregulariterque striatula, rufo-brunnea apice lutescente. Anfractus $8\frac{1}{2}$ lentissime crescentes, sutura albonarginata discreti, supremi 2 convexiusculi, sequentes fere plani, ultimus basi compressus, pone labrum planatus et lutescens, altitudinis $\frac{1}{3}$ vix superans. Apertura obliqua, semiovalis; peristoma acutum, intus fortiter luteolabiatum, edentulum, marginibus vix conniventibus, callo tenui lutescente junctis, externo strictiusculo, columellari multo breviore leviter dilatato et super rimam umbilicalem reflexo.

Alt. 10, diam 4 mm.

Cfr. Iconographie N. F. fig. 1102.

Hab. in montibus Alai Asiae centralis.

4. *Unio lapidosa Villa* in sched.

Concha subtriangulari-ovata, perinaequilatera, magna, solida, ponderosa, parum inflata, ruditer sulcato-striata, striis postice sublamellosis, cicatricibus irregularibus radiantibus munita, sub epidermide tenui viridi-fusca alba, in locis erosionis eleganter radiatim striata. Margo anticus compresso-rotundatus, superior ante umbones nullus, postice oblique descendens, posticus biangulatus, ventralis rotundatus. Umbones parum pone $\frac{1}{4}$ longitudinis siti, depresso, leviter antrorsi, erosi, apicibus approximatis; lunula angusta; ligamentum

percrassum, magnum, sinulus brevis; area carinulis duabus ex umbone decurrentibus in utroque latere insignis. Cardo percrassus; valvula dextra dentibus cardinalibus tribus, foveolis profundis discretis et lamella crassa unica armata, sinistra dentibus duobus elongatis compressis fovea profundissima discretis et foveolis duabus minoribus extus marginatis, lamellisque duabus fortibus armata, lamellis interstitio magna laevi pone dentes exciso a dentibus separatis. Impressiones musculares anticeae triplices, profundae, posticeae distinctae, magnae, infra lamellam intrantes; linea pallealis distincta, irregulariter crenata; margarita antice rosaceo-albida, incrassata, postice irisans. —

Long. 125, alt. 88, crass. 37 mm.

Hab. in fluvio Euphrates (Mus. Berolin.)

5. *Unio bithynicus* n.

Coneha inaequilatera, perelongata, angulato-ovata, postice rostrata, subcompressa, striatula, striis antice distinctioribus, vix nitens, parum crassa, unicolor brunneo-virescens. Margo anterior brevissime rotundatus, cum dorsali arcuatim ascendentem angulum formans, ventralis strictus, versus posticum primum descendenter, dein rotundato-truncatum vix ascendens. Umbones ante $\frac{1}{3}$ longitudinis siti, lati, depresso, vix prominuli, erosi; areola indistincta; ligamentum elongatum, angustum, sinulo longo; area compressa, cristis duabus vix conspicuis in utroque latere. Cardo ante umbones situs; dens valvulae dextrae elongatus, crassus, crenatus, a margine cardinali lamelliforme elevato vix divergens; dens posticus valvulae sinistrale conicus acutus, compressus, anticus subobsoletus, cristam elongatam humilem formans, usque ad marginem anticum productus; fossula lateralis, longa; lamellae elongatae, humiles, leviter

areuatae. Impressiones musculares antiae distincte trifidae, profundae, posticae distinetae; linea pallealis usque ad rostrum callo humerali marginata. Margarita coerulescens, hic illie salmonacea, postice irisans. —

Long. 57, alt. 27, crass. 17 mm.

Cfr. Iconographie N. F. Fig. 1128.

Hab. Asia minor.

Die marinen Mollusken der Philippinen (II).

nach den Sammlungen des Herrn José Florencio Quadras in Manila.

Von

Prof. Dr. O. Boettger in Frankfurt (Main).

(Fortsetzung zu Nachr.-Blatt d. d. Mal. Ges. 1893 pag. 97–115).

III. Die Eulimiden.

Betreffs der Systematik dieser Familie verweise ich auf Tryon, Manual of Conchology Bd. 8. 1886 pag. 258 ff., wo Literatur und alle Citate zu finden sind. Die Tryon'schen Untergattungen *Subularia* Monterosato und *Mucronalia* A. Adams habe ich als Gattungen behandelt, da es mir bis jetzt niemals schwer geworden ist, Vertreter dieser Formenkreise als solche zu erkennen, und da ich auch vermuthe, dass wenigstens *Mucronalia* infolge von Trennung der Geschlechter auch anatomisch von *Eulima* abweichen wird.

Die bis jetzt von den Philippinen bekannten Eulimiden lassen sich in 5 Gattungen unterbringen:

Gen. I. *Eulima* Risso.

Für die 12 mir vorliegenden Arten kann folgendes Schema gelten:

I. Rechte Schalenseite mit einer mehr oder weniger zusammenhängenden Reihe von eingedrückten Varices.

1. Querschnitt der Schale ein mehr oder weniger ausgesprochenes Oval.

- a. Länge 8—15 mm.
 - aa. Breit thurmförmig, Spitze nach rechts gewandt, Länge 15 mm. 2. *Eu. inflata* (Blv.)
 - bb. Kürzer, Spitze nach links gekrümmmt, mässig fest-schalig, Mündung im Verhältniss zur Breite der letzten Windung auffallend klein.
Länge 8—10 mm. 9. *Eu. saccata* Bttgr.
- b. Länge $2\frac{1}{2}$ —6 mm.
 - aa. Dünnschalig.
 - a. Schlank, nadelförmig, Wirbel nach rückwärts gebogen, letzter Umgang nach unten verschmälert, $\frac{1}{4}$ der Gehäusenhöhe 12. *Eu. recurva* Bttgr.
 - b. Regelmässig thurm-förmig, schwach verbogen, letzter Umgang gedrungen, schwach kantig, $\frac{2}{7}$ der Gehäusenhöhe 13. *Eu. imitatrix* Bttgr.
 - bb. Dickschalig.
 - a. Kurz, gedrungen, Spitze stark nach rechts gekrümmmt, letzter Umgang $\frac{1}{3}$ der Gehäusenhöhe, Mündung stark nach rechts ausladend 14. *Eu. spina* Bttgr.

b. Wie die vorige, aber die Spitze leicht hakig nach links gebogen und der Mundrand ganz auffallend verdickt, halb so dick wie die lichte Weite der Mündung 15. *Eu. pachychila* Bltgr.

2. Querschnitt der Schale ganz kreisrund.

- a. Länge 23—28 mm 3. *Eu. lactea* A. Ad.
- b. Länge 9—12 mm, Mundsaum auffallend dick 5. *Eu. quadrasi* Bltgr.
- c. Länge 6—9 mm. Festschalig, kurz pyramidenförmig 10. *Eu. pyramidalis* A. Ad.

II. Varices vereinzelt, über die ganze Schale unregelmässig verstreut.

- a. Nadelförmig, letzter Umgang $\frac{1}{4}$ der Gehäusehöhe, Länge 6—10 mm 6. *Eu. exilis* Pse.
- b. Thurm förmig, beide Gewindestufen leicht convex, letzter Umgang $\frac{1}{3}$ der Gehäusehöhe, Länge 11—12 mm 11. *Eu. cuspidata* A. Ad.
- c. Wie die vorige, aber kurz thurm förmig und die Umgänge ganz flach, Länge 4—5½ mm 16. *Eu. oblonga* Bltgr.

1. *Eulima grandis* A. Ad.

Insel Burias (A. Adams). — Mir unbekannt.

. 2. *Eulima inflexa* Blv.

Blainville, Man. de Malac. 1825 pag. 439, Taf. 35.

Fig. 5 (*Phasianella*).

Char. T. sat late turrita, dextrorsum arcuata, distinete a dorso compressa, solida, albida, nitida, polita; spira latere sinistro convexa, dextro concaviuscula, varicibus impressis, interdum opace albis, continuis, in anfr. antepenultimo et ultimo saepe discontinuis; apex acutus, submucronatus, flavescens. Anfr. 13—15 plani, sutura levi appressa disjuncti, lente accrescentes, ultimus peripheria vix angulatus, basi leviter tumidulus, $\frac{2}{7}$ altitudinis testae superans. Apert. modica verticalis, paullum angustata, subpiriformis, basi fere subangulata, intus levissime sublabiata; perist. rectum, acutum, marginibus callo junctis, dextro medio curvatum protracto, columellari strictiusculo, recedente, appreso.

Alt. 15—16, diam. min. $4\frac{1}{2}$, maj. $5\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. $4\frac{1}{2}$, lat. apert. $2\frac{1}{2}$ mm.

Ins. Luban bei Mindoro (coll. Quadras No. 14), Balabac (No. 605) und Cagbabatan bei Placer, Mindanao (No. 2169), überall nur einzeln. — Mauritius (coll. Boettger), Réunion (Deshayes).

Sehr ähnlich einer jungen *Eu. lactea* A. Ad., aber auch die Jugendwindungen ganz flach, die Gehäusespitze mehr nach rechts geneigt, die linke Seite des letzten Umganges etwas mehr sackartig verbreitert und namentlich durch die deutliche Compression der Schale verschieden, die im Durchschnitt ein Queroval bildet, das wesentlich breiter ist als tief.

3. *Eulima lactea* A. Ad.

Tumun, Insel Guajan (coll. Quadras No. 2844), 3 Stücke.
— Réunion (Deshayes).

Spitze gerade oder schwach nach rechts gedreht, 27—28 mm Schalenlänge, letzter Umgang kantig, Varixlinie vertieft, bis zum viertletzten Umgange zusammenhängend, dann etwas verschoben, wenigstens 16 Umgänge.

4. *Eulima acuta* A. Ad.

Sual, Prov. Cangisanan auf Luzon (A. Adams). — Réunion (Deshayes). — Mir unbekannt.

5. *Eulima quadrasi* n. sp.

Char. T. elongato-turrita, dextrorsum leviter arcuata, solidissima, alba, nitida, polita; spira latere sinistro convexa, dextro substricta, varicibus late et profunde impressis, continuis; apex breviter decollatus, opace albus. Anfr. superstites $10\frac{1}{2}$ planato-convexiusculi, sutura distincta sat profunda disjuncti, lente accrescentes, ultimus peripheria rotundato-subangulatus, basi convexiusculus, $\frac{2}{7}$ altitudinis testae aequans. Apert. modica leviter angustata, semiovalis, basi rotundata; perist. incrassatum, hebes, marginibus callo junctis, dextro medio leviter curvato, basali subprecedente, columellari concavo, appresso.

Alt. 12, diam. max. 4 mm; alt. apert. $3\frac{1}{2}$, lat. apert. $2\frac{1}{2}$ mm.

Insel Lugbon bei Romblon (coll. Quadras No. 1755) und Magallanes auf Sibuyan (No. 16), an beiden Orten von Herrn J. Fl. Quadras nur in Einzelstücken gesammelt. — Eine kleinere Form von Calatagan, Prov. Batangas (No. 15) misst bei $11\frac{1}{2}$ Umgängen nur alt. 9, diam. 3 mm und ihre unteren Varices stehen etwas unregelmässig.

Erinnert am meisten an die chinesische *Eu. solidula* Ad. Rve., ist aber grösser, viel solider, weniger gebogen, und die Umgänge sind entschieden flacher. Im Uebrigen ist die Art sehr bemerkenswerth durch die dicke Lippe, die nur am äussersten Rande etwas eingezogen ist und dadurch die Mundöffnung etwas verengert.

6. *Eulima exilis* Pease.

Pease, Proc. Zool. Soc. London 1862 pag. 242.

Omata-Merizo auf Guajan (coll. Quadras No. 10), Insel Lugbon bei Romblon (No. 1754), Balabac (No. 1463) und Bacon, Prov. Albay auf Luzon (No. 607), überall nur in Einzelstücken. — Fidji-Inseln (Pease).

Gewinde schlank, nadelförmig, doch oben nur kurz zugespitzt, grade, wenige unregelmässige Varices, Windungen flach, die letzte oblong, von $\frac{1}{4}$ Schalenhöhe. Mündung schmal. Stücke von Guajan und Lugbon messen alt. $8\frac{3}{4}$, diam. max. $2\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. $2\frac{1}{4}$, lat. apert. $1\frac{1}{8}$ mm, solehe von Balabac und Bacon nur alt. $6\frac{1}{4}$, diam. 2 mm.

Auch eine sehr mässig gehaltene Schnecke von Magallanes auf Sibuyan (coll. Quadras No. 24), die sich durch stärker gekrümmten und vorgezogenen rechten Mundrand auszeichnet, ziehe ich provisorisch zu dieser Art.

Eu. pusilla Sow. von St. Helena hat nach Original-exemplaren mit der vorliegenden Species nichts zu thun. Tryon hat irrthümlich beide Arten vereinigt.

7. *Eulima polygyra* A. Ad.

Cagayan, Prov. Misamis auf Mindanao (A. Adams). — Mir unbekannt, aber vermutlich nur die Jugendform einer der von den Philippinen bekannten grösseren Arten.

8. *Eulima modicella* A. Ad.

Insel Cebu (A. Adams). — Mir unbekannt.

9. *Eulima saccata* n. nom.

Pease, Amer. Journ. Conch. Bd. 3, 1867 pag. 294 (*inflexa*).

Insel Balauan (coll. Quadras No. 11) und Laylay bei Boac auf Marinduque (No. 36), überall einzeln. — Paumotu-, Fidji- und Sandwich-Inseln (Pease), Mauritius (coll. Bittgr.).

Mässig festschalig, Spitze leicht nach links gedreht, Nähte sehr deutlich und breit gerandet, 15 Umgänge, letzter links unten sackartig angeschwollen, Querschnitt deutlich queroval. Mündung im Verhältniss zum letzten Umgange

sehr klein, nach rechts vorgezogen. Die vorliegenden Schnecken stimmen genau überein mit der Abbildung von *Eu. inflexa* Pease 1867, non *Phasianella inflexa* Blv. 1825 und mit Stücken dieser Art von Mauritius. Wegen *Eu. inflexa* (Blv.), die ich ebenfalls von Mauritius besitze und als gute Art neben *Eu. arcuata* Sow. anerkenne, und wegen *Eu. inflexa* Monter. 1878 musste ich den Namen der vorliegenden Art ändern.

Alt. 8—10, diam. max. $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm.

Die verwandte *Eu. tenisoni* Tryon aus Tasmanien hat nach Originalstücken meiner Sammlung stumpfere, kaum verdrehte Spitze, viel konvexere Umgänge, tiefer eingeschnürte Nähte und bleibt kleiner (alt. $6\frac{1}{4}$ mm).

10. *Eulima pyramidalis* A. Ad.

Inseln Calumangan (coll. Quadras No. 7) und Lugbon bei Romblon (No. 18 und 1753), Magallanes auf Sibuyan (No. 17) und Badajoz auf Tablas (No. 9), überall einzeln. Insel Capul (A. Adams.) — Singapore (Tryon).

Kurz pyramidenförmig, festschalig, grade; bei unverletzten Stücken 12—13 sehr leicht gewölbte Umgänge mit deutlich eingedrückten Nähten, die Schlusswindung etwas winkelig verrundet. Varixreihe tief eingedrückt, zusammenhängend. Lippe dick, in der Mitte schwach vorgezogen.

Die vorliegenden Stücke messen nur $6\frac{3}{4}$ mm Länge bei 3 mm grösstem Durchmesser. Trotz einiger Abweichungen von der Adams'schen Diagnose glaube ich darin doch die *Eu. pyramidalis* zu erkennen, da die Art häufig ist und die Abbildung vorzüglich übereinstimmt. Wahrscheinlich sind unsere sämtlichen Stücke noch nicht vollkommen erwachsen.

11. *Eulima cuspidata* A. Ad.

Cebú (coll. Quadras No. 12), 2 Stücke. Sibonga auf Cebú (A. Adams).

Beide Gewindeseiten leicht konvex, Spitze grade, etwas mukronat, 11—12 mm lang, letzter Uingang verrundet, von $\frac{1}{3}$ -Gehäusehöhe.

12. *Eulima recurva* n. sp.

Char. T. levissime deppressa, subulata, gracilis, retrorsum leviter distorta, tenera, hyalina, nitens, polita; spira acutata, latere sinistro convexiuscula, dextro concaviuscula, varicibus anguste impressis continuis ornata; apex acutissimus, raro integer. Anfr. 12—13 plani, sutura superficiali et parum impressa, sed late marginata disjuncti, ultimus rotundatus, basi angustatus, $\frac{1}{4}$ altitudinis testae aequans. Apert. parva verticalis, anguste ovata, basi rotundata; perist. simplex, acutum, marginibus callo junctis, dextro medio modice curvato, parum protracto, columellari concaviusculo, cum basi testae angulum non formante.

Alt. $4\frac{3}{4}$ — $6\frac{1}{4}$, diam. max. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{7}{8}$ mm; alt. apert. $1\frac{1}{2}$, lat. apert. 1 mm.

Manila auf Luzon (coll. Quadras No. 365 und 366), zahlreich.

Erinnert den Abbildungen nach am meisten an *Eu. retrorsa* Sow. von Tahiti, die aber um das Doppelte grösser und festschaliger ist und dickere Mundlippe zeigen soll.

13. *Eulima imitatrix* n. sp.

Char. Differt ab *Eu. saccata* Bittgr., cui proxima est, t. minore, magis elongato-turrita, strictiore. — T. leviter deppressa, regulariter turrita, levissime aut sinistrorsum aut retrorsum torta, tenera, hyalina, nitida, polita; spira acuta lateribus fere concaviusculis, varicibus leviter impressis, subcontinuis ornata; apex integer, acutus. Anfr. 11 planati, sutura sat distincta, appressa. sat late marginata disjuncti, ultimus abbreviatus, subsaccatus, peripheria angulato-rotundatus, basi

oblique praeceps, modice convexus, $\frac{2}{7}$ altitudinis testae aequans. Apert. parva verticalis, regulariter ovata, parum altior quam lata, dextrorsum sat protracta; perist. simplex, acutum, marginibus callo junctis, dextro medio curvato sed parum protracto, columellari concavo, appreso.

Alt. 4— $4\frac{1}{2}$, diam. max. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm; alt. apert. $1\frac{1}{4}$, lat. apert. $\frac{7}{8}$ mm.

Subic, Prov. Zambales auf Luzon (coll. Quadras No. 1757) und Insel Luban bei Mindoro (No. 30), in mässiger Anzahl.

Scheint auf den ersten Blick nur ein Diminutiv von *Eu. saccata* Bttgr. zu sein, ist aber bei genauerer Vergleichung deutlich etwas schlanker, weniger stark gedreht, und das Gewinde erscheint fast stets beiderseitig etwas konkav ausgehöhlten.

14. *Eulima spina* n. sp.

Char. T. fere subrimata, distincte depresso-turrito-conica, dextrorsum curvata, solidissima, alba, nitidissima, polita; spira latè sinistro convexa, dextro concaviuscula, variebus impressis continuis ornata; apex brevis submucronatus, acutus. Anfr. 12 fere plani, sutura superficiali, late appressa et marginata disjuncti, sat rapide accrescentes, multo latiores quam alti, ultimus peripheria levissime angulatus, basi oblique praeceps et convexiusculus, $\frac{1}{3}$ altitudinis testae aequans. Apert. parva subverticalis, dextrorsum prosiliens, ovata; perist. crassiusculum, hebetatum, marginibus callo junctis, dextro supra medium leviter protracto, columellari concavo appreso.

Alt. 5— $5\frac{1}{2}$, diam. max. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{5}{8}$ mm; alt. apert. 2, lat. apert. 1 mm.

Omato-Merizo auf Guajan (coll. Quadras No. 2846) und Magallanes auf Sibuyan (No. 1752), in mässiger Anzahl.

Erinnert ebenfalls an *Eu. saccata* Bttgr., ist aber nur halb so gross, festschaliger, die Spitze stark nach rechts gebogen und die Mündung relativ grösser.

15. *Eulima pachychila* n. sp.

Char. Aff. *Eu. saccatae* Bttgr. (Tryon, Man. Conch. Bd.

8, Taf. 68, Fig. 4), sed duplo minor, brevior, magis conica, perist. crassissime labiato. — T. fere subrimata, leviter sed distincte depressa, elongato-conica, apice sinistrorsum curvata, caeterum stricta, solidissima, alba, nitidissima, polita; spira regulariter conica, varicibus anguste impressis, subcontinuis ornata; apex brevis acutus, submucronatus. Anfr. 10 leviter convexusculi, sutura sat distincta, appressa, taenia diaphana (obseuriore) marginata disjuncti, sat rapide accrescentes, multo latiores quam alti, ultimus peripheria levissime angulatus, globulosus, basi convexus, $\frac{1}{3}$ altitudinis testae fere superans. Apert. minima verticalis, coaretata, ovata; perist. crassissimum, marginibns callo junctis, dextro duplum diametrum latitudinis internae aperturae aequante.

Alt. $4\frac{1}{4}$, diam. max. 2 mm; alt. apert. $1\frac{1}{4}$, lat. apert. 1 mm.

Insel Luban bei Mindoro (coll. Quadras No. 8), wenige Stücke.

Anfangs war ich geneigt, auch diese Art nur als dickschalige Varietät zu *Eu. saccata* Bttgr. zu stellen, bis ich typische Stücke von letzterer Art auch bei Luban auffand, die sich durch die länger ausgezogene und wesentlich dünnere Schale mit kürzer und mehr plötzlich abgebogener Spitze konstant unterscheiden.

16. *Eulima oblonga* n. sp.

Char. T. suboblongo-turrita, stricta, solida, albida, nitida, polita; spira parum elata, turrita, lateribus levissimè

sed distincte convexiusculis, varicibus singulis irreguläribus, obsoletis ornata; apex breviter acutatus, summo saepe leviter decollato. Anfr. 11 plani, sutura superficiali appressa et late marginata disjuncti, sat lente accrescentes, ultimus peripheria rotundatus, deorsum subattenuatus, fere $\frac{2}{5}$ altitudinis testae aequans. Apert. modica verticalis, anguste ovata, basi fere subangulata; perist. simplex, acutulum, marginibus conjunctis, supero ad suturam retracto et sinuoso, dextro protracto, signoideo, columellari concaviusculo, cum basali curvaturam haud angulatam efficiente.

Alt. $4\frac{1}{2}$ —5, diam. max. $1\frac{3}{4}$ —2 mm; alt. apert. $1\frac{3}{4}$, lat. apert. 1 mm.

Tagana-an, Distr. Surigao (coll. Quadras No. 2167), Inseln Saguisi (No. 2288) und Balagnan, Distr. Surigao (No. 2290), Placer auf Mindanao (No. 29), Magallanes auf Sibuyan (No. 1751) und Balabac (No. 811), überall nur in mässiger Anzahl.

Von der doppelt so grossen philippinischen *Eu. cuspidata* A. Ad. hauptsächlich unterschieden durch das relativ kürzere Gewinde, die tiefe Bucht des Mundsaums eben nahe der breit angedrückten und gesäumten Naht und das Fehlen eines Winkels zwischen Spindel und Basaltheil des letzten Umgangs.

Gen. II. Subularia Monteros.

1. *Subularia oxytata* (Watson).

Watson, Journ. Lim. Soc. London (Zool.) Bd. 17, 1884 pag. 117 (*Eulima*).

Malanipa in der Basilanstrasse. — Mir unbekannt.

2. *Subularia bivittata* (L. et A. Ad.)

Sulusee. — Mir unbekannt.

3. *Subularia unilineata* (Ad. Rve.)

Sulusee. — Mir unbekannt.

Gen. III. *Mucronalia* A. Ad.

Die einzige mir von den Philippinen vorliegende folgende Art dieser Gattung unterscheidet sich von *Eulima* durch kurz gedrungene, gefärbte Schale und $4\frac{1}{2}$ — 5 Umgänge, auf denen die cylindrische, feine Spitze mukronat aufsitzt.

1. *Mucronalia fulvescens* (A. Ad.)

Diese bis jetzt nur von Labuan (Borneo) bekannte Art liegt von sehr verschiedenen Punkten überaus zahlreich vor; sie ist durch auffallenden Wechsel der Grösse ausgezeichnet, der vielleicht für die getrennten Geschlechter charakteristisch ist. Die mukronate Gehäusespitze besteht aus 3, das übrige Gehäuse aus $4\frac{1}{2}$ — 5 Umgängen.

Ensenada de Cayognó bei Ternate, Prov. Cavite (coll. Quadras No. 1115), Moron, Prov. Bataan (No. 812) und Insel Luban (No. 21, 333 und 4022), überall zahlreich in zwei Grössen, wahrscheinlich ♂ und ♀, von alt. 3, diam. $1\frac{1}{2}$ mm und alt. 5, diam. $2\frac{1}{2}$ mm, Guihulngna auf Negros (No. 2850 und 2851), Sitio Tagbag, Sur, auf Leyte (No. 26) und S. Juan auf Siquijor (No. 20 und 22), hier überall in Grössen von 3 und $4\frac{1}{2}$ mm Länge, aber gelegentlich auch in Uebergangsformen, Insel Cagauan, Distr. Surigao (No. 2289) und Looc auf Tablas (No. 1115), nur in Stücken der kleinen Form.

2. *Mucronalia obesula* (A. Ad.)

Salay, Prov. Cagayan de Misamis auf Mindanao (coll. Quadras No. 0); Gindulman auf Bohol (A. Adams). — Amboina (coll. Boettger), Réunion (Deshayes).

Von erstgenanntem Fundorte liegt nur ein schlecht erhaltenes, todt gesammeltes Stück von alt. 7, diam. max.

3 mm vor. Die Anwachsstreifchen sind bei dieser Art stark geschwungen; Varices fehlen.

3. *Mucronalia mindoroensis* (Ad. Rve.)

Insel Mindoro (Adams & Reeve). — Fidji-Inseln. — Mir unbekannt.

Gen. IV. *Niso* Risso.

1. *Niso mucronata* Sow.

Philippinen (A. Adams). — Mir unbekannt.

2. *Niso quadrasi* n. sp.

Char. T. anguste umbilicata, turrita, solida, laete castanea, angulo peripherico taenia angusta flava cincto, nitidissima, polita; spira elata lateribus strictis; apex subnormalis, modice acutus. Anfr. 12 plani, lentissime accrescentes, sutura lata, profunde incisa disjuncti, ultimus media parte distinete angulatus, basi convexiusculus et circa umbilicum carinatus, $\frac{1}{4}$ altitudinis testae aequans. Apert. verticalis rhomboidea, utrimque acuta; perist. simplex, acutum, marginibus callo junctis, dextro angulato, columellari subincrassato, reflexiusculo, umbilicum pro parte obtegente.

Alt. $5\frac{1}{2}$, diam. max. $2\frac{1}{4}$ mm; alt. apert. $1\frac{1}{2}$, lat. apert. 1 mm.

Laylay bei Boac auf Marinduque (coll. Quadras No. 37), nur ein anscheinend erwachsenes und ein ganz junges Stück von Herrn J. Fl. Quadras aufgefunden.

Durch die Färbung sehr an *N. brunnea* Sow. von Hainan erinnernd, von der sie sich aber durch die dreifach geringere Grösse und die vollkommen flachen Umgänge scharf unterscheidet.

3. *Niso goniostoma* A. Ad.

Insel Burias (A. Adams). — Mir unbekannt.

4. *Niso candidula* A. Ad.

Philippinen (A. Adams). — Mir unbekannt.

Gen. V. *Stylifer* Brod.

1. *Stylifer exaratus* A. Ad.

Philippinen (A. Adams). — Mir unbekannt.

2. *Stylifer quadrasii* n. sp.

Char. T. usque ad apicem perforata, conico-globosa, tenera, fragilis, pellucida, corneo-albida, nitidula; spirale late conica lateribus concaviusculis; apex acutissimus, submucronatus, vix distortus. Anfr. 10—11 leviter convexiusculi, sutura distincta, subappressa disjuncti, initio lente, tum rapide accrescentes, striatuli et lineis obsoletis spiralibus decussatuli, ultimus inflatus, globosus, $\frac{1}{2}$ altitudinis testae vix aequans. Apert. subobliqua, basi recedens, semilunaris, superne angustata, inferne sinistrorum tracta, subangulata; perist. simplex, acutum, marginibus callo levi sed lato conjunctis, dextro leviter arcuato, superne non aut vix compresso, basali subexciso, columellari valde spiraliter torto, incrassato. — Operculum nullum.

Alt. $13\frac{1}{2}$, diam. max. 8 mm; alt. apert. $7\frac{1}{4}$, lat. apert. 3 mm.

Laylay bei Boac auf Marinduque (coll. Quadras No. 734), von Herrn J. Fl. Quadras in kleiner Anzahl gefunden.

Die Art hat Aehnlichkeit mit *Apicalia guentheri* Angas von Neusüdwales, die wohl sicher besser bei *Stylifer* steht, unterscheidet sich aber wesentlich durch das Fehlen der Schulterkante und das kürzere Gewinde. Auch *St. ovoideus* H. et A. Ad. aus Borneo und *St. dubius* Baird von Neukaledonien haben mit der vorliegenden Species erhebliche Aehnlichkeit, zeigen aber gleichfalls einen unterhalb der

Naht eingedrückten oder nach oben hin abgeflachten letzten Umgang, eine Abflachung, die unserer Art gänzlich fehlt.

3. *Stylifer variabilis* n. sp.

Char. E grege *St. quadrasi* Bttgr., sed multo minor, ovatus, haud globosus, spira exacte conica, anfr. ultimo spiram superante. — T. usque ad apicem perforata, aut ovato- aut oblonga-conica, tenera, fragilis, subpellucida, albida, spira corneo-flavescens, nitidula; spira magis minusve elata, regulariter conica lateribus strictis; apex acutus, mucronatus, non distortus. Anfr. 8 planati, sutura distincta, submarginata disjuncti, sat celeriter accrescentes, dense striatuli et lineis obsoletissimis spiralibus decussati, ultimus magis ventriosus, basi convexus, $\frac{1}{2}$ altitudinis testae paulo superans. Apert. subobliqua basi recedens, irregulariter ovala, superne acuta, inferne sinistrorum tracta, rotundata; perist. simplex acutum, marginibus callo levi, lato junctis, dextro substricte descendente, basi bene rotundato, columellari valde spiraliter torto, subincrassato. — Operculum nullum.

Alt. $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$, diam. max. 3— $3\frac{1}{4}$ mm; alt. apert. $3\frac{1}{4}$, lat. apert. $1\frac{1}{2}$ mm.

Laylay bei Boac auf Marinduque (coll. Quadras No. 35 und 1007), von Herrn J. Fl. Quadras in mässiger Anzahl gefunden.

Wesentlich kleiner als *St. quadrasi* Bttgr. desselben Fundortes zeichnet sich die vorliegende Art durch rein kegelförmiges Gewinde aus mit ganz graden Seiten und durch die geringe Aufgeblasenheit des letzten Umganges. Sie erinnert in der Form, abgesehen von der ganz abweichenden Spindelbildung, am meisten an *Macronalia obesula* (A. Ad.) des indischen Oceans.

Literaturbericht.

Melvill, James Cosmo, and Alexander Abercrombie, the marine Mollusca of Bombay. Mem. Proc. Manch. IV. 7.

Es werden einschliesslich der vorstehend aufgeführten neuen Arten 320 Species aufgezählt, davon ca. 50 für die Gegend mehr oder minder sicher eigenthümlich. Die Fauna wird mit der von Aden, der des persischen Golfes und denen von Karachi und Ceylon verglichen. Die auf dem Markt zu findenden Arten werden besonders aufgeführt.

Hedley, C., Schizoglossa, a new genus of carnivorous Snails.

In Proc. Linn. Soc. N S. Wales 1892, p. 387. With. pl. IX.

Daudebardia novoseelandica hat sich bei der anatomischen Untersuchung zwar als eine Testacellide erwiesen, ist aber sowohl von *Daudebardia* wie von *Testacella* weit verschieden, dagegen nahe verwandt mit *Paryphanta* durch den einfachen Genitalapparat und den Mangel des Mittelzahnes. Von letzterer Eigenthümlichkeit ist der Gattungsname abgeleitet.

Hedley, C., the range of Placostylus, a study in ancient Geography. In Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1892, p. 335.

Die sämmtlichen Fundorte gehören dem vulkanischen Hochplateau an, welches sich in ca. 1300 Faden Tiefe, von sehr viel grösseren Tiefen umgeben, von den Salomonen über die neuen Hebriden nach Neuseeland und Neukaledonien erstreckt und welches Hedley als das melanesische Plateau bezeichnet. Die Verbreitung der Placostylen deutet auf eine frühzeitige Spaltung dieses Gebietes in eine nördliche und eine südliche Hälfte und auf eine uralte und dauernde Trennung von Australien.

Neue Mitglieder.

Herr Wehner, C., Eisenbahnfunktionär, Würzburg; — Herr Gude, G. K., London 5 Giesbach Rd., Upper Holloway, N.

Eingegangene Zahlungen:

Simroth, Lpz., 6 Mk.; — Löbbecke, Düss., 6 Mk.; — Rolle, Berl. 12 Mk.; — Gude, Lond., 6 Mk.; — Senck. nat. Gesellsch. Frkft. 24 Mk.; — Kimakowicz, H., 8.18 Mk.; — Schröder, N., 12 Mk.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M., Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

No. 11 u. 12.

November - Dezember 1893.

Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft.

Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Aeltere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Diagnoses

specierum novarum ex parte septentrionali insulae Luzon
auctoribus

J. F. Quadras et O. F. de Moellendorff.

1. *Vitrinoconus trochiscus* Quadr. et Mlldff.

T. modice umbilicata, elate trochiformis, tenuiuscula,
oblique et arcuatim costulato-striata, corneo-brunnea;
spira fere regulariter conica, lateribus vix convexius-
culis, apice subacuto, glabrato. Anfractus $8\frac{1}{2}$ plani,
sutura filoso-marginata discreti, lentissime accrescentes,
ultimus carina acuta bene exserta subcrenulata carina-

tus, basi planiusculus. Apertura modice obliqua, trapezoidalis, peristoma rectum, obtusum, margine columellari sat dilatato.

Diam. maj. 8, alt. 7 mm.

Hab. ad vicos Buguey et Aparri provinciae Cagayan leg. J. Quadras.

2. *Vitrinococonus latissimus* Mlldff.

T. latissime umbilicata, umbilico $\frac{2}{5}$ diametri adaequante, convexo-depressa, tenuis, superne confertim, sed distincte costulata, cornea; spira subregulariter conoidea, lateribus vix convexiusculis apice subacuto. Anfr. 7 lente accrescentes, carina filiformi cincti, subplani, ultimus basi paullum convexior, ad carinam subexcavatus, striatulus, subnitens, circa umbilicum indistincte angulatus. Apertura valde obliqua, rotundato-securiformis, peristoma superne substrictum, rectum, obtusum, basi valde arcuatum, breviter reflexum, sublabiatum.

Diam. maj. 10, alt. 4,75, apert. lat. 3,5, long. 3, alt. 2,5 mm.

Hab. prope vicum Malunú provinciae Isabela, leg. cl. O. Hennig et ad vicos Iguig, Magapig, Gaput, Gattaran provinciae Cagayan leg. cl. J. Quadras.

3. *Macrochlamys cagayanica* Quadr. et Mlldff.

T. imperforata, globoso-depressa, tenuis pellucida, subtilissime striatula, valde oleo-nitens, corneo-brunnea; spira breviter conoidea, lateribus substrictis. Anfr. 5 convexiusculi, lente accrescentes, sutura submarginata, subcrenulata discreti, ultimus convexior, basi tumidus, medio paullum excavatus. Apertura parum obliqua,

oblique elliptica, valde excisa, peristoma simplex, acutum, margine columellari calloso incrassato, superne dilatato, reflexo, appresso.

Diam. maj. 17,5, alt. 11,5 mm.

Hab. ad vicum Lallo provinciae Cagayan leg. J. Quadras.

4. *Kaliella micropetasus* Quadr. et Mlldff.

T. angustissime perforata, trochoidea, tenuis, subpellucida, superne costulis filiformibus tenuibus sat distantibus obliquis arcuatis sculpta, corneobrunnea; spira sat elevata, trochoidea, lateribus subconeavis. Anfr. 6 planiusculi, lente accrescentes, sutura filiformi, crenata discreti, ultimus carina acuta, exserta carinatus, basi convexiusculus, lineis spiralibus confertis decussatus. Apertura fere diagonalis, securiformis, peristoma simplex, rectum, obtusum, margine columellari calloso-subreflexo.

Diam. maj. 2,75, alt. 2,5 mm.

Hab. ad vicos Alcala, Magapig, Lallo et Buguey provinciae Cagayan leg. J. Quadras.

5. *Lamprocystis flavesens* Quadr. et Mlldff.

T. angustissime perforata, discoidea, tenuis, pellucida, glabrata, nitidissima, pallide flavesens; spira vix elevata. Anfr. $4\frac{1}{2}$ planiusculi, sat celeriter accrescentes, sutura distincte et latiuscule marginata discreti, ultimus convexior, basi valde convexus. Apertura modice obliqua, late elliptica, valde excisa, peristoma rectum, acutum, margine columellari superne breviter reflexo, calloso.

Diam. maj. 8, alt. 4 mm.

Hab. ad vicos Pamplona et Sanchez Mira provinciae Cagayan leg. J. Quadras.

6. *Lamprocystis leucosphaerion* Quadr. et Mlldff.

T. subimperforata, depresso-globosa, tenuis, pellucida, subtiliter striatula, nitens, hyalina; spira depresso conoidea. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, lente accrescentes, sutura appressa, distinete marginata discreti, ultimus lateraliter subcompressus, basi convexus. Apert. fere verticalis, late elliptica, valde excisa, peristoma rectum, intus sublabiatum, basi expansiusculum, margine columellari sinuoso, calloso-incrassato, brevissime reflexo.

Diam. 3, alt. 2 mm.

Hab. ad viennu Siam siam provinciae Cagayan leg. J. Quadras.

7. *Bensonia cardiostoma* Quadr. et Mlldff.

T. modice umbilicata, depressa, tenuis, superne liris elevatis et costulis transversis sculpta, luteo-cornea, subsericina; spira deppressa, breviter conoidea. Anfr. 6 vix convexiusculi, lente accrescentes, sutura impressa discreti, ultimus basi plicato-striatus, lineis spiralibus microscopicis decussatulus, subnitens. Aertura parum obliqua, late cordiformis, peristoma rectum obtusum, intus calloso-labiatum, margine columellari profundiuscule sinuato, haud reflexo.

Diam. maj. 8,5, alt. 4,75 mm.

Hab. ad vicos Abulug et Pamplona provinciae Cagayan leg. J. Quadras.

8. *Plectopylis quadrasi* Mlldff.

T. sat aperte umbilicata, conoideo-depressa, tenuis, superne costulata, subtus striatula, corneo-brunnea; spira parum elevata, lateribus convexiusculis. Anfr. 6 convexiusculi, sutura sat impressa discreti, ultimus

ad peripheriam subacute carinatus, circa umbilicum obtuse angulatus. Apertura diagonalis, irregulariter cordiformis, peristoma sat expansum, intus valde labiatum, brunneum, marginibus callo forti, prope insertionem marginis externi profundiuscule sinuato et lamellatim elevato junctis. Lamella parietalis supera alta, cum callo juncta, altera callum non attingens, humilior, utraque longe intrans, in tertia parte anfractus lamellis palatalibus 3 validiusculis, longiusculis oppositis.

Diam. 3,5, alt 1,75 mm.

Hab. ad vicum Siamsiam leg. cl. J. Quadras.

9. *Chloraea hennigiana* Mlldff.

T. imperforata, subdepresso-globosa, solidula, subtiliter striatula, lineis spiralibus minutissimis decussata, nitens, virescens, ad suturam zona latiuscula laete flava ornata; spira convexo-conoidea apice obtuso. Anfractus $4\frac{1}{2}$, supremi fere plani, sequentes convexiusculi, ultimus convexior, ad peripheriam obtuse angulatus, basi subgibber, pone apertum crista transversa parum distincta cinctus, tum breviter valde deflexus, subcontractus. Apertura diagonalis, truncato-ovalis, peristoma superne subrectum, tum expansum, basi reflexum, appressum, laete flavum, columella albo-callosa, oblique substricte descendens, callo tenui latiusculo cincta.

Diam. maj. 16—17, alt. 11—11.5 mm.

Hab. ad rupem Peña Blanca prope oppidum Tuguegarao provinciae Cagayan leg. cl. O. Hennig et J. Quadras.

10. *Chloraea cristatella* Quadr. et Mlldff.

T. imperforata, depressa, tenuis, subtiliter plicato-striata, lineis spiralibus tenuissimis decussata, pellucens,

nitida, caerulea; spira vix elata, apice plano, albido. Anfr. 4, pro sectione lente acrecentes, sutura marginata discreti, convexiusculi, ultimus carina compressa, acuta, pallide flavescente carinatus, pone aperturam crista transversa bene exserta cinctus, brevissime deflexus, sat coaretatus, basi gibber. Aertura diagonalis, securiformis, peristoma tenue, margo superus rectus, medio subprotractus, ad carinam dexter magis expansus, flavescentes, basalis parum arcuatus, reflexus, appressus, albus; columella brevis, dilatata, oblique descendens, haud dentata, alba,

Diam. maj. 20—20.5, alt. 8.5 mm.

Hab. ad vicos Pamplona et Sanchez Mira provinciae Cagayan leg. J. Quadras.

11. *Chloraea malleata* Quadr. et Milldff.

T. convexo-depressa, tenuiscula, plicato-striatula, lineis spiralibus confertis decussata et rugis pliciformibus antrorum decurrentibus sculpta, pellucens, valde nitens, caeruleo-viridis; spira depresso convexa apice plano macula castanea ornata. Anfr. 4 vix convexiusculi, ultimus basi convexior, subinflatus, ad columellam valde gibber, in ultima quarta parte a latere in modum Chloraeae thersitis peculiariter applanatus, pone aperturam cristatus, tum subito valde deflexus, coaretatus, carina compressa acuta viridiflava cinctus. Apertura maxime obliqua, elliptica, valde excisa, peristoma tenue viridiflavum, margo superus rectus, ad carinam expansus, dexter valde expansus, basalis reflexus, appressus, albus, columella brevis, oblique descendens, superne dilatata macula castanea ornata.

Diam. maj. 23,25, alt. 11 mm.

Hab. in insula Palauig ad promontorium Eugaño
provinciae Cagayan leg. J. Quadras.

12. *Cochlostyla (Callicochlias) chrysacme* Quadr. et Mlldff.

T. globosa, solidula, subpellucida, subtiliter et confertim plicato-striata, lineis spiralibus microscopicis decussata, flava, cuticula hydrophana tenuissima obducta, rarius taenia peripherica cuticulae paullo fortioris cincta; spira sat elevata apice laete flavo aut aurantiaco. Anfr. 5 convexiusculi, sutura appressa submarginata discreti, ultimus inflatus, ad columellam subgibber, antice paullum descendens. Apertura modice obliqua, fere circularis, valde excisa. peristoma sat late expansum, valde revolutum, albolabiatum, columella superne dilatata, albocallosa, sat excavata.

Diam. maj. 35,5, alt. 31, apert. lat. 24, long. 23,5, alt. 19 mm.

Hab. ad vicum Abulug provinciae Cagayan leg. J. Quadras.

13. *Cochlostyla (Callicochlias) semperi* Mlldff.

T. depresso-globosa, sat solida, oblique tenuiter plicato-striata, lineis spiralibus rugulosis confertis decussata et rugis pliciformibus oblique antrorsum decurrentibus sculpta, parum nitens, alba taeniis castaneis 3, una supra, altera infra peripheriam, tertia latiore in basi ornata; spira sat elevata apice acutulo. Anfr. 4½ convexiusculi, sutura vix appressa submarginata discreti, ultimus convexior antice paullum descendens, ad aperturam dilatatus. Apertura sat obliqua, truncato-ovalis, peristoma late expansum, reflexum, albolabiatum, columella excavata, dilatata, superne subdentata, cum margine basali angulum vix distinctum formans.

Diam. maj. 37, alt. 31, apert. lat. 24, long. 25, alt. 19 mm. *Cochlostyla albaiensis* Semper Phil. p. 176, t. VIII, f. 7. (non Sowerby).

Hab. ad litus pacificum insulae Luzon septentrionalis nec non in insula Camiguin leg. cl. C. Semper, prope vicum Malunu provinciae Isabela leg. cl. O. Hennig, prope vicum San Vicente et in insula Palauig provinciae Cagayan leg. cl. J. Quadras.

14. *Cochlostyla (Callicochlias) streptostoma* Mlldff.

T. pro genere parva, subdepresso-globosa, solidula, transverse subtiliter plicato-striatula, lineis spiralibus confertis decussatula nec non rugis pliciformibus, oblique antrorum decurrentibus sculpta, flavescens-albida aut castanea, taeniis fuscis 4, ad suturam, supra et infra peripheriam et circa columellam ornata, cuticula hydrophana albida in taenias confertas dissoluta obducta; spira semiglobosa apice obtuso. Anfr. 4, supremi planiusculi, ultimus subdistortus, valde inflatus, basi gibber, ad aperturam breviter sed distinete deflexus, superne peculiariter applanatus. Apertura sat obliqua, oblique truncato-ovalis, peristoma parum expansum, extus fuscomarginatum, columella parum excavata, dilatata, albocallosa, paullulum torta.

Diam. maj. 23,5, alt. 18,5, apert. lat. 15, long. 14, alt. 10,5 mm.

Hab. prope vicum Quiangan provinciae Nueva Vizcaya leg. cl. Dr. A. Schadenberg.

15. *Cochlostyla (Orustia) pulchella* Mlldff.

T. pro genere minuta, globoso-conoidea, solidula, oblique striatula, lineis spiralibus minutissimis decussatula, alba, cuticula tenuissima, pallidissime virescente subopaca obducta, taenia angusta castanea peripherica in an-

fractibus superioribus ad suturam conspicua usque in peristoma producta ornata; spira convexo-conoidea, sursum denudata, apice obtuso. Anfr. $4\frac{3}{4}$ planulati, sutura submarginata, subapressa discreti, ultimus paullo convexior, basi planulatus, haud descendens. Apertura modice obliqua, ovalis, sat excisa; peristoma parum expansum, albolabiatum, basi reflexiusculum, columella parum excavata, substricta, vix arcuata.

Diam. maj. 19, alt. 18 mm.

Hab. ad rupem Peña Blanca prope oppidum Tuguegarao leg. cl. O. Hennig et J. Quadras.

16. *Hapalus quadrasi* Mlldfl.

T. angustissime et semiobtecte perforata, ventricoso-fusiformis, tenuis, pellucida, arcuatim striatula, pallide straminea. Anfr. 7 vix convexiusculi, sutura subappressa, marginata discreti, ultimus paullo convexior, antice descendens. Apertura parum obliqua, truncato-ovalis, peristoma simplex, acutum, margo superus ad insertionem paullum recedens, columellaris reflexus, superne dilatatus, perforationem fere obtegens.

Long. 14,5, diam. 5,75 mm.

Hab. ad vicos Magapig, Alcalá, Gattáran et Napayacan leg. cl. J. Quadras.

17. *Opeas nitidum* Quadr. et Mlldfl.

T. rimata, graciliter fusiformis, tenuis, pellucida, levissime striatula, valde nitens, flavescens; spira sensim attenuata apice obtuso. Anfr. $6\frac{1}{2}$ planulati, sutura valde impressa submarginata subcrenulata discreti. Apertura fere verticalis, rotundato-rhomboidea, peristoma simplex, acutum, margo externus valde antrorum arcuatus, columellaris superne dilatatus, reflexus.

Long. 6,5, diam. 2 mm.

Hab. ad vicos Lallo et Sanchez Mira leg. J. Quadras.

18. *Cyclotus (Platyrhaphes) coptoloma* Mlldff.

T. late et aperte umbilicata, depressa, subdiscoidea, transverse striatula, costulis transversis tenuissimis distantibus et lineis spiralibus valde confertis sculpta, pallide lutescenti-cornea; spira brevissime conoidea, apice mucronato, obliqua, glabrata. Anfr. 4 teretes, ad suturam profunde impressam applanati, subplicati, ultimus antice valde deflexus, vix solutus. Apertura diagonalis, circularis, peristoma superne ad insertionem recedens, simplex, acutum, tum latiuscule expansum, basi attenuatum, ad alteram insertionem denuo simplex. Operculum valde concavum, anfr. 7 transverse striatulus nucleo glabro.

Diam. maj. 9,3, alt. 6 mm.

Hab. ad vicum Malunu provinciae Isabela leg. cl. O. Hennig, ad vicos Lallo, Magapig, Casagan, provinciae Cagayan leg. cl. J. Quadras.

19. *Cyclotus (Platyrhaphes) mammillatus* Quadr. et Mlldff.

T. latissime umbilicata, discoidea, solidula, striis transversis et lineis spiralibus valde confertis reticulata, costulis membranaceis in fasciis sat distantibus dispositis opacis induita, in interstitiis subnitens, corneo-brunnea; spira parum elevata, apice mammillari, obliqua. Anfr. 4½ teretes, sutura profunda discreti, ultimus valde deflexus. Apertura diagonalis, circularis, peristoma duplex, externum expansiusculum, internum porrectum, ad anfractum penultimum adnatum, dilatatum. Operculum normale, sulco laterali valde profundo, lamina calcarea profunde concava, anfr. 9 fortiter oblique plicatis.

Diam. maj. 16,5, alt. 9,25 mm.

Hab. ad vicos Pamplona, Siamsiam et Claveria
leg. J. Quadras.

20. *Leptopoma subalatum* Quadr. et Mlldff.

T. anguste perforata, depresso turbinata, tenuis, pellucida, nitidiuseula, oblique striatula, lineis spiralibus rugulosis confertis et liris tenuibus subelevatis albis 3 cincta, albida, saepe in apice et anfractu ultimo brunneoscens, interdum pallide brunneo-marmorata: spira sat alta, regulariter conica apice acuto. Anfr. 6 convexi, ultimus carina parum distincta et basi liris albis 4 cinctus. Apertura modice obliqua, subcircularis, peristoma modice expansum, margo columellaris profunde sinuatus, lateraliter excisus, basi valde dilatatus, alae instar patens.

Diam. maj. 12,25—13,25, alt. 11,75—12 mm.

Hab. ad vicos San Vicente, Sanchez Mira et Siamsiam nec non in insula Palauig leg. J. Quadras.

21. *Pupinella quadrasi* Mlldff.

T. angustissime et semiobtecta perforata, oblonge pupiformis, tenuiuscula, confertim costulato-striata, opaca, brunnea; spira subcylindrica, superne sensim attenuata apice acutulo. Anfr. 7 convexiusculi, sutura profunda discreti, ultimus paullum devians, sensim descendens, ad aperturam brevissime ascendens. Apertura fere verticalis, circularis, peristoma modice expansum, reflexum, calloso-labiatum, marginibus callo tenui junctis, incisura columellaris latimacula, obliqua, columella fere stricta, haud sinuata, ad incisuram angulum distinctum formans, paries aperturalis pone insertionem marginis externi nodulo sublamelliformi instructus. Operculum normale.

Long. 10,5 diam. 5 mm.

Hab. inter vicos Abulug et Linao provinciae Cagayan
leg. cl. J. Quadras.

22. *Moulinsia quadrasi* Mlldff.

T. irregulariter oblique ovalis, tenuiuscula, laevigata,
lubrica, valde oleonitens, fulvocornea. Anfr. $4\frac{1}{2}$ plani,
supremi 3 spiram subregularēm, depresse conicam
efficientes, ultimi in modum Streptaxidis valde distorti,
ultimus ventre applanatus, antice vix ascendens. Aper-
tura parum obliqua, circularis, peristoma sat ex-
pansum, calloso-incrassatum, columella fissura fere
verticali a margine infera sejuneta, valde dilatata,
canali subtus foramen subcircularē fere tubuliforme
formante.

Long. 4, diam. 2,33, axis 3 mm.

Hab. prope vicum San Vicente leg. cl. J. Quadras.

23. *Palaina conspicua* Mlldff.

T. pro genere magna, sinistrorsa, anguste perforata,
ovato-conoidea, solidula, subglabrata, luteo-cornea.
Anfr. $7\frac{1}{2}$ convexi, supremi spiram subregulariter
conoideam efficientes, penultimus tumidus, ultimus an-
gustior, modice devians, antice ascendens, costulatus,
costulis ad suturam subevanescentibus, initio leviter
constrictus. Apertura paullum retrorsum inclinata, sub-
circularis, peristoma sat expansum, multiplicatum,
calloso-labiatum, lutescens, marginibus callo tenui
junctis, columellari superne valde dilatato, medio
sinuato, subexciso.

Long. 6,5, diam. 3,5 mm.

Hab. ad rupem Peña Blanca leg. cl. O. Hennig et
J. Quadras.

Var. versicolor Mlldff. differt testa ventricosiore, aut flava aut rubello-fulva, costulis distinctioribus, constrictione magis profunda, margine columellari minus dilatato. Long. 6, diam. 3,5.

Hab. prope vicum Lallo leg. cl. J. Quadras.

24. *Palaina cristata* Quadr. et Mlldff.

T. sinistrorsa, anguste sed aperte umbilicata, umbilico cylindraceo usque ad apicem perspectivo, oblique ovato-conica, tenuis, albida vel lutescens, pellucida, subtilissime striatula; spira convexo-conoidea, apice obliquo, glabrato. Anfr. $6\frac{1}{2}$ convexi, ad suturam inferiorem acute costulati, ultimus sat distortus, initio valde constrictus, circa umbilicum maxime compressus, crista bene exserta, confertim costata cinctus. Apertura verticalis, subcircularis, peristoma campanulatum, valde expansum, multiplicatum, columella nodulo pseudolamelliformi per anfractum scrobiculatum effecto induita.

Long. 3,5—4, diam. 2,5—3 mm.

Hab. prope vicum Magapig leg. J. Quadras.

25. *Palaina modesta* Quadr. et Mlldff.

T. sinistrorsa, rimata, elongata ovata, tenuis, corneo-lutescens, confertim costulata; spira breviter convexo-conoidea, apice acutulo. Anfr. 6 convexit, ultimus paullum distortus. Apertura verticalis, circularis, peristoma duplex, internum porrectum, vix expansum, superne appressum, externum interruptum, latiuscule expansum.

Long. 2,25, diam. 1,25 mm.

Hab. ad vicos Napaya can et Magapig leg. J. Quadras.

26. *Diplommatina cagayanica* Mlldff.

T. dextrorsa, non rimata, ventricosulo-conica, tenuis, pellucida, confertim costulato-striata, pallide cornea. Anfr. $6\frac{1}{2}$ valde convexi, sutura profunda discreti, supremi 4 spiram regulariter conicam efficientes, ultimi paullum deviantes, penultimus maximus, ultimus angustior, initio valde constrictus, tum inflatus, gibber, antice paullum ascendens. Apertura parum obliqua, subauriformis, peristoma duplex, externum interruptum, latiuscule expansum, internum valde porrectum, incrassatum, superne callo tenui continuum, margine columellari sinuato, exciso, cum basali angulum fere rectum formante. Lamella columellaris parva, humilis, palatalis nulla.

Long. 2, diam. 1 mm.

Hab. ad rupem Peña Blanca leg. cl. O. Hennig.

27. *Diplommatina (Sinica) filicostata* Mlldff.

T. rimata, dextrorsa, ovato-conica, tenuis, pellucida, albida, costulis tenuissimis filiformibus, sat distantibus curvatis sculpta. Anfr. 6 convexi, ultimi parum deviantes, ultimus initio profunde constrictus, tum inflatus, subgibber, antice vix ascendens. Apertura paullum obliqua, subcircularis, peristoma parum expansum, vix incrassatum, subduplex. Lamella columellaris modica, palatalis longiuscula, valida, supra columellam translucens.

Long. 1,8, diam. 0,9 mm.

Hab. ad rupem Peña Blanca leg. cl. O. Hennig.

28. *Diplommatina (Sinica) concolor* Quadr. et Mlldff.

T. dextrorsa, vix rimata, elongate ovato-conica, tenuis, subpellucida, sat confertim costulata, luteo-cornea. Anfr. 8 convexi, supremi 6 spiram regulariter conicam

efficients, penultimus tunidus, prominens, paullum devians, ultimus sat distortus, initio valde constrictus, antice brevissime ascendens. Apertura parum obliqua, subauriformis, peristoma duplex, externum interruptum latiuscule expansum, internum superne appressum, expansiusculum, columella cum margine basali angulum valde distinctum formans. Lamella columellaris humilis, sed validiuscula, palatalis sat longa.

Long. 2,33, diam. 1 mm.

Hab. ad vicos Linao, Lallo, San Vicente et Napayaean leg. J. Quadras.

29. *Omphalotropis columellaris* Quadr. et Mlldff.

T. anguste perforata, sat clate turbinata, subtilissime striatula, lineis spiralibus tenuissimis valde confertis decussata, luteo-brunea; spira sat elevata, subregulariter conica apice acuto. Anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura valde impressa discreti, ultimus convexior, non descendens, circa umbilicum carina parum distincta cinctus. Apertura parum obliqua, oblique ovalis, peristoma simplex obtusum, basi et ad columellam reflexiusculum, columella sursum sat excisa, ad sinulum quasi bipartita, ramo uno lamellatum in perforationem ascidente, altero in callum parietalem desinente.

Long. 3,5, diam. 2,66 mm.

Hab. ad vicos Magapig, San Vicente et Napayaean provinciae Gagayan nec non in insula Catanduanes leg. J. Quadras.

30. *Omphalotropis semperi* Mlldff.

T. peranguste et fere obtecle perforata, turrito-conica, solidula, striis transversis et lineis spiralibus elevatis confertis reticulata, pilis brevissimis deciduis undique

hirsuta, brunneo-cornea, spira turrito-conica apice acuto. Anfr. 7—7½ convexi, sutura profunda discreti. Apertura fere verticalis, late ovalis, peristoma simplex, superne rectum obtusum, intus calloso-labiatum, basi parum expansum, margine columellari superne paullum dilatato, reflexo.

Long. 5,5, diam. 3,5 mm.

Hab. in provincia Isabela leg. cl. C. Semper, ad vicum Malunú cl. O. Hennig et prope vicos Alcalá et Siamsiam provinciae Gagayan cl. J. Quadras.

31. *Helicina (Ceratopoma) hennigiana* Mlldff.

T. depresso subsemiglobosa, carinata, solidula, transverse subtiliter striatula, lineis spiralibus confertis decussata et rugulis minutissimis oblique antrorum decurrentibus sculpta, nitens, lutea aut carneo-lutea aut rubella; spira convexo-conoidea apice submucronato acuto, semper citrino. Anfr. 5½ fere plani, ultimus paullo convexior, infra carinam acutam sed parum exsertam taenia angusta rubella interdum evanescente pictus, basi bene convexus. Apertura diagonalis rotundato-trigona, peristoma latiuscule expansum, columella brevis, cum margine basali angulum parum distinctum vix noduliferum formans, callus basalis validus, latus, minutissime granulatus, pallide citrinus.

Diam. maj. 10,5—12,5, alt. 6—8 mm.

Hab. ad rupem Peña Blanca leg. cl. O. Hennig, ibidem et prope vicum Magapig cl. J. Quadras.

Die marinen Mollusken der Philippinen,
nach den Sammlungen des Herrn José Florencio Quadras in Manila.
Von
Prof. Dr. Boettger in Frankfurt (Main).

(Fortsetzung zu Nachr.-Blatt d. d. Mal. Ges. 1893 pag. 97—115 und
pag. 153—167.)

I. Die Rissoiden (I. Nachtrag).

Durch eine neue Sendung des Herrn J. F. Quadras bin ich schon heute in der Lage, eine Fortsetzung meiner Aufzählung der philippinischen Rissoiden zu geben. Ausser zahlreichen neuen Fundorten konnte ich infolgedessen 6 für die Inseln neue Formen aufzählen, von denen eine *Onoba* und zwei *Rissoina* für die Wissenschaft neu zu sein scheinen. Als siebente und achte Gattung konnten *Fenella* und *Pyramidelloides* der philippinischen Fauna zugefügt werden. Bekannt sind jetzt von dort 54 Arten in 8 Gattungen, unter denen sich 12 Novitäten befanden.

Die einzelnen, im Folgenden aufgezählten Gattungen und Arten sind mit denselben Ziffern bezeichnet wie in der ersten Arbeit (vergl. diesen Jahrg. pag. 97 ff.), die neuen haben fortlaufende Nummern erhalten.

Gen. II. *Onoba* H. et A. Ad.

3. *Onoba philippinica* Bttgr.

Insel Lugbon bei Romblon (coll. Quadras No. 84) und Bacjauan auf Tablas (No. 1702a), an beiden Orten in einer auffallend kleinen Form von nur alt. 4, diam. max. $1\frac{3}{4}$ —2 mm.

4. *Onoba tenuilirata* Bttgr.

Himalalud auf Negros (coll. Quadras No. 2827), von alt. 3— $4\frac{1}{4}$, diam. max. $1\frac{1}{3}$ — $3\frac{3}{4}$ mm.

49. *Onoba quadrasi* n. sp.

Char. T. late rimata ovato-oblonga, media parte inflatula, albida, modice tenera; spira convexo-conica; apex parum acutus summo plane involuto. Anfr. $5\frac{1}{2}$ satis convexi, sutura bene impressa disjuncti, liris spiralibus tenuibus, subaequalibus lirati, antepenultimus liris 6, penultimus 9, ultimus 15 nec non lira cristiformi rimali, praetereaque striis incrementi tenuissimis, distinete crispulis decussati, penultimus reliquam spiram altitudine aequans, ultimus ante aperturam lente ascendens, $\frac{3}{7}$ altitudinis testae aequans. Apert. recta ampla, dextrorsum aperta, exakte ovalis, superne vix angulata; perist. continuum marginibus leviter reflexiusculis, dextro subexpanso, extus varice collari valido, subpresso, liris spiralibus crenulato, in liram cristiformem umbilicalem transeunte cincto. — Alt. $3\frac{1}{2}$, diam. max. $1\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. $1\frac{1}{2}$, lat. apert. 1 mm.

Fundort: Insel Bisucay, Calamianes (coll. Quadras No. 42) und Salay, Prov. Cagayan de Misamis, Mindanao (No. 77), in je einem Stücke von Herrn J. Fl. Quadras entdeckt und ihm zu Ehren benannt.

Bemerkungen: Die kleine Art steht zwar der vorigen sehr nahe, unterscheidet sich aber durch bauchigere, mehr eiförmig-oblonge Tosalgestalt, kräftigeren Mundwulst und 15 statt 11 Spiralkiele auf dem letzten Umgange. Wegen der Konstanz der Skulpturen bei den europäischen *Alvania*-Arten glaubte ich auf diese Skulpturverschiedenheit um so mehr Gewicht legen zu sollen, als zwei ganz gleiche Stücke von zwei weit getrennten Fundorten vorliegen.

Gen. III. *Alvania* Risso.

6. *Alvania quadrasi* Bttg.

Manila (coll. Quadras No. 202 und 293).

Gen. IV. *Rissoina* d'Orb.

Sect. 1. *Rissoina* Nev.

12. *Rissoina ambigua* Gould.

Malitbog (coll. Quadras No. 64) und Visita Hinayangan (No. 86) auf Leyte und Insel Balagnan bei Mindanao (No. 50).

var. *cincta* Dkr.

Insel Catanduanes (coll. Quadras No. 70), Insel Panaon bei Leyte (No. 71 und No. 74), Himalalud auf Negros (No. 2828) und Salay, Prov. Cagayan de Misamis, Mindanao (No. 80).

var. *perpusilla* Nev.

Nevill, Handlist Moll. Ind. Mus. Calcutta Bd. 2, 1884 pag. 74.

Insel Balagnan bei Mindanao (coll. Quadras No. 52), 1 Stück von nur 3 mm Länge bei $1\frac{1}{8}$ mm grösster Breite.

Sect. 2. *Rissolina* Gould.

16. *Rissoina plicata* A. Ad.

Bagac, Prov. Bataan auf Luzon (coll. Quadras No. 53), Agcalatao bei Badajoz auf Tablas (No. 61) und Inseln Limansaua (No. 92) und Jinituan bei Mindanao (No. 2255).

18. *Rissoina subfirmata* Bttgr.

Matalon auf Leyte (coll. Quadras No. 65) und Insel Jinituan bei Mindanao (No. 2555a).

19. *Rissoina obeliscus* Recl.

Inseln Catanduanes (coll. Quadras No. 69) und Lucban bei Mindoro (No. 55).

50. *Rissoina (Rissolina) signata* n. sp.

Char. T. modica, elongato-turrita, solida, albida, opaca, taenia fulva in medio anfractu ultimo ornata; spira turrita lateribus vix convexiusculis; apex acutus albus.

Anfr. 10 lente accrescentes, convexiusculi, sutura impressa disjuncti, initiales 2 glabri, caeteri costati, costis — 18—19 in anfr. penultimo — arcuatis, compressis, angustioribus quam interstitia laevia, ultimus $\frac{1}{3}$ altitudinis testae aequans, costis ad basin sigmoideis, usque ad torum spiralem crassum, valde prominentem, utrimque sulco profundo circumscriptum, obsoletissime pectinalium decurrentibus nec non striis spiralibus exiguis, ad basin solum distinctis ornatus. Apert. obliqua angulato-ovata, utrimque acuminata, basi late effusa; columella torta, callosa, basi subtruncata; perist. simplex, reflexiusculum, margine supero et infero retractis, media parte peristomatis arcuatim protracta, varice extero valido lato, calloso, cingulis spiralibus latis, modice elevatis, deorsum distinctioribus 5—7 sculpto. — Alt. $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$, diam. max. $2\frac{3}{8}$ — $2\frac{3}{4}$ mm; alt. apert. $2\frac{3}{4}$, lat. apert. $1\frac{1}{2}$ mm.

Fundort: Bagac, Prov. Bataan, Luzon (coll. Quadras No. 1564), Himalalud auf Negros (No. 2828a) und Bacjauan bei Badajoz auf Tablas (No. 1330a) je ein Stück, von Herrn J. Fl. Quadras gesammelt. — Ein abgeriebenes Stück einer kleineren Varietät von nur 5 mm Länge liegt auch von der Insel Bisucay, Calamianes (No. 38) vor.

Bemerkungen: Die Art gehört in die engere Verwandtschaft der *R. obeliscus* Recl., von der sie sich durch zahlreichere Radialrippen, konvexe, nicht treppenförmig abgesetzte Umgänge und weniger tiefe Nähte leicht unterscheiden lässt. Sie dürfte der neucaledonischen *R. fimbriata* Souv. nahestehen, die aber kein rothbraunes Spiralband zeigt und durch den Passus der Diagnose „costulis spiralibus et funiculo terminali nodulatim decussatis“ wesentlich abweicht.

Sect. 5. *Phosinella* Moerch.

25. *Rissoina erythraea* Phil.

Insel Bisucay, Calamianes (coll. Quadras No. 44).

27. *Rissoina strigillata* Gould.

Inseln Catanduanes (coll. Quadras No. 68) und Luban bei Mindoro (No. 48) Inopacan, (No. 90) und Visita Hinayangan (No. 85) auf Leyte, Giloctoc auf Cebu (No. 1561). Insel Cagauan bei Mindanao (No. 2249) und Dapitan auf Mindanao (No. 107a und 110a). — Agat auf Guajan, Marianen (coll. Quadras).

32. *Rissoina cerithiiformis* Dkr.

Bahia de Ulugan auf Rita (coll. Quadras No. 57), Insel Lugbon bei Romblon (No. 1561a) und Guihulugna auf Negros (No. 62).

33. *Rissoina samoensis* Dkr.

Insel Limansaua (coll. Quadras No. 91), Omata-Merizo auf Guajan, Marianen (No. 2853), Insel Panaon bei Leyte (No. 72) und Visita Hinayangan auf Leyte (No. 87), Insel Balagnan bei Mindanao (No. 54) und Salay, Prov. Cagayan de Misamis, auf Mindanao (No. 76 und No. 79).

Sect. 6. *Zebinella* Moerch.

38. *Rissoina evanida* Nev.

Insel Bisucay, Calamianes (coll. Quadras No. 41), hier von alt. 4, diam. $1\frac{5}{8}$ mm bei $7\frac{1}{2}$ Umgängen, und Insel Panaon bei Leyte (No. 75).

51. *Rissoina (Zebinella) trigonostoma* n. sp.

Char. T. parva oblongo-turrita, tenera, albida, opaca; spira elongata lateribus convexiusculis; apex modice acutus. Anfr. 7— $7\frac{1}{2}$ sat convexi, sutura distincta, impressa disjuncti, initiales 2 laeves, caeteri spiraliter dense lineati et costulis exiguis, obliquis, parum ar-

cuatis, in anfr. junioribus magis distantibus — 25 in tertio ultimo —, densissimis in anfr. penultimo — ca. 50 — et evanidis infra tertiam partem anfr. ultimi ornati, ultimus subinflatus, ad aperturam magis planatus, basi fere subrostratus, superne initio lente, tum prope peristoma subito ascendens, $\frac{3}{7}$ altitudinis testae aequans. Apert. ampla obliqua, fere sphaerico-triangularis, utrimque canaliculata; columella basi torta et subtruncata; perist. continuum, marginibus dextro stricte descendente et basali curvato expansis, extus varice parum valido auctis, intus leviter labiatis, columellari appresso, cum basali angulum acutum, sinistrorum formante. — Alt. $3\frac{1}{4}$ —4, diam. max. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm; alt. apert. $1\frac{7}{8}$. lat. apert. 1 mm.

Fundort: Insel Bisueay, Calamianes (coll. Quadras No. 40), Insel Panaon bei Leyte (No. 73) und Bacon, Prov. Albay auf Luzon (No. 60), in je einem Stück von Herrn J. Fl. Quadras gesammelt.

Bemerkungen: Die für eine so kleine Schnecke auffallend grosse Mündung erinnert in der Form an die der Untergattung *Parazebinella* Bttgr. Von den nächstverwandten philippinischen Arten *R. elegantula* Angas trennt sie sich durch die beiderseits auffallend stark ausgegossene Mündung, die konvexeren Umgänge und die tiefen Nähte, von *R. evanida* Nev. durch die weit feinere Radialskulptur und die viel grössere Mündung.

Sect. 8. *Moerchiella* Nev.

41. *Rissoina spirata* Sow. typ.

Inseln Calumangan und Tinago bei Mindanao (coll. Quadras No. 1444) und Visita Hinayangan auf Leyte (No. 88).

Diese Stücke von alt. $10\frac{1}{2}$ — $11\frac{1}{4}$, diam. $3\frac{7}{8}$ — 4 mm stehen ziemlich in der Mitte zwischen *R. spirata* und *R. orbignyi* A. Ad., so dass eine Entscheidung über ihre Zu-

gehörigkeit zu der einen oder andern Form schwierig wird. Ich glaube daher jetzt auch, dass Tryon Recht haben mag, wenn er beide vereinigt. *R. orbignyi* A. Ad. wäre dann, wie *R. striolata* A. Ad. nur als grössere Varietät von *R. spirata* festzuhalten.

var. *striolata* A. Ad.

Costa de Calatrava al Salado auf Tablas (coll. Quadras No. 59), Salay, Prov. Cagayan de Misamis, Mindanao (No. 78), und Insel Limansaua (No. 93).

var. *deformis* Sow.

Insel Bisucay, Calamianes (No. 1444a).

Das Stück zeigt die charakteristische Skulptur der *R. spirata*, aber die Verdrehung und namentlich die buckelförmige Anschwellung des vorletzten Umganges der echten *R. deformis* Sow., die sicher nur eine abgeriebene Form der var. *orbignyi* A. Ad. darstellt. — Alt. 10, diam. $3\frac{1}{2}$ mm.

Sect. 9. *Zebina* H. et A. Ad.

44. *Rissoina tridentata* Mich.

Inseln Balauan (coll. Quadras No. 2, No. 28 und No. 2161), Jinituan (No. 100) und Calumangan bei Nord-Mindanao (No. 2161a).

Frische Stücke haben 9 Umgänge, und die feine Spitze ist etwas schief aufgesetzt. Die Embryonalwindung ist glatt, die vier nächsten Umgänge zeigen weitläufige, flache, undeutliche Radialfalten. Das oberste Zähnchen ist meist etwas schwächer entwickelt als die beiden Basalzähnchen.

45. *Rissoina bidentata* Phil.

8 Umgänge beim Typus, der erste glatt, die 3—4 nächsten radialgefaltet.

var. *coronata* Recl.

Insel Balagnan bei Mindanao (coll. Quadras No. 49), nur ein Stück. — Diese Form ist wohl sicher nur eine un-

gezähnte Varietät von *R. bidentata* Phil. — Umgänge $8\frac{1}{2}$; die 3—4 auf das Embryonalende folgenden mit Radialfalten. — Alt. $6\frac{1}{2}$, diam. max. $2\frac{3}{4}$ mm.

46. *Rissoina eulimoides* A. Ad.

Insel Catanduanes (coll. Quadras No. 66), Bacjwan bei Badajoz auf Tablas (No. 1702) und Insel Balanan bei Nord-Mindanao (No. 19).

52. *Rissoina sublaevigata* Nev.

Insel Bisucay, Calamianes (coll. Quadras No. 104 und No. 106), Insel Balabac bei Paragua (No. 1751a), Inseln Catanduanes (No. 32) und Lugbon bei Romblon (No. 1752), Sitio Saob nächst Cabalian auf Leyte (No. 94) und Insel Balanan bei Nord-Mindanao (No. 4 und No. 5).

Der Wirbel ist nicht wesentlich von dem der *R. tridentata* Mich. verschieden; Umgänge zähle ich $8\frac{1}{2}$, die Naht ist nicht „impressa“, sondern „appressa, late marginata“. — Alt. $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{1}{2}$, diam. max. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ mm.

Gen. VII. *Pyramidelloides* Nev.

53. *Pyramidelloides miranda* (A. Ad.)

Insel Lugbon bei Romblon (coll. Quadras). — Mauritius (Nevill), Réunion (Deshayes), Persischer Golf, Bombay, Ceylon, Andamanen, Arakan, Singapore und Hongkong (Nevill), Japan (A. Adams).

Sehr festschalig; 10 Umgänge. — Alt. $4\frac{1}{2}$, diam. max. $1\frac{5}{8}$ mm.

Gen. V. *Stossichia* Brus.

47. *Stossichia mirabilis* (Dkr.)

Inseln Bisucay, Calamianes (coll. Quadras No. 39) und Luban bei Mindoro (No. 46).

Gen. VIII. *Fenella* A. Ad.

54. *Fenella pupoides* A. Ad. var. *fuscoapicata* Nev.

Manila auf Luzon (coll. Quadras No. 47), ein Stück.

Diese Form hat $9\frac{1}{2}$ Umgänge und ist einfarbig hell hornbraun mit dunkel rothbrauner Spitze. Die Mittelwindungen sind mit 6, die letzte mit etwa 12 Spiralreifen umzogen; der Nahtreifen ist stärker markiert; schmale, wenig vorragende, ziemlich weitläufig gestellte Radialrippen zeigen sich nur auf den 4—5 mittelsten Umgängen. Der Spindelrand ist stark verdickt, etwas ausgebrettet und umgeschlagen, die Mündung unten leicht ausgegossen. — Alt. $3\frac{7}{8}$, diam. max. $1\frac{1}{2}$ mm.

Von europäischen Arten hat sie einige Aehnlichkeit mit *Thapsiella rufa* (Phil.), ist aber schlanker, hat weniger tiefe Nähte und minder kräftige Radialskulptur.

III. Die Eulimiden (I. Nachtrag).

Gen. I. *Eulima* Risso.

13. *Eulima imitatrix* Bttgr.

Pinamonajan auf Cebú (coll. Quadras No. 113a).

14. *Eulima spina* Bttgr.

Inseln Balagnan (coll. Quadras No. 96) und Jinituan (No. 98) bei Mindanao.

16. *Eulima oblonga* Bttgr.

Inseln Balagnan (coll. Quadras No. 101) und Jinituan (No. 97 und No. 99) bei Mindanao.

Gen. III. *Mucronalia* A. Ad.

1. *Mucronalia fulvescens* (A. Ad.).

Pinamonajan auf Cebú (coll. Quadras No. 113), häufig in Größen von alt. $3-4\frac{1}{4}$ mm.

Drei neue Pneumonopomen aus Borneo.

Von
Prof. Dr. O. Boettger.

Opisthostoma otostoma n. sp.

Char. Differt ab *O. cespignyi* H. Ad. t. majore, apert. inverse auriformi, perist. superne angulatim valde protracto. — T. sinistrorsa, anguste umbilicata, elongato-conica, tenera, pallide fulva, sursum sanguinea; spira conica, lateribus fere strictis; apex obtusulus. Anfr. $6\frac{1}{2}$ perconvexi sed haud angulati, sutura profunda sejuncti, eleganter tenuilamellati, lamellis compressis, distantibus, albidis, ultimus initio constrictus, tum tubam solutam, sigmoideam, sinistrorum simulque sursum flexam efficiens. Apert. libera subverticalis, inverse auriformis, intus circularis; perist. duplicitum, exterum expansum, inferne subangulatum, superne in lobum rotundato-triangularem latere dextro emarginatum elongatum.

Alt. $2\frac{1}{4}$, diam. max. $2\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. $1\frac{1}{4}$, lat. apert. 1 mm.

Fundort. Auf einem hohen Kalkberge bei Brunei, N. W.-Borneo, in kleiner Anzahl mit *O. pulchellum* Godw.-Aust., *O. baritense* E. A. Smith, *Diplomatina ereretti* E. A. Smith, *D. baritensis* E. A. Smith u. a. Kleinschnecken zusammen gefunden und von Herrn Dr. O. Staudinger & A. Bang Haas in Blasewitz-Dresden mir zur Bestimmung eingeschickt.

Durch den aufwärts gerichteten spitzlichen Lappen des Mundsaums oben an der Mündung scharf von *O. cespignyi* H. Ad. und *baritense* E. A. Smith verschieden, zwischen denen die neue Art in Bezug auf die Form des Gewindes die Mitte hält. Der Lappen zeigt sich im Verhält-

torfer 1893), näher als dem mir gleichfalls von dort vorliegenden *A. jagori* v. Mts. Hauptunterschied von *A. hochstetteri*, der auf Westjava beschränkt sein und auf Borneo durch unsere Art ersetzt werden dürfte, ist der mehr aufgeblasene, nicht schwach kantige letzte Umgang, die glatte, ungestreifte Gehäusebasis, das Fehlen jeder Spur von Spiralstreifung und die kleine, zirkelrunde, nicht verrundet-quereckige Mündung. Der noch unbeschriebene *A. fultoni* v. Moell. aus Borneo weicht durch Skulptur und doppelt so lange Nahtröhre ebenfalls ab, und *A. galbanus* Godw.-Aust. von den Niah Hills Borneos hat flachere Umgänge und ebenfalls Spiralskulptur.

Alycaeus rimatus n. sp.

Char. T. aut punctato-rimata aut angustissime perforata, turbinata, solidiuscula, sordide virenti-flava, opaca; spira alta regulariter conica lateribus strictiusculis; apex acutiusculus. Anfr. $5\frac{1}{2}$ ad suturam profundissimam declives, inferne convexi, oblique costulati, costulis sigmoideis, et in interstitiis spiraliter striatuli, ultimus superne planatus, peripheria subangulatus, basi gibba modice inflatus. $2\frac{3}{4}$ mm ante aperturam modice constrictus, tum denuo inflatus, pone stricturam tubulo $\frac{1}{2}$ mm longo, suturam non excedente munitus, $\frac{1}{8}$ altitudinis testae vix superans. Anfr. ultimus aequem costulatus ac caeteri, costulis ad stricturam densioribus, inter stricturam et aperturam distinctis sed magis irregularibus. Apert. obliqua magna, truncato-ovalis, fere latior quam alta; perist. appressum album, extus subduplicatum, internum leviter protractum, externum late expansum, superne antrorum et inferne sinistrorum angulatim protractis, regione calli recedente.

Alt. $5\frac{1}{4}$ — $5\frac{1}{2}$, diam. max. $4\frac{1}{2}$ — $4\frac{3}{4}$ mm; alt. et lat. apert. 3, intus $1\frac{1}{2}$ mm.

Fundort. Brunei, N. W.-Borneo, mit *Opisthostoma otostoma* Bttgr. und *A. globosus* H. Ad. zusammen, in kleiner Anzahl von Herrn Dr. O. Staudinger und A. Bang Haas in Blasewitz-Dresden eingesandt.

Die Art erinnert nach direktem Vergleich an *A. hosei* Godw.-Aust. von den Busan Hills in Sarawak, ist aber nur geritzt, nicht eng genabelt, das Gewinde ist weniger schlank, der letzte Umgang mehr gewinkelt, die Mündung grösser, der Unter- und Spindelrand viel breiter ausgeschlagen, nach links gezogen und an die Basis des letzten Umgangs angedrückt. Der javanische *A. jagori* v. Mts., der mir von den Djaunjangs Westjavas aus 2000' Höhe (leg. H. Fruhstorfer 1893) vorliegt, unterscheidet sich von der vorliegenden Art schon durch den ziemlich weiten Nabel, die grössere Breite der Gehäusebasis und das konkav sich aufsetzende Gewinde.

Limax Schwabii in Deutschland.

Von

Dr. E. G. O. Müller, Breslau.

Am 24. Mai dieses Jahres bestieg ich von Wölfelsdorf aus den Glatzer Schneeberg. Als ich ungefähr zwei Drittel des Weges nach der Schweizerei zurückgelegt hatte, erblickte ich mitten auf der Fahrstrasse eine grössere Nacktschnecke, deren prachtvoll ultramarinblaue Farbe sofort in die Augen fallen musste, und ich vermutete sogleich, dass ich einen Limax Schwabii Frauenfeld vor mir habe. Ich kannte ihn aus der Beschreibung, die mir Herr Merkel, welcher ihn in der Tatra fand, gemacht hatte. Da ich nie gehört hatte, dass er in Deutschland beobachtet worden sei, nahm ich an, dass ich das Glück gehabt hatte, dieses wirklich schöne und verhältnismässig grosse Tier zum ersten Male auf

deutschem Boden zu finden. Diese Annahme bestätigte sich auch, als ich die Schnecke, welche ich glücklich lebend und sehr munter nach Breslau brachte, Herrn Merkel zeigte, dem ersten Molluskenkenner Schlesiens, dessen äusserst sorgfältige gearbeitete Molluskenfauna im Manuscript vorliegt und voraussichtlich in nächster Zeit im Druck erscheinen wird. Er erkannte die Schnecke sogleich als einen *Limax Schwabii*, und auch die Arbeit von Frauenfeld in den Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien vom Jahre 1864 und die von Seibert in dem Nachrichtenblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft vom Jahre 1873 bestätigten dies auf das genaueste. Die Schnecke war in gestreckter Stellung 11—12 cm lang und erglänzte besonders in vollem Sonnenlicht im schönsten Ultramarinblau. Am lebhaftesten war der Mantel gefärbt, fast ebenso lebhaft war der untere Körperrand und am wenigsten der Rücken. Hier ist der blaue Farbstoff nur auf dem oberen Teile der Runzeln des Körpers vorhanden. Der untere Teil derselben ist schwarz und der Grund zwischen ihnen mehr oder weniger grau. Da die Schnecke sehr lebhaft war und sich Kartoffeln und Obst reichlich schmecken liess, so übergab ich sie dem Direktor des Breslauer zoologischen Gartens, Herrn Stechmann, und dieser nahm sie mit Dank an. Sie wurde in einem leeren Behältnis bei den Reptilien untergebracht und war das erste Wesen aus dem Reiche der wirbellosen Tiere, welchem diese Gunst zu Teil wurde. Bis jetzt hat sie sich recht wohl befunden und mehrfach habe ich die Wahrnehmung gemacht, dass sie das lebhafteste Interesse der Besucher erweckte. Seither ist *Limax Schwabii* von Frauenfeld, der ihn zuerst als Art konstatierte, am Gavornik in Mähren gefunden worden. Nach Schwab, dessen Namen er trägt, und Nowicki ist er gemein in der Tatra und Parreys will blaugefärbte Nacktschnecken in Kroatien bemerkt haben. Anderweitige Fund-

R. Friedländer & Sohn in Berlin, N.W. 6, Carlstrasse. 11.

In unserem Verlage erschien:

Fauna der in der paläarctischen Region

(Europa, Kaukasien, Sibirien, Turan, Persien, Kurdistan, Armenien, Mesopotamien, Kleinasien, Syrien, Arabien, Egypten, Tripolis, Tunesien, Algerien und Marocco)

lebenden Binnенconchylien

von

Dr. Carl Agardh Westerlund.

**Preis des vollständigen Werkes: 7 Hefte nebst
Supplement und Register M. 67,50.**

Einzelne Hefte werden bis auf Weiteres noch abgegeben:

Heft I: Familiae Testacellidae, Glandinidae, Vitriidae et Leucochroidae. M. 3,50. Heft II: Genus Helix. M. 16. Heft III: Genera Buliminus, Sesteria, Pupa, Stenogyra et Cionella. Mit Beilage: Nachträge u. Berichtigungen zum Heft I, 3-6. M. 7,50. Heft IV: Subfamilia Pupina. Genera Balea et Clausilia. M. 7,50. Heft. V: Familiae Succinidae, Auriculidae, Limnaeidae, Cyclostomidae et Hydrocenidae. M. 5,50. Heft VI: Familiae Ampullaridae, Paludinidae, Hydrobiidae, Melanidae, Valvatidae et Neritidae, M. 5,50. Heft VII: Malacozoa Acephala. M. 11,50. Supplement: Zusätze zu Heft I—VII. M. 6. Allgemeines Register. M. 4,50.

Gleichzeitig erschien als Ergänzung zu dem Hauptwerke:

Katalog der in der Palaearetischen Region lebenden Binnенconchylien

von Dr. Carl Agardh Westerlund.

224 und 128 Seiten, gross-8. Preis 12 Mark.

Nautilus pompilius mit dem weichen Thier,

vorzüglich in Sprit conservirt, offeriren wir je nach Grösse zu Mark: 150—200. Wir machen auf dieses seltene Vorkommen ganz besonders aufmerksam und bitten eventuelle Reflektanten sich die Gelegenheit des Erwerbes nicht entgehen zu lassen.

Berlin N. W. Luisenplatz 6.

Linnæa.

Den dieser Nummer beiliegenden Prospekt des Herrn **Hermann Rolle** in Berlin empfehlen wir geneigter Beachtung.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.,
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

19. 5.
16

Nachrichtsblatt

der Deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Sechsundzwanziger Jahrgang.

Redigirt

von

Dr. W. Kobelt

in Schwanheim (Main).



FRANKFURT AM MAIN.

Verlag von MORITZ DIESTERWEG.

1894.

Inhalt.

	Seite
<i>Böttger, Prof. Dr. O.</i> , Die Binnenschnecken der griechischen Inseln Cerigo und Gerigotto	1
<i>Quadras, J. F. et O. F. de Moellendorff</i> , Diagnoses specierum novarum a J. F. Quadras in insulis Mariannis collectarum	13, 33
<i>Thiele, Dr. J.</i> , Ueber die Zungen einiger Landschnecken	23
<i>Goldfuss, Otto</i> , Beitrag zur Molluskenfauna der Mansfelder Seen und deren nächster Umgebung	43
<i>Clessin, S.</i> , Beschreibung neuer Arten aus der Umgebung des Issykul-Sees	64
<i>Böttger, Prof. Dr. O.</i> , Ein neuer Amphidromus aus Borneo . .	66
<i>Pfeiffer, Carl</i> , Kleine Reiseergebnisse	68
<i>Quadras, J. F. et O. F. de Moellendorff</i> , Diagnoses specierum novarum ex insulis Philippinis	81, 113
<i>Naegele, G.</i> , Einiges aus dem östlichen Kleinasien	104
<i>Böttger, Prof. Dr. O.</i> , H. A. Pilsbry und die Verwandtschaftsbeziehungen der Helices im Tertiär Europas	107
<i>Simroth, Dr. H.</i> , Nachträge zu dem Aufsatze von F. Neumann: die Molluskenfauna des Königreichs Sachsen	130
<i>Sterki, Dr. V.</i> , Eine merkwürdige Form von <i>Pupa pagodula</i> Desm.	133
<i>Martens, E. von</i> , Diagnosen neuer Arten	135
<i>Rolle, H.</i> , Diagnosen neuer Arten	136
<i>Weiss, Dr. A.</i> , Die Conchylienfauna der altpleistocaenen Travertine des Weimarisch-Taubacher Kalktuffbeckens und Vergleich der Fauna mit aequivalenten Pleistocaenablagerungen	145, 185
<i>Westerlund, Dr. C. Ag.</i> , Specilegium Malacologicum. Neue Binnen-Conchylien aus der palaearctischen Region V	163, 190
<i>Löns, H.</i> , Funde aus dem hannoverschen Oberharz	177
<i>Möllendorff, O. F. von</i> , Zur Molluskenfauna der Sulu-Inseln . .	205
<i>Pässler, W.</i> , Zur Verbreitung der <i>Pupa ronnebyensis</i> Westerl. in Norddeutschland	216
<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0; border: 0.5px solid black;"/>	
Literaturbericht	25, 71, 139, 179, 216
Mitgliederverzeichniss	74



Druck von Peter Hartmann, Schwanheim a. M.



neuer Clausilien und ein Buliminus in der Literatur verzeichnet waren. Auch die Liste einer kleinen Anzahl von Arten, die Fräulein Jos. Thiesse ums Jahr 1886 auf Gerigo aufzammeln liess und mir mittheilte, ist noch nicht veröffentlicht worden. Es war darum mit Freude zu begrüssen, dass Herr Dr. Theob. Krüper, Konservator am Zoologischen Museum zu Athen, Herrn Leonis aufforderte, die beiden Inseln anfangs April 1891 gewissenhaft auf Schnecken abzusuchen. Nach Gerigotto zu gelangen ist schwierig, da sich nur sehr selten eine Gelegenheit findet, die ein- bis zweitägige Bootfahrt von Gerigo aus zu unternehmen. Zur Ueberfahrt musste Leonis eine Barke auf 5 Tage mieten. Die Hinfahrt war sehr günstig, bei der Rückfahrt aber überfiel ihn ein Sturm auf halbem Wege. Gerigotto erhebt sich steil bis zu 375 m aus dem Meer; am nördlichen Ende befindet sich ein kleiner Hafen. Strandsand gibt es nirgends. Es leben 70--75 Menschen auf der Insel zerstreut, die stark mit Creta Kontrebande treiben. Während seines dreitägigen Aufenthaltes auf Gerigotto sammelte Leonis mit einem gemieteten Grettenser auf allen Stellen der Insel, so dass ihm wohl keine Molluskenart entgangen sein dürfte. Mit sehnsüchtigen Blicken betrachtete er oft die noch mit Schnee bedeckten Berge Cretas! Das Meer war ringsum belebt mit Janthinen und Velellen, Thieren, die seit 16 Jahren dort nicht mehr gesehen worden sein sollen.

I. Liste der Arten von Gerigo.


1. *Helix (Anchistoma) lens* Fér.

Wird auf Creta durch *Hx. barbata* Fér., eine sehr distinkte, aber seltene Art ersetzt.

2. *Helix (Anchistoma) lenticula* Fér.

3. *Helix (Euparypha) pisana* Müll.

4. *Helix (Xerophila) pyramidata* Drap.



14. *Clausilia (Albinaria) cytherae* n. sp.

Char. Aff. *Cl. compressae* P. var. *subcompressae* Btigr. (vide infra), sed multo minor, gracilior, anfr. mediis sublaevigatis, cervice densius costulato-striato. — T. breviter rimata periomphalo modico, fusiformis, gracilis, solidula, lactea, irregulariter fusco strigata, nitidiuscula; spira turrita lateribus aut strictis aut convexiusculis; apex obtusulus, fusco-niger, nitidus. Anfr. $10\frac{1}{2}$ — $11\frac{1}{2}$ subplanati, lente accrescentes, sutura bene impressa, minutissime subcrenulata disjuncti, embryonales 2 laeves, sequentes densestriati, medii 3 obsolete striati vel laevigati, ultimus deorsum angustatus, latere subcompressus, acute et dense costulato-striatus, basi anguste sulcatus et gibboso-subbieristatus, striis crebris subparallelis, medio cervice bifidis, ad suturam multifidis ornatus, cristis subtus parallelis, superiore minus distincta, latiore, inferiore validiore longiore, subcompressa, subtus gibboso-arcuata, duplo densius striata. Apert. obliqua basi recedens, breviter rhomboideo-oblonga, utrimque leviter angulata, intus hepatica, sinulo lato; perist. continuum, breviter solutum, modice expansum, haud reflexum, albo leviter labiatum. Lamellae parvae subaequales, conniventes; supera submarginalis, parum alta, compressa, spiralem disjunctam profundam non transcurrens; infera profunda, alte sita, e basi callosa arcuatim ascendens, intus bipartita; parallela obsolete; subcolumellaris inconspicua. Sub principali subprofunda, valida lunella dorso-lateralis brevis, superne hamiformi-recurva sicut clausilium apice rotundato-acuminatum oblique intenti distincte conspicua. — Alt. 12—14, diam. max. $2\frac{1}{8}$ mm; alt. apert. 3, lat. apert. $2\frac{1}{8}$ mm.

Auf Gerigo, in der Nähe der Stadt Kapsali, selten (comm. Th. Krüper 1891).

Bemerkungen: Die Art könnte zur Noth noch als eine besonders kleine, schlanke, auf den Mittelwindungen glatte oder nahezu glatte Varietät der *Cl. compressa* Pfr. aufgefasst werden, die die leicht glänzende Schale der var. *calcarea* Bttgr. und die Nackenskulptur der gleich zu beschreibenden var. *subcompressa* Bttgr. angenommen hat, aber es fehlen alle Uebergänge zu ihr, so dass ich es vorziehe, sie vorläufig artlich getrennt zu halten. Von *Cl. cerigottana* Bttgr. trennt sie sich durch viel geringere Grösse, kräftiger entwickelten oberen Nackenkiel und weniger langoblonge Mündung.

15. *Clausilia (Albinaria) compressa* Pfr. typ.
und var. *calcarea* Bttgr.

Neben diesen beiden findet sich noch als dritte Form eine var. *subcompressa* n.

Char. Differt a typo t. distinctius fusco variegata et tessellata, apice spirae minus attenuato, anfr. $10\frac{1}{2}$ — 11, ultimo basi bieristato, eritis minus distinete subtus conniventibus nec contiguis, costis cristarum acutioribus, non confluentibus, apert. paulo majore. — Alt. $15\frac{1}{2}$ — 17, diam. max. $3\frac{3}{4}$ mm; alt. apert. $3\frac{3}{4}$, lat. apert. $2\frac{1}{2}$ mm.

Auf Gerigo anscheinend häufiger als die typische Form (comm. Th. Krüper 1891).

16. *Clausilia (Pupillifera) confusa* Bttgr.

17. *Ancylus pileolus* Fér.

II. Liste der Arten von Gerigotto.

1. *Amalia (Malinastrum) cretica* Simr.

2 erwachsene Stücke.

2. *Leucochroa candidissima* Drap. var. *insularis* n.

Char. Differt a typo Gallico t. minore, anfr. $4\frac{1}{2}$ convexioribus, sutura profundiore disjunctis, anfr. ultimo

initio hanc angulato, ad aperturam magis deflexo, apert. angustiore non circulari, marginibus supero et basali subparallelis. — Alt. 10—10 $\frac{1}{2}$, diam. max. 14 bis 15 $\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. 5 $\frac{3}{4}$ —6 $\frac{1}{2}$, lat. apert. 8 $\frac{1}{2}$ bis 9 mm.


Auf Cerigotto nur an einer beschränkten Stelle häufig.

Bemerkungen: Die Art ist neu für ganz Griechenland und die Form auch sonst von erheblichem Interesse. Sie zeigt nämlich deutlich konvexe Umgänge und tiefere Nähte als alle mir vorliegenden zahlreichen Formen der *L. candidissima* Drap. und namentlich als die kleinen, in der etwas gedrückten Mündung sonst noch am meisten mit ihr übereinstimmenden Stücke der var. *hierochuntina* Boiss. aus Damaskus.

3. *Helix (Euparypha) pisana* Müll.

4. *Helix (Cressa) cerigottana* n. sp.

Char. Differt ab omnibus speciebus affinibus anfr. spirae 6 arelius volutis et colore fere unicolore, varicibus nullis. T. anguste umbilicata, umbilico $\frac{1}{9}$ — $\frac{1}{10}$ latitudinis testae aequante, subdepresso-globosa, fragilis, sordide corneo-flavescens, fascia peripherica obsoletissima pallida cineta, striga variciformi ante aperturam flava cineta, parum nitens; spira sat elata, conico-convexa; apex acutiusculus. Anfr. 6 lente acrescentes, convexiusculi, sutura bene impressa, clariore disjuncti, valide et subregulariter striati, obsoletissime spiraliter lineolati et punctis impressis irregularibus hic illuc malleolati, hanc setosi, ultimus bene rotundatus, supra et infra subaequaliter convexus, antice valde descendens, $\frac{2}{3}$ altitudinis testae aequans. Apert. diagonalis exciso-ovata; perist. expansum intus roseolabiatum, marginibus convergentibus modice approximatis, callo levi conjunctis, supero subhorizontali, dextro bene



fere cylindratum abiens. Apert. obliqua exciso-subcircularis; perist. simplex, acutum, intus late et crasse albolabiatum, marginibus conniventibus, basali ad insertionem non incrassato et vix dilatato. — Alt. $7\frac{1}{2}$ bis $9\frac{1}{4}$, diam. max. $11-13\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. $4\frac{3}{4}$ bis $5\frac{3}{4}$, lat. apert. $5\frac{1}{4}-6\frac{1}{4}$ mm.

Auf Cerigotto, häufig (comm. Th. Krüper 1891).

Diese Form steht der westeretischen *H. subvariegata* v. Maltz. sehr nahe und gehört nach direktem Vergleiche mit ihr in dieselbe engere Gruppe, hat aber einen Nabel, der $\frac{1}{6}$ der Gehäusebreite beträgt, während die cretische Art einen solchen von nur $\frac{1}{8}-\frac{1}{9}$ Gehäusebreite besitzt, und weicht auch in dem kegelförmigeren Gewinde und der mehr kreisförmigen, weniger ausgeschnittenen Mündung ab.

7. *Helix (Macularia) vermiculata* Müll.

Ein besonders dickschaliges Stück auch in subfossillem Zustande.

8. *Helix (Pomatia) figulina* Rossm.

Kommt nur noch in subfossillem Zustande auf der Insel vor. Leonis fand sie in altgriechischem Gemäuer zwischen gebrannten Ziegelsteinen.

9. *Buliminus (Pseudomastus) pupa* Brug. var. *ventriosa* Bttgr.

Auf Cerigotto häufig in einer Form von etwa alt. 16, diam. max. $7\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. 7, lat. apert. 5 mm. Annähernd ebenso bauchige Formen kenne ich nur noch von Nezerà in Achaia.

var. *ehrenbergi* Pfr.

Diese Varietät scheint nur noch subfossil vorzukommen. Ein Spratt'sches Originalexemplar meiner Sammlung hat alt. 20, diam. max. $9\frac{1}{2}$ mm; die grössten vorliegenden Stücke messen alt. $21\frac{1}{2}$ bei diam. max. 10 mm. *Bul. ehrenbergi* Pfr. ist absolut weiter nichts wie ein besonders

grosser, oblonger *Bul. pupa* Brug. und der Vorläufer und Stammvater der kleineren und kürzeren var. *ventriosa* Bttgr., zu der Uebergänge, wenn auch nicht reichlich, in subfossilem Zustande vorliegen. An eine zweimalige Besiedelung der Insel mit Formen von *Bul. pupa* zu verschiedenen Zeiten ist somit nicht zu denken.

10. *Buliminus (Brephealus) zebra* Oliv. typ.

Leonis hat diese Art auf Cerigotto nicht gefunden, aber ich besitze ein Stück, das von der Insel stammen soll, aus der Hand Spratt's (comm. 1884).

11. *Stenogyra (Rumina) decollata* L. var. *truncata* Kob.

Noch kleiner und schmäler als die kleine festländisch-griechische Form. — Alt. 22—24, diam. max. 7—8 mm.

12. *Clausilia (Albinaria) cerigottana* n. sp.

Char. Aff. *Cl. compressae* Pfr., sed gracilior, lactea, anfr. mediis sublaevibus, cristis cervicis nullomodo conniventibus, superiore obsoletiore, apert. angustius oblonga. — T. leviter rimata, turrito-fusiformis, solidula, lactea, aut unicolor aut irregulariter corneo-variegata aut rarius hic illic fusco flammulata, nitidusculta; spira saepe subito attenuata, subregulariter turrita; apex acutus, nigrescens, nitidus. Anfr. 12—14 planulati, sutura parum profunda, in anfr. superioribus crenulata disjuncti, embryonales 2 laeves, sequentes dense costulato-striati, medii 3 laeves vel laevigati, ultimus deorsum angustatus, latere subcompressus, costulatus, basi sulcatus et gibboso-subbicristatus, costulis crebris undulatis medio cervice bifidis, ad suturam multifidis

ornatus, cristis subtus non convergentibus, superiore obsoleta, inferiore longa, arcuata, subcompressa, densius costulata. Apert. perobliqua basi recedens, rhomboideo-oblonga, perangusta, multo altior quam lata, utrimque distincte angulata, intus hepatica, sinuolo lato subquadrato; perist. continuum, brevissime solutum, leviter expansum, haud reflexum, albo leviter labiatum. Lamellae parvae subaequales, conniventes; supera non marginalis, parum alta, spiralem disjunctam non transcurrentis; infera profunda, alte sita, e basi callosa arcuatim ascendens, interdum subbipartita; parallela subcolumellarisque inconspicuae. Sub principali subprofunda, valida, antice in callum obsoletum flavescentem terminata lunella sublateralis brevis, superne hamiformi-recurva sicut clausilium apice rotundato-acuminatum oblique intuenti aegre conspicua. — Alt. $17\frac{1}{2}$ – 21 , diam. max. $3\frac{3}{4}$ – $4\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. $3\frac{3}{4}$ bis $4\frac{1}{4}$, lat. apert. $2\frac{1}{4}$ – $2\frac{3}{4}$ mm.

Auf Cerigotto, die einzige vorkommende Clausilie, häufig.

Bemerkungen: In Habitus und Färbung erinnert die Art merklich an *Cl. discolor* Pfr. von Cerigo, lässt sich aber immer leicht von ihr durch die aufallend langoblonge Mündung und die Andeutung zweier Nackenkiele unterscheiden. In Mundform und Nackenbildung nähert sie sich mehr der *Cl. compressa* Pfr. var. *subcompressa* Bttgr., gleichfalls von Cerigo, die aber stets überall kräftig kostuliert ist und deren Nackenkiele nach unten auch in den extremsten Formen immer etwas konvergieren. *Cl. cerigottana* ist aber jedenfalls die ihr nächstverwandte Art und vermittelt in gewissem Sinne zwischen den Formenkreisen der *Cl. discolor* Pfr. und *Cl. caerulea* Fé. Die Skulptur des Nackens hat auch einige Ähnlichkeit mit der von *Cl. kreglingeri* Pfr., doch ist die Basalfurche tiefer.

Resultate.

Vereinigen wir die vorstehend aufgezählten Arten zu einer Tabelle und vergleichen wir sie in ihrer horizontalen Verbreitung durch die Nachbargebiete, so erhalten wir:

Arten von Cerigo und Cerigotto.	Oriechisches Festland	Cerigo	Cerigotto	Gretu
1. <i>Amalia cretica</i> Simr.	○	○	+	+
2. <i>Leucoscozia candidissima</i> Drap.	○	○	+	○
3. <i>Helix lens</i> Fér.	+	+	○ ○	○ ○
4. „ <i>lenticula</i> Fér.	+	+	○ ○	○ ○
5. „ <i>pisana</i> Müll.	+	+	+	+
6. „ <i>cerigottana</i> Bittgr.	○ ○	○ ○	+	○
7. „ <i>cretica</i> Fér.	○ ○ ○	○ ○ ○	+	+
8. „ <i>porcifoloma</i> Bittgr.	○ ○	○ ○	+	○
9. „ <i>pyramidata</i> Drap.	+	+	○ ○	○ ○
10. „ <i>vermiculata</i> Müll.	+	+	+	+
11. „ <i>aspersa</i> Müll.	+	+	○ ○	+
12. „ <i>figulina</i> Rossm.	+	○ ○	+	○
13. <i>Buliminus pupa</i> Brug.	+	+	+	+
14. „ <i>zebra</i> Oliv. (mit v. <i>compacta</i>).	+	+	+	+
15. „ <i>bergeri</i> Roth	+	+	○ ○	○ ○
16. <i>Stenogyra decollata</i> L.	+	○ ○	+	+
17. <i>Oreula dolium</i> Brug.	+	+	○ ○	+
18. <i>Modicella philippii</i> Cantr.	+	+	○ ○	○ ○
19. <i>Clausilia discolor</i> Pfr.	+	+	○ ○	○ ○
20. „ <i>grayana</i> Pfr.	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
21. „ <i>cerigottana</i> Bittgr.	○ ○	○ ○	+	○
22. „ <i>clythereae</i> Bittgr.	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
23. „ <i>compressa</i> Pfr.	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
24. „ <i>confusa</i> Bittgr.	+	+	○ ○	○ ○
25. <i>Ancylus pileolus</i> Fér.	+	+	○ ○	○ ○

Von 17 Arten, die auf Cerigo vorkommen, weisen somit 14 auf einen Landzusammenhang, resp. auf eine Besiedelung von Morea aus hin, während nur 6 Arten mit Creta gemeinsam und 3 eigenthümlich sind. Dagegen weisen von 12 Arten, die Cerigotto besitzt, 6 aufs griechische Festland und 7 auf Creta, während 4 Arten für die Insel eigenthümlich sind. Mit Cerigotto hat Cerigo von 25 Arten nur 4 gemein, und zwar nur weitverbreitete Formen, die sowohl auf dem Festlande, als auch auf Creta und auf vielen anderen Inseln vorkommen. Daraus können wir mit Sicherheit schliessen, dass der Einbruch des Meeres zwischen Morea und Creta ein bereits sehr alter ist, da sich auf Cerigo etwa $\frac{1}{6}$, auf Cerigotto $\frac{1}{3}$ aller vorkommenden Arten zu neuen Species umwandeln konnte, und da beiden Inseln trotz anscheinend nahezu gleichen Existenzbedingungen von 25 Arten nur 4, also weniger als der sechste Theil, gemeinsam sind. Nach den von uns gefundenen Zahlen können wir es aber auch mit grosser Wahrscheinlichkeit aussprechen, dass die Meeresstrasse zwischen Cerigo und Cerigotto sehr alt ist, dass der zweite Einbruch des Meeres zwischen Cerigotto und Creta jünger und dass der dritte Einbruch zwischen Cerigo und Morea verhältnissmässig am jüngsten sein muss.

Diagnoses

specierum novarum a J. F. Quadras in insulis Mariannis
collectarum scripserunt

J. F. Quadras et O. F. de Moellendorff.

1. *Lamprocystis (Microcystina) denticulata* Q. et Mlldff.

T. imperforata, conoideo-globosa, tenuis, pellucida, levissime striatula, pallide flavescens; spira fere semi-globosa apice obtuso. Anfractus 5 convexiusculi, sutura anguste marginata discreti, lente accrescentes, ultimus basi subapplanatus, medio paullum excavatus. Apertura fere verticalis, late elliptica, valde excisa, peristoma simplex acutum, margine columellari calloso, reflexiusculo, appresso; columella superne tuberculo dentiformi sat valido munita.

Diam. maj. 4, alt. 3,25 mm.


2. *Patula fusca* Q. et Mlldff.


T. modice sed aperte umbilicata, umbilico $\frac{1}{4}$ diametri adaequante, lenticularis, tenuis, striis transversis pliciformibus et lineis spiralibus valde confertis sculpta, opaca, fusca; spira parum elevata. Anfr. 4 planiusculi, infra medium subconcavi, lente accrescentes, sutura profundiuscula discreti, acute carinati, carina crenata ad suturas paullum exserta, ultimus vix descendens, basi convexiusculus, circa umbilicum indistincte angulatus. Apertura modice obliqua, securiformis, peristoma simplex, acutum.

Diam. maj. 6. min. 5,5, alt. 2,75 mm.

3. *Patula rotula* Q. et Mlldff.

T. aperte umbilicata, umbilico $\frac{2}{7}$ diametri adaequante, discoidea, tenuis, striis transversis, lineis spiralibus tenuissimis maxime confertis et costulis arcuatis sat





8. *Tornatellina quadrasi* Mlldff.

T. imperforata, ovato-globosa, tenuis, pellucida, subtiliter striatula, nitidula, pallide luteo-cornea; spira parum elevata apice obtusulo. Anfr. 3¹/₂, vix convexiusculi, rapide accrescentes, ultimus magnus, tumidulus. Apert. modice obliqua, ovalis, peristoma simplex acutum margine columellari levissime reflexo, appreso. Lamella parietalis valde elevata, spiraliter intrans, columella valde lamellatim dilatata, basi angulo recto profunde excisa.

Diam. maj. 2, alt. 2.5 mm.

9. *Tornatellina (Lamellina) microstoma* Q. et Mlldff.


T. subrimata, oblongo-conica, tenuis, subpellucida, subtiliter striatula, parum nitens, luteo-cornea; spira turrita, lateribus convexiusculis, apice acuto. Anfr. 6¹/₂ planiusculi, sutura parum impressa discreti, lente accrescentes, ultimus pone aperturam spiraliter impressus, subsulcatus. Apertura sat obliqua, rhomboidea; peristoma simplex, acutum, margine columellari paullum dilatato, patente; columella valde spiraliter torta, lamellatim intrans, superne excisa, processu dentiformi extus porrecta. Lamella parietalis modice elevata intus longe producta, palatalis una breviuscula, a margine remota.

Diam. 1.75, alt. 3.5 mm.

In junioribus columella trilamellata, lamella parietalis magis elevata, anfractus ultimus costis transversis internis denticulatis 3 sat distantibus in adultis omnino evanescentibus munitus.

10. *Tornatellina (Lamellina) subcylindrica* Q. et Mlldff.

T. non rimata, subcylindraceo-turrita, subtiliter striatula, tenuis, subpellucida, nitidula, luteo-cornea; spira sensim



aequans. Apert. modice obliqua, fere exakte ovalis, peristoma rectum acutum, columella subuplicata.
Diam. 8, alt. 13,5, apert. long. 10, lat. 5,5.

13. *Succinea (Amphibina) piratarum* Q. et Mlldff.

T. ovato-oblonga, tenuis, confertim plicato-striata, indistincte decussatula et malleata, luteo-cornea, apice fulvo. Anfr. 3 convexi, ultimus valde descendens, superne paullum applanatus. Apert. modice obliqua, acuminato-ovalis.


Diam. 7, alt. 11,25, apert. long. 8, lat. 5 mm.

14. *Melampus (Signia) quadrasi* Mlldff.

T. ovato-oblonga, solida, sulcis spiralibus profundiusculis confertis et striis transversis pliciformibus undique granulata, opaca, brunnea; spira convexo-conoidea apice mucronato, peracuto. Anfr. 9 plani, sutura appressa, lacerata discreti, ultimus $\frac{4}{5}$ altitudinis adaequans, supra medium obtuse angulatus, infra medium subimpressus, plerumque albobitaeniatus. Apert. parum obliqua, angusta, oblonga, peristoma rectum, obtusum, intus sublimbatum, margine columellari valde callosocinerassato, appresso. Lamellae parietales 2, supera sat humilis, infera valida horizontalis, longe intrans, columellaris parva.

15. *Palaina taeniolata* Q. et Mlldff.

T. sinistrorsa aut rarius dextrorsa, rimata, ovato-conica, tenuiuscula, subpellucida, costulis acutis sat distantibus sculpta, flava, pallide fulva, fulva aut corneo-brunnea. Anfr. $6\frac{1}{2}$ convexi, penultimus magnus, ultimus initio constrictus, paullum devians, ad suturam plerumque taenia rufofusca interdum usque in anfractum penultimate producta ornatus, antice sat ascendens. Apert.



Var. contracta. Differt a var. praec., cui proxima, anfr. $6\frac{1}{2}$, labro validiore, basi magis effuso. Alt. 6,3, diam. 4 mm.

18. *Omphalotropis picta* Q. et Mlldff.

T. anguste perforata elongata pyramidata, tenuis, subpellucida, laevigata, nitens, rubello fulva flavidomarmorata; spira elongata, exacte conica. Anfr. 7 vix convexiusculi, sutura submarginata discreti, ultimus vix angulatus, basi crista compressa, bene exserta perforationi approximata cinctus. Apert. fere verticalis, acuminato-ovalis, peristoma haud expansum, intus sublabiatum.

Alt. 5,5, diam. 3,20 mm.

19. *Omphalotropis ochthogyra* Q. et Mlldff.


T. anguste perforata, graciliter conico-turrita, tenuis, subpellucida, laevigata, lineolis spiralibus microscopicis indistincte decussata, brunneo-cornea, flavidomarmorata; spira turrita apice obtuso. Anfr. 8 lente accrescentes, sutura submarginata discreti, supremi convexiusculi, sequentes planiusculi, ultimus paullo convexior, infra medium obtuse angulatus, basi carina valida, bene exserta perforationi approximata cinctus. Apert. fere verticalis, acuminato-ovalis, peristoma haud expansum, intus sublabiatum, basi ad carinam subeffusum, ad columellam profundiuscule sinuatum.


Alt. 6,5, diam. 3,5 mm.

var. attenuata, paullo gracilior, anfr. ultimo vix angulato, columella magis sinuata, lineolis spiralibus paullo magis distinctis. Alt. 6, diam. 3 mm.

20. *Omphalotropis laticosta* Q. et Mlldff.

T. angustissime perforata, graciliter elongato turrita, transverse striatula, lineis spiralibus confertis, tenuibus sed





Ueber die Zungen einiger Landdeckelschnecken.

Von

Dr. J. Thiele, Dresden (zoolog. Museum).

Un'er dem Material, das mir zu einem Ergänzungshefte zu Troschels „Gebiss der Schnecken“ dienen soll, befinden sich die Zungen einiger Landdeckelschnecken, die nach der Beschaffenheit dieses Organs die ihnen bisher angewiesene Stellung im System nicht beibehalten können. Da vermutlich bis zur Fertigstellung der Arbeit noch einige Zeit verfliessen wird, so will ich hier kurz mittheilen, wie die Reibplatten dieser Gattungen beschaffen sind.

Rolleia Crosse. Der Typus, *martensi* Maltz., war von Maltzan zu *Cyclotus* gestellt worden. Crosse schuf (Journ. Conchyliologie 39, p. 162—62) die neue Gattung dafür mit der Bemerkung, die Art könne weder zu *Cyclotus* noch zu *Neocyclotus* gerechnet werden und der Deckel weise sowohl auf *Neocyclotus*, als auch auf *Choanopoma* hin. Die Zunge nun ist der eines *Choanopoma*, wie sie Troschel (Bd. 1, T. 4, Fig. 18) abgebildet hat, ganz ähnlich: die mittleren Platten zugespitzt, die innere Seitenplatte schwach gezackt, die äusserste mit sehr zahlreichen (über 100) spitzen Zähnen. Demnach könnte *Rolleia* wohl als UnterGattung von *Choanopoma* angesehen werden.

Pseudocyclotus n. gen., Typus *novaehiberniae* Q. G. Diese Art, die nach der Schale einem *Leptopoma* ganz ähnlich sieht, aber einen kalkigen vielgewundenen Deckel besitzt, wurde von Pfeiffer zu *Cyclostomus* gestellt, während Tapparone-Canevari eine ähnliche Art als *Cyclotus* beschreibt; beides dürfte schon nach der Schalenform als unwahrscheinlich gelten. Durch die Beschaffenheit der Radula wird die Frage entschieden; darnach gehört die genannte Art zu den Cyclostomiden, und zwar ist sie am nächsten mit der Gattung *Omphalotropis* verwandt. Da sie mit dieser aber

zu überlassen. Ich bin gern bereit, ihnen Verzeichnisse der schon präparirten Zungen zu senden, um überflüssige Mühe zu vermeiden, und werde die Schalen nach Entnahme der Thiere natürlich unversehrt zurückschicken.

Literaturbericht.

Troschel, Dr. H., Das Gebiss der Schnecken zur Begründung einer natürlichen Classification untersucht. Fortgesetzt von Dr. J. Thiele. Zweiten Bandes siebente und achte Lieferung. Berlin, Nikolai 1891 und 92.


Nach einer Unterbrechung von mehr als zehn Jahren hat das von Troschel unvollendet gelassene Werk glücklich einen Fortsetzer gefunden, der es in würdiger Weise zu Ende führen wird. Die siebente Lieferung führt zunächst die Rhipidoglossen zum Schluss. *Magarita*, *Turcicula* Dall, *Machaeroplax* Friese, *Photinula* Ad., *Margaritella* n. gen. für die neuseeländischen seither zu *Photinula* gestellten Arten, die aber näher an *Margarita* stehen und diese Gattung in den südlichen Meeren repräsentiren, und *Minolia* Ad. — Eng an diese Familie an schliessen sich die Stomatellaceae, von denen nur *Gena lutea* L. untersucht werden konnte. Weiter folgen die Titiscaniidae, von Berg für die nackte *Titiscania limacina* gegründet, und die Scutellinidae, die nach Dall hierher, nicht zu den Patelliden, gehören. Den Schluss der Abtheilung bilden die Cocculinidae, deren Stellung unsicher bleibt und die vielleicht eher zu den Neritiden gehören.

Es folgen die Zygobranchiata, die Rhipidoglossen mit doppelter Kieme umfassend. Thiele trennt sie in Schismatobranchiata mit Spiralschale und Dicranobranchiata mit schüsselförmiger Schale. Erstere umfassen die Scissurellidae, die Pleurotomariidae, und die Haliotidae, deren Gattungen wahrscheinlich alle nur subgenerischen Werth haben, innerhalb deren sich aber zwei leicht verschiedene Gebissarten nachweisen lassen. Unter den Dicranobranchiaten lassen sich die beiden Familien Emarginulidae und Fissurellidae nicht ganz leicht aufrechterhalten und sind durch Uebergänge verbunden. Behandelt werden die Gattungen *Subemarginula*, *Hemitoma*, *Emarginula*, *Parmophorus*, *Puncturella* bei den ersteren, und *Glyphis*; *Fissuridea*, *Lucapinella*

Fissurella, *Cremides*, *Fissurellidea*, *Macrochisma* bei den anderen; Die drei ersten Gattungen der Fissurelliden bilden eine eigene den Emarginuliden näher stehende Gruppe.

Die Dokoglossa werden auf die Patellidae, Acmaeidae und Lepetidae beschränkt. In der Familie Patellidae werden unterschieden die Patellinae mit den Gattungen *Ancistromesus*, *Patellidea* n. gen. für *Patella granularis*, *Patellona* n. gen. für *P. granatina*, *Olana* Ad., *Cymbula* Ad., *Patellastra Monteros.*, *Patella* L., *Patellopsis* n. gen., auf eine unbestimmte Art vom Cap gegründet, *Helecion Montf.*, *Patinastra* n. gen. für *P. pruinosa*, *Patina* Leach; — die Nacellinae mit den Gattungen *Nacella* Schum., *Patinella* Dall., *Helecioniscus* Dall. — Bei den Acmaeidae wird ebenfalls unterschieden eine Unterfamilie Acmaeinae mit den Gattungen *Collisellina* Dall., *Collisella* Dall., *Scurria* Gray, *Lotia* Sow., *Tectura* M. Edw. und Acmaea Eschsch., und Pectinodontinae mit der einzigen Gattung *Pectinodonta*. — Die Lepetidae zerfallen in die Unterfamilien Lepetinae mit den Gattungen *Lepeta* Gray, *Pilidium* Forbes, *Cryptobranchia* Midd., Propylidiinae mit der Gattung *Propylidium*. Die Familie Addisoniidae enthält die einzige Gattung *Addisonia* Dall.

Die Chitoniden werden als Lepidoglossa vollständig von den Prosobranchiern getrennt und ihre Verwandtschaft mit den Würmern hervorgehoben. Besprochen werden die Gattungen *Chiton* L., *Amanrochiton* n. gen. für *Ch. olivaceus*, *Chondroplax* n. gen. für *Ch. granosus*, *Diochiton* n. gen. für *Ch. albilineatus*, *Poeciloplax* n. gen. für *Ch. glaucus*, *Sypharochiton* n. gen. für *Ch. pellis serpentis*, *Triboplax* n. gen. für *Ch. seabriula*, *Georgus* n. gen. für *Ch. rusticus*, *Clathropleura* Tib., *Rhyssoplax* n. gen. für *Ch. janeirensis*, *Radsiella* n. gen. für *Ch. punctatissimus*, *Tonicia* Gray, *Toniciosis* n. gen. für *Ch. pictus*, *Acanthopleura* Guild., *Rhopalopleura* n. gen. für *Ch. aculeatus* L., *Onychochiton* Gray, *Enoplochiton* Gray, *Schizochiton* Gray, *Ischnoplax* Carp., *Anthochiton* n. gen. für *Ch. tulipa*, *Lophyriscus* n. gen. für *Ch. textilis*, *Ischnoradsia* Carp., *Callistochiton* Carp., *Lophyrus* Saw., *Chaetopleura* Shnittl., *Leptopleura* n. gen. für *Ch. catenulatus* Sory., *Ischnochiton* Gray, *Lepidoradsia* Carp., *Stenochiton* Augas., *Stenoradsia* Carp., *Maugerella* Carp., *Stereoplax* n. gen. für *Ch. multicostatus*, *Stenoplax* Carp., *Rhodoplax* n. gen. für *Ch. squamulosus*, *Helioradsia* n. gen. für *Ch. gemma*, *Pallochiton* Dall., *Dinoplax* Carp., *Leptochiton* Gray,



Smith, Edgar A., Descriptions of new species of Helix, Rissoina and Actaeon. — From „the Conchologist“ vol. II. part 5.

Neu *Helix* (*Gonostoma*) *baudinensis* und *collingii* von Baudin Island in N. W. Australien: — *Rissoina Walkeri* von ebenda und *Actaeon reevei* (= *Tornatella suturalis* part. Reeve Conch. icon. vol. XV pl. II fig. 9a, b) unbekannten Fundorten.

Chia, Manuel de, Contribucion a la Fauna malacologica catalana. Moluscos terrestres et de aqua dulce de la provincia de Gerona. Gerona 1893, 8°, 23 S.

Es werden unter Ausschliessung der zweifelhaften und eines guten Theiles der Bourguignat'schen etc. Arten noch 143 sichere angeführt, mit genauer Angabe der Fundorte.


Drouët, H., Description de deux Unio nouveaux du bassin de l'Oronte. — In Revue biologique Nord de la France V. *Unio Barroisi* und *U. tinctus*, beide im Holzschnitt abgebildet.

Simroth, Dr. H., über einige Parmarion-Arten. Sep.-Abz. aus Dr. M. Weber. Zoologische Ergebnisse einer Reise in niederländisch Ostindien Band II. Mit Taf. 7 und 8. Neu *Parmarion Weberi*, p. 105 fig. 6, 9, 18, 19 von Java; — *P. Martensi*, p. 107 fig. 8, 20, 21, 22. Cambodscha; — *Microparmari* (n. gen.) *Strubelli*, p. 108 fig. 5, 11, 12, 15, Java; — *M. Austeni*; p. 109 fig. 4, 13, 14, Java.

Brusina, S., Saccaria. Nuovo genere di Gasteropodi terziari italo-francesi. In Bull. Soc. mal. ital. XVIII. p. 49—54. Die neue Gattung umschliesst *Melania oryza* Sism., *Paludestrina escoffierae* Tourn., *Hydrobia fontannesi* Capell. und *H. congenerana* Font.

Hedley, C. and Suter H., Reference List of the Land- and Freshwater Mollusca of New Zealand. — From Vol. VII (Ser. 2) of the Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Decbr. 1892.

Nach einer strengen Sichtung und bei ziemlich weiter Umgrenzung der Art bleiben für Neuseeland 184 Arten, mit wenigen, dazu unsicherer Ausnahmen alle der Insel eigenthümlich. Die Gattungen *Testacella*, *Daudibardia*, *Diplomphalus*, *Vitrina*, *Xanina*, *Patula*, *Hyalina*, *Zonites*, *Succinea*, *Helix*, *Bulimus*, *Rhabdotus*, *Limax*, *Arion*, *Cyclophorus*, *Leptopoma*, *Physa* und



The Journal of Conchology Vol. VII. pp. 7 und 8.


- p. 193. Cockerell, T. D. A., Arion occidentalis, an apparently new species.
p. 195. Standen, R. Land- und Freshwater Mollusca collected around
Portsalon, County Donegal, Ireland.
p. 208. Simroth, Dr. H., some remarks with respect to Mr. Wottons
Paper on the Life-history of Arion ater.
p. 210. Guppy, R. J., Lechinere, the Land- and Freshwater Mollusca
of Trinidad.
p. 232. Knight, G. A. Frank, Contribution towards a List of the Marine
Mollusca of the Upper Portion of Loch Lomond, Argyllshire.
p. 241. Marshall, J. T., Additions to British Conchology.
p. 265. Cooper, J. E. Note on Helix pisana in the Channel Island.
p. 266. Standen, R. and J. Ray Hardy, the Land- and Freshwater
Mollusca of Oban and the Island of Lismore.
p. 274. Milnes, Rev. Herbert, List of the Land- and Freshwater Shells
of Derbyshire.

Sterki, Dr. V., Observations on Vallonia. In Pr. Acad. N. S.
Philadelphia 1893 p. 234 pl. VIII (and Tryon Manual
(2) VIII pl. 32 und 33.)

Der Autor betrachtet Vallonia als Gattung und unterscheidet innerhalb derselben folgende Arten, welche sämmtlich in Tryon-Pilsbry l. c. abgebildet sind: pulchella Müll. nebst var. eumensis Gredl., hispanica n., persica Rosen; — excentrica n. = Hel. minuta Say ex parte; — adela Westerl.; — declivis n. = tenuilabris Glessin, nec Braun, nebst var. altilis n.; — pollinensis Paul; — costata Müll. nebst var. helvetica n., amurensis n., pyrenaica n., montana n.; — albula n. von Quebec; — parvula n. aus den Prairien; — tenera Reinh. = pulchellula Heude, China und Japan; — patens Reinh., China; — gracili-costa Reinh., Nordwestamerika; — perspectiva n., Appalachen; — tenuilabris Br.; — mioneeton Bttg., Caucasus, nebst var. schambalensis Rosen; — ladacensis Nevill nebst var. asiatica, Tibet.

Norman, the Rev. Canon, a Month on the Trondjem Fjord.
In Ann. Mag. N. H. (6) XII. 1893 p. 341.

Es werden 165 Arten aufgeführt, davon mehrere neu für den Fjord.
Für Jumala Friele wird der Name Ukko substituiert, da Jumala im Finnischen heute noch Gott bedeutet. Abgebildet werden Ukko turtoni var. tumida, U. schantaricus, Sipho gracilis var. glaber und proquinus.



p. 106. Vayssi  re, A., Note sur les coquilles de l'Homologyra polyzona et de l'Ammonicera Fischeriana.

Proceedings of the Malacological Society of London, edited by B. B. Woodward. Vol. I No. 1.

p. 5. Godwin-Austen, H. H., on the Genus Paryphanta. With pl. I.

p. 10. Smith, Edg. A., 6 new Species of Land-Shells from Annam. (*Macrochlamys promiseua*, *Rhyssota pergrandis*, *Hadra pachychilus*, *Amphidromus costifer*, *Cyclophorus eudeli*, *consociatus*, mehrere in Zinkographie abgebildet).

p. 14. Sowerby, G. B., notes on the genus Carinaria, with an enumeration of the species and the description of a new form. (Neu *C. elata*).

p. 17. Scharff, R. F., Note on the geographical distribution of *Geomalacus maculosus* Allm. in Ireland. — Mit Karte.

p. 19. Crouch, Walter, on the occurrence of *Crepidula fornicate* in Essex.

p. 20. Woodward, M. F., on the anatomy of *Ephippodonta Maedougalli Tate* — with pl. II.

p. 27. Sowerby, G. B., Description of a new species of Cancellaria from Penang (*Scalptia eudeli*).

p. 20. Sykes, E. R., on the Clausiliae of sumatra, with descriptions of two new species and a new variety. (*Cl. aenigmatica*, *mellilli* und *sumatrana* var. *vicaria*, alle abgebildet).

Eingegangene Zahlungen:

Tomlin, Ch., Mk. 12; — Riemenschneider, N., Mk. 6; — Seibert, E., Mk. 6; — Goldfuss, H., Mk., 6; — Clessin, O., Mk. 6; — Salm-Salm, A., Mk. 6; — Arnold, N., Mk. 6; — Schmidt, W., Mk. 6; — Wagner, W., Mk. 12; — Wohlgemuth, B., Mk. 5.37; — Metzger, M., Mk. 6; — Sterki, N. Ph., Mk. 16.49.

Anzeigen.

 Eine sehr reichhaltige, werthvolle Sammlung seltener Muscheln, vorzugsweise von den Molukken, ist wegen Sterbefalles preisw  rdig zu verkaufen. Fr. Off. unt. **F. No. 1** an M. Diesterweg, Verlagsbuchhandlung in Frankfurt a. M.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.,
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Sechsundzwanziger Jahrgang.

Abonnementpreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Diagnoses

specierum novarum a J. F. Quadras in insulis Mariannis
collectarum scripserunt

J. F. Quadras et O. F. de Moellendorff.

(Fortsetzung).

25. *Omphalotropis submaritima* Q. et Mlldff.

T. rimata, ovato-conica, solidula, subpellucida, luteo-corna, opaca, fere laevigata: spira modice elevata, fere regulariter conica apice obtuso. Anfr. fere 6, sat convexi, sutura profunda, subcanaliculata discreti, ultimus ad peripheriam obtuse carinatus, basi crista valida sed parum elevata, rimae valde approximata

cinctus. Apertura verticalis, acuminato-ovata, peristoma obtusum, intus sublabiatum, basi et ad columellam expansiusculum. Operculum normale.

Alt. 4, diam. 3 mm.

26. *Omphalotropis (Solenomphala) conica* Q. et Mlldff.

T. anguste perforata, elongate ovato-conica, tenuis, pellicula, laevigata, oleonitens, corneo-brunnea; spira fere exakte conica apice obtusulo. Anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura submarginata discreti, ultimus bene convexus, basi crista parum distincta rimae valde approximata cinctus. Apertura parum obliqua, acuminato-ovalis, peristoma rectum, obtusum, basi subeffusum, ad columellam reflexiusculum, profundiusculum sinutatum.

Alt. 4,75, diam. 3 mm.

Chalicopoma Mlldff. n. sect. *Omphalotropis*. Operculum corneum paucispirum extus, lamina tenui testacea vix spirali ad nucleus erosa obtectum.

Typ. *O. semicostulata* Q. et Mlldff.

27. *Omphalotropis (Chalicopoma) semicostulata* Q. et Mlldff.

T. angustissime perforata, globoso-conica, ad suturas costulis sat distantibus, fortibus, sublus evanescentibus sculpta, ceterum fere laevigata, nitens, lutea, brunnea- et albo-marmorata; spira sat elevata lateribus vix convexiusculis, apice obtuso. Anfr. 6 convexiusculi, sutura profunda, subdistinete marginata disjuncti, ultimus bene convexus, vix angulatus, basi carina parum distincta, perforationi valde approximata cinctus. Apertura vix obliqua, acuminato-ovalis, peristoma haud expansum, basi ad carinam paulum effusum, columella sat sinuata, superne dilatata, callo lato appressa. Operculum normale.

Alt. 6, diam. 4,5 mm.

28. *Omphalotropis (Chalicopoma) laevigata* Q. et Mlldff.

T. rimata, oblongo-conica, solidula, subtilissime striatula, nitens, flava, pallide marmorata; spira sat elongata, exacte conica. Anfr. 6 convexiusculi, sutura sat impressa discreti, ultimus bene convexus, basi crista distincta rimae valde approximata cinctus. Apertura parum obliqua, acuminato-ovalis; peristoma expansiusculum, paullum labiatum, ad columellam sinuatum. Operculum normale.

Alt. 5, diam. 3 mm.

29. *Omphalotropis (Scalinella) gracilis* Q. et Mlldff.

T. anguste perforata, graciliter turrita, tenuis, costis validis, sat distantibus et in interstitiis lineolis spiralibus tenuissimis sculpta, corneo-brunnea; spira valde elongata, sensim attenuata, apice subacuto. Anfr. $7\frac{1}{2}$ lentissime accrescentes, perconvexi, sutura valde profunda discreti, ultimus penultimo vix altior, $\frac{1}{5}$ altitudinis adaequans, antice paullum ascendens, basi haud cristatus. Apert. fere verticalis, late ovalis, sat excisa, peristoma simplex, rectum, marginibus callo tenui junctis, columellari paullum dilatato, patente.

Alt. 3,5, diam. 1,5 mm.

30. *Omphalotropis (Scalinella) pilosa* Q. et Mlldff.

T. anguste perforata, sat elongate turrita, tenuis, subpellucida, sat confertim costulata, undique pilis brevibus tenuibus hirsuta, laete flava; spira elongata, exacte conica apice acutulo. Anfr. 7 convexitates, lentissime accrescentes, sutura profunda discreti. Apertura modice obliqua, late acuminato-ovalis, peristoma rectum, obtusum, margine columellari subsinuato.

Alt. 3,5, diam. 1,5 mm.

Var. pilosella. T. graciliter elongato-turrita, sat distanter costulato-striata, flava, strigis corneo-rufis ornata.

Heteropoma Mlldff. n. gen. Realiidarum. Testa umbilicata, turbinata, parva, varie sculpta, operculum subspirale anfr. 4, nucleo subexcentrico, lamina interna tenuis cornea, externa testacea, haud sulco ab illa separata.

Typ. *H. quadrasi* Mlldff.

31. *Heteropoma quadrasi* Mlldff.

T. anguste umbilicata, turbinata, solidula transverse striatula, lineis spiralibus minutis confertis decussata, costis validis sigmoideis distantibus eleganter sculpta; spira sat elevata, conoidea, lateribus paullum concavis apice obtuso. Anfr. 5 convexi, ad suturam valde profundam, subcanaliculatam subangulati, tum planiusculi, ad suturam inferiorem obtuse cristati, ultimus ad peripheriam carina bene exserta, valida, obtusa, crenata, altera minore media basi, utraque usque ad peristoma producta cinctus. Apert. fere verticalis, late elliptica, peristoma multiplicatum, incrassatulum, haud expansum. Operculi lamina externa parum concava, radiatim striata, nucleo corneo, nitente, interna vix concava.

Alt. 3,33, diam. 3,25 mm.

32. *Heteropoma pyramis* Q. et Mlldff.

T. sat aperte umbilicata, pyramidata, solidula, subtilissime striata, costulis tenuibus foliaceis, distantibus sculpta, corneo-brunnea; spira valde elevata, fere exacte conica apice sat obtuso. Anfr. 6 lente accrescentes, sutura profunde canaliculata discreti, convexi sed lateraliter compressi, ultimus carinis 2 ad peripheriam et media

35. *Heteropoma fulrum* Q. et Mlldff.

T. anguste umbilicata, turbinata, solidula, subtilissime striatula, costulis tenuibus foliaceis distantibus sculpta; spira sat elevata lateribus fere strictis, apice obtusulo. Anfr. 5 perconvexi, sutura profunda subceanaliculata discreti, ultimus ad peripheriam et media basi carinis obtusis sed bene exsertis, per costulas subalatis cinctus. Apertura sat obliqua, subcircularis, peristoma simplex, obtusum, margo superus ad insertionem valde recedens, fere excisus, medio profunde sinuatus. Operculum illi H. quadrasi simile.

Diam. 2, 5, alt. 2,75 mm.

36. *Heteropoma glabratum* Q. et Mlldff.

T. perforata, turbinata, vix striatula, subnitens, luteocornea; spira sat elevata, fere exacle conica, apice obtusulo. Anfr. 5 convexi, sutura profunda discreti. Apert. fere verticalis, ovato-rotundata, peristoma simplex rectum obtusum. Diam. 2,3, alt. 2,3 mm.

Quadrasiella Mlldff. n. gen. Realiidarum. T. aperte umbilicata, depressa aut depresso-conica, varie sculpta, parva, operculum 2 laminis constitutum, interna tenuis, cornea, anfr. 3-4 nucleo subexcentrico, externa testacea aperturam superans, intus sulco ad recipiendum peristoma induita, spiralis, margine praecipue superne dilatato et revoluto.

Typ. *Q. mucronata* Mlldff.

37. *Quadrasiella mucronata* Mlldff.

T. late et aperte umbilicata, depressa, plerumque fere discoidea, tenuis, lineis spiralibus valde confertis et costulis tenuibus foliaceis sat distantibus sculpta, corneo fulva; spira plus minusve elevata, lateribus

concavis, apice inueronato, obtusulo, rubello. Anfr. 5 convexi, sat celeriter accrescentes, sutura profunde canaliculata discreti, ultimus prope suturam obtuse angulatus, ad et infra peripheriam carinis obtusis sed exsertis cinctus, costulis in carinis elongatis, inter carinas planulatus. Apertura fere verticalis, subcircularis, peristoma rectum obtusum. Operculum acuminato-ovale, anfr. 4 transverse plicato-striati, ultimus valde dilatatus undique aperturam superans et circa peristoma revolutum, superne longe patens.
Diam. maj. (sine operculo) 4 alt. 2.25, apert. diam. 1.5, operculi long. 2, lat. 1.66 mm.
Forma conoidea : Diam. 3.25, alt. 3 mm.

38. *Quadrasiella clathrata* Mlldff.

T. anguste sed aperte umbilicata, depresso-conica, solidula, lineis spiralibus elevatis et costulis acutis sat confertis clathrata, undique pilis brevibus hirsuta, corneo-brunnea; spira sat elevata, lateribus paullum concavis, apice acutulo rubello. Anfr. 5 convexi, sutura profunda discreti, ultimus paullum lateraliter compressus haud carinatus. Apert. fere verticalis, late ovalis, peristoma rectum, obtusum. Operculum extus valde concavum, anfr. 4, ultimus latissimus plicato-striatus, margine crenulatus, haud reflexus, intus lamellatum transverse costatus.

Diam. maj. 4, alt. 3.5, apert. long. 1.75, lat. 1.66, opere. long. 2.5, lat. 2 mm.

39. *Truncatella mariannarum* Q. et Mlldff.

T. distincte rinata, subcylindrica, solida, costis elevatis, obtusis, confertis, interstitia subaequantibus, 33—35 in anfractu ultimo sculpta, pallide lutea aut rubella; spira sensim attenuata. Anfractus qui supersunt 5

convexusculi, ultimus basi crista compressa obtusa usque ad peristoma producta cinctus. Apert. verticalis, oblique ovalis, peristoma modice expansum, superne subsolutum, basi ad cristam leviter sinnatum. Operculum valde convexum, radiatim plicatum.

Alt. 8,5, diam. 4 mm.

40. *Truncatella subauriculata* Q. et Mlldff.

T. rimata, cylindraceo-turrita, solidula, sat distanter costata, costis 23—25 in anfr. ultimo, luteo-albida; spira sensim attenuata. Anfr. superst. 5 convexi, sutura profunda discreti, ultimus basi crista compressa valida usque ad peristoma producta cinctus. Apertura verticalis, acuminato-ovalis, peristoma simplex, continuum, superne breviter adnatum, sat expansum, basi ad cristam leviter sinuatum, breviter effusum. Operculum ut praec.

Alt. 10, diam. maj. 4 mm.

41. *Truncatella expansilabris* Q. et Mlldff.

T. vix rimata, turrita, solidula, subpellucida, costis validis substrictis interstitia aequantibus, ad suturas subtuberulatis — 31 in anfr. ultimo — sculpta, luteo-alba. Anfr. qui supersunt 5 sat convexi, sutura marginata discreti, ultimus antice paullum ascendens, basi crista crassula paullum exserta usque ad peristoma producta cinctus. Apertura verticalis, acuminato-ovalis, peristoma extus late expansum, basi sat effusum, profundiuscule sinuatum, ad columellam sat expansum, superne expansiusculum, breviter adnatum. Operculum extus valde convexum, radiatim plicatum.

Alt. 10,5, diam. 4,5 mm.

42. *Truncatella (Taheitia) parcula* Q. et Middff.

T. imperforata, fere cylindrica, solidula, subpellucida, alba, costis validis latiusculis distantibus — 13-14 in anfr. ultimo — sculpta. Anfr. superst. 4 planiusculi, ad suturam perprofoundam subtabulati, ultimus basi crista bene exserta crenulata in labrum externum desinente cinctus. Apertura verticalis, oblique ovalis, peristoma duplex, externum sat expansum, valde incrassatum, basi cum crista junctum, internum valde porrectum undique solutum expansiusculum.

Alt. 5,5, diam. 2,5 mm.

43. *Truncatella (Taheitia) lamellicosta* Q. et Middff.

T. non rimata, subcylindrico-turrata, tenuis, costis tenuibus, acutis, sat elevatis distantibus — 18 in anfr. ultimo — sculpta. Anfr. superst. 5 convexi, lente accrescentes, sutura profunda discreti, ultimus basi crista valida, valde compressa, lamellatum costata cinctus. Apertura verticalis, oblique ovalis, peristoma simplex, undique solutum, sat expansum, margine dextro sat effuso.

Alt. 7, diam. 2,75 mm.

44. *Truncatella (Taheitia) alata* Q. et Middff.

T. imperforata, elongate turrata, solidiuscula, lamellose costata, costis 22 in anfractu ultimo, albida; spira sensim attenuata, decollata. Anfr. qui supersunt 6 convexi, sutura profunda disjuncti, ultimus basi haud cristatus. Apertura verticalis, anguste ovalis, peristoma duplex, internum sat expansum, incrassatum, subporrectum, externum latissime expansum, sinuosum, superne magis dilatatum, alae instar patens. Operculum cartilagineum, extus conyexum, costulis lamelli-formibus radiatis ornatum.

Alt. 10, diam. fere 3, apert. c. perist. lat. 3, long. fere 4, alt. 3,5 mm.

45. *Georissa elegans* Q. et Mlldff.

T. conico-globosa, solidula, transverse striatula, corneo-fulva; spira sat elevata, lateribus convexiusculis, apice acutulo glabrato. Anfr. 4 convexi, medio subcompressi, pone suturam et infra peripheriam angulati, in angulis costulis aliformibus curvatis sculpti. Apertura diagonalis, truncato-ovalis, peristoma simplex obtusum, intus sublabiatum, margine columellari reflexo, callo latiusculo appresso. Operulum normale.
Alt. 2,5, diam. 2,5 mm.

46. *Georissa biangulata* Q. et Mlldff.

T. globoso-conica, tenuis, subtiliter striata, costulis tenuissimis membranaceis valde deciduis sculpta, corneo-lutescens aut flavescens. Anfr. 4 convexi, lateraliter compressi, supra et infra peripheriam obtuse angulati, in angulis alis brevibus curvatis ornati. Apertura valde obliqua, late ovalis, truncata, peristoma rectum obtusum, margine columellari reflexo, appresso.

Alt. 1,75, diam. 1,5 – 1,66 mm.

47. *Georissa laevigata* Q. et Mlldff.

T. ovato-conica, tenuis, subpellucida, vix striatula, nitidula, corneo-fulva; spira convexo-conoidea apice obtuso. Anfr. 4 convexitate celeriter accrescentes, sutura valde impressa disereti, ultimus magnus, tumidulus. Apertura sat obliqua, truncato-ovalis, peristoma simplex, acutum, margine columellari reflexo, callo late appresso.

Alt. vix 2, diam. 1,5 mm.

— — —

Beitrag zur Molluskenfauna der Mansfelder Seen und deren nächster Umgebung.

Von
Otto Goldfuss.

Der „Salzige See“, ein etwa 15 km. von Halle a. S., 6 km. von Eisleben entferntes, fast genau von Osten nach Westen sich erstreckendes Wasserbecken, liegt unter dem $51^{\circ} 30'$ nördlicher Breite und $29^{\circ} 20'$ östlicher Länge, 88,9 m über dem Spiegel der Nordsee; seine Länge beträgt 6,2 km, seine mittlere Breite 1,5 km.

Im Osten erweitert sich der See nach Norden und bildet hier den durch die sogenannte Teufelsbrücke abgetrennten Bindersee; einschliesslich dieser Erweiterung hat der See eine Flächenausdehnung von 8.797 □ km; seine durchschnittliche Tiefe beträgt 7–8 m, die nur an 4 trichterartigen Stellen bedeutend grösser ist.

So befinden sich im Bindersee zwei Einsenkungen, die eine Tiefe von 10 und 11 m zeigen, das Heller Loch mitten im See, Unterröblingen gegenüber ist 17,25 m tief und die Teufe westlich vom Seebad Oberröblingen weisst die grösste Tiefe mit 18 m auf.

Der Salzgehalt beträgt 0,15%, ist früher aber unzweifelhaft grösser gewesen; die Ursache dieses Salzgehaltes und sein allmähliches Abnehmen ist im See selbst zu suchen. In der grossen Mansfelder Trias-Mulde gelegen, besteht der Untergrund des Salzigen Sees aus unterem Buntsandstein, der auf Schichten von Zechstein ruht, welche Formation hauptsächlich aus Kalkstein, Gyps, Rauchwacke und Letten besteht. Im Zechstein befinden sich Salzlager, die durch das Wasser allmählich ausgelangt worden sind. Im Laufe der Jahrhunderte sind nun wohl die Salzlager erschöpft worden und der Salzgehalt des Sees, welch letzterer

ziemlich starken Abfluss durch die Salke in die Saale hat, ging zurück.

Es ist kein Zweifel dass die vorerwähnten trichterförmigen Einsenkungen im See auf diese Weise entstanden sind, das Wasser hat die Salzlager ausgelaugt, dadurch in den Gypsschichten Hohlräume geschaffen und nach und nach die sie überdeckenden Buntsandsteinschichten aufgelockert, die dann in diese Gypsschlotten eingestürzt sind.

Auf diese Ursachen sind jedenfalls auch die grossen Veränderungen, die sich seit Februar 1892 am Salzigen See bemerkbar machen, zurückzuführen; von diesem Zeitpunkte an sinkt das Niveau des Sees bald mehr, bald weniger, ohne wesentliche Unterbrechung und bis Ende October dieses Jahres ist ein Niedergang von etwas über 5 m constatirt worden.

Mit dem Sinken des Seespiegels stellte sich in den Mansfelder Bergwerken eine erhebliche Wassercalamität ein: einzelne Schächte sind vollständig unter Wasser gesetzt, und trotz ununterbrochener, mit Vollkraft betriebener Pumparbeit können die kolossalen Wasserhaltungsmaschinen bis dato die Schächte nicht wasserfrei und befahrbar machen.

Da ein, wenn auch nur mittelbarer Zusammenhang des Salzigen Sees mit den Bergwerken ohne Zweifel besteht, hat sich die Mansfelder Gewerkschaft, um nicht den Betrieb der Bergwerke ganz in Frage zu stellen, zu dem freilich sehr bedauerlichen Schritt veranlasst gessehen, den See auszupumpen, und durch das Salkebett in die Saale leiten zu lassen.

Das Enteignungs-Verfahren ist bereits zur Ausführung gekommen und die Vorarbeiten zur Trockenlegung des Sees sind in vollem Gange; sobald diese erledigt sind, wird sofort mit der Trockenlegung des Sees begonnen werden.

In unmittelbarer Nähe des Salzigen Sees, nur durch die sogenannten „Wach Hügel“ getrennt liegt der Sürze See;

seine Länge beträgt 5,2 km bei einer Breite von 800 m, sein Flächeninhalt 2,61 □ km. Die durchschnittliche Tiefe ist 4—5 m, nur an wenigen Stellen 7—8 m.

Der Salzgehalt beträgt 0,3%. Im Gegensatze zu dem Salzigen See, mit nur 0,15% Salzgehalt, führt daher der Sürre See seinen Namen mit Unrecht. Beide Seen stehen im Mühlbachthale durch einen Graben in gegenseitiger Verbindung.

Auch bei dem Süssen See ist namentlich in letzter Zeit ein stärkeres Fallen beobachtet worden, und konnte seit Februar 1892 bis 1. October 1893 ein Niedergang von 0,50 m nachgewiesen werden. Leider wird wohl auch dieser See dem Schicksal des Salzigen Sees verfallen, denn schon haben sich an seinem Ostende im Mühlbachthale Erdfälle und Spalten gezeigt.

Naturgemäß haben die gegenwärtigen Veränderungen an den beiden Seen auch in weiteren Kreisen ein sehr lebhaftes Interesse hervorgerufen, wie viel mehr in den Kreisen derer, die sich für Naturwissenschaften interessiren. Wie ungeheuer viel des Interessanten bergen nicht die Seen in ihren Tiefen an Urthieren, Würmern, Entomostrakten, Hydrachniden, Mollusken, welch stattliche Anzahl halophiler Käfer und Hemipteren finden sich an ihren Ufern und welch reiche Beute machte der Botaniker in schönen und seltenen Salzpflanzen. Auch die Vogelwelt war bis vor Kurzem sehr reich vertreten, viele Wasservögel haben sich aber seit Eintritt der Katastrophe schon vom Salzigen See zurückgezogen.

Mit der Trockenlegung des Salzigen Sees verschwinden zum grössten Bedauern aller Naturfreunde und Naturforscher die meisten dieser interessanten Thiere und Pflanzen, die nur den Seen und deren Salzgehalt ihr Dasein verdanken.

Wer sich eingehender über die Fauna, Geologie etc. der Seen informiren will, dem seien folgende Schriften empfohlen:

Dr. Otto Zacharias:

Zur Kenntniß der Fauna des Süssen und Salzigen Sees bei Halle a. S. (Separat-Abdruck aus: Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie XLVI 2. Leipzig bei Wilhelm Engelmann 1888.)

Wilhelm Ule:

Die Mansfelder Seen. Inaugural-Dissertation. Halle a. S. 1888. Druckerei des Waisenhauses.

Dr. W. Marschall:

Spaziergänge eines Naturforschers. Leipzig 1890 bei Arthur Seemann.

Dr. Wilhelm Ule:

Die Mansfelder Seen und die Vorgänge an denselben im Jahre 1892. Eisleben bei Ed. Winkler 1893.

Den ersten ausführlichen Bericht über die Molluskenfauna der beiden Seen gibt Dr. Reinhardt im Nachrichtenblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, Jahrgang 1871, Seite 2, bei Gelegenheit einer von den Herren Dr. von Martens, Schacko und Dr. Reinhardt unternommenen Excursion an die Ufer dieser Seen.

Kürzere Sammelnotizen finden sich ferner von mir im Nachrichtenblatt derselben Gesellschaft, Jahrgang 1881, Seite 160.

Das ausführlichste Verzeichniß veröffentlicht dagegen Dr. O. Zacharias in der Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie XLVI 2. 1888, worin die Sammelergebnisse Dr. Reinhardts, so wie die meinigen zu Grunde gelegt werden.

Es werden 24 Species, resp. Varietäten aufgeführt, die in den nachstehenden Aufzeichnungen von mir aber weit um das Doppelte vermehrt werden.

Obgleich nicht speziell, kommt auch Prof. Dr. Marschall in Leipzig in seinen bekannten „Spaziergängen eines Naturforschers“ auf die Molluskenfauna des Salzigen Sees zu sprechen.

Nachstehend das Verzeichniß aller der Wasser- und Land-Mollusken, die ich während eines Zeitraumes von 12 Jahren in den Seen und deren nächster Umgebung gesammelt habe.

Limnaea.

stagnalis L.

Häufig an der Erdeborner Spitze und im Bindersee.

, var. *turgida* Mke.

Bei Amsdorf, Wansleben und im Seeteiche.

, var. *lacustris* Stud.

In sehr gedrungenen Exemplaren, welche Stücke, die ich aus den Schweizer Seen besitze durchaus ähnlich sind.

Bei Amsdorf und in der Ostseite des Sees, in der Nähe der Kärnerbrücke.

auricularia Drap.

Bei Unterröblingen, an der Erdeborner Spitze und in ausserordentlich grossen Stücken im Bindersee.

lagotis Schr.

Besonders häufig in der Nähe des Flegelsberges und an der Kärnerbrücke.

, var. *janoriensis* Król.

Im Kanal zwischen dem Süßen und Salzigen See.

Wenn auch nicht als eine direkte Bewohnerin der Seen führe ich hier noch die interessante:

, var. *wimmeriana* Haz.

an, die ich in einem Steinbassin des Schlosshofes zu Seeburg sammelte.

orata Drap.

Im schlammigen Theile des Sees, in der Nähe der Kärnerbrücke und vereinzelt an der Erdeborner Spitze.

, var. *patula* Da Costa.

Bei Amsdorf. Nach Prof. Dr. Böttger eine der *L. baltica* L. sehr nahe stehende Form.

orata var. *Dickini* Kblt.

In grossen typischen Exemplaren im Bindersee.

var. *obtusa* Kblt.

Bei Seeburg im Süssen See.

peregra Müll.

In wenigen Exemplaren bei Unterröblingen.

var. *apricensis* Ad.

Nur an der Kärnerbrücke beobachtet.

Eine höchst interessante sehr eingeschnürte ausgezogene Form, die nach Prof. Dr. Böttger vollkommen typisch ist. (Vergleiche Rm. Kob. Iconogr. f. 1492).

palustris Müll.

Sehr verbreitet in den verschiedensten Formen. In grösster Vollkommenheit bis zu 26 mm Grösse finden wir diese Species in dem Salzigen See und in dem Verbindungskanale zwischen dem Salzigen See und in dem mit dem Salzigen See in Verbindung stehenden Seeteiche bei Wansleben. Fehlt der sandigen Nordseite des Sees gänzlich.

Vom Typus zweigen sich eine Menge Zwischenformen ab, je nachdem die Seeufer an den bezüglichen Fundstellen beschaffen: ob sie mit Rohr bewachsen, schlammig, sandig, steinig und mehr oder weniger dem Wellenschlag ausgesetzt sind. Als hervorragendste Formveränderungen nenne ich:

var. *corrus* Gml.

Gehört nicht direkt dem See an. In typischen Exemplaren in einem Steinbassin des Schlosshofes zu Seeburg.

var. *septentrionalis* Cless.

Bei Amsdorf und am stark bewegten Seeufer in der Nähe des Flegelsberges.

var. *turricula* Held.

An der Erdeborner Spitze, bei Wansleben und

Unterröblingen und im Bindersee, meist in abgestorbenen Exemplaren.

nautileus L.

Sehr häufig an allen geeigneten Stellen, auch im Süssen See bei Seeburg.

, var. *crista* L.

An der Kärnerbrücke in sehr grossen Exemplaren.

complanatus L.

Vereinzelt an der Kärnerbrücke.

Ancylus.

fluriatilis Müll.

var. *cornu* Gless.

Bei Oberröblingen, nur in abgestorbenen Gehäusen.

lacustris L.

Erdeborner Spitze und Kärnersee. Bei Seeburg im Süssen See nicht selten.

Bythinia.

tentaculata L.

In grossen typischen Exemplaren, bis zu 10—11 mm Grösse, an der Westseite des Sees und im Seeteiche bei Wansleben.

Eine abweichende kleinere 9—9½ mm grosse Form und in schöner bersteinartiger Färbung häufig im Bindersee.

, var. *producta* Mke.

Stark gewölbte und ausgezogene Exemplare bis zu 14 mm Länge an der Kärnerbrücke, bei Unterröblingen und an der Westseite des Sees.

Troscheli Paasch.

Wird von Dr. Reinhardt vom Süssen See angegeben.

Leachi Shepp. = *ventricosa* Gray.

Kärnerbrücke und Flegelsberg.

Aus diesen Gründen erklärt sich auch die unendliche Anzahl der die Ufer bedeckenden leeren Gehäuse.

Nehmen wir dagegen den entgegengesetzten Fall an, dass *Hydrobia ventrosa* ein Fossil sei, (vergleiche Clessin deutsche Excursions Mollusken Fauna, II. Auflage Seite 476) dann würden jeden Falls mit der Länge der Zeit, durch den starken Wellenschlag des Sees und die Unbilden der Witterung, die an den Ufern angeschwemmten Gehäuse zu Atomen zersplittet worden sein.

Wir werden daher zu dem Schlusse berechtigt, dass *H. ventrosa* keine fossile Species, sondern vielmehr als eine erst in der Neuzeit abgestorbene Bewohnerin unseres Sees zu betrachten ist, um so mehr da ein grosser Theil der zu Tausenden das ehemalige Seebett bedeckenden Exemplare ganz crystallklar, ein geringer Theil sogar noch die Epidermis besitzt.

Wie lange *Hydrobia ventrosa* den beiden Mansfelder Seen angehört, muss dahin gestellt bleiben, — doch neige ich mich zu der Ansicht hin, dass diese Species durch Seevögel, die seit jeher auf ihren Frühjahrs- und Herbstzügen hier Rast halten, von den benachbarten Meeren nach hier verschleppt worden ist.

In ausserordentlich grosser Zahl, namentlich dort wo die Ufer des Sees vorwiegend schlammig oder mit Rohr bewachsen sind, so an der Erdeborner Spitze, bei Ober- und Unterröblingen und im Bünzersee. Fehlt dagegen theils der sandigen Nordseite und dem theils steinigen Ufer der Ostseite beinahe gänzlich.

Weniger häufig im Süßen See bei Seburg, wo ich in den angeschwemmten Algen auch lebensfrische Gehäuse sammelte.

Valvata.

antiqua Sow.

In nur todten Exemplaren an der Erdeborner Spitze. A. Schmidt und Dr. Reinhardt geben solche auch aus dem Süßen See an.

piscinalis Müll.

Durch den niedrigen Wasserstand im verflossenen Jahre konnte ich diese Species in grosser Anzahl und in lebendem Zustande bei Oberröblingen einsammeln.

obtusa Stud.

Häufig bei Unterröblingen, an der Kärnerbrücke und im Bindersee.

Unterscheidet sich von der vorhergehenden Art durch das mehr zusammengedrückte Gehäuse, stumpferes Gewinde, die weniger tiefe Naht und namentlich durch den viel weiter geöffneten Nabel.

cristata Müll.

Vereinzelt an der Erdeborner Spitze. Im Süßen See durch Dr. Reinhardt nachgewiesen.

Neritina.

fluvialis L.

var. *halophila* Klett.

Sehr häufig an Steinen, sowohl im Salzigen als auch im Süßen See. In todten, sehr schön gefärbten Exemplaren massenhaft am Ostufer angeschwemmt.

Eine grössere typische Form in dem nunmehr trockenen Verbindungsgraben des Salzigen mit dem Süßen See.

Sphaerium.

rivicola Leach.

In nicht ganz ausgewachsenen Exemplaren im Bindersee bei Rollsdorf.

Calyculina.

lacustris Müll. Salziger See. (Dr. Reinhardt.)
Creplini Dkr.

Bei Oberröblingen in der Nähe des Seebades, aber vielfach in zerbrochenem Zustande.

Sehr erfreut war ich durch das Auffinden dieser in unsern heimischen Gewässern nur von wenigen Fundorten nachgewiesenen Species.

Von meinem alten Gönner und Freunde Dr. A. Schmidt in Aschersleben erhielt ich im Jahre 1852 eine Handzeichnung unserer critischen deutschen Pisidien und Calyculina Arten. Die Figur der C. Creplini stimmt in allen Theilen mit meinem neuesten Funde überein und wird vollständig durch die Umrisse gedeckt. Professor Dr. Böttger, dem ich Exemplare zur Begutachtung einsandte, determinirte mir solche ebenfalls als dieser Species angehörig.

Pisidium.

annicum Müll.

Häufig bei Oberröblingen in der Nähe des Seebades.
henslowianum Shepp.

Vereinzelt bei Oberröblingen.

pulchellum Jen.

Bei Oberröblingen.

nitidum Jen. var. *splendens* Baud.

Grösser, namentlich viel bauchiger und gerundeter als der Typus.

Bei Oberröblingen.

fontinale C. Pf.

Unterröblingen und am Fusse des Flegelsberges.

, var. *acuminatum* Cless.

In grossen charakteristischen Exemplaren bei Oberröblingen.

Erst im verflossenen Jahre, bei dem niedrigen Wasserstande des Salzigen Sees hatte ich Gelegenheit, Hunderte von Exemplaren einer genauen Untersuchung und Sichtung unterwerfen zu können, und kam zu der Einsicht, dass wir in den Mansfelder Seen nicht 1, sondern 5 verschiedene, an gewisse Localitäten der Seen gebundene Species, resp. Formen von Anodonten besitzen.

Bis auf eine Species, *A. manica* Serv. gehören diese Anodonten dem Formenkreise der *A. piscinalis* an, aber es ist keine darunter, die mit var. *rostrata* in Vergleich gezogen werden könnte.

Herrn Prof. Dr. O. Boettger in Frankfurt a. M., dem ich eine Serie der Mansfelder Anodonten über sandte, war so freundlich, diese einem genauen Ver gleiche zu unterwerfen.

Nach diesen Untersuchungen leben demnach in den beiden Seen:

Anodonta.

(Formenkreis der *A. piscinalis* Nilss.)

Journei Bgt.

Westerlund Fauna VII Malacozoa Acephala pag. 280.

Ist mit Originalexemplaren der *A. conferrigera* Schlüter, die in der Schlüterschen Sammlung liegen, identisch, da wie schon bemerkt diese Bezeichnung nur als Manuscriptnamen bekannt, muss sie auch nur als synonym mit aufgeführt werden.

Wurde von mir hauptsächlich in unmittelbarer Nähe der abgeflachten Ufer gesammelt. Der Hintertheil der Muschel meist mit Conserven bewachsen, daher der bezeichnende Schlüter'sche Name.

Besonders häufig an dem sandigen Nordufer des Sees, Oberröblingen gegenüber.

den Niedergang des Salzigen Sees und dessen Trockenlegung, die eine oder die andere der Land-Mollusken, namentlich die Gattungen *Succinea* in Mitteidenschaft gezogen wird — dürfte es von Interesse sein, in Nachstehendem auch eine Aufzählung der in nächster Nähe der beiden Seen lebenden Landbewohner zu geben.

Die Lebensbedingungen für die Landschnecken sind dort nicht gerade günstig zu nennen. Die flache Südseite des Sees zeigt wenig Baumwuchs, nur bei Oberröblingen findet sich am See ein kleines von einem Wasserlauf durchrieseltes Gebüsch. Die theils ebene Ostseite bei Wansleben wird nach der Kärnerbrücke zu theils durch den Flegelsberg begrenzt, wo an dem kurzen Gestrüpp *Helix striata* nicht selten vorkommt.

Günstiger gestalten sich die Verhältnisse an der Nordseite, namentlich an den Rändern des Bindersees nach Rollsdorf zu. Die Böschungen der Landstrasse und die, die dortigen Hügel einschliessenden Weinbergsmauern beherbergen manche Species.

Nicht unerwähnt lassen kann ich noch einen bewaldeten Hügel bei Seeburg, wo *Helix pomatia* vorkommt, und den dortigen Schlossgarten, als Fundort für kleinere Pupaarten, sowie eine kleine mit Buschwerk bewachsene Anhöhe an der Nordwest-Seite des Salzigen Sees, der sogenannten Erdeborner Spitze.

Die Ufer des Süßen Sees, theils von hohen Hügeln begrenzt, bergen einen grossen Theil der auch am Salzigen See lebenden Species.

Limax.

tenellus Nilss.

In der Nähe des Seeteiches bei Wansleben.

hispida L. var. *minor*.

In einer kleinen mir nur noch von Leissling bei Naumburg a. S. bekannten Form, in einem Gebüsche an der Erdeborner Spitze.

rubiginosa Zglr.

Häufig bei Rollsdorf, in unmittelbarer Nähe des Sees, im Mühlbachthal auf feuchten Wiesen.

striata Müll.

Allgemein verbreitet in der Umgegend der beiden Seen. Typische Exemplare am Flegelsberg bei Wanßleben.

, var. *nilssoniana* Bk.

In sehr grossen Exemplaren und mit weit geöffnetem Nabel an der Landstrasse nach Rollsdorf, an den Böschungen der Eisenbahn bei Oberröblingen, Wachhügel und an andern Orten.

hortensis Müll. Schlossgarten zu Seeburg.

nemoralis L.

Sehr häufig an Weinbergsmauern bei Rollsdorf, im Mühlbachthal und an der Kärnerbrücke.

Die Färbung ist vorherrschend eine gelbe, meist in der Bänderformel — — 3. 4. 5. und — — 3. — —, ungebänderte Stücke fehlen gänzlich.

, var. *albina*.

In einem sehr schönen Exemplare mit vollständig weißer Lippe und diaphanen Bändern im Mühlbachthal.

pomaticia L. Häufig bei Seeburg.

Buliminus.

detritus Müll.

Wird von Dr. Reinhardt in den Weinbergen an der Nordseite des Sees angegeben, mir ist dagegen nie ein Stück daselbst zu Gesicht gekommen und scheint daher diese Species von dort verschwunden zu sein.

Von dem Naturalienhändler W. Schlüter wurde diese Species Anfang der vierziger Jahre ebenfalls in dortiger Gegend und zwar an der Kärnerbrücke gesammelt, sie ist aber auch dort nicht mehr vorhanden.
tridens Müll. Häufig bei Rollsdorf und Seeburg.

Cionella.

lubrica Müll.

In einem Erlengebüsch bei Oberröblingen.

acieula Müll.

Bei Oberröblingen und im Mühlbachthal in lebenden Stücken gesammelt.

Pupa.

frumentum Drap.

Häufig an Weinbergsmauern, an der Landstrasse bei Rollsdorf.

muscorum Müll.

Sehr häufig unter Steinen am Seeufer bei Rollsdorf.
, var. *bigranata* Rssm.

Unter Steingerölle an der Erdeborner Spitze.

minutissima Hartm. und

costulata Nilss.

Beide Species gesellschaftlich an der Erdeborner Spitze und im Schlossgarten zu Seeburg.

Vertigo.

antirertigo Drap.

An der Erdeborner Spitze und im Erlenbusch bei Oberröblingen.

pygmaea Drap.

Unter Steinen am Flegelsberg, bei Seeburg und an der Erdeborner Spitze.

angustior Jeffr.

In wenigen Exemplaren bei Seeburg.

Succinea.

Bezüglich dieser Gattung ist mir keine Gegend in Sachsen und Thüringen bekannt, wo an einer so beschränkten Oertlichkeit, eine solche Mannigfaltigkeit von Formen vertreten wäre. Mit Ausnahme des kahlen Nordufers wird der See förmlich umrahmt von sämmtlichen in unserm Vereinsgebiete lebenden Species. Besonders häufig vertreten ist *S. Pfeifferi* Rissm., meist in unmittelbarer Nähe des Wasserspiegels, selbst auf im Seewasser schwimmendem Röhricht. Die Färbung ist eine sehr mannigfaltige, dieselbe schwankt von hellgelb bis ins bernsteinfarbige, nicht selten finden sich auch isabell- und chamoisartig gefärbte Gehäuse, welche Nuancen im Vereinsgebiete nur auf die Mansfelder Seen beschränkt zu sein scheinen.

Leider sind die Tage dieser interessanten Schnecken gezählt. Durch den Niedergang des Seespiegels wurden die schützenden Fundstellen, das Röhricht, dem Seeufer entrückt, und ist bereits der grösste Theil dieser Species dem Untergange anheimgefallen.

putris L.

Wird von Dr. Reinhardt von der Nord- und Südseite des Sees angegeben, wurde aber von mir dort nicht mehr aufgefunden.

„ var. *olivula* Baud.

Häufig an einem Wasserlaufe im Mühlbachthal bei Rollsdorf.

„ var. *Charpyi* Baud.

In einer stark aufgeblasenen, höchst eigenthümlichen Form, in einem Strassengraben in der Nähe des Bahnhofes bei Oberröblingen.

elegans Riso.

Im Röhricht in der Nähe der Kärnerbrücke. Durch Trockenlegung der Fundstelle bereits von dort verschwunden.

Pfeifferi Rsm.

Bei Amsdorf und an den Ufern des Bindersees.

, var. *recta* Baud.

Unter Steinen in unmittelbarer Nähe des Flegelsberges, dort sehr dickschalig, in ganz eigenthümlicher Färbung und in Exemplaren bis zu 17 mm Grösse. Ferner bei Wausleben und Rollsdorf.

, var. *brorispirata* Baud.

Bei Amsdorf, der Erdeborner Spitze und an Steinen in der Nähe des Seebades bei Oberröblingen.

, var. *contortula* Baud.

An Wiesengräsern, auf dem abgeflachten Seenfer an der Erdeborner Spitze. Im Mühlbachthal und bei Rollsdorf, auch nicht selten bei Seeburg am Süssen See.

, var. *propinqua* Baud.

Im Erlenbusch an der Erdeborner Spitze und am Verbindungskanal zwischen dem Süssen und Salzigen See.

oblonga Drap.

Wurde erst im vorigen Jahre von mir beim Seebade Oberröblingen aufgefunden.

Carychium.

minimum Müll.

Allgemein verbreitet in der Umgegend der beiden Seen.

Bei Aufstellung vorstehenden Verzeichnisses bin ich der systematischen Anordnung Westerlund's, in seinem Werke über die in der Palaearectischen Region lebenden Binnencnochtylien, gefolgt. Der Kürze wegen habe ich die Angaben der Familien, Subgenera und Gruppen fortgelassen.

Es leben sonach in den beiden Mansfelder Seen
an Wasser-Conchylien:

43 Species und 17 Varietäten,
an Land-Conchylien wurden in unmittelbarer Nähe der
Seen beobachtet:

35 Species und 9 Varietäten,
in Summa also

104 Species incl. Varietäten,
ein beredtes Zeugniss für die Reichhaltigkeit der Mollusken
der Provinz Sachsen und Thüringen an einer so beschränkten
Localität.

Wie Eingangs schon erwähnt ist bereits ein grosser
Theil der Seeconchylien zu Grunde gegangen. Das Schick-
sal des Salzigen Sees ist besiegelt, möge daher vorstehendes
Verzeichniß ein Wahrzeichen bleiben, da die Fauna des-
selben schon im nächsten Jahre der Vergangenheit ange-
hören dürfte.

Schliesslich kann ich nicht umhin, hierdurch sowohl
Herrn Professor Dr. O. Boettger in Frankfurt a. M., als
auch Herrn Dr. A. Westerlund in Ronneby, für die Durch-
sicht einiger kritischer Arten meinen verbindlichsten Dank
auszuspreschen.

Halle a. S. im Oktober 1893.

Beschreibung neuer Arten aus der Umgebung des
Issykkul-See's.

Von
S. Clessin.

Buliminus (Chontrulopsis) costatus m. n. sp.

Gehäuse: rechtsgewunden, tonnenförmig, mit kurzer
kegelförmiger Spitze, von röthlichbrauner Farbe, mit

scharfen quer über die Umgänge laufenden, sehr hervortretenden weissen Rippen. Umgänge 7, gewölbt, sehr langsam und gleichförmig zunehmend, der letzte etwas aufsteigend, nach unten fast gewinkelt; an demselben drängen sich gegen die Mündung zu die Streifen allmählich näher zusammen, verlieren an ihrer Schärfe und stehen die 3 letzten dicht gedrängt hart vor derselben; Mundsaum scharf, erweitert, nicht umgestülpt, weiss; Mündung eiförmig, ohne Zähne, ca. $\frac{2}{3}$ der Gehäusehöhe einnehmend.

Höhe 6 mm, Durchm. 3,8 mm.

Fundort: Semiretschye am Tschusflusse, (legit Peter Schmidt Mus. Petersburg).

Buliminus (Chondrulus) retrodens Mart. v. n. longulus m.

Gehäuse: fein geritzt; länglich-eiförmig; Umgänge 7, langsam und gleichförmig zunehmend, wenig gewölbt, ziemlich deutlich unregelmässig gestreift; Mündung halb-eiförmig, mit einem Zahn auf der Mündungswand. Die Spindel dick, an derselben nach unten ein kleiner Zahn aufgesetzt.

Höhe 8 mm, Durchm. 3,2 mm.

Fundort: Semiretschye, Kastek (legit. P. Schmidt. Mus. Petersburg).

Buliminus (Chondrulus) retrodens Mts. v. n. Schmidtii.

Gehäuse: fein geritzt; Umgänge 7, wenig gewölbt, rascher an Breite zunehmend, fein gestreift, erst gegen die Mündung werden die Streifen stärker und stehen etwas weitläufiger. Mündung verdickt, schwach erweitert; auf der Mündungswand ein kurzer, ziemlich zurückstehender Zahn; Spindelrand verdickt, mehr umgeschlagen.

Höhe 8,5 mm, Durchm. 4 mm.

Fundort: Semiretschye, Kastek. — (legit P. Schmidt, Mus. Petersburg).

Bemerkung. Die bauchige plumpere Varietät stimmt in

der Form des Gehäuses, die schlanke in der Bezeichnung mit der typischen Form überein.

Macrochlamys Schmidtii n. sp.

Gehäuse flach, Gewinde kaum hervortretend, glänzend, dünnsechlig, von horngelber Farbe, nicht genabelt, Umgänge $5\frac{1}{2}$, anfangs langsam zunehmend, sehr fein gestreift dann rasch sich erweiternd, durch eine wenig vertiefte Naht getrennt, der letzte fast $\frac{1}{3}$ des ganzen Gehäusedurchmessers einnehmend; Mund weit; Mundsaum scharf, geradeaus, der obere Rand weit vorgezogen.

Durchm. 15 mm., Höhe 5,3 mm.

Fundort: Ketwiengebirge, in der Nähe von Dorf Podgorny und in der Kapkak-Schlucht (legit P. Schmidt, Mus. Petersburg).

Caspia Issykkulensis n. sp.

Gehäuse: kaum geritzt, kegelförmig, aus 6 langsam und gleichmäßig zunehmenden, stark gewölbten und durch tiefe Naht getrennten Umgängen bestehend von denen der letzte wenig mehr als $\frac{1}{3}$ der Gehäuselänge einnimmt. Mündung eiförmig. Mundsaum nicht erweitert, nicht verdickt, zusammenhängend, oben der Anheftestelle der letzten Naht etwas vorgezogen.

Höhe 4,3 mm, Durchm. 2 mm.

Fundort: Im Issykkulsee. (legit P. Schmidt, Mus. Petersburg).

Ein neuer Amphidromus aus Borneo.

Von

Prof. Dr. O. Boettger in Frankfurt a. Main.

Amphidromus martensi n. sp.

Char. T. magna, sinistrorsa, brevissime rimata, late conico-ovata, solidissima, levissime dense striatula, subopaca.

laete citrina, vittis suturali et rimali latis albis, in anfr. (antepenultimo et) penultimo taenia unica basali, in anfr. ultimo taeniis 2 infraperiphericis latis olivaceo-viridibus, inferiore duplo latiore cincta, varicibus obscuris nullis; spira elate conica, latere dextro convexiore, apex pallide roseo-albus. Anfr. 6 convexiusculi, sutura distincta, appressa disjuncti, ultimus subventriosus, antice non ascendens, $\frac{1}{2}$ altitudinis testae fere superans. Apert. auriformis intus alba, taeniis duabus obscuris translucentibus, $\frac{8}{15}$ longitudinis testae aequans; perist. album, crassum, callosum, aequaliter late expansum et undique reflexum, marginibus callo parietali lato, albo junctis, sinistro aequaliter valide curvato, columella perpendiculari, callosa, leviter torta.

Alt. 49—53, diam. max. 27—30 mm; alt. apert. 26—28, lat. apert. c. perist. 19—21 mm.

Fundort: Berg Kina Balu, Nord-Borneo, von Herrn Dr. O. Staudinger und A. Bang Haas in 3 übereinstimmenden Exemplaren eingeschickt. Lebt zusammen mit einer zweiten Art, die sich von *A. perversus* L. var. *tenera* v. Mts., den ich von sicheren Fundorten aus Java vergleichen kann, nur durch ein Gewinde unterscheidet, das $\frac{1}{2}$ —1 Umgänge weniger zeigt.

Bemerkungen. Tritt wegen der breiten weissen Nahtbinde an *A. leucoranthus* v. Mts. heran, in der kurzen, bauchigen Gehäuseform an *A. interruptus* Müll., ist aber festshaliger als dieser, hat konvexe Umgänge, viel breiter umgeschlagenes Peristom und ganz andere Färbung und Zeichnung.

Kleine Reiseergebnisse.

Von

Carl Pfeiffer.

Die auf folgenden Blättern angeführten Arten verdanke ich einer kleinen Reise, die ich im Spätsommer vorigen Jahres in die Alpen unternommen hatte. Doch habe ich in Nachstehendem nur solche Arten aufgeführt, die durch ihr Vorkommen an sich oder durch eine Variation von besonderem Interesse sein dürften.

1. *Amalia nigra.*

Thier klein und schlank, auf der ganzen Oberseite, einschliesslich des Mantels, dunkel schwarz, an den Seiten am Sohlenrande etwas heller gefärbt. An diesem ziehen sich zwei schwarze Linien hin, die einer schmalen gelben zwischen sich Platz lassen. Auch die vom Mantelrande nach dem Sohlenrande verlaufenden Furchen (9 auf jeder Seite) sind gelb. Ein mässig stark hervortretender Kiel zieht sich vom Mantelrande bis zur Schwanzspitze, ebenso schwarz gefärbt als der Körper. Mantel hinten stark ausgebuchtet und sehr fein, fast nur mit der Loupe wahrnehmbar gekörnelt. Atemloch sehr klein, hinter der Mitte des Mantels liegend; vor ihm ist der Mantel bis zum Rande geschlitzt. Körper Skulptur aus feinen Runzeln bestehend, die am Mantel und Fussende deutlich ausgeprägt sind, wogegen das Mittelstück des Körpers ganz glatt ist, hier lassen sich nur ganz feine punktierte Linien mit der Loupe erkennen, die einander parallel dem Rücken entlang laufen. Sohle gelblich weiss, dreitheilig. Ueber die Fühler kann ich nichts Bestimmtes sagen, da das einzige von mir gefundene Thier dieselben im Spiritus eingezogen hat.

Fundort: Auf dem Gipfel des Mte Generoso (1695 m.

6. *Limnaea ovata var. diaphana.*

Gehäuse sehr dünnshalig und durchsichtig; Umgänge 3, durch eine nicht tiefe Naht getrennt; die beiden ersten Umgänge sind sehr klein und bilden ein punktsförmiges spitzes Gewinde; im Verhältnis zu diesem ist der letzte Umgang stark ausgebaucht. Mündung eiförmig, fast gerade; Mundsaum nur am unteren Rande nach Aussen gebogen; Spindel etwas gedreht.

Bemerkungen. Die Schnecke, die bei Bellaggio im Geniste des Comer Sees zahlreich vorkommt, gehört zu ovata, von deren Stammform sie sich durch grosse Feinheit der Schale und die Mündungsform unterscheidet.

7. *Limnaea ovata var.*

Ich fand diese merkwürdige Form bei St. Moritz im St. Moritzer See mit *Limnaea peregra* var. *Heydeni* Kob. zusammen. Die Exemplare zeigen bis zum letzten Viertel des letzten Umganges eine durchaus gleichmässige Entwicklung. Sie unterscheiden sich jedoch zum grösseren Theile schon auf dieser ersten Strecke von der Stammform ovata durch eine tief einschneidende Naht und stark gewölbte Umgänge. Von der oben erwähnten Stelle an werden die Umgänge mehr oder minder farblos und verfolgen entweder mit nicht zu grossen Abweichungen die erste Richtung oder erweitern sich bis zu der am meisten monströs gestalteten Form.

Bemerkungen. Für eine Varietät kann man diese Form nicht erklären, da sie offenbar durch eine plötzliche Veränderung des Wassers oder der Nahrung entstanden ist, doch bildet sie immerhin eine recht interessante Missgestalt in dem Formenkreis der L. ovata.

8. *Planorbis supracarinatus.*

Gehäuse scheibenförmig, oben konkav unten konvex, hellbraun-grünlich, sehr fein gestreift, mit einigen stärkeren

Anwachsstreifen, glänzend und durchsichtig. Umgänge 4, durch eine tiefe Naht getrennt, schnell zunehmend, an der Unterseite stark gewölbt, auf der Oberseite dagegen flacher; ihre obere Hälfte greift sehr weit über, so dass der letzte Umgang, von oben gesehen, dreimal so breit erscheint als der vorletzte, auf der Unterseite dagegen kaum doppelt so breit. Die Umgänge sind von einem stark ausgeprägten fadenförmigen Kiele an der Oberseite eingefasst — gerade entgegen *Pl. marginatus*. — Mündung eiförmig, sehr schief; Mundränder durch einen deutlichen Callus mit einander verbunden.

Fundort: Am Ufer des Comer Sees bei Bellaggio nur in toten Exemplaren im Genist.

Literaturbericht.

Smith, Edgar A., Observations on the Genus Sphenia, with descriptions of new Species. In Ann. Mag. N. H. (6) XII. 1893 p. 277.

Die Gattung wird auf 10 Arten reduziert, davon neu: Sowerbyi von Pondichery, similis unbekannten Fundortes, inaequalis von Singapore. Alle Arten sind Taf. XV A. abgebildet.

Smith, Edgar A., on the Land-Shells of the Sulu Archipelago.
In Ann. Mag. N. H. (6) XIII. pag. 49—60 pl. 4.

23 Arten, meist im Tavi-Tavi-Archipel der Sulu-Inseln gesammelt; der Charakter der Fauna ist entschieden polynesisch. Als neu beschrieben werden Trochonanina bongaensis p. 52 t. 4 und 2; — Chloritis sibutuensis p. 53 t. 4 fig. 4; — Cyclotus suluanus Möll. mss. p. 56 t. 4 fig. 7; — C. bongaoensis p. 57 t. 4 fig. 8. Ausserdem werden abgebildet: Macrochlamys angulata Möll. fig. 1; — Plectotropis squamulifera Möll. fig. 3; — Corasia aegrota Rev. var. fig. 5; — Amphidromus maculiferus var. fig. 9; — Diplomatina roebeleni Möll. fig. 11; — Helicina contermina Semp. fig. 6.

Smith, Edgar A., Reports on the Zoological Collections made in Torres Straits by Prof. A. C. Haddon 1888—89.
In Proc. Roy. Soc. Dublin 1890. — The Land-Shells.

Prof. Haddon hat nur wenige bekannte Arten mitgebracht, aber der Autor benutzt die Gelegenheit, um eine Zusammenstellung aller aus den Torres-Straits bekannten Arten mit genauen Fundorten zu geben.

Drouët, Henri, Unionidae de l'Espagne. Avec deux planches doubles. Extrait des Mémoires Acad. Dijon (4) IV année 1894.

Nach einer allgemeinen Uebersicht der spanischen süssen Gewässer und ihrer physikalischen Verhältnisse werden 48 Arten aufgeführt, davon neu: *Unio circinatus* p. 33 t. 1 fig. 6 von Valencia; — *U. rhysopygus* p. 37 t. 1 fig. 7 von Almenare; — *U. cameratus* p. 45 t. 2 fig. 8 aus Galicien; — *U. limosellus* p. 46 t. 2 fig. 4 aus Nordspanien; — *U. decurtatus* p. 47 t. 1 fig. 9 aus Duero und Tago; — *U. gravatus* p. 49 t. 2 fig. 6 unbestimmten Fundortes; — *U. almenarensis* p. 62 t. 1 fig. 2 von Almenare bei Castellon de la Plana; — *U. callipygus* p. 65 t. 2 fig. 2 aus dem Guadiana; — *U. turdetanus* p. 66 t. 1 fig. 4 von Moron bei Sevilla; — *Anodonta latirostris* p. 69 t. 1 fig. 8 aus dem Tordera bei Gerona; — *An. mollis* p. 70 t. 2 fig. 7 von Valencia und Gerona; — *An. adusta* p. 75 t. 1 fig. 3 aus dem Albufera von Valencia; — *An. glauca* p. 78 t. 1 fig. 1 aus Nordportugal und von Gerona; — *An. prasina* p. 79 t. 2 fig. 9 aus Minho und Tamega; — *An. nobilis* p. 80 t. 2 fig. 5 aus dem Albufera; — *An. bicolor* p. 81 t. 1 fig. 5 aus dem Albufera; — *An. valentina* p. 84 t. 2 fig. 3 aus dem See von Almenare; — *An. emacerata* p. 85 t. 2 fig. 1 aus dem Albufera.

Hedley, C., Pholas obturamentum, an undescribed Bivalve from Sydney Harbour. — In Records Austr. Mus. Vol. II No. 4. With pl. XIV.

Die seither als *Barnea similis* betrachtete Bohrmuschel ist gut von der Gray'schen Art aus Neuseeland verschieden.

*Hedley, C., on *Parmacochlea Fischeri Smith.* — In Macleay Memorial Volume No. 8 p. 201 pl. XXVII.*

Die Gattung gehört zu den *Helicarionidae*, ist aber generisch gut verschieden.

The Journal of Conchology, Vol. VII. No. 9.

- p. 289. Chaster, G. W. and W. H. Heathcote a Contribution towards a List of Marine Mollusca and Brachiopoda of the Neighbourhood of Oban.
p. 313. Milne, J. G. and Chas. Oldham, the Molluscan Fauna of the Bowdon District of Cheshire.
p. 325. Daniel, A. T., Hydrobia jenkinsi Smith in an Inland Locality.
p. 327. Taylor, Ino, W., Abnormal Clausilia perversa.
p. 328. Mason, Ph, Br., Variations in the Shells of the Mollusca.

Bucquoy, Dautzenberg et Dollfuss, les Mollusques marins du Roussillon. Vol. II Fasc. VIII et IX.

Enthalten die Veneridae und Petricolidae. Die nach einem neuen Verfahren hergestellten Tafeln sind ganz ausgezeichnet und zeigen ohne den störenden Glanz der Photographieen die feinsten Details.

Neue Mitglieder.

Herr **A. Weiss** in Heidelberg, Sandgasse 10; Herr Dr. **Arthur Krause** in Berlin S. O. Adalbertstrasse 77; Herr **W. Pässler**, städt. Lehrer in Berlin, O. Pallisadenstrasse 77; Herr **L. A. Paar** in Reutte (Tirol); Herr **Hans von Gallenstein**, k. k. Professor in Görz.

Eingegangene Zahlungen:

Boog-Watson Mk. 24.90; Fruhstorfer, B., Mk. 6.—; Merkel, B., Mk. 6.—; Krause, B., Mk. 6.—; v. Monsterberg, B., Mk. 6.—; Pässler, B., Mk. 6.—; Wehner, W., Mk. 6.—; Fietz, St., Mk. 6.—; Liebe, G., Mk. 6.—; Nighutsch, T., Mk. 6.—; Strubell, F., Mk. 6.—; Hesse, V., Mk. 6.—; v. Tschapeck, W., Mk. 5.92; Prinzing, U., Mk. 6.—; Rosen, A., Mk. 6.—; Protz, B., Mk. 12.—; Naturforschende Gesellschaft, Görlitz, Mk. 6.—; v. Koch, Br., Mk. 6.—; Scholvien, H., Mk. 6.—; Schacko, B., Mk. 6.—; Rolle, B., Mk. 6.—; Andreae, H., Mk. 6.—; Arndt, B., Mk. 6.—; Friedel, B., Mk. 6.—; v. Heimburg, O., Mk. 6.—; Heise, N., Mk. 6.—; Jetschin, P., Mk. 6.—; Konow, T., Mk. 6.—; Löbbecke, D., Mk. 6.—; Museum für Naturkunde, Berlin, Mk. 6.—; Schlüter, H., Mk. 6.—; Ponsonby, L., Mk. 6.—; Pfeiffer, G., Mk. 6.—; Petersen, H., Mk. 6.—; Zoolog. Institut, Kiel, Mk. 6.—; Naturwiss. Museum, Lübeck, Mk. 6.—; Wiegmann, J., Mk. 6.—; Dallatorre, J., Mk. 5.87; Weiss, H., Mk. 6.—; v. Lasser, T., Mk. 5.96; Nägele, W., Mk. 6.—; Neumann, E., Mk. 6.—; Schepman, R., Mk. 6.—; Westerlund, R., Mk. 6.—; Reinhardt, B., Mk. 6.—; Gysser, S., Mk. 6.—; Schedel, Y., Mk. 6.—; Paar, R., Mk. 6.—; v. Gallenstein, G., Mk. 6.—.

Verzeichniss der Mitglieder und Institute,

an welche das Nachrichtenblatt direkt versandt wird.

Inland.

Anholt, Westfalen.

Fürst zu Salm-Salm.

Bamberg.

von Monsterberg, k. preuss. Major z. D.

Berlin.

E. Friedel, Stadtrath, N. W. Paulstrasse 4.

Dr. Arthur Krause, S. O. Adalbertstrasse 77.

Linnaea, Naturhistorisches Institut, N. W. Luisenplatz 6.

Prof. Dr. E. von Martens, N. W. Paulstrasse 28.

Zoologische Sammlung des Königl. Museums f. Naturkunde,
N. Invalidenstrasse 43.

Pässler, Städt. Lehrer, O. Palisadenstrasse 77.

Albert Protz, N. W. Turmstrasse 12.

Prof. Dr. O. Reinhardt, N. Weissenburgerstrasse 4a.

H. Rolle, N. W. Emdenerstrasse 4.

G. Schacko, S. O. Waldemarstrasse 14.

Bitsch, Lothringen.

Pastor, Erzpriester.

Braunschweig.

Victor von Koch, Neue Promenade 21.

Bremen.

B. Schmacker, Dobben 61.

Breslau.

E. Merkel, Thiergartenstrasse 43.

Bützow, Mecklenburg.

C. Arndt, Oberlehrer.

Düsseldorf.

Löbbecke, Th., Rentier, Schadowstrasse 51.

Eberbach am Neckar.

H. Seibert.

Erfurt.

Rob. Neumann.

Frankfurt a. M.

J. Blum, Reuterweg 51.

Dr. O. Boettger, Seilerstrasse 6.

D. F. Heynemann, Schifferstrasse 53.

Dr. Kinkelin, Zeiselstrasse 7.

Dr. J. Krätzer, Liebigstrasse 37.

H. Roos, Bäckerweg 4.

Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft.

Br. Strubell, Schwindstrasse 9.

Gera.

Prof. Dr. Liebe.

Gohlis bei Leipzig.

Dr. H. Simroth.

Görlitz, Schlesien.

Naturforschende Gesellschaft.

Gotha.

F. Hocker, Rentamtassessor.

Halle.

Prof. Dr. K. von Fritsch, Margarethenstrasse 3.

O. Goldfuss, Ulestrasse 17.

W. Schlüter, Wuchererstrasse 8.

Hamburg.

H. Burmeister, Eimsbüttel, Eduardstrasse 39.

Hartwig Petersen, Makler.

Dr. G. Pfeffer, Rappstrasse 10.

W. Scholvien, St. Georg, an der Alster 79.

Hanau.

Wetterauische Gesellschaft für Naturkunde.

Heidelberg.

*Prof. Dr. A. Andreat, Ploeckstrasse 71.
A. Weiss, Sandgasse 10.*

Hohen-Wittlingen, Württemberg.

Dr. D. F. Weinland.

Jena.

Fritz Wiegmann, Apotheker.

Kassel.

K. Pfeiffer, Terrasse 20.

Kiel.

Zoologisches Museum der Universität.

Königsberg i. Pr.

Prof. Dr. M. Braun (K. Zoolog. Museum).

Leipzig.

P. Trübsbach, Stud. chem., Sidonienstrasse 9.

Lübeck.

Naturhistorisches Museum.

Meissen.

Schaufuss, Direktor des Museums.

München.

Graf Max von Otting, Ottostrasse 6.

Münden, Hannover.

Prof. Dr. Metzger.

Naumburg a. Saale.

Heise, Geh. Regierungsrath.

Dr. R. Schröder, Rektor.

Nordhausen.

Hermann Arnold.

C. Riemenschneider, Eisenbahn-Assistent.

Nürnberg.

Bauer und Raspe, Verlagsbuchhandlung.

Wiesbaden.

F. Schirmer, Bahnhofstrasse.

Würzburg.

C. Wehner, Eisenbahnenfunctionär.

Ausland.

Acireale, Sicilien.

G. Platania, Via S. Giuseppe No. 14.

Agram.

Spiridion Brusina, Vorsteher des Zoologischen Museums.

Ashabad, Russland.

Baron O. Rosen.

Basel.

Gust. Schneider, Zoolog. Comptoir.

Batavia, Java.

Fruhstorfer, German Consulate.

Bergen, Norwegen.

Hermann Friele.

Bozen.

Vinc. Gredler, Gymnasialdirektor.

K. Wohlgemuth, Laubengasse 62.

Bruxelles, Belgien.

Société royale malacologique.

Cardross, Dumbartonshire Schottland.

Rev. Boog Watson.

Cordoba, Süd-Amerika.

Prof. Dr. A. Döring, Universidad de Cordoba, Argent.
Republik.

Dublin.

Dr. R. F. Scharff, Leeson Park 22.

Folkestone, England.

Frau Dr. Fitz-Gerald, West-Terrace 10.

Görz.

H. v. Gallenstein, k. k. Professor.

Helsingfors, Finnland.

A. J. Mela.

Innsbruck.

Prof. Dr. K. W. v. Dallatorre.

London.

H. Fulton, S. W. 216 Kings Road.

G. K. Gude, N. 5. Giesbach Road Upper Holloway.

J. H. Ponsonby, Esq. S. W., St. James Street 16.

Edgar A. Smith, Esq., British Museum.

London zoological Society care of P. W. Slater Esq., Hanover Square.

Manila, Philippinen.

Dr. O. F. von Möllendorff, Deutsches Consulat.

Neapel.

Stazione zoologica.

New-Haven, Connecticut, U. St. of North-Am.

Connecticut Academy of Arts and Sciences.

New-Philadelphia, Ohio, U. St. of N.-A.

Dr. med. Sterki.

Paris.

H. Crosse, directeur du journal de conchyliologie, 25, rue Tronchet.

Dr. Le Sourd, directeur de la gazette des Hôpitaux, 4, rue de l' Odéon.

Philadelphia.

Academy of natural sciences. S. W. corner of Nineteenth and Race-Sts.

Pisa, Italia.

Società malacozoologica italiana.

Prag.

M. U. C. Bohumil Klika, Museumseleve.

Reutte, Tirol.

L. A. Paar.

Ronneby, Schweden.

Dr. C. A. Westerlund.

Rhoon b. Rotterdam.

M. M. Schepman.

Rio Grande do sul.

Dr. von Ihering Per Snrs: Pietzeker & Co.

Salzburg.

V. S. Lasser, Ritter von Taxenbach.

Theodosia Krim.

Dr. O. Retoswki, Staatsrath.

Trenesin i. Ungarn.

Dr. Karl Brancik, Comitats-Physikus.

Unter-Kulm, Schweiz.

Dr. J. Hofer.

Venedig.

P. Hesse, Calle della Madonna 4422.

Warschau.

W. Puppe, Senatorskastrasse 24.

Washington.

Wm. H. Dall, Esq., Smithsonian Institution.

Wien.

K. K. Naturwissenschaftl. Museum.

H. Tschapek, Hauptmann Auditor, III., Hauptstr. 65.

Dr. Anton Wagner, Regimentsarzt IX. Mußdorfer Str. 32.

Yokohama, Japan.

Jos. Schedel, Normal Dispensary, Main-Street 77.

Lamella parietalis valida, sat elevata, longe intrans, columellaris valida, subhorizontalis, dentes palatales 2 profundi.

Alt. 4, diam. 1.25 mm.

Hab. in insula Catanduanes.

2. *Ennea (Huttonella) cardiostoma* Q. et Mlldff.

T. rimata, subcylindracea, gracilis, costulis transversis flexuosis sculpta, spira cylindricaceo-turrita apice mammilliari, obtuso, glabrato. Anfractus 9 convexi, supra medium obtuse angulati, ultimus antice sat ascendens. Apertura verticalis, angusta, rotundato-triangularis, perist. valde incrassatum, continuum, superne subsolutum, margo externus ad insertionem recedens, medio protractus. Lamella parietalis parva, cum callo dentiformi marginis externi sinulum ovalem formans, columellaris parva, oblique intuenti conspicua. Alt. 4, diam. 1.25 mm.
Hab. ad vicum Boac insulae Marinduque leg. collector indigena.

3. *Ennea (Huttonella) otostoma* Q. et Mlldff.

T. sat aperte perforata, cylindrico-turrita confertim costulato-striata, sericina, hyalina; spira elongata, sursum sensim attenuata. Anfr. $8\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura sat impressa disjuncti, ultimus paullum distortus, antice sat ascendens, basi valde compressus. Apertura verticalis, auriformis, peristoma parum expansum, crassiuscule labiatum, margo externus superne nodulo crassiusculo munitus, cum lamella parietali modica, sed sat elevata sinulum subcircularem valde sursum protractum formans. Lamella columellaris crassa, dentes palatales 2 valde profundi. Alt. 5, diam. 1.5 mm.

Hab. in insula Catanduanes.

4. *Ennea (Diaphora) macrostoma* Q. et Mlldff.

T. aperte perforata, cylindrico-turrita, valde confertim et arcuatim costulato-striata, sericina, hyalina. Anfractus 8 modice convexi, ultimus antice breviter solitus, descendens et porrectus, basi compressus. Apertura parum obliqua, rotundato-rhomboidea, peristoma sat expansum, crassiuscule albolabiatum. Lamellae columellaris et

7. *Ennea (Diaphora) unicristata* Mlldff.

T. peranguste umbilicata, cylindraceo-turrila, tenuis, pellucida, hyalina, subtiliter costulato-striata, valde nitens; spira sursum parum attenuata, apice obtuso. Anfractus 8 modice convexi, sutura impressa disjuncti, ultimus distinctius costulatus, a quarta aut tertia parte solutus, deflexus et porrectus, lateraliter valde compressus, crista parum distincta cinctus. Apertura verticalis, rotundato-piriformis, peristoma latiuscule expansum, albolabiatum, margo externus superne profundiuscule sinuatus, cum lamella parietali valida longe intrante sinulum ovalem formans. Columella lamella sat humili munita. Alt. 9, diam. 2 mm.

Hab. in insula Coron archipelagi Calamianes dicti leg. cl. C. Roebelen.

8. *Ennea (Diaphora) bicristata* Mlldff.

T. anguste sed aperte cylindrice umbilicata, oblongo-turrita, tenuis, pellucida, subtilissime striatula, valde nitens, hyalina; spira sursum paullum attenuata apice obtuso. Anfr. 8 modice convexi, ad suturam impressam crenulati, ultimus distinctius striatus, pone aperturam confertim costulatus, a medio solutus, deflexus, porrectus, lateraliter valde compressus, basi distinete bicristatus. Apertura verticalis, rotundato-piriformis, perist. late expansum, albolabiatum, margo externus superne profundiuscule sinuatus, cum lamella parietali longe intrante sinulum ovalem formans, collumellaris per sulcum anfractus intrantem pseudolamellatus. — Alt. 8,5—11, diam. 3 mm.

Hab. ad rupem Bintuan insulae Busuanga leg. collector indigena.

9. *Vitrinopsis quadrasii* Mlldff.

T. depressa, tenuis, subtiliter radiatim striatula, nitida, pellucida, corneo-flavescens; spira planiuscula, apice obliqua, papillato. Anfr. 3½ rapide accrescentes, sutura appressa, distinete marginata disjuncti, planiusculi, ultimus magnus, sat dilatatus, convexior. Apert. diagonalis, ampla, cordiformis, perist. superne valde protractum,

tum bene arcuatum, ad columellam profundiuscule excisum. — Diam. maj. 14.5, alt. 6.5 mm.

Hab. ad vicos Margarin et Bulalacao insulae Mindoro nec non in insula Ilin.

10. *Vitrinoconus goniomphalus* Q. et Mlldff.

T. aperte et subcylindrice umbilicata, elate trochiformis, tenuis, confertum costulato-striata, corneo-brunnea; spira valde elevata, lateribus convexiusculis. Anfr. $8\frac{1}{2}$ planiusculi, lentissime accrescentes, carina sat exserta cincti, sutura subceanaliculata disjuncti, ultimus basi convexiusculus, circa umbilicum acute angulatus. Apert. diagonalis, securiformis, perist. rectum, obtusum, incrassatulum, ad columellam reflexiusculum. — Diam. maj. 8, alt. 5 mm.

Hab. in insula Catanduanes.

11. *Tennentia carinata* Mlldff.

T. interna. omnino obducta, anguste ovalis. Animal concolor, pallide flavescentia sine taeniis aut maculis, tergum pedis valde compressum, superne acute carinatum, postice ad glandulam mucosam leviter excisum. Clypeus superne planus, utrinque dilatatus, marginibus liberis, acutis. — Long. (specim. conserv.) 16, lat. superne vix 5 mm.

Hab. in insula Sibuyan leg. cl. C. Roebelen.

12. *Tennentia quadrasi* Mlldff.

Diffrerit a *T. carinata* m. longitudine majore, diametro clypei multo majore, colore magis obscuro, pede postice magis exciso, cornu supra glandulam curvatum formante, appendice clypei anteriore magis protracto. — Long. (specim. conserv.) 19, diam. superne 8 mm.

Hab. in insula Busuanga.

13. *Helicarion quadrasi* Mlldff.

T. angustissime et semiobtecte perforata, depresso, tenuissima, levissime plicato-striatula, valde nitens, virescenti-flavescentia; spira brevissime prominula. Anfr. $3\frac{1}{2}$ convexiusculi, sat celeriter accrescentes, sutura appressa, distinete marginata discreti, ultimus bene convexus, basi tumidulus. Apert. modice obliqua, subcircularis, sat ex-

cisa, perist. rectum, acutum, margine columellari superne brevissime reflexo. — Diam. maj. 12,5, min. 8, alt. 7,25 mm.
Hab. in insula Mindoro.

14. *Macrochlamys (Pseudhelicarion) latitans* Middff.

T. angustissime perforata, valde deppressa, tenuis, pellucida, subtiliter plicato-striata, valde nitens, pallide corneo-flavescens; spira breviter conoidea. Anfr. $4\frac{1}{2}$ celerimē accrescentes, sutura appressa latiuscule marginata disjuncti, ultimus ad peripheriam indistincte subangulatus, antice valde dilatatus. Apert. sat obliqua, elliptica valde excisa, perist. rectum acutum, margine columellari superne breviter triangulariter reflexo. — Diam. maj. 16,5, min. 13,5, alt. vix 10, apert. lat. 10, long. 8,5, alt. 8 mm.
Hab. ad montem Halcon insulae Mindoro leg. cl. B. Schmacker.

15. *Macrochlamys (Pseudhelicarion) compacta* Q. et Middff.

T. angustissime et semiobteete perforata, deppressa, pro genere solidula, leviter plicato-striatula, lineis spiralibus microscopicis decussata, parum nitens, pallidissime flavescens; spira vix elevata apice plano. Anfr. 4 planulati, celeriter accrescentes, sutura appressa, marginata discreti, ultimus sat convexus. Apert. sat obliqua, late elliptica, valde excisa, perist. rectum, acutum, margine columellari superne calloso, triangulariter reflexo, fere revoluto. — Diam. maj. 14,5, min. 13, alt. 8,5 mm.
Hab. in insula Luban leg. coll. indigena.

16. *Macrochlamys (Pseudhelicarion) virescens* Q. et Middff.

T. angustissime perforata, convexo-deppressa, tenuissima, pellucida, sat distincte sed subtiliter plicato-striatula, virescenti-cornea; spira breviter conoidea apice obtuso. Anfr. $4\frac{1}{2}$ convexiuseculi, sat celeriter accrescentes, sutura appressa, anguste marginata disjuncti, ultimus bene convexus, basi tumidulus. Apert. modice obliqua, late elliptica, sat excisa, perist. rectum, acutissimum, margine columellari superne breviter triangulariter reflexo. — Diam. maj. 12, min. 10, alt. 7,5, apert. lat. 6,5, long. 6, alt. 5,5 mm.
Hab. ad rupem Bintuan insulae Busuanga.

17. *Macrochlamys (Pseudhelicarion) perforata* Mlldff.

T. anguste sed pervie perforata, depresso conoideo-globosa, pro sectione solidula, levissime striatula, nitens, flavescenti-albida; spira breviter conoidea apice obtusulo. Anfr. 5 lente accrescentes, sutura appressa, submarginata disjuncti, convexiusculi, ultimus bene convexus. Apert. valde obliqua, subcircularis, valde excisa, perist. rectum acutum, margine columellari superne breviter reflexo. Diam. maj. 10, min. 9, alt. 6,75 mm.

Hab. in monte Tirac insulae Luzon leg. cl. A. Schadenberg.

18. *Macrochlamys sanchezi* Q. et Mlldff.

T. pervie perforata, valde depressa, fere discoidea, tenuis, pellucida, levissime striatula, pallide corneo-brunnea; spira brevissime conoidea, vix prominula. Anfr. 5 convexiusculi, ad suturam sat impressam subcrenulati, lente accrescentes, ultimus bene convexus, basi lineis spirali bus tenuissimis decussatus, pallidior, circa perforationem sat excavatus. Apert. parum obliqua, late elliptica, valde excisa, perist. rectum, acutum, margine columellari superne breviter reflexo. Diam. maj. 14,5, min. 13, alt. 8, apert. lat. 7,5, long. 6,5, alt. 6 mm.

Hab. prope oppidum Dapitan insulae Mindanao leg. rev. P. Sanchez.

19. *Macrochlamys (Macroceras) radiata* Mlldff.

T. anguste perforata, depressa, tenuis, pellucida subtiliter striatula, nitens, lutescenti-albida, strigis radialibus confertis albidis variegata; spira breviter conoidea apice obtusulo. Anfr. 4 $\frac{1}{2}$, sat lente accrescentes, sutura appressa anguste marginata disjuncti, convexiusculi. Apert. sat obliqua, late elliptica, valde excisa, perist. rectum obtusum, intus leviter limbatum, margine columellari superne breviter reflexo, cum basi angulum parum distinctum formante. Diam. maj. 10,5, min. 8,25, alt. 5,75.

Hab. in insula Hin prope Mindoro primus leg. cl. C. Micholitz.

20. *Euplecta (Coneuplecta) convexospira* Mlldff.

T. anguste et semiobtecte perforata, globoso-conica, tenuis, subpellucida, levissime plicato-striatula, lineis spiralibus

microscopicis decussatula, pallide corneo-lutescens; spira sat conoideo-elevata lateribus convexiusculis, apice sat acuto. Anfr. $6\frac{1}{2}$ vix convexiusculi, ultimus basi vix convexior, pallidior, magis nitens, distinctius decussatulus, ad peripheriam acute angulatus. Apert. diagonalis, subsecuriformis, perist. rectum, acutum, margine columellari superne valde reflexo. Diam. maj. 6,5, alt. 5,25.

Hab. prope vicum Sibul insulae Luzon leg. coll. indigena.

21. *Euplecta (Coneuplecta) catanduanica* Q. et Mlldff.

T. vix rimata, depresse turbinata, tenuis, pellucida, transverse subtiliter striatula, lineis spiralibus sub lente fortiore vix conspicuis decussatula, subopaca, pallide corneo-brunnea; spira sat conoideo-elevata, lateribus paullulum concavis, apice acutulo. Anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi, sat lente accrescentes, sutura filari discreti, ult. ad peripheriam carina acuta, exserta, crenulata cinctus, basi pallidior, nitidulus. Apert. modice obliqua securiformis, perist. normale. Diam. maj. 8,5, alt. 6 mm.

Hab. in insula Catanduanes.

22. *Euplecta (Coneuplecta) costulata* Mlldff.

T. angustissime et semiobteete perforata, conico-turrita, pro sectione solidula, subpellucida, confertim costulato-striata, sericina, pallide luteo-cornea; spira valde elevata, lateribus convexiusculis. Anfr. $7\frac{1}{2}$ convexiusculi, lentissime accrescentes, sutura filiformi disjuncti, ult. carina acuta bene exserta carinatus, basi planulatus, transverse leviter striatus et lineis spiralibus tenuissimis decussatus. Apert. parum obliqua, trapezoidalis, perist. rectum, intus incrassatulum, margine columellari valde calloso, superne vix reflexo. Diam. maj. 5,33, alt. 5. 66 mm.

Hab. prope vicum Sibul insulae Luzon leg. coll. indigena.

23. *Euplecta (Coneuplecta) roebeleni* Mlldff.

T. anguste perforata, conico-turrita, tenuis, pellucida, subtilissime striatula, corneo-hyalina; spira valde elevata lateribus convexiusculis, apice acutulo. Anfr. 7 sat convexi, sutura impressa filiformi disjuncti, ult. ad peripheriam subacute carinatus, subtus pallidior, magis

nitens. Apert. fere verticalis, subsecuriformis, perist. rectum, acutum, margine columellari calloso- incrassato, superne paullum dilatato, vix reflexo. Diam. maj. 4,5, alt. 4,5 mm.

Hab. ad fluvium Butuan insulae Mindanao leg. cl. G. Roebelen.

24. *Euplecta (Coneuplecta) crystallus* Q. et Mlldff.

T. angustissime perforata, conico- turrita, tenuis, pellucida, subtiliter striatula, basi laevigata, valde elevata, lateribus convexiusculis, apice obtusulo. Anfr. 8 convexiusculi, lente acrescentes, sutura subappressa, marginata disjuncti, ultimus bene convexus. Apert. parum obliqua, late elliptica, sat excisa, perist. simplex, acutum, margine columellari incrassatulo, superne reflexiusculo, paullum sinuato. Diam. maj. 5, alt. 5,33 mm.

Hab. in insulis Bintuan et Sangat archipelagi Calamianes dicti.

var. *vitrea* Mlldff. Differt testa globoso-turbinata, pallide virenti-flavescente, spira lateribus fere strictis minus elevata, anfr. 7. Diam. maj. 5,25, alt. 4,5 mm.

Hab. in insula Coron ejusdem archipelagi.

25. *Sitala oxyconus* Mlldff.

T. rimata, turrito-conica, tenuis, pellucida, subtiliter oblique plicato-striatula, lineolis spiralibus tenuissimis, confertis decussata, sat nitens, pallide corneo-lutescens; spira valde elevata, fere exakte conica apice acuto. Anfr. $8\frac{1}{2}$ convexiusculi, lentissime acrescentes, sutura filiformi disjuncti, ult. ad peripheriam carina acuta, bene exserta cinctus. Apert. valde obliqua, rotundato-securiformis, perist. rectum, acutum, basi bene arenatum, ad columellam dilatatum, triangulariter reflexum. Diam. 5, alt. 5,5 mm.

Hab. in insula Coron archipelagi Calamianes dicti leg. cl. G. Roebelen.

26. *Sitala fimbriosa* Q. et Mlldff.

T. rimata, elate trochiformis, tenuis, pellucida, transverse oblique striatula, sericina, pallide corneo-flavescens; spira

valde elevata, subregulariter conica, apice obtusulo. Anfr. 6 angulate convexi, lente accrescentes, sutura valde profunda disjuncti, ad et infra peripheriam lineis spiralibus parum distinctis cincti, in angulo peripherico pilis brevibus valde deciduis fimbriosi, ult. basi distinctius decussatus, striis transversis evanescentibus, nitens. Apert. diagonalis, rotundato-trapezoidalis, perist. rectum, acutum, margine columellari brevissime reflexo. Diam. 1,3, alt. 1,75 mm.

Hab. in insula Negros.

27. *Kaliella dentifera* Q. et Mlldff.

T. rimata, trochoidea, tenuis, vix pellucida, confertim sed distincte costulato-striata, opaca, luteo-brunnea; spira turrito-conoidea, lateribus vix convexiusculis, apice acutulo. Anfr. 6 convexiusculi, lente accrescentes, sutura filari disjuncti, ult. carina filiformi acutula cinctus, basi subglabratus, spiraliter decussatulus, nitens. Apert. sat obliqua, late securiformis, perist. rectum acutum, margo columellaris callosus, medio tuberculo dentiformi munitus, superne breviter reflexus. Diam. maj. 2,66, alt. 3 mm.

Hab. prope vicum Guilhunghña insulae Negros.

Glyptoconus Mlldff. n. gen. an Naninidarum?

T. minuta, subimperforata, multispira, globoso-conica, undique costulata, hyalino-alba.

Typ. *G. mirus* Mlldff.

28. *Glyptoconus mirus* Mlldff.

T. vix rimata, globoso-conica, solidula, subpellucida, costulis sat validis, acutis, sat confertis sculpta, sericina, hyalino-alba; spira gradata, sat elevata fere exakte conica, apice obtusulo. Anfr. $7\frac{1}{2}$, lentissime accrescentens, angulato-convexi, ad suturam sat impressam planulati, ult. sub suturam et basi obtuse angulatus, medio fere planus, basi costulis minus validis, sigmoideo-curvatis sculptus. Apert. verticalis, angusta, rhomboidea, triangulariter excisa, perist. rectum, obtusum, margine columellari dilatato, expanso, vix reflexo. Diam. maj. 3,5, alt. 3 mm.

Hab. in insula Busuanga.

29. *Lamprocystis discoidea* Q. et Mlldff.

T. angustissime perforata, valde depressa, fere discoidea, tenuis, pellucida, subtilissime striatula, valde nitens, flavescenti-hyalina; spira vix elevata. Anfr. 5 convexiusculi, sat lente accrescentes, ad suturam impressum submarginatum subcremulati, ult. basi bene convexus. Apert. parum obliqua, late elliptica, sat excisa, perist. rectum, acutum, margine columellari superne triangulariter reflexo. Diam. maj. 8, min. 7,25, alt. 4,2 mm.

Hab. in insula Balabac.

30. *Lamprocystis calamianica* Q. et Mlldff.

T. angustissime perforata, depresso-conoidea, tenuis, pellucida, superne distinete et regulariter plicato-striatula, corneo-brunnea; spira breviter conoidea lateribus fere strictis, apice acutulo. Anfr. 6½ lente accrescentes, sutura anguste marginata disjuncti, convexiusculi, ult. basi convexior, laevigatus, circa perforationem excavatus. Apert. parum obliqua, elliptica, sat excisa, perist. rectum acutum, columella albo-callosa, superne dilatata, reflexa. Diam. maj. 6,33, min. 5,75, alt. 4 mm. *Nanina glaberrima* Hidalgo Obras 1890 p. 96 (ex parte, non Semper).

Hab. in insula Busuanga.

31. *Lamprocystis arctispira* Q. et Mlldff.

T. subimperforata, conoideo-depressa, tenuiter sed distinete striatula, subpellucida, brunneo-cornea, valde nitens; spira breviter conoidea apice acutulo. Anfr. 7 lentissime accrescentes, sutura submarginata disjuncti, convexiusculi, ult. lateraliter compressus, basi subglabratus, valde nitens. Apert. fere verticalis, angusta, elliptica, maxime excisa, perist. rectum, acutum, columella valde callosa, superne reflexa, appressa. Diam. maj. 5, min. 4,5, alt. 3,25 mm.

Hab. ad vicum Margarin insulae Mindoro.

32. *Lamprocystis leucodiscus* Mlldff.

T. vix rimata, discoidea, tenuis, pellucida, levissime striatula, valde nitens, hyalino-alba; spira vix prominula. Anfr. 6 fere plani, lente accrescentes, sutura appressa marginata

disjuncti, ult. basi planulatus. Apert. parum obliqua, longe elliptica, valde excisa, perist. rectum, acutum, margine columellari sursum calloso, superne breviter sed late reflexo, perforationem fere omnino obtegente. Diam. maj. 9,5, min. 8,5 alt. 4,5, apert. lat. 4,75, long. 3,5, alt. 3,25 mm.

Hab. in provinciis Manila, Morong, Bulacan insulae Luzon leg. ipse.

33. *Lamprocystis candida* Q. et Mlldff.

T. anguste set aperte perforata, conoideo-depressa, tenuis, pellucida, levissime striatula, subopaca, quasi pruinosa, alta; spira breviter convexo-conoidea. Anfr. 5 convexiusculi, sutura appressa anguste marginata disjuncti, ult. basi bene convexus. Apert. modice obliqua, late elliptica, fere circularis, sat excisa, perist. rectum, acutum, margine columellari superne breviter reflexo, patente. Diam. maj. 7,75, min. 7, alt. 4,5, apert. lat. 4, long. 3,5, alt. 3 mm.

Hab. in insula Catanduanes.

34. *Lamprocystis mindoroana* Q. et Mlldff.

T. anguste sed aperte perforata, subconoideo-depressa, tenuis, pellucida, levissime striatula, valde nitens, pallidissime flavescenti-albida; spira breviter convexo-conoidea apice planiuscule. Anfr. 5 convexiusculi, lente accrescentes, sutura appressa marginata disjuncti, ult. bene convexus, basi subplanatus. Apert. parum obliqua, late elliptica, valde excisa, perist. rectum, acutum, margine columellari superne calloso, brevissime reflexo. Diam. maj. 9, min. 8, alt. 5,5 mm.

Hab. prope vicum Baco insulae Mindoro.

35. *Hemitrichia consimilis* Q. et Mlldff.

T. vix rimata, depresso-globosa, solidula, brunnea, spira convexo-conoidea, sursum pallescens, apice obtusulo, albido. Anfr. 6 convexiusculi, lente accrescentes, sutura valde impressa disjuncti, lineolis spiralibus et radialibus

minute granulati, granulis pilis brevibus flavidis — ca. 100 in 1 □ mm. — obsiti, ult. convexus vix angulatus, basi laevigatus nitidus, regione sculpta linea vix distincta terminante. Apert. parum obliqua, late elliptica, sat excisa, perist. simplex, acutum, columella curvatim oblique descendens, albocallosa, superne paullulum dilatata. Diam. maj. 21, alt. 15, apert. lat. 11,5 alt. 9 mm.

Hab. in insula Tablas.

36. *Hemitrichia deppressa* Q. et Mlldff.

T. convexo-depressa, solidula, pallide flavescens; spira parum elevata apice obtuso. Anfr. 6 vix convexiusculi, lente accrescentes, sutura parum impressa disjuncti, lineis spiralibus et radialibus confertis granulati, granulis ca. 30 in 1 □ mm., pilis luteis longiusculis sat rigidis pilosi, ult. zona lateraliter applanata cinctus, supra peripheriam subdistincte angulatus, basi laevigatus, nitens. Apert. sat obliqua, compresse elliptica, valde excisa, perist. simplex, acutum, basi et ad columellam intus albocallosum, columella superne reflexiuscula. Diam. maj. 24, alt. 13,5 mm.

Nanina tagalensis var. γ Hid. J. de Conch. 1887 p. 49, t. III f. 2 (non Dohrn). *N. tagalensis* var. *tablasensis* Hid. Obr. 1890 p. 82, t. X, 75.

Hab. in insula Tablas.

37. *Bensonia (Glyptobensonia) exasperata* Mlldff.

T. anguste sed aperte umbilicata, deppressa, solidula, pallide cornea, costulis confertis transversis et lineis spiralibus elevatis sculpta; spira parum elevata, subregulariter conica. Anfr. 6 convexi, lente accrescentes, ult. carina obtusa, parum exserta cinctus, basi tumidus, antice breviter descendens. Apert. parum obliqua, late elliptica, valde excisa, perist. rectum obtusum, margine columellari sinuato. Diam. 23,5, alt. 13 mm.

Hab. in monte Angilog provinciae Morong insulae Luzon leg. coll. indigena.

38. *Bensonia (Glyptobensonia) euglypta* Q. et Mlldff.

T. sat aperte, pervie et subcylindrice umbilicata, depressa, fere discoidea, solidula, subpellucida, costulis transversis et lineis spiralibus elevatis superne distinctioribus exasperata, corneo-lutea; spira parum convexa, apice obtuso. Anfr. $5\frac{1}{2}$ sat convexi, lente accrescentes, sutura valde impressa subeanaliculata disjuncti, ult. basi convexior, ad peripheriam carina acutula, bene exserta cum lira prima reliquis majore sulcum profundiusculum formante cinctus. Apert. modice obliqua, angulato-elliptica, valde excisa, perist. rectum, obtusum, intus caloso-labiatum. Diam. maj. 10,5, min. 9,66, alt. 5,5 mm.

Hab. ad vicum Badajoz insulae Tablas.

39. *Obbina viridiflava* Mlldff.

T. aperte umbilicata, acute carinata, valde deppressa, fere discoidea, solidula, oblique striatula, lineis spiralibus rugulosis confertis, subtus valde distinctis decussata, unicolor pallide virescenti-flava, superne cuticula hydrophana albida lacerata obiecta; spira depresso-convexa apice plano. Anfr. $4\frac{1}{2}$ convexiusculi, lente accrescentes, sutura impressa, marginata disjuncti, ult. basi convexior, ad aperturam subgibber, pone aperturam constrictus, tum breviter deflexus. Apert. diagonalis, lanceolata, perist. superne leviter, inferne latiuscule expansum, basi reflexiusculum, marginibus approximatis callo modico junctis, supero bene curvato. Diam. maj. 22,5, alt. 8,5 mm.

Hab. prope Dingalan provinciae Nueva Ecija insulae Luzon leg. cl. C. Roebelen.

40. *Obbina subhorizontalis* Mlldff.

T. sat anguste et semiobtecte umbilicata, deppressa, tenuiscula, undique minutissime granulosa, subnitens, superne brunnea, subunicolor, tum lutescens, taeniis 5, 1 ad suturam angusta, 3 aequidistantibus latiusculis ad peripheriam, 1 circa umbilicum latissima pieta. Spira deppresse subsemiglobosa apice planiusculo. Anfr. $4\frac{1}{2}$ fere plani, sutura filari disjuncti, ult. convexior, ad peripheriam paullum, rarius distinete, angulatus, pone aperturam coactatus, gibber, tum subito deflexus. Apert. subhori-

zontalis, suboviformis, perist. sat expansum, valde reflexum, calloso-labiatum, continuum, superne subsolutum, margine supero et externo usque ad medium inferum hepaticum, tum usque ad umbilicum album, margine infero medio dentem plus minusve validum, acutulum gerente. Diam. maj. 27,5, alt. 14, apert. lat. 16, long. 10,5 alt. 4,5 mm.

Hab. in insula Sibuyan leg. cl. J. Quadras et C. Roebelen.

41. *Obbina flavopicta* Q. et Mlldff.

T. modice et semiobtecte umbilicata, orbiculato-depressa, solidula, confertim costulato-striata, fusca; spira parum convexa, superne plana. Anfr. $4\frac{1}{2}$, superi planiusculi, penultimus convexiusculus, ult. convexior, primi 2 pallidiores, reliqui ad suturum maculis flavidis sat distantibus ornati, tum in costulis interruptim flavide picti, ult. ad peripheriam subacute angulatus et serie macularum cinctus, basi subplanus, ut supra flavide pictus. circa umbilicum zona angusta, flavescenti cinctus, pone aper- turam gibber, tum subito fere verticaliter deflexus. Apert. maxime obliqua, subhorizontalis, ovalis, perist. continuum, superne subsolutum, breviter expansum, tenuiter albo-labiatum, margine basali dente brevi munito. Diam. maj. 20,5, min. 18, alt. 11, apert. long. 11,5, lat. 8,25 mm.

Hab. ad vicum Galiano provinciae Benguet insulae Luzon leg. cl. C. Roebelen.

42. *Aulacospira (Micropetasus) porrecta* Q. et Mlldff.

T. aperte umbilicata, conoideo-depressa, tenuis, subtiliter striatula, brunneo-cornea; spira breviter conoidea, gra- data. Anfr. 4 planulati, carina obtusa, parum exserta carinati, supra carinam leviter sulcati, ult. basi convexius- culus, antice breviter deflexus et solutus. Apert. dia- gonalis, ellipsoidea, perist. continuum, undique brevissime expansum. Diam. maj. 3, min. 2,66, alt. 1,25 mm.

Hab. in insula Ilin prope Mindoro.

43. *Chloritis subsulcata* Mlldff.

T. aperte umbilicata, discoidea, sat tenuis, subpellucida, leviter striata, lineis impressis irregulariter oblique decurrentibus et punctis impressis confertis regulariter

depositis sculpta (verosimiliter pilosa), subnitens, pallide brunnescenti-cornea; spira leviter concava. Anfr. 5 convexiusculi, sutura valde impressa disjuncti, ult. laterali subcompressus, medio paullum impressus, subsulcatus, antice longe descendens, tum ad aperturam breviter sed valde deflexus. Apert. fere horizontalis, cordiformis, perist. superne vix, externe parum, inferne magis expansum, reflexiuslum, incrassatum. Diam. maj. 20, alt. 10 mm.

Hab. in insula Culion archipelagi Calamianes dicti leg. collector indigena.

44. *Cochlostyla (Corasia) globosula* Mlldff.

T. depresso-globosa, tenuis, vix striatula, lineis spiralibus confertis undique decussata, opaca, albescens, cuticula tenuissima flavescenti-albida obducta; spira regulariter semiglobosa, apice plano nigrescente. Anfr. 4½ planulati, sutura subappressa, anguste marginata disjuncti, sat celeriter accrescentes, ult. ad peripheriam confuse angulatus, angulo ad apert. evanescente, inflatus, subtus ad columellam vix gibber, ad apert. valde dilatatus. Apert. valde obliqua, exciso-ovalis, perist. superne vix, externe sat expansum, inferne reflexiusculum, margine supero paullum protracto, externo bene curvato; columella dilatata, albo-callosa, oblique substricte descendens. Diam. maj. 21, alt. 15, apert. lat. 13, long. 13, alt. 10,5 mm.

Hab. prope Dingalan provinciae Nueva Ecija insulae Luzon leg. cl. C. Roebelen.

45. *Cochlostyla (Callicochlias) hidalgoi* Mlldff.

T. depresso-globosa aut globosa aut conoideo-globosa, solidula, transverse indistincte striatula, lineis spiralibus impressis sat distinctis decussata, pallide virescenti-lutea aut lutea aut olivacea aut brunnescens aut castanea aut atrofusca, semper taenia castanea circa columellam, rarius altera ad peripheriam, et tertia ad suturam ornata, cuticula hydrophana cinerea in taenias spirales varie lacerata obducta. Spira depresso-globosa apice plano concolore. Anfr. 4½ celeriter accrescentes, convexiusculi, ult. magnus,

bene convexus. Apert. modice obliqua, rotundato-trapezoidalis, intus caerulescens, perist. valde expansum, reflexiusculum, extus semper nigrum, intus labiatum, caerulescens, nigromarginatum, marginibus callo tenui junctis. Columnella valde dilatata, callosa, alba, oblique stricte descendens, cum margine basali angulum distinctum formans. Diam. maj. 52, alt. 41 mm.

Cochlystyla samarensis Hidalgo J. de Conch. 1887, p. 136, t. VI, f. 1.2 (non Semper).

Hab. in insula Sibujan leg. cl. cl. J. Quadras et C. Roebelen.

46. *Cochlostyla (Callicochlias) trisculpta* Mlldff.

T. subglobosa, crassa, subtiliter striatula, lineis spiralibus subtus distinctioribus et plicis oblique antrosum decurrentibus sculpta, pallide virescens, taeniis 2, una circa columellam, altera infra peripheriam perlata, fuscis picta, cuticula hydrophana albescente in taenias varie lacerata obducta; spira convexoconoidea apice obtuso, albo. Anfr. $4\frac{1}{2}$ convexiusculi, sat celeriter acrecentes, sutura paullum appressa, submarginata disjuncti, ult. ad peripheriam distincte angulatus, antice breviter sed valde deflexus. Apert. diagonalis, rotundato-tetragona. perist. latiuscule expansum, reflexum, nigrolabiatum, marginibus callo distincto junctis, columella superne albocallosa, parum excavata, oblique et substricte descendens. Diam. maj. 39, alt. 30, apert. lat. 25, long. 22, alt. 14.5 mm.

Hab. in montibus altis insulae Simbyuan leg. cl. C. Roebelen.

47. *Cochlostyla (Orustia) strigata* Q. et Mlldff.

T. subglobosa, solidula, leviter striatula, lineis spiralibus tenuissimis decussatula, pallide flavescens, cuticula luteocorna late castaneo-strigata obducta, opaca; spira conoideo-semiglobosa, apice obtuso. Anfr. $4\frac{1}{2}$ convexiusculi, ult. obtuse angulatus, basi denudatus, nitens. Apert. modice obliqua, rotundato-rhomboidea, perist. vix expansum, anguste albolumbatum, columella recta, dilatata, sat excavata, oblique substricte descendens, versus basim subdentata. Diam. maj. 28, alt. 25, apert. lat. 17, long. 17, alt. 15 mm.

Hab. in insula Romblon leg. coll. indigena.

48. *Cochlostyla (Orustia) versicolor* Mlldff.

T. globosa aut conoideo-globosa, tenuiuscula, consertim striatula, lineis spiralibus microscopicis decussatula, pallide flavescentia aut corneo-brunnea aut castanea, cuticula hydrophana corticina taeniis 2 latiusculis albidis picta obducta; spira convexo-conoidea apice obtuso, corneo-brunneum aut atrofusco. Anfr. 5 convexiusculi, sutura subappressa, anguste albido-marginata disjuncti, ult. bene convexus, antice breviter descendens. Apert. valde oblique ovalis, sat excisa; columella superne sat excavata, dilatata, oblique descendens, indistincte subdentata, perist. parum expansum, sublabiatum, in spec. flavescentibus album, in brunneis brunnescens, in obscuris castaneum.

Diam. maj. 22 alt. 20 mm.

"	"	20	"	20	"
"	"	19	"	19	"
"	"	18,5	"	19,5	"

Hab. in valle Sabani provinciae Nueva Ecija insulae Luzon leg. cl. C. Roebelen.

49. *Cochlostyla (Helicostyla) roebeleni* Mlldff.

T. globosa aut conoideo-globosa, solida, bene striatula, ex luteo castanea, tum fuscescens, denique atrofusca, nitens, cuticula hydrophana opaca, cineracea, valde decidua, strigatim interrupta induita; spira conoideo-globosa, apice nigricante. Anfr. $5\frac{1}{2}$, supremi convexiusculi, ultimi convexi, ult. tumidus, antice paullum descendens. Apert. valde obliqua, exciso-ovalis, perist. late expansum, reflexum, valde incrassatum, late nigromarginatum, intus purpurascens, tum caeruleo-album; columella sat lata, excavata, subrecta.

Diam. maj. 49, alt. 49, apert. c. perist. lat. 33,5, long. 33, alt. 27 mm.

Diam. maj. 50, alt. 53, apert. c. perist. lat. 34, long. 34, alt. 28 mm.

Diam. maj. 54, alt. 54, apert. c. perist. lat. 36, long. 35, alt. 29 mm.

Diam. maj. 55, alt. 51, apert. c. perist. lat. 37, long. 37, alt. 30 mm.

Hab. prope Diagalan provinciae Nueva Eeija insulae
Luzon leg. cl. C. Roebelen.

50. *Cochlostyla (Hypselostyla) accedens* Mlldff.

T. graciliter turrita, solida, subtiliter striata, lineis spiralibus rugulosis tenuissimis decussata, ex fulvo et castaneo atrofusca, cuticula hydrophana obscure corticina, strigis angustis obscurioribus irregulariter variegata; spira valde elongata, sensim attenuata apice acutiusculo denudato. Anfr. $8\frac{1}{2}$ fere plani, sutura angustissime marginata disjuncti, ult. ad peripheriam subangulatus. Apert. valde obliqua, angusta, ovalis, perist. modice expansum, reflexiusculum, valde incrassatum, fusconigrum, columella subrecta, superne alba, subtus fuscescens, cum margine basali angulum obtusum formans.

Alt. 84, diam. 32, apert. lat. 22, long. 34, alt. 30 mm.
" 75 " 30, " 21, " 32, " 28 mm.
" 65 " 26, " 17.5 " 27, " 25 mm.

Hab. prope Dingalan provinciae Nueva Eeija insulae
Luzon leg. cl. C. Roebelen.

51. *Cochlostyla (Prochilus) calamianica* Q. et Mlldff.

T. anguste et fere obtecte perforata aut rimata aut vix rimata, elongata ovato-pyramidata, solida, leviter stria-tula, lineis spiralibus parum distinctis decussata, pallide flavescentia aut brunneo-cornea aut castanea, saepe taeniis 3 fuscis ad suturam, peripheriam et circa columellam ornata, cuticula hydrophana flavo-albida strigatim interrupta obducta; spira valde elongata apice obtuso. Anfr. 6 vix convexiusculi, sutura appressa submarginata disjuncti, ult. a latere spiram altitudine subaequans. Apert. sat obliqua, subauriformis, perist. late expansum, reflexiusculum, crassiuseule albolabiatum, columella parum torta, subrecta, cum basi angulum parum distinctum formans, superne valde dilatata, reflexa, perforationem fere interdum omnino obtegens.

Alt. 42 diam. maj. 24 apert. diam. 17, long 21, alt. 18 mm.
" 43.5 " 25 " 17.5 " 21.5 " 18.5 "
" 45 " 24 " 11 " 22 " 19 "

Hab. in insula Busuanga.

52. *Hypselostoma roebeleni* Mlldff.

T. modice et perspective umbilicata, depresso-conoidea, levissime radiato-striatula, lineolis spiralibus microscopicis decussatula, corneo-brunnea; spira gradata, modice elevata, lateribus paullum concavis apice obtusulo. Anfr. $4\frac{1}{2}$ convexi, sutura profunda disjuneti, ult. a medio sursum tortus, tum solutus et sursum tubae instar porrectus, superne et ad peripheriam obtuse carinatus, supra earinam profunde sulcatus, circa umbilicum obtuse angulatus. Apert. fere horizontalis, sursum spectans, rotundato-tetragona; perist. simplex, tenue, undique expansum. Lamella parietalis valida, valde elevata, subduplicata, dentibus 1 columellari et 2 palatalibus lamelliformibus ad formam crucis oppositis. Diam. maj. 4, min. 3, alt. 2,1 mm.

Hab. in insula Coron archipelagi Calamianes dicti leg. cl. C. Roebelen.

53. *Hypselostoma pusillum* Mlldff.

T. rimata, turbinata, tenuis, subtiliter striatula, cornea; spira valde elevata, gradata. Anfr. $5\frac{1}{2}$ angulato-convexi, sutura maxime impressa disjuneti, ult. ad peripheriam obtuse carinatus, basi planatus, distortus et ascendens, a quarta parte solutus, porrectus, pone aperturam fere quadrangularis. Apert. aliquantulum retrorsum inclinata, rotundato-tetragona, perist. simplex, tenue, breviter expansum. Lamella parietalis sat elevata, altera minor in margine externo opposita illam fere attingens et cum ea sinulum circularem includens, columellaris et palatalis valde profundae, humiles. Diam. 2, alt. 2 mm.

Hab. in insula Coron leg. cl. C. Roebelen.

54. *Hypselostoma edentulum* Mlldff.

T. perforata, elate turbinata, tenuis, subpellucida, leviter striatula, lineolis spiralibus microscopicis decussatula, corneo-brunnea; spira sat elevata lateribus strictis, apice obliquo, obtusulo. Anfr. $5\frac{1}{4}$ angulatae convexi, sutura perprofunda discreti, ult. ad peripheriam obtuse angulatus, superne leviter sulcatus, antice paullatim sat ascendens, tum breviter solutus. Apert. verticalis, rhom-

boidalis, perist. solutum, tenue, undique breviter expansum. Dentes nulli. Diam. maj. 3,25, alt. 3,25 mm.
Hab. in insula Sangat archipelagi Calamianes dicti leg. cl. C. Roebelen.

Petroglyphus Mlldff. n. gen. Hydrobiidarum.

T. solida, illi Lithoglyphi similis, operculum testaceum, extus paullum convexum, medio subconcavum, indistincte spirale, intus superne et inferne recurvatum, ad columellam callo crasso granuloso munitum.
typ. *P. mindanavicus* Mlldff.

55. *Petroglyphus mindanavicus* Mlldff.

T. vix rimata, oblique ovata, solida, subtiliter striatula, microscopice decussata. opaca, olivaceo-brunnea, spira globoso-elevata, apice eroso. Anfr. $3\frac{1}{2}$ rapide accrescentes, sutura subappressa vix marginata disjuncti, ult. inflatus, antice paullum descendens. Apert. ovalis, perist. rectum, obtusum, intus albo-sublabiatum, columella lata, albocallosa. Operculum typicum. Diam. 6, alt. 6 mm.
Hab. in lacu Mainit insulae Mindanao leg. cl. C. Roebelen.

56. *Sitala ditropis* Q. et Mlldff.

T. angustissime perforata, globoso-conoidea, tenuis, pellucida, subtiliter striatula, albida; spira gradata, apice obtuso. Anfr. $4\frac{1}{2}$ convexi, medio carina acuta filiformi, altera ad suturam inferiorem cincti, inter carinas planulati, ult. ad peripheriam carinis 2 sat distantibus cinctus, basi decussatulus. Apert. parum obliqua, late elliptica, modice excisa, perist. rectum, acutum, margine columellari superne breviter reflexo. Diam. maj. 2,1, alt. 1,7 mm.
Hab. prope vicum Jabonga insulae Mindanao leg. J. Quadras.

57. *Lamprocystis planorbis* Mlldff.

T. imperforata, discoidea, tenuis, pellucida, levissime striatula, nitens, albohyalina; spira plana apice vix prominula. Anfr. $4\frac{1}{2}$ sat celeriter accrescentes, sutura sat impressa latiuscule marginata disjuncti, convexiusculi, ult. basi planiusculus. Apert. vix obliqua, elliptica, valde excisa;

perist. simplex acutum, margine columellari superne brevissime reflexo, calloso, appresso. Diam. maj. 12, min. 10,25, alt. 5,9 mm.

Hab. in insula Linapacan archipelagi Calamianes dicti leg. coll. indigena.

58. *Trochomorpha (Videna) morongensis* Mlldff.

T. parva, anguste umbilicata, umbilico circa $\frac{1}{7}$ diametri adaequante, depresso trochiformis, transverse leviter striatula, lineis spiralibus confertis undique decussata, corneo-fulva, taenia castanea perangusta supra, interdum altera infra peripheriam picta; spira pro sectione sat elevata, subregulariter conica. Anfr. 6 lente accrescentes, sutura appressa marginata discreti, convexiusculi, ult. sat acute carinatus. Apert. sat obliqua, rotundato-rhomboidea, perist. rectum acutum, margine infero bene rotundato. Diam. maj. 11, min. 10, alt. 5,5 mm.

Hab. in montibus altioribus districtus Morong leg. coll. indigena.

59. *Trochomorpha (Videna) atticola* Mlldff.

T. parva, modice umbilicata, umbilico $\frac{1}{6}$ diametri adaequante, conico-depressa, tenuiscula, sat acute carinata, nitens, corneo-lutea, ad peripheriam taenia angusta fusca ornata; spira deppresa, convexo-conica. Anfr. 6 modice convexi, lentissime accrescentes, sutura parum impressa disjuncti, distinete et regulariter striati, undique sub lente spiraliter lineolati, ult. inferne convexior, tumidulus ad regionem umbilicalem praeceps, non descendens. Apert. angusta, parum obliqua, irregulariter rhomboidea, modice excisa, perist. simplex, acutum, margo superus brevis, basalis valde curvatus, parum callosus. Diam. 12,5, alt. 5,25, apert. lat. 5,25, alt. 3,5 mm.

Hab. in montibus altioribus districtus Morong leg. coll. indigena.

60. *Trochomorpha (Videna) schmackeri* Mlldff.

T. anguste umbilicata, umbilico $\frac{1}{9}$ diametri adaequante, conico-depressa, tenuiscula, sat acute carinata, nitens, superne corneo-flava, inferne laetior, ad peripheriam taenia

fusca latiuscula ornata; spira depressa, exacte conica, apex pro genere acutus. Anfr. $5\frac{1}{2}$ perparum convexi, lente accrescentes, sutura parum impressa disjuncti, irregulariter striati et lineis impressis spiralibus perdistinctis undique decussati, ult. basi convexior, ad regionem umbilicalem declivis, non descendens. Apert. parum obliqua, transversim acute ovalis, modice excisa, perist. simplex, margo superus acutus, haud protractus, basalis et columellaris paullum calloso-incrassati. Diam. 14, alt. 5,75, apert. lat. 6,5, alt. 3,75 mm.

Hab. in parte septentrionali insulae Mindoro primus leg. cl. B. Schmacker.

61. *Trochomorpha (Videna) intermedia* Mlldff.

T. umbilicata, umbilico $\frac{1}{5}$ diametri aequante, subconoideo-depressa, tenuis, acute carinata, nitens, pallide corneo-flava, ad peripheriam taenia angusta fusca ornata; spira conico-depressa. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura sat profunda disjuncti, sat lente accrescentes, perdistincte et regulariter striati, superne minus distincte quam inferne spiraliter lineolati, ult. basi convexior, antice non descendens. Apert. obliqua, irregulariter securiformis, perist. simplex, margo superus acutus, basalis regulariter curvatus, parum callosus. Diam. 12,75—13,5, alt. 4,75—5,25, apert. lat. 6, alt. 4,25 mm.

Hab. in insula Polillo leg. coll. indigena.

62. *Trochomorpha (Videna) gracilis* Mlldff.

T. parva, pro sectione anguste umbilicata, umbilico $\frac{1}{7}$ diametri adaequante, conoideo-depressa, tenuis, acute carinata, corneo-lutescens, ad carinam taenia perangusta castanea ornata; spira sat elevata, convexo-conoidea. Anfr. 6, vix convexiusculi, lentissime accrescentes, sutura submarginata disjuncti, transverse subtiliter striatuli, lineis spiralibus impressis, sat confertis decussati, ult. basi convexiusculus. Apert. valde obliqua, rotundato-rhomboidea, perist. simplex, acutum. Diam. maj. 10, min. 6, alt. 4,9 mm.

Hab. prope vicum Malunu provinciae Isabela insulae Luzon leg. cl. O. Hennig.

63. *Trochomorpha (Videna) suturalis* Q. et Mlldff.

T. late et aperte umbilicata, umbilico $\frac{8}{11}$ diametri adaequante, subconoideo-depressa, tenuis, transverse tenuiter sed distincte striatula, lineis spiralibus microscopicis decussatula, sericina, fulvocornea; spira breviter conoidea. Anfr. $5\frac{1}{2}$ sat convexi, lente accrescentes, sutura latiuscule marginata disjuncti, ult. carina valde acuta, bene exserta, granulosa, suberenata cinctus, circa umbilicum rotundato-subangulatus. Apert. sat obliqua, late securiformis, perist. simplex acutum. Diam. maj. 17, alt. 6,25, apert. lat. 7, long. 5, ali. 4 mm.

Hab. in insula Balagnan prope Mindanao leg. J. Quadras.

64. *Trochomorpha (Videna) heptagyra* Q. et Mlldff.

T. modice umbilicata, umbilico pervio, subcylindrico, $\frac{1}{4}$ diametri adaequante, conoideo-depressa, transverse distincte striatula, subopaca, flavescenti-cornea; spira breviter conoidea apice obtuso. Anfr. 7 planiusculi, lentissime accrescentes, sutura filiformi disjuncti, ult. carina peracuta bene exserta cinctus, basi vix convexiusculus, circa carinam subexcavatus. Apert. diagonalis, angusta, irregulariter rhomboidea, perist. rectum, acutum. Diam. maj. 9,5, min. 9, alt. 3,75 mm.

Hab. prope oppidum Surigao insulae Mindanao leg. J. Quadras.

(Schluss folgt).

Einiges aus dem östlichen Kleinasiens.

Von

Pfarrer G. Nägele in Waltersweier bei Offenburg.

Wie aus dem nordwestlichen Persien aus der Gegend von Salmas (cf. Jahrg. 1893 pag. 148), so erhielt ich im Verlaufe des letzten Sommers auch einige Conchylien aus dem östlichen Kleinasiens und zwar vom obern Laufe des Jeschil-Irmak (grüner Fluss) oder Iris, wie ihn die Alten nannten, und zwar wurden sie gesammelt in der Umgegend

von Tokat, das 600 m über dem Meere liegt, ein mildes Klima hat und eine Bodenbeschaffenheit, die der Molluskenfauna günstig ist. Meine Einläufe bieten zwar wenig Neues, aber immerhier manches Interessante, was diese kurzen Notizen im Nachrichtsblatt wohl rechtfertigen dürfte. Die aufgeführten Arten lagen alle Herrn Professor Dr. O. Boettger zur Einsicht vor, und hatte dieser Herr wie immer die Güte sein Gutachten darüber abzugeben.

Es sind folgende Arten:

1. *Vitrina (Trochoritrina) Sieversi* MSS.
2. *Hyalinia (Mesomphix) cypria* Pfr. selten.
3. *Helix (Fruticicola) carascaloides* Bgt. selten.
4. *Helix (Pomatia) pathetica (Parr.) Albers.* selten.
5. *Helix (Pomatia) taurica Kryn.* Durch ihre Grösse ausgezeichnet 50 : 60 mm. In der Form ist diese Art sehr veränderlich. theils hochgewunden, theils sehr gedrückt. Ebenso veränderlich in Farbe. Manche Exemplare sind ganz kastanienbraun und haben nur eine schmale, scharf begränzte weisse Mittelbinde, andere zeigen auf den obersten Umgängen deutliche Bänder, andere haben bei ganz verschwommenen Bändern scharf hervortretende, regelmässige dunkelbraune Querstriemen und dürften diese wohl mit *Hel. radiosa* Zgl. identisch sein.
6. *Buliminus (Brephealus) tournefortianus* Fér.; gehört zu den gemeinsten Arten um Tokat.
7. *Buliminus (Mastus) Kindermannii* (Parr.) Pfr. ziemlich selten.
8. *Buliminus (Chondrulus) lamelliferus* Rssm.
9. *Buliminus (Chondrulus) incertus* Ret.
10. *Buliminus (Amphiscopus) eudoxinus* Naeg. n. sp.
T. umbilicata, conico-fusiformis, oblique striatula. nitida, lutescenti-cornea; spira elongata apice obtusiusculo;

anfractus $7\frac{1}{2}$ lente crescentes, convexi, ultimus tumidus, basi subangulatus, $\frac{1}{3}$ testae subaequans; sutura incisa, filosa, apertura magna, obliqua, fere circinata, ad dexterum producta, 5 dentibus coaretata, 1 dente parietali, permagno, lamelliformi, torquato, 1 dente columellari, 3 marginalibus quorum infinus magis eminens; peristoma album, expansum, incrassatum, marginibus callo in insertione gibba dentiformi ornato conjunctis.

Alt. 6, diam. $2\frac{1}{2}$ mm.

Habit. Tokat.

Diese Art scheint sehr selten zu sein; sie wurde nach dem Fundorte benannt. Das heutige Tokat hiess nämlich unter der byzantinischen Herrschaft Eudoxia.

11. *Buliminus (Petrueus) nogelli* Roth selten.

12. *Pupa (Orcula) dololum* Brug.

var. *batumensis* Ret. ziemlich selten.

13. *Pupa (Torquilla) avenacea* Brug.

14. *Clausilia (Oligoptychia) laevicollis* Parr.

var. *tocatensis* Naeg. n.

Haec varietas differt a Typo testa graciliore, costulata, lutescenti-corneo colore, lamella aperturae inferiore magis conspicua et ad marginem magis egrediente.

Alt. 17, diam. $3\frac{1}{2}$ mm. Hab. Tokat.

Diese Varietät ist eine constante und weicht vom Typus besonders durch starke Rippenstreifung und durch schlankere Form bedeutend ab. Sie scheint nicht besonders häufig zu sein.

15. *Lithoglyphus parrulus* Naeg. n. sp.

T. perforata, ovuliformis, albida, pellucida, spira brevissima; apice acutiusculo; anfractus $3\frac{1}{2}$, ultimus ventricosus, permagnus; apertura longior quam spira, ovoidea,

supra obtuse angulata; peristoma acutum, margine columellari late complanato, cum margine exteriore callo conjuncto.

Diam. $1\frac{1}{2}$: $1\frac{1}{4}$ mm. Hab. Tokat.

Dieser *Lithoglyphus* und *Lith. affinis* Ffld. sind bis jetzt die einzigen bekannten vorderasiatischen Arten.

H. A. Pilsbry und die Verwandtschaftsbeziehungen
der Helices im Tertiär Europas.

Von

Prof. Dr. O. Boettger in Frankfurt (Main).

In Pilsbry's wichtiger Arbeit „Preliminary outline of a new classification of the Helices“ in Proc. Nat. Sc. Philadelphia 1892 findet sich pag. 393 eine befremdliche Stelle, die im Interesse der europäischen Paläontologen und Malakozoologen nicht unbesprochen bleiben darf. Pilsbry behauptet daselbst folgendes. Ich übersetze wörtlich: „Mit Ausnahme weniger abweichender Gruppen, die augenscheinlich keine Nachkommen hinterlassen haben, gehören alle Helices des europäischen Tertiärs zu Untergattungen, die jetzt noch irgend einen Theil des paläarktischen oder doch wenigstens des holarktischen Faunengebietes bewohnen. Die angeblichen *Corasia*, *Chloraea*, *Euryceratera*, *Coryda*, *Dentellaria*, *Obba*, *Chloritis*, *Thelidomus*, *Mesodon*, *Triodopsis* u. s. w., die aus dem Eocaen, Oligocaen und Miocaen Europas angeführt worden sind, gehören in keinem Falle zu diesen Gruppen, sondern zum grössten Theil zu der Gattung *Helix* im engeren Sinne. Viele von ihnen können glatt zu Untergattungen und Sektionen der Jetzwelt gestellt werden, wie zu *Campylaea*, *Gonostoma* und besonders zu jener von Schmidt und Sandberger *Pentataenia* genannten ursprünglichen Gruppe, aus der sich die jetzigen *Tachea*, *Macularia* u. s. w. entwickelt haben.“

Damit macht Herr Pilsbry den europäischen Palaeontologen und Malakozoologen und namentlich Fr. v. Sandberger, Ed. v. Martens, P. Oppenheim und mir den indirekten Vorwurf, dass wir in den letzten 25 Jahren bei Vergleichung der fossilen mit den lebenden Heliceen fortwährend Irrthümer begangen hätten. Der amerikanische Forscher will uns belehren, dass wir bei unseren Vergleichen nicht so weit hätten zu schweifen brauchen, da das Gute so nahe lag. Aber er möge mir aufs Wort glauben: Hätten wir unter den uns wohlbekannten europäischen Arten oder Untergattungen solche gefunden, mit denen unsere fossilen Formen auch nur einigermassen befriedigend übereingestimmt hätten, so wären wir gewiss und wahrhaftig nicht darauf verfallen, mühsam nach tropisch-amerikanischen, südasiatischen und australischen Schalen zu suchen, die wir für näher vergleichbar mit den fossilen halten müssen als die in unseren Sammlungen so gut und so reichlich vertretenen paläarktischen Arten.

Der Grund aber, warum Herr Pilsbry Vorfahren jetzt ausschliesslich tropischer *Helix*-Gruppen in unserem europäischen Tertiär nicht anerkennen will, ist mir nicht recht einleuchtend. Er wird mir doch zugeben, dass die Pflanzenwelt des europäischen Tertiärs eine grosse Anzahl tropischer Gattungen einschliesst, dass die Meere des Eocäns, ja noch die des Miocaens eine erstaunliche Fülle von Arten enthielten, die den Gattungen *Rimella*, *Conus*, *Cancellaria*, *Oliva*, *Terebra*, *Voluta*, *Pleurotomaria*, *Plicatula*, *Crassatella* und *Perna*, also anerkannten Tropengattungen angehören! Weiss Herr Pilsbry nicht, dass das Wiener Becken allein, in seinem jüngsten Miocaen, 54 sichere Arten der Tropengattung *Conus* aufzuweisen hat? Und was die Süßwasserschnecken anlangt, so möchte ich fragen, ob irgend Jemand leugnet, dass die bei Frankfurt im Untermiocaen vorkommende *Gundlachia francofurtana* Bittgr. mit cubanischen, dass *Planorbis cornu* Brongn.

ebenfalls mit westindischen Formen zu vergleichen ist? Welche europäische Verwandtschaft will Herr Pilsbry unserer *Hybocystis pupa* (Al. Braun) von Hochheim, der *Megalomastoma mumia* (Lmk.) des Pariser Beckens, der *Palaina diezi* (Flach) aus dem Obermiocaen von Undorf zuweisen? Wie erklärt er das Vorkommen zahlreicher kleiner, schlanker *Oleacina*-Arten im Oligocaen von Hochheim und Tuchoritz, wie das Auftreten von *Gibbulina* und *Partula* im Eocaen Oberitaliens und das Auftauchen von massenhaften Arten der oceanischen, tropisch-asiatischen und westindischen Pupidengattungen *Ptychochilus* und *Leucochilus* in allen Oligocaen- und Miocaen-Schichten Europas? Da wir diese fossilen Schnecken mit tadelloser Skulptur und oft noch mit Färbung und Deckeln besitzen und jederzeit vergleichen können, darf uns Herr Pilsbry die Berechtigung zu unserer Anschauung nicht absprechen. Aber — könnte er sagen — die Gruppe der Helices bildet davon eine Ausnahme! Das ist aber falsch, grundfalsch! Und warum auch grade diese eine Gruppe? Ich gestehe Herrn Pilsbry zu, dass auch mir die Verwandtschaften von *Helix bohemica*, *hortulana*, *deflexa*, *crepidostoma*, *girondica* und *subsoluta* bis heute dunkel geblieben sind, und dass ich an deren Unterordnung unter die westindischen *Coryda* nicht mehr denke. Aber dass die Einfügung derselben in eine primitive Gruppe „*Pentataenia*“ — ohne dass wir eine Analogie mit irgend einer lebenden paläarktischen Art herausfinden können — doch nur ein kläglicher Notbehelf ist, das wird uns Herr Pilsbry sicherlich, wenn er unser reiches Vergleichsmaterial vor sich hätte, einräumen müssen. Von *Helix rugulosa* haben wir in *Tachea* allerdings noch europäische Nachkommen.

Ueber die Bilder des überaus sorgfältig gearbeiteten Oppenheim'schen Werkes (Land-und Süßwasserschnecken der Vicentiner Eocaenbildungen in: Denkschr. Math.-Nat. Cl. Akad. Wien Bd. 57, 1890), die allein Herr Pilsbry

anscheinend beurtheilt hat, lässt sich vielleicht streiten, über die Originale in meiner Sammlung nicht. Vor mir liegt ein prachtvoll erhaltenes Stück von *Helix damnata* Al. Brongn. aus dem Eocaen von Ronca. Die im Innern weit zurücktretende, aber senkrecht in die Höhe steigende, volle $5\frac{1}{2}$ mm Höhe erreichende, schneidende Bassallippe hat neben der Mündungsform, Skulptur und Kielung der Schale so evidente Aehnlichkeit mit den analogen Bildungen bei *Dentellaria* und *Thelidomus*, und ist andererseits so grundverschieden von allen Lippenbildungen u. s. w. bei europäischen lebenden Heliceen, dass Pilsbry's Urtheil, diese fossile Art falle etwa in die Verwandtschaft von *Macularia*, *Leptaxis* und *Hemicycلا* einfach komisch erscheint. Sandberger und Oppenheim vergleichen sie mit Tropenformen, jener nach Habitus und Mündung mit den malayischen *Obba*-Arten, dieser mit den westindischen Gattungen *Caracolus*, *Dentellaria* und *Thelidomus*. Auf Grund eingehender Vergleiche muss ich Oppenheim Recht geben und es auch billigen, dass er für die Arten aus der Verwandtschaft der *Helix damnata* eine eigne Untergattung geschaffen hat, die nur mit westindischen *Helix*-Gruppen in Beziehung zu bringen ist. Ich könnte noch viele Beispiele geben, die Pilsbry's Ansicht als willkürlich und unhaltbar erscheinen lassen. Das schlagendste dürfte aber sein das absolut sichere Auftreten echter *Chloritis*-Arten im europäischen Oligocaen, dieser lokalisierten Gebirgsformen, die in den tropisch-asiatischen und austromalayischen Gebieten ganz die Rolle unserer Campylaeen spielen. Glaubt Herr Pilsbry wirklich, der *Helix filholi* Bgt. aus den altoligocänen Phosphoriten des Quercy, der *Helix lepidotricha* Al. Br. aus dem Oberoligocaen von Hochheim das Recht absprechen zu dürfen, sich *Chloritis* zu nennen? Skulpturen, wie er sie bei diesen typischen *Chloritis*-Arten finden kann — auch Sandberger hat diese in seinem Mainzer Becken Taf. 3, Fig. 4 d meisterhaft wiedergegeben

— soll er mir bei irgend einer europäischen *Campylaea* zeigen, ebenso die charakteristische Ausbuchtung des linken Mundrandes in der Nähe des mit stumpfem Kiele umgebenen, steil abfallenden Nabels! Ich gehe mit Vorbedacht so weit zu erklären, dass ich Jeden, der leugnet, dass *Chloritis lepidotricha* (Al. Br.) zur typischen Gruppe von *Chloritis* gehört, für einen Stümper halte, dem jede Spur von Beobachtungsgabe abgeht!

Es mag ja für einen Amerikaner nicht ganz leicht sein, sich diese seltneren Arten unseres europäischen Tertiärs in guten Stücken zu verschaffen; aber dann darf man auch nicht über die wissenschaftliche Thätigkeit unserer ersten paläontologischen Autoritäten den Stab brechen und leichtsinnig irrite Lehren aufstellen, wie es Pilsbry in den oben citierten Sätzen gethan hat.

Herr Pilsbry beklagt sich noch über „the sadly mis-named subgenera *Dentellocaracolus* and *Prothelidomus* of Oppenheim“ und sagt „It is time that we heard the last of this habit of going to the ends of the earth to find subgenera for the European fossil Helices!“ Aber ich denke, es wird auch in Zukunft vernünftiger sein, für fossile Gruppen, die in ihrer Verwandtschaft nicht ganz klar sind oder sich von lebenden Gruppen durch gewisse Merkmale unterscheiden, neue Namen und gute Definitionen und Abbildungen zu geben, als sie, dem Pilsbry'schen Grundsatze getreu, als „*Helix s. str.*“ zu bezeichnen, nur damit dessen Monroe-Theorie „Europa den Europäern, Amerika den Amerikanern“ keinen Stoss erleidet.

Trotz Pilsbry's Anschauungen birgt unser europäisches Tertiär nicht blos eine reiche tropische Flora von bei uns längst ausgestorbenen Familien und Gattungen, sondern es liegen in ihm auch begraben tropische See-, Süßwasser- und Landschneckengenera neben ausgestorbenen Gattungen und solchen, deren Nachkommen noch jetzt im

paläarktischen Gebiete leben. Wir würden die Thatsachen auf den Kopf stellen, wollten wir auch nur den Schein einer Berechtigung der neuen amerikanischen Theorie zuerkennen, besonders wenn wir beachten, dass ihr Autor seine Studien an Abbildungen und Beschreibungen, nicht an Originalen gemacht hat. Solche aber sind zu vergleichend-morphologischen Studien doch wohl in erster Linie nothwendig.

Necrologie.

Dr. Paul Fischer, der langjährige Mitredakteur des Jounial de Conchyliologie und Verfasser des Monuel de Conchyliologie et de Paleontologie starb zu Paris am 29. November 1893, erst 59 Jahre alt.

A. P. von Middendorff, der Verfasser der „Beiträge zur Malacologia Rossica“ und der „sibirischen Reise“, geboren 1815 in Petersburg, starb am 16. Januar d. J. auf seinem Gute Hellenorm in Livland.

Nur wenige Tage später, am 20. Januar, starb in Petersburg der Nachfolger Middendorffs in der Erforschung Sibiriens und der Amurländer, Leopold von Schrenk, zuletzt Direktor des anthropologisch-ethnographischen Museums der Petersburger Akademie; er war am 24. April 1826 geboren.

Kleinere Mittheilungen.

Nach einer Mittheilung des Weekly Bulletin von San Francisco, welche der Nautilus reproduziert, ist bei San Diego an der californischen Küste ein Coyote von einer *Haliotis* (*H. Gracherodii*) gefangen worden. Der Wolf hatte versucht das Thier unter der nicht ganz fest angedrückten Schale herauszuholen und die Muschel hatte ihm die Schnauze eingeklemmt und ihn so festgehalten, dass er gegriffen werden konnte.

Berichtigung.

In No 34 des „Nachrichtsblattes“ ist die Adresse des Herrn V. S Ritter von Lasser falsch angegeben. Richtig lautet dieselbe:

Taxenbach.

(Kronland Salzburg)

Herr V. S. Ritter von Lasser.

Eingegangene Zahlungen:

Scharff, D., Mk. 18; — Graf Otting, M., Mk. 6; — Schirmer, W., Mk. 6; — Reinhardt, B., Mk. 6; — Retowski, Th., Mk. 6.

Dieser Nummer liegen Prospekte bei von Herrn C. A. Westerlund in Ronneby (Schweden) und von Herren Bauer & Raspe in Nürnberg.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M., Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Sechsundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwaneheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn** in Berlin zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Diagnoses

specierum novarum ex insulis Philippinis auctoribus

J. F. Quadras et O. F. von Moellendorff.

(Obs. Species, quarum collector non citatur, a. cl. J. F. Quadras collectae sunt.)

65. *Plectopylis coarctata* Mlldff.

T. minuta, latissime et aperte umbilicata, discoidea, tenuis, pellucida, minutissime decussata, sericina, alba; spira plana apice hand prominulo. Anfr. $3\frac{1}{2}$ lente accrescentes, convexiusculi, sutura sat profunde impressa discreti, ult. lateraliter compressus, non descendens. Apert. modice obliqua, oblonge auriformis, perist. parum expansum, sat incrassatum, margine sinistrorso soluta, in lamellam validam curvatain apert. fere obcludentem elevato. Paries pone labrum lamellis 2 sat brevibus munitus. Diam. 1,4, alt. vix 0,5 mm.

Hab. in insula Panglao prope Bohol, comm. cl. O. Koch.

66. *Satsuma poecilotrochus* Mlldff.

T. semiobtecte perforata, sat late trochiformis, tenuiscula, oblique plicato-striatula, lineis spiralibus impressis decussata, flavescenti-cornea, taeniis 2 castaneis, una angustissima infra suturam, altere angusta supra peripheriam ornata; spira valde elevata, fere exakte conica. Anfr. $6\frac{1}{2}$ planiusculi, lente accrescentes, sutura distincte marginata disjuncti, ult. carina acuta, exserta, suberecta, nulata carinatus, basi convexiusculus, distinctius spiraliter sculptus, antice subito breviter deflexus. Apert. maxime obliqua, oblique angulato-ovalis, parum excisa, perist. sat late expansum, reflexiusculum, margine columellari superne valde dilatato, patente, perforationem fere obtegente. Diam. 19, min. 17, alt. 18, apert. lat. 12, long. 10, alt. 6,5 mm.

67. *Plectotropis luzonica* Mlldff.

T. anguste sed aperte et subcylindrice umbilicata, convexo-orbicularis, tenuis, superne dense costulato-striata et liris spiralibus tenuibus, sat distantibus cincta, subtus subglabrata, superne sericeina, basi nitens, corneo-brunnea; spira parum elevata, convexo-conoidea. Anfr. $5\frac{1}{2}$ planulati, sutura filari disjuncti, ult. basi convexior, carina obtusa sed bene exserta circumdatus, ad carinam pilis longiusculis rigidis fimbriatus. Apert. parum obliqua, rotundato-securiformis, perist. rectum, subincrassatum, obtusum. Diam. maj. (absque pilis) 15,5, alt. 7,5 mm.

Hab. in montibus altioribus districtus Morong leg. coll. indigena.

68. *Camaena stolidota* Q. et Mlldff.

T. latinuscule sed semiobtecte umbilicata, globoso-depressa, solidula, striis transversis sat distinctis et plicis oblique antrorum decurrentibus, subregulariter distantibus sculpta, opaca, aut fulva, taenia supraperipherica angusta, altera infraperipherica lata castaneis ornata, aut unicolor castaneo-fusca; spira semiglobosa apice obtuso. Anfr. $4\frac{1}{2}$, primi 2 nucleus distincte separatum — diam. 7 mm — formantes, convexiusculi, ult. ad peripheriam plus minusve angulatus, basi planiusculus, lineis spiralibus

sat confertis rugulosis sculptus, antice breviter sed valde deflexus. Apert. diagonalis, truncato-ovalis, perist. sat expansum, revolutum, castaneo-labiatum, margine columellari valde dilatato, umbilicum medio obtegente. Diam. 30, alt. 23, apert. lat. 21, long. 17, alt. 11 mm.

Hab. ad vicum Ganigarán prope oppidum Puerto Princesa insulae Paragua.

69. *Cochlostyla (Corasia) loheri* Mlldff.

T. subgloboso-depressa, fragilissima, transverse tenuiter striata, lineis spiralibus impressis irregularibus sculpta, pellucida, subopaca, pallide corneo-lutescens; spira parum elevata, convexo-conoidea apice obtuso. Anfr. $3\frac{1}{2}$ sat celeriter accrescentes, sutura appressa, marginata, subcrenata disjuncti, planiusculi, ult. carina obtusa, sed utrimque, praesertim inferne bene exserta carinatus, basi convexus, circa columellam subgibber. Apert. sat obliqua, late securiformis, perist. simplex, brevissime expansum, columella recta, sat excavata, oblique et substricte descendens, cum margine basali angulum obtusum sed distinctum formans, Diam. maj. 18,5, min. 15, alt. 11 mm.

Hab. in cacumine montis Mariveles leg. cl. A. Loher.

70. *Prosopeas rhodinaeforme* Mlldff.

T. non rimata, graciliter cylindraceo-fusiformis, tenuis, subpellucida, tenuiter striatula, sericina, pallide straminea. Anfr. 10 sat lente accrescentes, sutura parum impressa disjuncti, planiusculi, ult. penultimum altitudine fere aequans. Apert. modice obliqua, guttiformis, perist. simplex acutum margine dextro valde arcuato. Columella non truncata, callosa, inferne bene arcuata, superne valde torta, elevata, lamellae instar spiraliter recedens. Alt. 33,5, diam. 6,5 mm; alt. 28 diam. 7 mm.

Hab. in insula Sibuyan leg. G. Roebelen.

71. *Melampus brachyspirus* Mildff.

T. imperforata, subcylindracea, solidula, tenuiter plicato-striatula, fere laevigata, nitens, pallide olivacea; spira brevissima apice submucronato, hyalino. Anfr. 5 plani,

ult. lateraliter subcompresso, basi paullum saccatus. Apert. perangusta, oblonga, perist. rectum acutum, intus albocallosum. Lamella parietalis unica, valida, horizontalis, columella incrassatula, biplicata. Alt. 7,5, diam. 4, apert. long. 7, lat. vix 2 mm.

Hab. in insula Cebu leg. cl. O. Koch.

72. *Plecotrema mucronatum* Mlldff.

T. imperforata, conico-ovata, solidula, spiraliter confertim sulcata, transverse subirregulariter plicata, griseofusca, taeniis castaneis 3 ornata; spira convexoconica apice mucronato, acuto. Anfr. 8-9 plani, ult. a latere $\frac{2}{3}$ - $\frac{7}{16}$ altitudinis adaequans, basi crista parum exserta circumdatus. Apert. parum obliqua, angusta, oblonga, perist. rectum, obtusum, intus sat crasse albolabiatum, labro externo dentibus 3 munitum, lamellae parietales 2, supera punctiformis, infera valida horizontalis, longe intrans, extus usque ad marginem producta, in cristam basalem desinens, columellaris humilis. Alt. 9,5, diam. 5,75, apert. c. perist. lat. 4,25 long. 7, alt. 6,5 mm.

Hab. in insula Bohol comm. cl. O. Koch.

73. *Cyclotus (Platyrhaphes) eurystoma* Mlldff.

T. aperte umbilicata, discoidea, solidula, striis incrementi parum distinctis et lineis spiralibus confertis paullum undulatis sculpta, luteo-brunnea; spira plana apice mucronatim prominulo. Anfr. 4 teretes, rapide accrescentes, ad suturam profunde exsertam planiusculi et plicatuli, zona suturali latiuscula pallidiore cincti, ult. magnus, sensim paullum descendens, antice dilatatus, campanulatus, pone aperturam pallidior. Apert. circularis, parum obliqua, in fauce rufa, perist. duplex, externum parum expansum, haud reflexum, margine columellari evanescente, internum rectum, vix porrectum. Operc. subterminale, lamina interna cornea subplana, sulco profundo ab externa calcarea crassa valde concava anfr. 8 transverse striatis separata. Diam. maj. 17, min. 12,5, alt. 9, apert. diam. 8 mm.

Hab. in montibus altioribus districtus Morong leg. coll. indigena.

74. *Cyclotus (Platyrhaphes) gradatus* Mlldff.

T. modice sed aperte umbilicata, depresso turbinata, tenuis, subpellucida, transverse subtiliter striatula, spiraliter valde confertim lirulata, luteo-cornea; spira sat elevata, gradata. Anfr. 5 perconvexi, sutura profunda disjuncti, ult. antice paullatim descendens. Apert. sat obliqua, circularis, perist. duplex, internum continuum, vix porrectum, ext. superne et externe sat, inferne minus, ad umbilicum haud expansum, margine supero ad insertionem paullum recedente. Oper. normale, sat concavum, anfr. 8 transverse striatulis. Diam. 7,5—8,25, alt. 5,75—6,5 mm.

Hab. in insula Coron archipelagi Calamianes dicti leg. coll. indigena.

75. *Cyclophorus batanicus* Q. et Mlldff.

T. pro genere sat anguste umbilicata, depresso conica aut globoso-conica, solidula, superne lineis spiralibus elevatis confertis, fere aequalibus sculpta, inferne subglabrata, lineis spiralibus evanescentibus decussata, in umbilico denuo fortiter spiraliter sculpta, albida, ad suturam maculis castaneis subregulariter picta, tum castaneo-marmorata, subtus taeniis fuscis subinterruptis ornata; spira sat elevata, subregulariter conica. Anfr. 5 sat celeriter acercentes, sutura profunde canaliculata discreti, convexi, ult. teres, antice paulisper descendens. Apert. parum obliqua, circularis, perist. multiplex, valde incrassatum, margine columellari in appendicem linguaeformem umbilicum fere obtegentem dilatato. Diam. maj. 24, alt. 18 mm; diam. maj. 23,5 alt. 19 mm.

Hab. in insula Batan leg. coll. indigena.

76. *Cyclophorus sericinus* Q. et Mlldff.

T. semiobtecta umbilicata, conoideo-depressa, tenuiscula, leviter transverse striatula, carinulis subelevatis, quarum 5 fortiores, et in interstitiis lirulis spiralibus sculpta, costulis membranaceis microscopicis obiecta, quasi pruinosa, sericina, fulva strigis fulguratis castaneis confertis, ad suturam serie macularum sat magnarum aequae distantium ornata. Spira conoidea lateribus concavis, apice

acuto. Anfr. 6 convexi, ad suturam parum impressam applanati, ult. basi sublaevigatus. Apert. valde obliqua, late elliptica, perist. sat late expansum, albo-sublabiatum, margine basali medio sat protracto, columellari profundiuncule sinuato, reflexo, dilatato, umbilicum medio obtegente. Diam. 25,5, alt. 20, apert. lat. 15,25, long. 14, alt. 12 mm.

Hab. in insula Busuanga.

77. *Lagochilus gradatum* Q. et Mlldff.

T. mediocriter umbilicata, turbinata, tenuis, subpellucida, transverse striatula, costulis membranaceis tenuissimis, deciduis sculpta, corneo-brunnea; spira sat elevata, gradata. Anfr. 5 convexi, ad peripheriam carinulis 2 parum elevatis cincti, in carinulis pilis longinseulis deciduis fimbriati, ult. basi liris 2—3 tenuioribus pilis brevioribus indutis cinctus. Apert. modice obliqua, circularis, perist. simplex, tenue, margo superus ad insertionem recedens, paullum excisus, obtusus, vix expansus, basalis et columellaris expansiusculi. Diam. 5,75, alt. 4,75 mm.

Hab. in insula Busuanga.

78. *Lagochilus solidulum* Mlldff.

T. sat anguste sed pervie umbilicata, depresso trochiformis, solidula, transverse striatula, liris spiralibus valde confertis, quarum 5—6 majores, cariniformes, sculpta, pallide corneo-fulva, strigis flammulatis castaneis picta; spira gradata, fere regulariter conica, apice subobliqua, glabrato. Anfr. 5 convexi, sutura subcanaliculata disjuncti. Apert. fere diagonalis, subcircularis, perist. duplex, internum continuum, brevissime porrectum, superne paullum excisum, externum breviter expansum, margo superus ad insertionem recedens, tum antrorum protractus, ad carinulas 3 superiores leviter sinuosus. Diam. maj. 7,25, alt. 5,75.

Hab. in insula Panglao prope Bohol, comm. cl. O. Koch.

79. *Leptopoma roseum* Mlldff.

T. sat anguste umbilicata, subdepresso trochiformis, solidula, oblique striatula, carinulis 4—6, quarum una ad peri-

pheriam fortior, et lineis spiralibus confertis cincta, opaca, rosea, albido quasi irrorata. Anfr. 5 convexi, ad suturam planulati, ult. antice non descendens, basi planior, subglabrus. Apert. obliqua, subcircularis, intus aurantiaca, perist. duplex, externum latiuscule expansum, internum calloso-porrectum, marginibus callo crassiusculo junctis, columellari leviter sinuato cum basali angulum obtusum formante. Diam. maj. 18,5, min. 15, alt. 17 mm.

Hab. in montibus altioribus districtus Morong, insulae Luzon leg. coll. indigena.

80. *Leptopoma polillanum* Mlldff.

T. anguste umbilicata, depresso-conoidea, transverse subtiliter striatula, carinulis elevatis numerosis inaequalibus et in interstitiis lineis confertis spiraliter sculpta, solidula, opaca, albida. Anfr. 6 convexiusculi, spiram conicam acutiusculam efficientes, ult. convexior ad peripheriam carinula fortiore, interdum maculis fuscis ornata cinctus. Apert. obliqua, truncato-elliptica, perist. late expansum, vix incrassatum, marginibus callo junctis, columella sinuosa, reflexa, cum margine basali angulum obtusum formante. Diam. maj. 21, min. 16,5, alt. 18 mm.

Hab. in insula Polillo leg. coll. indigena.

81. *Leptopoma pulchellum* Q. et Mlldff.

T. sat anguste perforata, globoso-turbinata, tenuis, pellucida, subopaca, oblique temiter striatula, lineolis spiralibus subtilibus undique decussata, liris subelevatis 6—7 cincta, alba, saepe strigis flammulatis castaneis, taenia infraperipherica, interdum altera supera peripheriam ornata: spira regulariter conica, sat elevata, apice acuto. Anfr. 6 convexi, sutura sat profunda discreti, ult. teres, non descendens. Apert. parum obliqua, circularis, perist. late expansum, ad columellam profundiuscule sinuatum, subito attenuatum, in formis taeniatis macula castanea pictum. — Diam. maj. 13, alt. 13, apert. diam. int. 5,5, e. perist. 8, long. 8,5, alt. 8 mm.

Hab. in insulis Busuanga et Tangat archipelagi Calamianes dicti primus leg. J. Quadras.

82. *Leptopoma euconus* Mlldff.

T. anguste umbilicata, globoso conica, tenuis, pellucida, nitidula, transversim tenuiter striatula, lineolis spiralibus subtilibus, rugulosis, confertis undique decussata, albida, taenia castanea, saepe interrupta infra, interdum altera supra peripheriam pecta; spira gradata lateribus strictis. Anfr. $6\frac{1}{2}$ convexi. Apert. modice obliqua, circularis, perist. modice expansum, ad columellam parum excisum, paullum sinuatum. — Diam. 12, alt. 13 mm.

Hab. in insula Caron archipelagi Galamianes dicti leg. coll. indigena.

83. *Helicomorpha conella* Mlldff.

T. aperte umbilicata, globoso-conica, costulis tenuibus acutis, valde distantibus — 19 in anfractu ultimo — et in intersticiis lineolis minutissimis spiralibus sculpta, alba; spira subregulariter conica, lateribus vix convexiusculis apice acutulo subexcentrico, glabrato. Anfr. $4\frac{1}{2}$ teretes sutura profundissima discreti. Apert. parum obliqua, circularis, perist. duplex, externum parum expansum, tenue, internum multiplicatum, tubuli instar porrectum. — Diam. 1,6, alt. 1,6.

Hab. in insula Guimaras ipse legi.

84. *Helicomorpha costulata* Q. et Mlldff.

T. aperte umbilicata, globoso-depressa, solidula, confertim costulata, albida; spira semiglobosa, apice valde obliqua, subimmerso. Anfr. 4 perconvexi, sutura profunda impressa disjuncti, ult. ad aperturam paullum dilatatus, levissime deflexus. Apert. parum obliqua, subcircularis, perist. rectum, obtusum, incrassatulum, multiplicatum. — Diam. 2, alt. 1,33 mm.

Hab. in rupibus Bintuan insulae Busuanga.

85. *Arinia cuspidata* Mlldff.

T. vix rimata, subcylindraceo-oblonga, solidula, costulis sat distantibus, validiusculis undique sculpta, fulvo-flava; spira subcylindrica, superne conoidea, apice mucronato, obliqua, glabrato, acutulo. Anfr. $6\frac{1}{2}$ perconvexi, sutura profunda discreti, ult. vix constrictus, paullum distortus,

antice breviter ascendens. Apert. verticalis, circularis, perist. duplex, internum continuum, breviter expansum, sat incrassatum, porrectum, superne callo crassiusculo appressum, externum interruptum, sat late expansum. — Alt. 4,5, diam. max. 2,4 mm.

Hab. in Insula Coron archipelagi Calamianes dicti leg. C. Roebelen.

86. *Arinia (Leucarinia) minutior* Mlldff.

T. anguste sed aperte umbilicata, subcylindracea, confertim costulato-striata, alba; spira superne breviter conoidea. Anfr. 5 convexi, ult. medio leviter constrictus, antice paulisper ascendens, pone aperturam paullo distantius costulatus. Apert. verticalis, circularis, perist. duplex, externum interruptum, sat expansum, incrassatum, internum porrectum, superne appressum. — Alt. 1,6, diam 1,25 mm.

Hab. in insula Marinduque leg. coll. indigena.

87. *Arinia (Leucarinia) simulabris* Mlldff.

T. sat aperte perforata, ovato-conica, tenuiter sed sat distanter costulata, serieina, subpellucida, alba. Anfr. 5 convexi, superi spiram regulariter conicam efficientes, penultimus sinistrorum paullum prominens, ult. paullulum devians, medio sat constrictus, antice breviter ascendens, pone aperturam valde confertim costulatus. Apert. verticalis, subcircularis, perist. duplex, externum paullum expansum, internum sulco profundiuseulo ab illo separatum, continuum, superne subsolutum, margine dextro superne profunde sinuato. Alt. 2, diam. 1,25 mm.

Hab. in insula Samal prope Mindanao leg. coll. indigena.

88. *Arinia (Leucarinia) plagiostoma* Mlldff.

T. anguste perforata, ovato-conica, tenuis, pellucida, tenuiter costulata, alba; spira subcylindrica, superne convexo-conoidea, apice obliquo, glabrato. Anfr. 5 perconvexi, ult. sat devians, medio valde constrictus, tum valde ascendens. Apert. paullum retrorsum inclinata, circularis, perist. multiplicatum, crassissimum, exterum valde expansum, internum superne appressum, sat expansum. Alt. 1,5, diam. 1 mm.

Hab. in insula Samal prope Mindanao leg. coll. indigena.

89. *Diplommatina turritella* Mlldff.

T. vix rimata, turrita, costulato-striata, luteocornea; spira gracilis apice acuto. Anfr. 8 perconvexi, regulariter accrescentes, ult. initio constrictus, tum inflatus. Apert. diagonalis, subcircularis, perist. subduplex, expansiusculum, margo columellaris superne paullum excisus; lamella columellaris humili, spiraliter recedens. — Alt. 2.9, diam. 1.3 mm.

Hab. in montibus districtus Morong leg. coll. indigena.

90. *Diplommatina aculus* Mlldff.

T. vix rimata, graciliter turrito-conica, sat confertim costulata, pallide luteo-cornea; spira gracilis lateribus paullum concavis. Anfr. 8 perconvexi, ultimi parum distorti, ult. initio paullum constrictus, tum inflatus, antice brevissime ascendens, ad aperturam distantius costulatus. Apert. parum obliqua subcircularis, perist. duplex, externum interruptum, sat expansum, incrassatum, internum porrectum, marginibus superne callo tenui junctis, columella cum basi angulum subdistinctum formans. Lamella columellaris humili. Alt. 2.1, diam. 0.8.

Hab. in insula Marinduque leg. coll. indigena.

91. *Diplommatina prostoma* Mlldff.

T. non rimata, graciliter turrito-conica, glabriuscula, corneo-flavescens. Anfr. 7 convexi, superi 5 spiram subregulariter conicam apice acutiusculo rufescente formantes, ultimi valde distorti, ult. initio maxime constrictus, tum inflatus, ascendens et dextrorsum protractus. Apert. sat obliqua subcircularis, perist. duplex, externum interruptum, sat late expansum, incrassatum, internum expansiusculum, superne appressum. Lamella columellaris, modica, subhorizontalis. Alt. 1.75, diam. 0.75 mm.

Hab. in insula Marinduque leg. coll. indigena.

92. *Diplommatina gonostoma* Mlldff.

T. ovato-conica, solidula, argute costulato-striata, fulva. Anfr. 7, superi spiram subregularē leviter concavam efficientes, valde convexi, penultimus magnus, inflatus, ult. multo angustior, sat devians, initio constrictus, tum

tumidus, antice paullum ascendens. Apert. parum obliqua, arcta, rotundato-tetragona, perist. distincte duplex, exterrnum sat expansum, interruptum, ad basim columellae sat distincte angulatum, ad columellam profunde sinuatum appressum. Lamella columellaris modica, subhorizontalis. Long. 2.5, diam. 1.2 mm.

Hab. in insula Guimaras ipse legi.

93. *Diplommatina rubella* Mlldff.

T. dextrorsa, non rimata, ventrosulo-pyramidata, tenuis, subpellucida, dense costulato-striata, rubello-fulva; spira subregulariter conica, apice obtusulo glabrato. Anfr. $7\frac{1}{2}$ perconvexi, ult. angustior, paullum distortus, antice vix ascendens. Apert. parum obliqua, subcircularis, perist. duplex, exterrnum breviter expansum, interruptum, internum sulco parum profundo ab illo separatum, incrassatum, breviter expansum, superne callo latiusculo appressum. Lamella columellaris humilis, subhorizontalis, columella fere recta, cum margine basali angulum obtusum formans. Alt. 2.9, diam. 1.33 mm.

Hab. ad vicum Gimbalauan insulae Negros ipse legi.

94. *Diplommatina subcalcarata* Mlldff.

T. dextrorsa, vix rimata, elongate ovato-conica, fere biconica, solidiuscula, argute costulata, fulva; spira valde elevata, subregulariter conica, apice obtuso. Anfr. $6\frac{1}{2}$ perconvexi, ultimi 2 paullum deviantes, ult. initio modice constrictus, angustior, antice vix ascendens. Apert. parum obliqua, subauriformis, perist. duplex, exterrnum late expansum, interruptum, cum columella angulum fere rectum formans, ad angulum calcaris instar subproductum, internum sat expansum, superne callo lato appressum. Lamella columellaris humilis. Alt. 2, diam. vix 1 mm.

Hab. in insula Samal prope Mindanao leg. coll. indigena.

95. *Diplommatina (Sinica) oligogyra* Mlldff.

T. dextrorsa, rimata, graciliter ovato-conica, solidula, confertim costulata, corneo-fulva. Anfr. 5, superiores spiram conoideam apice obtuso efficientes, ult. angustior, paullum devians, brevissime ascendens. Apert. paullum obliqua,

rotundato-rhomboidea, perist. distincte duplex, internum superne callo lato appressum, sat porrectum, expansiusculum, sulco ab externo sat expanso, interrupto sejunctum. Lamella columellaris subhorizontalis, humilis sed sat valida, palatalis brevis, validiuscula, valde lateralis, parietalis profunda, validiuscula. Alt. 1.75, diam.

Hab. in insula Coron archipelagi Galamianae dicti leg. coll. indigena.

96. *Diplomatina (Sinica) megaloptyx* Mlldff.

T. sinistrorsa, vix rimata, ovato-conica, confertim costulato-striata, pallide cornea. Anfr. $6\frac{1}{2}$ —7 convexi, supremi spiram subregulariter conicam efficienes, ultimi 2 paulum deviantes, ult. initio constrictus, tum inflatus, antice brevissime ascendens. Apert. parum obliqua rotundato-subtetragona, perist. duplex, externum valde expansum, ad columellam appressum, internum sat expansum, sulco ab illo separatum, lamella columellaris valida, subhorizontalis, palatalis longa, valida, supra columellam conspicua. Long. 2.25, diam. 1 mm.

Hab. prope balnearium Sibul provinciae Bulacan leg. coll. indigena.

97. *Diplomatina (Sinica) concarospira* Mlldff.

T. dextrorsa, non rimata, elongate fusiformis, solidula, confertim costulata, subpellucida, albida; spira elongate turrita, lateribus concavis, apice acuto, glabrato. Anfr. 9 convexiusculi, sutura sat profunda discreti, penult. tumidus, prominens, ult. parum distortus, initio modice constrictus, antice vix ascendens. Apert. paullulum obliqua, subcircularis, perist. duplex, externum modice expansum, internum expansiusculum, paullum porrectum. Lamella columellaris parva, palatalis punctiformis. Alt. 2.5, diam. vix 1 mm.

Hab. in mentibus altioribus districtus Morong insulae Luzon leg. coll. indigena.

98. *Diplomatina (Sinica) oostoma* Mlldff.

T. dextrorsa, subrimata, ovato-conica, tenuiscula, oblique et sat confertim costulata, fulva. Anfr. $7\frac{1}{2}$ convexi,

ult. paullum devians, antice brevissime ascendens. Apert. modice obliqua, oblique ovalis, perist. late expansum, duplex, internum porrectum sulco ab externo separatum. margo columnellaris superne attenuatus, ad basim valde dilatatus. Lamella columnellaris valde humilis, palatalis mediocris. — Alt. 2,5, diam. 1,25 mm.

Hab. ad vicum Bislig insulae Mindanao leg. cl. O. Koch.

99. *Pupina josephi* Mlldff.

T. ventricosulo-ovato-conica, tenuis, pellucida, laevigata, lutescenti-albida; spira sat elevata, convexo-conoidea. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura vix impressa submarginata disjuncti, ult. paullum devians, antice brevissime ascendens. Apert. verticalis, angulato-ovalis, perist. vix expansum, temiter labiatum, margo superus superne angulo obtuso sat recedens; lamella parietalis sat elevata, tenuis, obliqua, a margine remota. Columella dilatata, parum callosa, revoluta, margo inferus fissura latiuscula ab illa separatus, extus tum sursum recurvatus, sub columellam desinens. Alt. 6,75, diam. supra apert. 4, c. apert. 5 mm.

Hab. in insula Balabac leg. cl. Josephus Quadras.

100. *Pupina spectabilis* Q. et Mlldff.

T. ovato-conica, tenuis, pellucida, laevis, valde nitens, corneo-brunnea; spira valde elevata, convexo-conoidea apice submucronato, obtusulo. Anfr. 6 convexiusculi, sutura parum impressa submarginata disjuncti, ult. vix devians, antice paullulum ascendens. Apert. verticalis, circularis, perist. modice expansum, sat labiatum, margo superus superne angulatim longe recedens, cum lamella parietali valida valde obliqua fissuram superam formans, columella valde dilatata, reflexa, fissura infera in foramen ovale subtus spectans desinens. Operc. normale. Alt. 10,5, diam. 5, c. apert. 6 mm.

Hab. ad rupem Bintuan insulae Busuanga.

101. *Pupina calamianica* Q. et Mlldff.

T. ovato-conica, solidula, laevis, valde elevata, lateribus valde convexis. Anfr. $5\frac{1}{2}$ pro genere sat convexi, ult. $\frac{5}{12}$ altitudinis subaequans, antice paullum ascendens.

Apert. verticalis, circularis, perist. sat expansum, margo superus superne breviter, sed valde recedens, in parte recedente sinuosus; lamella parietalis valde obliqua, fere horizontalis, intus marginem fere attingens. Columella brevis, sat dilatata, fissura infera latiuscula in foramen lateraliter apertum desinens. Long. 6, diam. supra apert. 3,5, c. apert. 4,25 mm.

Hab. in insula Busuanga, primus leg. J. Quadras.

102. *Pupina hyptiostoma* Q. et Mlldff.

T. oblique ovato-conica, solidula, laevigata, valde nitens, pallide lutescens; spira modice elevata, convexo-conoidea. Anfr. $5\frac{1}{2}$ fere plani, sutura vix distinguenda disjuncti, ult. sat devians, ventre applanatus, antice valde ascendens. Apert. retrorsum inclinata, subcircularis, perist. parum expansum, sat labiatum, margo superus superne paullatim parum recedens, lamella parietalis modica, obliqua, marginem non attingens, columella lata valde callosa, fissura infera valde obliqua, perangusta, foramen oblongum, angustum. Alt. 8, diam. 4,5, cum apert. 5,5 mm.

Hab. in insulis Sibuyan et Tablas.

var. *angustior*. T. gracilior, apert. minus retrorsum inclinata. Alt. 8, diam. 4, c. apert. 4,75 mm.

Hab. in insula Romblon.

103. *Pupina striatella* Q. et Mlldff.

T. ovato-conica, tenuis, pellucida, subtilissime sed conspicue striatula, pallide lutescens, valde nitens; spira sat elevata, convexo-conoidea apice obtusulo. Anfr. $5\frac{1}{4}$ convexiuseuli, sutura submarginata disjuncti, ult. sat devians, antice breviter ascendens. Apert. subverticalis, paullum retrorsum inclinata, circularis, perist. vix expansum, incrassatum, margo superus superne callo subnodiformi munitus, tum breviter recedens, cum lamella parietali subhorizontali sinulum subcircularis includens. Columella sat dilatata, callosa, fissura infera subhorizontalis, latiuscula, foramen oblongo-ovale. Alt. 5,25, diam. supra apert. 2,75, c. apert. 3,25.

Hab. in insula Hin prope Mindoro.

104. *Pupina quadra* MiIdff.

T. oblonga, subcylindrica, glabra, pellucida, valde nitens, laete flava; spira medio fere cylindrica, sursum convexo-conoidea apice obtusulo. Anfr. 6 planiusculi, ult. paullum devians, antice sat ascendens, ventre subapplanatus. Apert. paullum retrorsum inclinata, circularis, perist. expansiusculum, flavo-labiatum, margo superus ad insertionem vix recedens, superne nodulo subdentiformi intus lamellae instar producto munitus. Lamella parietalis modica, subverticalis, cum margine fissuram superam valde angustam formans, cum columella callo distincto juncta. Columella sat lata, valde callosa, fissura infera perangusta, subhorizontalis. Alt. 7,5, diam. supra apert. 3,25, e. apert. vix 4 mm.

Hab. in insula Luban leg. coll. indigena.

105. *Moulinia peregrina* Q. et MiIdff.

T. graciliter pupaeformis, tenuis, laevigata, pellucida, valde nitens, lutescenti-albida; spira medio subcylindrica, superne breviter convexo-conoidea apice obtusulo. Anfr. 5 planiusculi, sutura vix impressa, marginata disjuncti, ult. paullum devians, antice brevissime ascendens, ventre subplanatus. Apert. paullum retrorsum inclinata, circularis, perist. vix expansum, sat incrassatum, superne callo appresso continuum, fissura infera obliqua, perangusta. Alt. 5,3, diam. supra apert. 2,5, cum apert. 3 mm.

Hab. ad vicum Looe insulae Tablas.

106. *Moulinia streptaxis* MiIdff.

T. oblique ovata, glaberrima, pellucida, corneo-flavescentia. Anfr. 5 planiusculi, supremi spiram depresso conoideam apice acutiusculo effientes, ultimi valde deviantes, penult. valde prominens, ult. supra aperturam planatus, antice vix ascendens. Apert. verticalis, subtus paullum protracta, circularis, perist. sat expansum, incrassatum, labiatum; columella paullum dilatata, subexcavata, retrorsum curvata. Fissura valde declivis in foramen circulare lateraliter apertum desinetus.

Alt. 6, diam. 3,75 mm.

“ 5,5 “ 5 mm.

W.M. H. Smith, author, *Shoreline Biology Studies*,
Volume 10, 1970.

A horizontal bar composed of several small, square-shaped blocks of varying shades of gray, arranged in a pattern that suggests a digital signal or a series of binary code.

- To continue with planning, you have to identify what needs to be done, how to do it, who will do it, and to whom it will be reported. This is a process of defining the project, setting up a team, and defining the roles and responsibilities of each member. The team should consist of people with different skills and experience, and they should be able to work together effectively. The project plan should be clear and concise, and it should include a timeline, budget, and milestones.

www.ijerph.org

A horizontal grayscale bar with a smooth gradient from dark gray on the left to white on the right, representing a grayscale calibration or a background image.

- **George Bush, George H.W. Bush, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, Kamala Harris**

The above is a list of presidents and former presidents of the United States of America. These names are often used in political discourse, news media, and other contexts related to politics. Some names are well-known, while others may be less familiar. Other names reflect historical events, such as Lincoln, Washington, and Franklin D. Roosevelt. Some names are more recent, such as Clinton, Bush, and Obama. Some names are controversial, such as Trump and Biden.

- It is questionable that humans have any significant role in climate change. The main argument against this is that the increase in atmospheric CO₂ levels has been accompanied by a rise in temperature, which is consistent with the greenhouse effect. However, there is also evidence that the Earth's temperature has been increasing over the past century, which cannot be attributed to human activity alone.

- Q. Was there any other reason or motive which induced you to do so?

spiralibus minutissimis rugulosis decussatula, nitidiusecula, corneo-fulva; spira subregulariter conica apice acuto, subinueronato, glabrato. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, regulariter accrescentes, sutura impressa haud marginata discreti, ult. carina acutiuscula albescente carinatus, antice paulisper descendens. Apert. maxime obliqua, securiformis, perist. sat expansum, tenui, intus sublabiatum, columnella brevis, valde excavata, basi angulo fere dentiformi cum margine basali juncta, anfr. ultimo ad columellam profundiuscule umbilici instar excavato. Operc. tenui, subpellucidum, ad columellam bifidum, lamina supra valde sursum recurvata, processu dentiformi validiusculo praedita. Diam. maj. 8, alt. 5,25 mm.

Hab. ad balnearium Sibul provinciae Bulacan leg. coll. indigena.

111. *Georissa denselirata* Mlldff.

T. rimata, turbinata, transverse striatula, lirulis spiralibus confertis sculpta, corneo-rufa. Anfr. $4\frac{1}{2}$ celeriter accrescentes, perconvexi, ulti. magnus, $\frac{2}{5}$ alt. adaequans. Apert. diagonalis, late ovalis, perist. simplex, acutum, margine columellari dilatato, reflexo. Alt. 1,5, diam. 1 mm.

Hab. in insula Marinduque leg. coll. indigena.

112. *Georissa elongatula* Mlldff.

T. elongate conica, solidula, transverse striatula, lineis spiralibus minutissimis, maxime confertis decussata, opaca, pruinosa, fulva; spira elongata apice glabrato nitente. Anfr. 4 convexi, sat celeriter accrescentens. sutura profunda disjuncti. Apert. sat obliqua, acuminato-ovalis, perist. rectum, obtusum, intus sublabiatum. Columnella valde dilatata, calloso-incrassata, extus subexcavata.

Hab. in insula Tangat archipelagi Galamianes dicti leg. C. Roebelen.

113. *Georissa styloptycta* Mlldff.

T. imperforata, elongate globoso-conica, solidula, transverse confertim costulato-striata, liris spiralibus sat confertis

cineta, rubello-fulva; spira sat elevata, gradata. Anfr. $4\frac{1}{2}$ perconvexi, supra peripheriam angulati, ult. paullum descendens. Apert. diagonalis, truncato-elliptica, perist. superne rectum, obtusum, basi paullum expansum, sublabiatum. Columella latissima, extus profundiuscule excavata, plica acuta, arcuata in marginem basalem desinente circumdata. Diam. 1,75, alt. 2,25.

Hab. in insula Coron archipelagi Calamianes dicti leg.
C. Roebelen.

114. *Paludomus (Philopotamis) quadrasi* Middff.

T. vix rimata, ovato-conoidea, solida, sulcis confertis, subaeque distantibus sculpta, fusca; spira breviter conoidea apice eroso. Anfr. qui supersunt 2—3 convexi, sutura appressa, marginata disjuncti, ult. tumidulus. Apert. parum obliqua, ovalis, perist. rectum, subacutum, intus calloso-labiatum, columella valde dilatata, crassiuscula, callo forti cum margine externo juncta. Operc. normale.

Alt. 18, diam. 15,5 mm.

Hab. in insula Busuanga.

Nachträge zu dem Aufsatze von F. Neumann:
Die Molluskenfauna des Königreiches Sachsen.

Von
Dr. H. Simroth.

Ich hatte geglaubt, die Anregung, welche Neumann durch seine neue Zusammenstellung der sächsischen Mollusken in diesen Blättern gegeben hat, würde bald von Seiten so manchen Sammlers Nachfolge und Ergänzung finden. Da das bisher nicht geschehen ist, will ich selbst wenigstens einiges zur Vervollständigung beitragen. Neumann hat die Arbeiten von Ehrmann und mir (zum Theil in dem Sitzungsbericht der naturf. Ges. Leipzig, zum Theil an anderen Orten) nicht berücksichtigt. Sie ergeben theils eine Steigerung der Artenzahl, theils eine Bereicherung der Fundorte.

Als neue Arten kommen hinzu:

Planorbis rotundatus Poiret. Leipzig.

Hyalina nitens Mich. Leipzig.

Pupa inornata Cl. = *Pupa edentula* Drap. Leipzig (Ehrmann).

Agriolimax laevis Müller, dürfte nur in den Nadelwäldern, namentlich der Gebirge fehlen.

Limax tenellus Nils. In allen Bergwäldern, in den Nadelwäldern der Ebene, selten in den Laubwäldern. Speciell führe ich an Leipzig, Sächsische Schweiz, verschiedene Stellen des Erzgebirges (Bienenmühle u. a.).

Amalia marginata Drap., meines Wissens zuerst von Böttger bei Freiberg gefunden. Ebenso von Loschwitz bei Dresden angegeben. Bestimmt Doebe bei Grimma, ebenso Filsen weiter abwärts, sowie Sächsische Schweiz (Schandau).

Arion subfuscus Drap. gemein namentlich in den Nadelwäldern, zumal der Gebirge. Aber auch sonst in Wäldern zweifellos verbreitet, bei Leipzig z. B. reichlich in der Harth, selten im Rosenthal.

Arion brunneus Lehmann. Bindenlose erwachsene Formen gelegentlich zwischen den normalen, z. B. im Erzgebirge. Die scharf zweifarbige Jugendform, mit braunem Rücken und hellen Seiten in scharfer Abgrenzung, die hier und da local vielleicht familienweise auftritt, ist mir aus Sachsen noch nicht bekannt geworden.

Arion intermedius Normann = *A. minimus* Simroth, von mir zuerst in der Harth bei Leipzig gefunden, später auch bei Rochsberg im Muldenthal; vermisst im Erzgebirge. Bei seiner Kleinheit leicht übersehen oder mit Jugendformen anderer Arten verwechselt.

Arion Bourguignati Mab. (= *A. circumscriptus* Johnst.) jedenfalls im Flachland so ziemlich überall, nach den Gebirgen wohl etwas seltner; dort fand ich auch bei Bienenmühle die hellere Laubwaldform ohne gelbe Binden vereinzelt.

Als fraglich muss wohl der *Planorbis Rossmaessleri* Auerswald bei Leipzig gelten. Ehrmann suchte ihn vergebens; die Gräben und Sümpfe, die er erwähnte, scheinen zugeschüttet zu sein.

Wenn wir auch von ihm abssehen, so scheint mir doch die Hinzufügung nicht ganz unwichtig. Während Neumann für einen Zeitraum von vierzig Jahren einen Zuwachs von drei Arten constatiren konnte (von 117 auf 120), so fallen die neun hier genannten schon in's Gewicht, mag man auch über die Abtrennung von *Hyalina nitens* und *nitidula* noch schwanken. Ich selbst aber habe nie eigentlich faunistisch gesammelt, wenn ich auch den Nacktschnecken fortdauernd ein näheres Augenmerk zuwandte. Ich sollte daher meinen, dass eifrige Localstudien noch manche hübsche Bereicherung bringen dürften.

Noch schliesse ich einige Fundortsangaben an, die in Neumann's Zusammenstellung fehlen. Sie würden selbstverständlich bei regerem Sammeln sich noch sehr vermehren lassen.

Planorbis marginatus Drap. Leipzig.

Planorbis albus Müll. Leipzig.

Planorbis complanatus L. Leipzig.

Limnaeus stagnalis L. Leipzig.

Limnaeus amplius Hart. Leipzig. (im stark strömenden Kuhburger Wasser).

Limnaeus pereger Müll. Leipzig.

Limnaeus minutus Drap. Leipzig.

Ancylus fluvialis Müll. Leipzig.

Succinea oblonga Drap. Leipzig.

Cionella lubrica Müll. Leipzig.

Clausilia laminata Mont. Leipzig.

Clausilia biplicata Mont. Leipzig.

Clausilia plicatula Drap. Leipzig.

Pupa pygmaea Drap. Müll. Leipzig.

Pupa angustior Jeffr. Leipzig.

Pupa antivertigo Drap. Leipzig.

Helix nemoralis L. Leipzig.

Helix hortensis Müll. Leipzig. (Kleine dünnchalige Formen mit farblosen, durchscheinenden Bändern auf feuchtem Urgebirge, z. B. Bienenmühle).

Helix arbustorum L. Leipzig.

Helix fruticum Müll. Leipzig.

Helix incarnata Müll. Leipzig.

Helix umbrosa Pts. Leipzig.

Helix sericea Drap. Leipzig.

Helix aculeata Müll. Leipzig.

Helix pulchella Müll. Leipzig.

Vitrina elongata Drap. Leipzig.

Arion empiricorum Fér. Leipzig.

Arion hortensis Fér. Leipzig.

Limax variegatus Drap. Leipzig.

Limax cinereus List. Leipzig.

Limax cinereoniger Vlf. Leipzig., Erzgebirge Bienenmühle, Sächsische Schweiz, Königstein.

Limax cinereoniger var. *Harreri* Heynem. Bienenmühle, zwischen ganz dunkeln.

Digitized by Google

Eine merkwürdige Form von *Pupa pagodula* Desm.

Von

Dr. V. Sterki.

Vor einigen Jahren erhielt ich aus Frankreich mehrere Exemplare der genannten Art; Fundort „Payence“. Dieselben weichen so sehr von der gewöhnlichen Form ab, wie es kaum von irgend einer andern Art bekannt ist, dass man sie für eine durchaus verschiedene Species halten müsste, wenn nicht die Schale im übrigen mit der typischen Form vollständig übereinstimmend wäre. Vielleicht finden sich

auch Zwischenformen.— Ob dieselbe irgendwo beschrieben worden, ist mir unbekannt; doch dürfte eine Notiz darüber von Interesse sein.

Das Gehäuse ist von gewöhnlicher Grösse, die Rippenstreifung oben mässig dicht, im letzten halben Umgang viel dichter; entsprechend der zu langen Gaumenfalte, ist ein mässig tiefer Eindruck, und ein solcher wieder in der äussern Mündungswand. Unter dem innern Ende der grössern Gaumenfalte, die sehr hoch und stark ist, d. h. zwischen ihr und der Basis, und gegenüber der starken Columellarlamelle, ist eine kürzere aber ziemlich starke Falte, und eine dritte darüber, etwas tiefer im Gehäuse; ganz oben nahe der Naht, ist eine sehr feine aber deutliche Suturalfalte. Ausserdem sind zwei Lamellen tief innen auf der Parietalwand: eine ziemlich gut entwickelt, langsam ansteigend und abfallend, in der Mitte und eine andere sein, niedrig, nahe der Naht, beide etwa $\frac{1}{3}$ Umgang entsprechend, und mit dem innern Ende über der Mündung stehend. Die Gaumenfalten sind von aussen durch die Schale sichtbar; doch um ihre Gestalt und Grösse, sowie um die parietalen, und die Spindelfalte zu sehen, muss die Schale geöffnet werden. In Exemplaren von verschiedenen Orten der österreichischen Alpen war keine Spur der erwähnten Lamellen und Falten zu sehen, weder durch die Schale, noch im geöffneten Gehäuse. Es mag noch erwähnt werden, dass bei unserer Art die Spindelfalte zuerst spiralig ist, und sich dann nach der Basis wendet, der sie, wenn stark entwickelt, breit aufruht.

Die vorliegende Form ist offenbar mindestens eine bedeutungsvolle Varietät unserer Art, und möchte mit dem Namen *perplicata* nicht unpassend bezeichnet werden.

New Philadelphia, Ohio, Januar 1894.

Diagnosen neuer Arten.

Von

E. von Martens.

1. *Helix (Acusta) plicosa* sp. n.

T. aperte perforata, globosa, confertim plicato-striata, flavescenti-vel rufescenti cornea; spira sat elevata, conoidea; anfr. 6, convexiusculi, sutura sat profunda divisi, ultimus inflatus, rotundatus; apertura paulum obliqua, lunato-circularis, peristoma simplex, rectum, margine columellari arcuato, triangulatim reflexo, plus minusve rosaceo.

Diam. maj. 25, min. $20\frac{1}{2}$, alt. $21\frac{1}{2}$; aperturae diam. 19, alt. 15 mm. Japan, Rolle.

In der allgemeinen Gestalt zwischen *H. sieboldiana* Pfr. und *ravida* Bens. stehend, breiter als erstere und nicht so breit als letztere (in der Richtung des grossen Durchmessers), von beiden aber durch die scharfe Rippenstreifung leicht zu unterscheiden. Das eine grössere Exemplare, dessen Ausmessungen angegeben sind, ist gelblichbraun, auf den oberen Windungen schon etwas röthlich, das zweite nur 20 mm im Durchmesser, auch auf der letzten mehr röthlichbraun, eine Farbenvariation wie sie z. B. auch bei *H. rufescens* an demselben Fundorte vorkommt.

2. *Lippistes rollei* sp. n.

T. transversim elongata, striis spiralibus elevatis numerosis exarata, obtuse biangulata, nitida, pallide rubella; anfr. $1\frac{1}{2}$, contigui; apertura quadrangula, extrorsum dilatata, peristome simplice, margine columellari appreso, paullum incrassato, supero et externo rectilineis, infero leviter sinuato. Diam. maj. 7, min. 3, alt. 4; apert. diam. $4\frac{1}{2}$, alt 4 mm.

Japan, bei Iki in feinem Sand gefunden; von H. Rolle erhalten.

Durch feinere Streifung und rascher zunehmende Windungen von der typischen Art der Gattung *Lippistes Montfort* 1810 (*Argonauta cornu Fichtel et Moll.* 1803, *Cornu carinatum* Schumacher 1817) aus Süd-Afrika verschieden. Ob das einzige mir vorliegende Stück völlig erwachsen ist oder bei weiteren Wachsthum die letzte Windung vielleicht auch noch ein wenig sich ablösen würde, kann ich nicht entscheiden. *Lippistes* dürfte vermutlich in die Nähe von *Cyclostrema* gehören, während die öfter damit zusammen geworfene Gattung *Separatista*, von A. Adams 1850 auf *S. grayi* gegründet, durch entschieden vortretende Spitze und dunkle Schalenhaut unterschieden, ganz nahe an *Trichotropis* herankommt, vgl. z. B. *Trichotropis blainvilleana* Petit Journ. de Conch. II 1851 p. 22 Taf. 1 Fig. 5 (von den Gebrüdern Adams gen. II p. 136 zu *Separatista* gestellt) mit *Tr. bicarinata* Brod. et Sow.

Diagnosen neuer orientalischer Arten.

Von

Hermann Rolle.*)

1. *Helix (Levantina) lapithoënsis* n.

T. perspectiviter umbilicata, depressa, solidula, laeviuscula, infra suturam tantum distinctius striatula, fasciis 5 fusco-albo fulguratim interruptis ornata; spira vix elevata, apice obtuso, concolore. Anfr. 4 convexi, sutura profunda discreti, sat celeriter crescentes, ult. aperturam versus dilatatus, antice profunde deflexus.

*.) Ich gebe hier die vorläufigen Diagnosen einer Anzahl der von mir auf meiner Sammelreise erbeuteten Novitäten: die genauere Beschreibung und Abbildung wird in einer eigenen Arbeit erfolgen, welche ich mit Herrn Dr. Kobelt zusammen herausgeben werde.

Apert. perobliqua ovato-piriformis faucibus fuscescentibus; perist. incrassatum, undique late expansum et reflexum, albido-fuscescens: marginibus perconniventibus, callo crasso junctis, columellari dilatato, umbilici tertiam partem vix tegente. Diam. maj. 37, min. 28, alt. 19, diam. apert. 23, min. 18, diam. umbil. 7,5 mm.

Hab. Lapitho prope monasterium Sima ins. Cyprus.

2. *Helix (Levantina) gertrudis* n.

T. vix obtecta perforata, depresso-globosa, solida, ruditer et irregulariter striatula, sub epidermide tenuissima fuscescente griseo-fuscescens, quinquefasciata, fasciis strigis fulguratis albis praesertim in parte supera pulcherrime interruptis; spira convexo-conica, apice magno, plano, concolore. Anfr. 4 convexi, regulariter crescentes, sutura impressa, inter inferos levissime crenulata et distincte albomarginata discreti, ult. sub-inflatus, antice perprofunde deflexus. Apert. perobliqua, rotundato-ovata, intus fuscescens; peristoma incrassatum, undique fere aequilatum, marginibus quam in Hel. lapithoensi minus conniventibus, callo percrasso fere continuis, columellari umbilicum omnino occludente, appresso, perforationem minimam vix relinquente. Diam. maj. 34—36, min. 26,5—27, alt. 21, diam. apert. 25—18 mm.

Hab. Belpais ins. Cyprus.

3. *Helix (Levantina) chrysostomi* n.

T. vix obtecta rimata, subglobosa, solida, ruditer et irregulariter striatula, sub epidermide tenuissima fuscescente griseo-fuscescens, quinquefasciata, fasciis albo interruptis; spira conica, apice laevi, magno, obtuso, concolore; anfr. 4 convexi, regulariter crescentes, ult. aperturam versus haud dilatatus, antice perprofunde deflexus. Apert. perobliqua, subcirculari-piriformis,

intus fuscescens; peristoma tenue, undique late expansum et reflexum, albidum vel fuscescens, margine supero multo angustiore, marginibus conniventibus, callo crasso nitido junctis, columellari dilatato, umbilicum fere omnino ocludente.— Diam. maj. 29, min. 23, alt. 21.5, diam. apert. 18.5 : 17 mm.

Hab. Santo Chrysostomo insulae Cyprus.

Affinis praecedenti, differt spira magis elata, anfr. ult. haud dilatato, apert. magis circulari.

4. *Helix (Macularia) callirhoë* n.

T. omnino exumbilicata, depressa, solida, parum nitens, oblique et sat ruditer striatula, sub epidermide tenuissima fugaci fusca griseo-fusca, fasciis fusco-albo interruptis, secunda et tertia confluentibus, ornata; spira breviter conica, apice obtuso. Anfr. $4\frac{1}{2}$ convexi, sutura vix impressa, subcrenulata, angustissime albo-marginata discreti, regulariter sed sat celeriter crescentes, ultimus rotundatus, subcompressus, circa umbilicum excavatus, antice dilatatus et profunde deflexus, prope suturam spiraliter striatus. Apert. perobliqua, ovato-rotundata, parum lunata, faucibus fuscescentibus; perist. albidum, expansum, extus et infra breviter reflexum, marginibus conniventibus, vix callo tenuissimo junctis, columellari supra dilatato, umbilicum fere omnino claudente, aciem versum compresso. — Diam. maj. 45—50, min. 38—40, alt. 24—26, dimens. apert. 23—30 mm.

Hab. in Lycia, in montibus Ak-Dagh nec non prope Macri. Differt ab Hel. lycica Martens testa multo magis depressa, anfractu ultimo compresso, supra spiraliter striato.

5. *Zonites megistus* n.

T. permagna, latissime et perspectiviter umbilicata, de- pressa, parum solida, oblique ruditer striata, in au-

fractibus superis et in parte supera anfractus ultimi subtilissime granulata lineisque spiralibus obsoletissimis cincta, vix nitens, luteo-virescens, in speciminibus bene conservatis basi vix pallidior, plerumque striga unica lutea ad initium anfr. ultimi inunita. Spira parum convexa, apice parvo, granulato. Anfractus 7 regulariter crescentes, sutura impressa discreti, superi carinam distinctam, suturam sequentem exhibentes, ultimus convexior latior, leviter compressus, basi vix planatus, carina aperturam versus evanescere. Aertura magna, late rotundato-ovata, valde lunata; peristoma simplex, intus remote sublabiatum, marginibus conniventibus, haud junctis, columellari ad insertionem vix dilatato. — Diam. maj. spec. max. 57, min. 48, alt. 30, diam. apert. 27 mm.

Hab. prope Castellorizo insulae Meïs (Megiste olim).

— 139 —

Literaturbericht.

Martini-Chemnitz, Conchylien-Cabinet. Lfg. 404 und 405.

Enthält die Fortsetzung von *Helix* von Kobelt bearbeitet. Zum ersten Mal abgebildet werden: *Helix rohdei* Dohrn t. 185 fig. 3, 4; *lepidophora* Dohrn t. 185 fig. 5 6; *delphax* Dohrn t. 186 fig. 5—7; *inquieta* Dohrn t. 187 fig. 9, 10; *geotrochus* Mlldft. t. 88 fig. 4, 5; *strubelli* Bttg. t. 194 fig. 1, 2. Neu aufgestellt ist *Helix subnimboosa* t. 192 fig. 78 aus Japan.

Bergh, Dr. R., die Gruppe der Doridiiden. In Mitth. Zoolog. Station Neapel, XI. p. 107 t. 8.

Giebt die genaue Anatomie von *Dor. bicoloratum* Ren., mit dem *Meckelii* delle Chiaje und *membranaceum* Meckel vereinigt werden und von *D. depictum* Renier (= *carnosa* Cuv. = *aplysiaeforme* delle Ch. = *Acera marmorata* Cantr.) Als neu beschrieben werden ferner *D. punctilucens* aus Westindien p. 131 t. 8 fig. 16; *D. purpureum*, *diomedaeum* und *ocelligerum* aus dem stillen Ocean, sowie *Navarchus aenigmaticus* von Panama.

Bulletino della Società malacologica italiana. Vol. XVIII.
1893 fogli 4—7.

- p. 49. Brusina, S., *Saccoja*, nuovo genere di gasteropodi tertiari italo-francesi.
- p. 55. Foresti, L., *Enumerazione dei brachiopodi e dei molluschi pliocenici dei dintorni di Bologna*.
- p. 73. Bonarelli, Guido, *Hecticoceras*, novum genus Ammonitarum (für die Gruppe des *Ammonites hecticus* Rein., nebst subg. *Lanuloceras* für *Amm. lunula* Rein.).
- p. 109. Pantanelli, Dante, *Campylaea nicatis* Costa. Sie ist eine ächte Felsenschnecke und findet sich nicht unter 1000 m Meereshöhe.

Sabidussi, Hans, der Buchenicaldteich und seine Muscheln.
In „Carinthia“, II No. 5, 1893, 12 p.

Der Teich ist ein allerdings vielfach umgearbeiteter und vertiefter Arm der Glansfurt und steht bei Hochwasser in direkter Verbindung mit den Zuflüssen des Wörthsees; in ihm leben *Unio batavus*, *Anod. cellensis* und *piscinalis*, die beiden letzteren immer, besonders in den Jugendformen scharf zu unterscheiden.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 1893.

- p. 219. Woolman, Lewis, Cretaceous Ammonites and other Fossils near Moorestown N. S.
- p. 234. Sterki, Dr. V., Observations on Vallonia.
- p. 285. Dall, Wm. H., the Phylogeny of the Docoglossa. Der Autor hält gegenüber Thiele seine Ansichten aufrecht.
- p. 310. Ford, John, Remarks on a new species of *Cypraea* (gregori, früher für eine Varietät von *cruenta* angesehen, mit Abbildung).
- p. 328. Pilsbry, Henry A., a new marine Gasteropod from New Jersey (*Sipho stonei* t. 14 f. 1—3).
- p. 338. Pilsbry, Henry A. Notes on a Collection of Shells from the State of Tabasco. *Neu Eucalodium compactum* p. 338 t. 14, f. 4; *Pachychilus* (between *polygonatus* and *immanus*) t. 14, f. 5, 6; *P. glaphyrus* *potamarchus* p. 339 t. 14 f. 7; *Potamanax* n. gen., zunächst mit *Hemisimus* verwandt, aber ohne Kerbe an der Basis; *P. revirosai* n. p. 341 t. 14 f. 8, 9.
- p. 387. Pilsbry, Henry A., Preliminary outline of a New Classification of the *Helices*.

Proceedings of the U. S. National Museum. XIV. 1891.

- p. 95. Stearns, Robert E. C., List of North American Land- and Fresh-water Shells received from the U. S. Department of Agriculture, with notes and comments thereon.
- p. 173. Dall, W. H., on some new or interesting West American Shells obtained from the Dredgings of the U. S. Fish Commission Steamer Albatross in 1888, and from other Sources. With pl. V--VII.
- p. 307. Stearns, Robert E. C., List of Shells collected on the West Coast of South America, principally between lat 7° 30' S. and 8° 49' N. by Dr. W. H. Jones. 209 Arten mit sicheren Fundorten, keine n. sp.
— — Vol. XVI.
- p. 317. Stearns, Robert E. C. Preliminary Report on the Mollusca Species collected by the U. S. Scientific Expedition to West Africa 1889—90. 122 sp.; neu *Petaloconchus interliratus* (nomen prov.).
- p. 341. — — —, on rare and little known Molluses from the West Coast of North and South America, with descriptions of new Species. (*Onchidella binneyi* t. 50 f. 1, 2; *Nassa brunneostoma*; *Chicoreus palmarosae mexicana*, *Leeanus*; *Tectarius atyphus* t. 50 f. 5; *Uvanilla regina* t. 50 f. 6, 7; *Chlorostoma gallina* var. *multifilosa* t. 50 f. 8, 9.)
- p. 353. — — —, Scientific Results of Explorations of the U. S. Fish Commission Steamer Albatross XXV. Report on the Mollusk-Fauna of the Galapagos Islands with descriptions of new Species. Neu *Pleuropyrgus Habeli* t. 51 f. 1; *Onchidium Lesliei* t. 51 f. 2, 3; *Onchidella Steindachneri Semp.* t. 51 f. 4, 5; *Nitidella incerta* t. 51 f. 6; *Tectarius galapagiensis* t. 51 f. 7. Das Verzeichniss aller bekannten Mollusken umfasst 288 sp.
- p. 454. — — —, XXVI. Reports of the Pteropods and Heteropods, by James J. Peck. With pl. 53—55. Keine n. sp.
- p. 471. Dall, W. H., a subtropical Miocene Fauna in Arctic Siberia. Am Golf von Penjinsk, unter 62° n. Br. finden sich *Ostrea gigas*, *Seimene Stimpsoni* n., *Siphonaria penjinae* n., *Conus okhotensis* n., *Cerithium cymatophorum* n., *Diloma ruderata* n.
- p. 591. Simpson, Chas. T., on some fossil Unios and other Freshwater Shells from the drift at Toronto, Canada, with a Review of the distribution of the Unionidae of Northeastern North America.
- p. 743. Stearns, Robert E. C., Notes on recent collections of North American Land-, Freshwater and Marine Shells received from the U. S. Department of Agriculture. Keine n. sp.

- Lönnberg, E., Ofversigt over Sveriges Cephalopoder.* In Beh. Vet. Ak. Handl. Stockholm 1891. 8° 41 p. mit 1 Taf. Non vidi.
- Vayssière, A., Etude anatomique sur le Coleophysis (Utriculus) truncatula Brug.* In Annales Fac. Sc. Marseille 1893. 4°. 28 p. mit 1 pl.
- Lillie, F. R., Preliminary Account of the Embryologic of Unio complanatus.* In Journal of Morphol., Boston 1893. 10 p. with 1 pl.
- Girard, A. A., Revision des Mollusques du Muséum de Lisbonne. III. III. Description de deux Ennea nouveaux de l'île Fernando Po. — IV. Note sur le Coelaxis Layardi. — V. et VI. Revision de la faune malacologique des îles St. Thomé et du Prince (Mollusques terrestres et fluviatiles).* In Jorn. Sc. Math. Phyc. nat. 1893. 41 pg. avec 1 planche.
- Kew, H. W., the Dispersal of Shells; an inquiry into the means of dispersal possessed by Freshwater and Land-Mollusca.* With a preface by A. R. Wallace. London 1893. 8°, 306 pg. with illustr. — Non vidi.
- Tonning, H., l'Ostréiculture.* Aperçu sur l'état actuel de cette industrie (Anglais et Français). Copenhague 1894. 8°. Non vidi.
- Appelof, A., Teuthologische Beiträge. III. IV.*
Bemerkungen über die auf der norwegischen Nordmeer-Expedition 1876 - 79 gesammelten Cephalopoden. Ueber einen Fall von doppelseitiger Hektokotylisation bei Eledone moschata. Bergen, Mus. Aarbog 1893, gr. 8°. 14 p. mit 1 Taf. Non vidi.
- Babor, J. a J. Kostel, Prispeky ku poznání pomeru polklarnich u některých Limacidů.* Aus Vestnik Králové ceské opolecnosti nauk. Trida mathematicko-přírodovedecká 1893. 8°, 7 p. mit Taf. 20.
- Böhmiscl. Behandelt die Zungenzähne einer Anzahl Nacktschnecken, darunter ein neuer, aber nicht benannter Malacolimax.

Ihering, H. von, die Süßwasserbivalven Japans. In Abhandl.
der Senckenberg. Gesellschaft XVIII. Frankfurt 1893.
4°, mit Tafel.

Als neu beschrieben werden *Anodonta Kobelti* p. 151 fig. 1; *An. haconensis* = *cellensis* juv. Kobelt Fauna t. 22 fig. 4; *Unio yokohamensis* = *japanensis* Kob. nec Lea; *U. haconensis* p. 161 fig. 3. Mit China gemeinsam sind 62% aller Arten; eigene Typen hat Japan nicht, aber es fehlen ihm zahlreiche Typen, die aus Indien nach Südchina vordringen.

Journal de Conchyliologie 1893, No. 3.

- p. 153. Morlet, L., Descriptions d'espèces nouvelles, provenant de l'Indo-Chine (Suite). Neu *Melania Dugasti* p. 153 t. 6 fig. 1; — ferner zum erstenmal abgebildet: *Melania Hamonvillei* Brot fig. 2, *Lacunopsis Dugasti* fig. 3; *Unio Dugasti* fig. 4.
- p. 157. Dautzenberg, Ph., Mollusques nouveaux recueillis du Tonkin par M. le capitaine Em. Dorr. *Ennea calva* p. 157 t. 7 fig. 1; *E. atomaria* p. 159 t. 7 fig. 2; *Xesta unilineata* p. 161 t. 7 fig. 4; *Streptaxis dorri* p. 160 t. 7 fig. 3; *Macrochlamys tenuigranosa* p. 162 t. 7 fig. 5; *Microcystis mirmido* p. 162 t. 8 fig. 1; *Kaliella haiphongensis* p. 163 t. 8 fig. 2; *Pupina dorri* p. 164 t. 8 fig. 3.
- p. 166. Dautzeuberg, Ph., description d'un Mollusque nouveau provenant du Congo Français. (*Spatha corrugata* t. 8 fig. 5).
- p. 166. Drouët, H., Unionidae nouveaux ou peu connus (suite). Neu *Unio circinatus*, Valencia; *U. rhysopygus*, Almenar; *U. cameratus*, Galicien, Duero; *U. limosellus*, Duero; *U. decurtatus*, Duero, Tago; *U. almenarensis*, Almenar; *U. callipygus*, Guadiana; *U. turdetanus*, Sevilla; *Anod. macella*, Schweden; *An. lanceolata*, Schweden; *An. limbata*, Schweden; *An. laevigata*, Mälarsee; *An. retziana*, Stockholm; *An. gregalis*, Schweden, Finnland; *An. aeneolina*, Schweden; *An. pulchella*, Schweden; *An. fuliginea*, Schweden.
- p. 179. Grosse et Fischer, Diagnosis Mollusei novi, reipublicae mexicanae incolae (*Unio Sallei*).
- p. 179. Brusina, S., Note préliminaire sur le groupe des *Aphanostylus*, nouveau genre de Gastropode de l'horizon à *Lyraea*, et sur quelques autres espèces nouvelles de Hongrie. Die neue Gattung ist wahrscheinlich mit *Valvata* verwandt.

Neues Mitglied:

Herr Julius Heller, Firma: Bald. Hellers Söhne in Teplitz.

Eingegangene Zahlungen:

Pastor, B., Mk. 6.—; Weinland, H., Mk. 6.—; Roos, K., Mk. 6.—;
Heller, T., Mk. 6.—; v. Ihering, S. P., Mk. 18.—; Höcker, G., Mk. 6.—;
Friele, B., Mk. 29.16.

Anzeigen.

Wichtige Preisermässigung.

Wir haben das in unserem Verlage erschienene
Fundamentalwerk der systematischen Conchyliologie:

Dr. Carl Agardh Westerlund's
Fauna der in der palaearktischen Region

[Europa, Kaukasien, Sibirien, Turan, Persien, Kurdistan, Armenien, Mesopotanien, Klein-
asien, Syrien, Arabien, Egypten, Tripolis, Tunesten, Algerien und Marocco]
lebenden

Binnenconchylien.

2 Bände in 7 Heften mit 2 Supplementheften. 1886—1890.
20] 2061 Seiten in Gross-Oktav.

für kurze Zeit (von M. 67,50) auf **40 Mark** ermässigt.

Der Preis der einzelnen Hefte bleibt unverändert.

R. Friedländer & Sohn,
Berlin N. W. Carlstr. 11.

In J. U. Kern's Verlag (Max Müller) in Breslau ist soeben
erschienen:

Molluskenfauna von Schlesien.

Von

21] **E. Merkel,**

Lehrer am Realgymnasium zum heiligen Geist in Breslau.

Herausgegeben mit Unterstützung der Schlesischen
Gesellschaft für Vaterländische Cultur.

Gross 8°, geheftet. — Preis 7 Mark.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Berittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Die Conchylienfauna der altpleistocaenen Travertine des Weimarisch-Taubacher Kalktuffbeckens

und

Vergleich der Fauna mit æquivalenten Pleistocænablagerungen
von

Dr. phil. Arthur Weiss (Weimar).

Obgleich über das Weimarisch-Taubacher Travertinbecken durch Herbst, A. Portis (1), F. v. Sandberger (2), O. Schmidt (3), Pohlig (4), Virchow, Klopffleisch, A. Götze (5) u. a. schon vieles publiciert worden ist, fühle ich mich doch noch veranlasst das Resultat langjähriger Aufsammlungen zu veröffentlichen. Da die Fundstellen zum Teil schon abgebaut sind, zum Teil in sehr kurzer Zeit es sein werden, so ist es um so mehr von Interesse eine revidierte Zusammenstellung der bis jetzt

gemachten Conchyliensunde zu geben und die neu nachgewiesenen Species zu verzeichnen. Auch würde ein Vergleich mit ähnlichen pleistocaenen Fundorten von Werth sein und zur Altersbestimmung unseres Travertinbeckens dienen können; ich behalte mir dies für eine spätere eingehende Arbeit vor und erwähne hier nur die wesentlichsten Unterschiede. Wir haben es in Weimar mit einem Schichten-complexe von 20 bis 25 m Mächtigkeit zu thun, während viele der nachher erwähnten diluvialen Fundorte manchmal nur eine typische, conchylienführende Schicht (resp. zusammengehörige Schichtenreihe) enthalten, wie die Sande von Mosbach bei Wiesbaden, Mauer im Elsenzthal bei Heidelberg, Darmstadt etc. Ich habe das Vorkommen von Taubach besonders erwähnt, da diese Fundstelle von der Weimaraner etwas abweicht, und weil sie in der Litteratur fast gar keine Erwähnung gefunden hat. Herrn Professor Dr. A. Andreæ und Herrn Professor Dr. O. Boettger, die mir ihre reichhaltigen Sammlungen zur Verfügung stellten und mir mit ihren gütigen Ratschlägen zur Seite standen, spreche ich an dieser Stelle meinen wärmsten Dank aus.

Bevor ich die Liste der Conchylien gebe, sollen noch einige Citate, welche sich auf obengenannte Autorennummern beziehen, besprochen werden.

1) A. Portis erwähnt in seiner „Osteologie von *Rhinoceros Merckii* Jäg. und die diluviale Säugetierfauna von Taubach“ (Palaeontographica XXV. 143.) folgende durch Dr. Kriechbaumer bestimmte Species: *Helix pomatia* L., *Helix hortensis* Müll., *Helix arbustorum* L., *Helix nemoralis* L., *Succinea Pfeifferi?* Rossin., *Lymnaeus fuscus*; *Lymnaeus?* *palustris* (L) Cuv., *Paludina impura?* Pfeiff., *Planorbis marginalis* Drp., *Planorbis?* sp.; die gesamten Conchylien, welche, wie schon nach den Namen ersichtlich (was die Autoren betrifft etc.), oberflächlich bestimmt sind, sollen aus der knochenführenden Schicht stammen, während in

Dieser, wie ich seiner Zeit (Verhandlungen der Berl. anthrop. Gesellsch. Ausserord. Sitzung vom 9. Juli 1892 p. 367, 368, 371) nachgewiesen habe, nur folgende Species: *Vallonia pulchella* Müll., *Vallonia costata* Müll., *Limnaeus oratus* Drap., *Planorbis crista* L., *Pisidium pusillum* Gmel., *Chara hispida* L. (Kapseln) vorkommen. Diese sind mit Ausnahme der Characeenkapseln, äusserst selten, so dass ich vermute, sie seien aus einer der überliegenden Schichten eingeschwemmt. Was die Angabe der stratigraphischen Verhältnisse aubetrifft, so sind dieselben unrichtig. Die Mächtigkeit der horizontal gelagerten Schichten in der Grube Hänzgen soll nach Portis 7,7—8,3 m betragen, während die grösste mir bekannte und wohl je in Taubach beobachtete Mächtigkeit in der tiefsten Grube höchstens 6,12 m betrug. Die der Grube „Hänzgen“ nächste Grube „Ernst“ hat eine Mächtigkeit von nur 3,87 m. Wie ich von Herrn Hänzgen erfuhr, war seine Grube höchstens 4 m tief, eine Mächtigkeit, die sehr gut mit derjenigen der Grube „Ernst“ übereinstimmt.

2. Fr. v. Sandberger in seinem Werke „Land- und Süßwasseroconchylien der Vorzeit“ erwähnt viele Species von Weimar und stützt sich auf Material, welches von Herrn Professor von Fritsch bei Weimar aufgesammelt worden ist. Die Sandbergerschen Bestimmungen sind, wie ich mich selbst überzeugt habe, richtig.

3. Oscar Schmidt erwähnt in seiner Abhandlung „Zur Molluskenfauna von Weimar mit Berücksichtigung der in den Pleistocaen Ablagerungen vorkommenden Arten“ (Malacozoologische Jahrbücher VIII, Jahrgang 1881) ausser den von v. Sandberger schon nachgewiesenen, noch folgende Formen: *Vitrina elongata* Drp., *Helix personata* Lam., *Helix bidens* Chem., *Helix incarnata* M., *Helix lapicida* L., *Helix hortensis* Müll., *Cochlicopa columnaria* Gless., *Clausilia biplicata* Mont.

4. Pohlig giebt in „Vorläufige Mittheilungen über

das Pleistocaen, insbesondere Thüringens (Zeitschrift für Naturwissenschaften*, Halle, 58. Band, p. 257 ff.) genau dieselben Arten an, wie v. Sandberger und es scheint, dass seine Arbeit weiter nichts als ein Auszug aus letzterer ist, obwohl Herr Pohlig sagt, die Spezies seien grössten-theils durch ihn als neu nachgewiesen, während doch v. Sandberger schon 10 Jahre und O. Schmidt 4 Jahre früher dieselben Arten aufführten. Ferner muss ich die Einziehung folgender Arten missbilligen: *Helix tonnensis* Sndb., welche er zu *H. atrolabiata* Kryn., und *Helix canthensis* Beyr., welche er zu *H. banatica* Prtsch. stellt, ohne jeglichen Grund für dieses Verfahren anzugeben. Beide Formen sind, wie ich später nachweisen werde, wohlgegründete Arten. Ausser diesen führt er noch an: *Helix semirugosa* Sandberger (diese Varietät der strigella ist vom Autor selbst eingezogen worden). Was das in Frage stellen einiger Arten betrifft, welche v. Sandberger und Bornemann angeben, so glaube ich den Bestimmungen v. Sandberger's und Bornemann's mehr Vertrauen schenken zu dürfen als denen Pohlig's; ich brauche nur die doppelte Aufführung des *Planorbis marginatus* Drap. unter den beiden synonymen Namen *Planorbis marginatus* und *Planorbis umbilicatus* als 2 verschiedene Species zu erwähnen. Ferner fehlen bei allen Species die Autorennamen; man kann sich daher unter einer Species wie z. B. *Helix vindobonensis* alles mögliche vorstellen, man kann sie als *H. sylatica* Drap. (= *vindobonensis* Dupuy) oder was hier am wahrscheinlichsten ist, als *H. austriaca* Mühlfeld. (*vindobonensis* Pffr.) annehmen.

5. A. Götze erwähnt meine Bestimmungen der Conchylien der knochentragenden Schicht in Taubach und die stratigraphische Aufnahme zweier Gruben in Taubach anlässlich eines Vortrages über die „Palaeolithische Fundstelle von Taubach bei Weimar“ (Verhandl. d. Berl. anthr. Gesellsch. v. 9. Juli 1892).

I. Revidierte Liste der Conchylienvorkommen von Weimar und Taubach.

Gasteropoda.

I. Genus *Daudebardia*, Hartmann.

1. *Daudebardia rufa* Fér. s. s. Durch Sandberger und Pohlig von Weimar bekannt. Von Taubach von mir nachgewiesen. Nach O. Schmidt lebend bei Berka im Ilmthal angegeben.

II. Genus *Amalia*, Moquin-Tandon.

2. *Amalia marginata* Drap. s. s. Für Weimar und Taubach neu. Lebend bei Oettern und Buchfart (O. Sch.)

III. Genus *Limax*, Müller.

3. *Limax (Agriolimax) agrestis* L. h. Für W. und T. neu. Lebend bei W. (O. Sch.)

3a. *Limax (Heynemannia) maximus* L. s. s. Für T. neu. Lebt bei W. (O. Sch.).

IV. Genus *Vitrina*, Drap.

4. *Vitrina (Phenacolimax) pellucida* Müll. s. s. Schon durch Sandberger und Pohlig bekannt. Für T. neu. Lebend bei W. (O. Sch.)

5. *Vitrina (Semilimax) diaphana* Drap. s. s. Neu für T. Noch nicht bei W. lebend beobachtet.

6. *Vitrina (Semilimax) elongata* Drap. s. Von O. Schmidt für T. erwähnt. Für W. von mir, als neu, nachgewiesen. Bei W. lebend (O. Sch.)

V. Genus *Hyalina*, Féussae.

7. *Hyalinia (Polita) cellaria* Müll. z. h. Von Sandberger, O. Schmidt, Pohlig nachgewiesen. Bei W. lebend (O. Sch.)

8. *Hyalinia (Polita) nitens* Mich. s. Für Weimar neu. Bei Weimar lebend (O. Sch.)

9. *Hyalinia (Vitreola) contracta* Westerlund. s. s. Für W. und T. neu. Lebt in Norddeutschland.

10. *Hyalinia (Polita) pura* Alder. Neu für W. und T. Bei Weimar lebend (O. Sch.)

11. *Hyalinia (Polita) radiatula* Gray z. h. = *Hyalinia (Polita) hammonis* Ström. Neu für W. und T. Lebt bei W. vereinzelt (O. Sch.)

12. *Hyalinia (Vitreæ) crystallina* Müll. s. Von O. Schmidt für Weimar nachgewiesen. Neu für T. Lebt bei W. (O. Sch.)

13. *Hyalinia (Vitreæ) diaphana* Stud. s. s. Von Sandberger und Pohlig angegeben (von Weimar). Neu für T. Lebend von W. noch nicht bekannt.

14. *Hyalinia (Vitreæ) subrimata* Reinh. s. s. Neu für W. und T. Lebend von W. unbekannt.

15. *Hyalinia (Comulus) fulra* Müll. h. Von O. Schmidt angegeben. Von W. lebend unbekannt.

16. *Hyalinia (Zonitoides) nitida* Müll. z. h. Von W. durch Sandberger und Pohlig bekannt. Für Taubach neu. Lebt bei W. (O. Sch.)

VI. Genus *Zonites*, Montfort.

17. *Zonites verticillus* var. *praecursor* n. var. Diese bei Weimar ziemlich häufige Art steht dem „*Z. croaticus*“ Partsch“ (einer osteuropäischen, in Croation sehr gemeinen, auch in Unterösterreich vorkommenden Art) sehr nahe. Er unterscheidet sich vom *verticillus* durch weit mehr compresse Schale und etwas weniger enge Aufwindung der Umgänge und deutlich stärkeren Mittelkiel.

Uebergangsformen, die zwischen den typischen *verticillus* und unsere Varietät sich stellen, kenne ich aus Tarvis, Oberkärnthen.

(Höhenverhältnisse meiner Varietät: alt: 11, d. maj. 23,
d. min. 21 mm.

(Höhenverhältnisse der Oberkärnthner Varietät: alt: 15,5
dia. maj. 26, dia. min. 24,2 mm.

Davon, ob meine Varietät mit Sandberger's *Zonites subangulosus* Sudb. ident. ist, werde ich mich noch überzeugen, da mir die Sandbergersche Arbeit, über fränkische pleisto-

caene Tufse erst sehr spät zugänglich wurde. Jedenfalls ist aber der Name *subangulosus* Sndbgr. zu streichen, da schon eine tertiäre Art diese Benennung erhalten hat. Von Weimar war *Z. verticillus* Fér. durch Sandberger und Pohlig bekannt. — Von Taubach durch O. Schmidt mit gekielten Umgängen bekannt. — Kommt lebend nur an der Süd-Ostgrenze Deutschlands bei Passau vor.

VII. Genus *Patula*, Held.

18. *Patula (Discus) rotundata* Müll. h. Durch Sandberger, Schmidt und Pohlig von Weimar bekannt. In T. als seltener von mir nachgewiesen. Lebt bei W. (O. Sch.).

19. *Patula (Discus) ruderata* Studer s. s. Durch Sandberger und Pohlig für W. angegeben. Noch nicht lebend bei W. beobachtet.

20. *Patula (Goniodiscus) solaria* Menke z. h. Für W. (s. s.) und T. (h.) neu. In Deutschland nur aus Schlesien und den bayr. Alpen bekannt.

21. *Patula (Punctum) pygmaea* Drap. s. Für Weimar und T. neu. Lebt bei W. (O. Sch.).

VIII. Genus *Helix*, Linné.

22. *Helix (Acanthinula) aculeata* Müll. s. Für W. und T. neu. Lebend von W. bekannt (O. Sch.).

23. *Helix (Vallonia) pulchella* Müll. h. Für W. durch Sandberger, Schmidt und Pohlig citiert. Für T. neu. Lebt bei W. (O. Sch.).

23a.* *Vallonia pulchella* Müll. var. *excentricoides* Sterki (nov. var.). Herr Dr. V. Sterki, welcher die Güte hatte meine Vallonien zu bestimmen, giebt für diese neue Varietät folgende Characteristik. Sie unterscheidet sich von pulchella durch etwas geringere Grösse, nach der Mündung zu schnell erweiterten und dadurch länglichen Umbiliens, wenig und allmälig ausgebogenen Mundsau. Bis jetzt nur aus dem Pleistocaen von T. durch mich nachgewiesen. Hat keinen recenten Vertreter.

* Die mit a versehenen Nummern wurden während des Drucks noch zugefügt. (W.)

31. *Allochrysalis* *varia* (Burm. s. l.) Pfeiffer
Budapest, Schmid and Kirby collections. Bur. T.
1970. Lote 1000. sp. nov.

32. *Allochrysalis* *varia* (Burm. s. l.) Pfeiffer
Budapest, Schmid and K. Schmid collection. Bur. T.
1970. Lote 101. sp. nov.

33. *Allochrysalis* *varia* (Burm. s. l.) Pfeiffer
Budapest, Schmid and Kirby collections. Bur. T.
1970. Lote 102. sp. nov.

34. *Allochrysalis* *varia* (Burm. s. l.) Pfeiffer
Budapest, Schmid and Kirby collections. Bur. T.
1970. Lote 103. sp. nov.

35. *Allochrysalis* *varia* (Burm. s. l.) Pfeiffer
Budapest, Schmid and Kirby collections. Bur. T.
1970. Lote 104. sp. nov.

36. *Allochrysalis* *varia* (Burm. s. l.) Pfeiffer
Budapest, Schmid and Kirby collections. Bur. T.
1970. Lote 105. sp. nov.

37. *Allochrysalis* *varia* (Burm. s. l.) Pfeiffer
Budapest, Schmid and Kirby collections. Bur. T.
1970. Lote 106. sp. nov.

38. *Allochrysalis* *varia* (Burm. s. l.) Pfeiffer
Budapest, Schmid and Kirby collections. Bur. T.
1970. Lote 107. sp. nov.

39. *Allochrysalis* *varia* (Burm. s. l.) Pfeiffer
Budapest, Schmid and Kirby collections. Bur. T.
1970. Lote 108. sp. nov.

31. *Helix (Eulota) fruticum* Müll. h. Von W. durch Sandberger, Schmidt und Pohlig nachgewiesen, für T. neu. Lebt bei W. (O. Sch.). Ausser dem Typus kommen noch vor var. *fasciata* Moq.-Tand. h. Neu für W. und T.
var. *turfica* Slavic s. Neu für W.

32. *Helix (Monacha) incarnata* Müll. z. h. Für T. neu. Von W. durch Schmidt bekannt. Lebt bei W. (O. Sch.). *Helix (Monacha) carpathica* Friwaldsky. Von Pohlig aus W. erwähnt, von mir nicht gefunden.

33. *Helix (Chilotrema) laticida* Linné z. h. Durch Schmidt von W. nachgewiesen. Von T. neu (sehr selten). Die Weimaraner Exemplare zeigen Neigung zu Scalaridenbildung. Man findet flache und sehr hohe Formen. Lebt bei W. (O. Sch.). Ausser dem Typus kommt noch sehr selten vor: var. *grossulariae* v. Voith. Für W. neu.

34. *Helix (Arionta) arbustorum* Linné h. Von W. durch Sandberger, Schmidt und Pohlig angegeben. In W. selten. In T. häufig. Ausser dem Typus noch neu aufgefunden: var. *trochoidalis* Röfflaen Vorkommen in W. und T. var. *alpicola* Fér. = *Alpestris* Pfr. h. Vorkommen in W. und T. Extremformen von *arbustorum* sind in T. selten, die kleinste hat einen Durchmesser von 15, die grösste von 25 mm. Die Varietäten sind oft stark gestreift und in Streifung und Höhe sehr variabel. In T. beträgt der Durchmesser der meisten Exemplare meist 20 mm. In W. lebend (O. Sch.).

35. *Helix (Xerophila) striata* Müll. h. Durch Sandberger, Schmidt und Pohlig nachgewiesen. In T. noch nicht gefunden. Kommt nach O. Schmidt bei W. nicht lebend vor. Ausser dem Typus noch: var. *nilssoniana* Beck. s. Neu für W.

36. *Helix (Tachea) hortensis* Müll. h. Durch Schmidt und Pohlig nachgewiesen. Lebt bei W. (O. Sch.).

37. *Helix (Tachea) nemoralis* Linné z. h. Durch Sandberger, Schmidt und Pohlig nachgewiesen. Für T. neu.

Gold and Wilson 1986, 1990). Many birds have learned to fly through snow, as do p. W. reflected on his research group's preparation for the Polarstern expedition and described how each member selected, their own winter gear. Some gear was chosen to fit the specific needs of the team (e.g., p. W. 1990).

In their fieldwork publications, P. W. L. et al. also emphasize food. For p. W. and C. H. Thompson, food and nutrition are important for the field team.

In their off-base research studies, e. g., Van Wilgen and Polden 1977 noted, "We had to fly and C. Thompson, myself and Thompson developed plans after our first air flight experiences. We developed various strategies to ensure we chose the best flying sites. At each flight, we checked on visibility and, especially during the polar day, determined the best altitude before we took off. In discussions between us three, the flight distance and time, fuel load & cost & visibility were always considered and we discussed our strategy and operation plan, and discussed flight duration. Fuel consumption & cost, and because there is no route for aircraft maintenance, this is not an issue. We depend on the weather forecast & our visibility over land. Fuel cost is negligible, due to the limited distances covered, whereas duration can be extended or shortened by the interpretation."

In their fieldwork publications, P. W. L. et al. also discuss food and nutrition. Many eat winter campgrounds. This was the case for p. W. in the summer field, reflected on in the following section on nutrition etc.

In their research paper et al. (e. g., Van Wilgen and Polden 1977) emphasize the issue. For P. W. the issues are the following. All campers brought freeze-dried meals, supplies, fuel cans and other necessities.

Wirbel, die Naht ist bei *canthensis* leicht dachförmig gerandet, der Kiel ist entschieden schärfer als bei *banatica*. grösster Durchmesser der weim. *canthensis* 32 mm. kleinster Durchmesser: 27 mm. Höhe 20 mm.

IX. Genus *Buliminus*, Ehrenberg.

43. *Buliminus (Chondrula) tridens* Müll. h. Für W. von Sandberger, Schmidt und Pohlig nachgewiesen. Lebt bei W. (O. Sch.).

44. *Buliminus (Napaeus) obscurus* Müll. s. s. Für W. neu. Lebt bei W. (O. Sch.).

X. Genus *Cochlicopa*, Risso.

45. *Cochlicopa (Zua) lubrica* Müll. Von W. durch Sandberger, Pohlig und Schmidt nachgewiesen. Ausser dem Typus wurden noch neu aufgefunden: var. *columna* Clessin. Von Schmidt für T. nachgewiesen. Von Clessin selbst dafür erkannt. var. *minima* Siem. Vorkommen: W. var. *major* Kreglingen = *nitens* Kokeil Vorkommen: W. Lebt bei W. (O. Sch.).

XI. Genus *Gaeclianella*, Bourg.

Gaeclianella acicula Müller. Wird von Sandberger und Pohlig von W. erwähnt. Die gefundenen Exemplare werden jedenfalls gebleichte recente gewesen sein, da diese Schnecke sich sehr tief in die Erde vergräbt; ich habe sie deshalb aus der Liste gestrichen und bezweifle jedes fossile Vorkommen.

X. Genus *Pupa*, Drap.

46. *Pupa (Oreula) doliolum* Brug. s. Von W. von Sandberger, Schmidt und Pohlig erwähnt. Bei W. nicht lebend beobachtet.

47. *Pupa (Pagodina) pagodula* Desmoulin s. s. Für W. neu; findet sich in Deutschland lebend nur in den Alpen oder in der Nähe derselben.

Mr. Mayor proposed another to Mr. Frank Shadley, Shadley and Feltz, bankers. It is now ready. He wishes such an association Shadley and Feltz can make available to the public from the 1st of Jan.

Mr. Page visited another business, Mr. Feltz, about Shadley's proposal, and made some suggestions. They are now being considered by the public. Mr. Feltz.

Mr. Shadley has another plan, as well, and I, Mr. W. and other local business men feel it can stand on its own, and therefore have suggested Shadley and the Adelton Bank.

Mr. Page offered another suggestion, an option on Shadley, or Shadley and Feltz, or whatever bank they will be in Milwaukee now. He wishes Shadley to make available, from Milwaukee funds, Milwaukee City, State and County.

Mr. Page suggested another suggestion, Mr. Feltz, that Mr. W. and other local business men.

Mr. Page thinks we should discuss it based on the Shadley Shadley Business act. See the W.

Mr. Page asked another suggestion. They have Page suggested that Mr. Feltz suggests. Mr. Feltz, Mr. W. and other local business men, John Lee Mr. W. and Mr. Feltz.

Mr. Page is asked another suggestion. It is an option Shadley or another business. The Shadley and Feltz Mr. W. and other local business men, suggested Mr. Feltz, Shadley when the association was organized, Mr. Feltz, and others to re-establish Shadley and Shadley association. Shadley and Shadley association and the Shadley and Feltz, a partnership between Shadley and Feltz, which, would not, however, be able to make available Shadley, Feltz, Mr. Feltz, Birmingham, Shadley and Feltz, a trust holding by Shadley and Feltz.

6) Schweiz; Bern; 7) Frankreich; 8) Oberitalien; 9) Sieilien; 10) Helenendorf bei Elisabethpol (Russisch Armenien) und Kaukasus.

55. *Pupa (Vertigo) pygmaea* Drap. s. Von W. von Sandberger und Pohlig angegeben. Von T. neu. Lebt bei W. (O. Sch).

56. *Pupa (Vertigo) substriata* Jeffreys s. s. Für W. neu. Bei W. noch nicht lebend gefunden.

57. *Pupa (Vertigo) alpestris* Alder s. s. = *Shuttleworthiana* Charpentier. Für W. neu. Lebt im Harz und in Schlesien, überhaupt in den Gebirgen Mitteleuropas, in Nordeuropa und Sibirien.

58. *Pupa (Vertilla) pusilla* Müll. s. Von W. und T. neu. Lebend noch nicht bei W. beobachtet.

59. *Pupa (Vertilla) angustior* Jeffreys h. = *venetzii* Charpentier. Von Sandberger und Pohlig als sehr seltenes Vorkommen von W. nachgewiesen. Von T. neu. Lebt bei W. (O. Sch).

XI. Genus *Clausilia* Drap.

60. *Clausilia (Clausiliastra) laminata* Mont. z. h. Von Pohlig, Schmidt und Sandberger für W. angegeben. Von T. neu (sehr selten). Lebt bei W. (O. Sch).

61. *Clausilia (Alinda) biplicata* Montagu. Von Schmidt für W. nachgewiesen, von mir nicht aufgefunden. Lebt bei W. (O. Sch).

62. *Clausilia (Alinda) plicata* Drap. h. Von W. durch Sandberger, Schmidt und Pohlig angegeben. Für T. neu. Lebt bei W. (O. Sch.)

63. *Clausilia (Strigillaria) vetusta* Ziegler. Von Sandberger für W. angegeben. Fehlt lebend bei W.

64. *Clausilia (Strigillaria) cana* Held s. Neu für W. Lebt nicht bei W.

Mr. Charles W. Knobell, State Rep., a. The W. church
members were almost unanimous. Mr. C. was chosen
Chairman and selected Mr. Lewis and Mr. John
H. as speakers.

The church members, however, were not unanimous
and, after the W. chose Mr. Lewis and Mr. John H.
as speakers.

Mr. Charles W. Knobell, State Rep., a. The W. church
members and many others, Mr. C. and Mr. John H.
were here.

The church members, mostly members of First
Baptist Church, voted and elected Mr. W. chairman. Mr.
W. said, "Some other people were not chosen at this
church meeting due to time. First Baptist church
voted him in at this time."

Mr. Charles W. Knobell, State Rep., a. First
Baptist Church, voting and electing Mr. W. chairman. Mr.
W. said, "None but Mr. W. was here."

Mr. Charles W. Knobell, State Rep., a. First
Baptist Church and others, Mr. W. chosen, others not
W. could be found.

Mr. Charles W. Knobell, State Rep., a. The
members of the W. majority, later in their meeting
voted to have speakers, Mr. C. and Mr. John H. as the
representatives appointed and to remain unnamed.

Mr. Charles W. Knobell, State Rep., a. The
members, however, did not fully vote Mr. W. chairman, Mr.
C. was their choice. Later in their meeting, John H. Knobell
was made Mr. Chairman and speaker.

Mr. Lewis, State Rep., responded.

Mr. Charles W. Knobell, State Rep., a. The W. church
members, however, did not fully vote Mr. W. chairman, others not
fully chosen, and Charles W. Knobell was not chosen
as chairman. At another meeting, Mr. C. was chosen
Chairman, however, because First Baptist Church
voted him in. However, First Baptist Church
did not fully vote him in. Mr. Lewis and Mr. C. were both
elected by the W. church.

74. *Succinea (Amphibina) Pfeifferi* Rossm. h. Durch Sandberger, Schmidt und Pohlig von W. bekannt. Der Typus für T. neu. Lebt bei W. O. Sch. Ausser dem Typus noch folgende neue Vorkommen von Varietäten der *S. pfeifferi* als: var. *brevispirata* Baudon (T.) s. und var. *recta* Baudon (W.) s. s.

75. *Succinea (Amphibina) elegans* Risso. s. Für W. und T. neu. Lebt in Schlesien; im westlichen Deutschland nicht vorhanden. Meine pleistocänen Exemplare sind den recenten englischen ähnlich. Die von Sandberger bei Tonna gefundene *S. hungarica* wird wohl ebenfalls *S. elegans* sein.

76. *Succinea (Lucena) oblonga* Drap. h. Von Sandberger, Schmidt und Pohlig von W. erwähnt. Für T. neu. Ausser dem Typus noch: var. *elongata* Al. Br. (für W. und T. neu) h. Uebergänge zwischen dem Typus und der var. *elongata* kommen häufig vor. Lebt bei W. (O. Sch.).

XIII. Genus *Carychium*, Müller.

77. *Carychium minimum* Müll. h. Von W. durch Sandberger, Schmidt und Pohlig bekannt. Von T. neu. Lebt bei W. (O. Sch.).

XIV. Genus *Limnaea*, Lamarek.

78. *Limnaea (Limnus) stagnalis* Linné h. Durch Sandberger und Pohlig von W. bekannt. Kommt nur in den höheren Niveaus des Weimarischen Pleistocaenbeckens vor. Ausser dem Typus noch: var. *producta* Jul. Colbeau (für W. neu).

79. *Limnaea (Gulnaria) orata* Drap. h. Von Sandberger und Pohlig von W. erwähnt. Von T. neu. Ausser dem Typus noch: var. *lacustrina* Clessin (für W. neu).

80. *Limnaea (Limnophysa) peregra* Müll. h. Durch Pohlig angegeben. Für T. neu.

81. *Limnaea (Limnophysa) palustris* Müll. h. Durch Sandberger und Pohlig für W. angegeben. Für T. neu. Ausser dem Typus noch: var. *corrus* Gmel. Neu für W.

and Dr. Brown were also with him. Rev. Dr. W. and Dr. G. G. had visited him. Rev. Dr. T. C. had just left Dr. Rev. Dr. E. L. was visiting him. Rev. Dr. H. and Dr. G. G. had just visited Brown and all stopped Brown out. Dr. Brown's personal physician and had advised him to lie prostrate on the ground and remain there.

Mr. Brown discharged from Hilltop Hospital on Sunday M.
Mr. Brown discharged from Hilltop Hospital on Sunday M.
Sunday morning and Dr. G. G. reported. Rev. C. was.

Hilltop Hospital on Sunday.

Mr. Brown discharged from Hilltop on Sunday M.
Mr. Brown discharged from Hilltop on Sunday M.

Hilltop Hospital on Sunday.

Mr. Brown admitted back to "The Hospital" and
Friday evening before he reported. Rev. C. was on Sunday M.
Mr. Brown.

Hilltop Hospital on Sunday.

Mr. Brown admitted back to "The Hospital" and
Friday evening before he reported. Rev. C. was on Sunday M.
Mr. Brown.

Hilltop Hospital on Sunday.

Mr. Brown (Hospital) admitted Hilltop on
Sunday evening. Rev. C. was visiting him
on Sunday evening. Dr. G. G. was also visiting him
on Sunday evening. Dr. G. G. was also visiting him
on Sunday evening. Dr. G. G. was also visiting him
on Sunday evening.

Mr. Brown (Hospital) admitted Hilltop on
Sunday evening. Rev. C. was visiting him
on Sunday evening. Dr. G. G. was also visiting him
on Sunday evening. Dr. G. G. was also visiting him
on Sunday evening. Dr. G. G. was also visiting him
on Sunday evening. Dr. G. G. was also visiting him
on Sunday evening. Dr. G. G. was also visiting him
on Sunday evening.

87. *Planorbis (Tropidiscus) carinatus* Müll. h. Von W. durch Pohlig und Sandberger erwähnt. Von T. neu.

88. *Planorbis (Gyrorbis) vortex* Linné h. Von W. durch Sandberger und Pohlig bekannt. Diese Species ist ebenso wie *Chondrula tridens* und *Limnaea stagnalis* auf die oberen Schichten des Weimarischen Pleistocaens beschränkt.

89. *Planorbis (Gyrorbis) spirorbis* Linné h. Von Sandberger bei W. nachgewiesen.

90. *Planorbis (Gyrorbis) leucostoma* Müll. = *rotundatus* autt. Von Pohlig erwähnt. Für T. neu. Ist wahrscheinlich nur eine Varietät der vorigen Art.

91. *Planorbis (Bathyomphalus) contortus* Linné h. Von W. durch Sandberger und Pohlig citiert. Von T. neu. Ausser dem Typus kommt noch eine weniger hohe Varietät vor, welche wohl mit var. *spondyloides* Weinland identisch ist.

92. *Planorbis (Gyraulus) crista* Linné s. Von Sandberger und Pohlig für W. nachgewiesen. Für T. neu. Ausser dem Typus noch var. *nautilus* Linné und *cristatus* Drap. als neu nachgewiesen.

93. *Planorbis (Hippeutis) complanatus* L. = *fontanus* Lightfoot. Durch Sandberger von W., durch mich von T. bekannt.

94. *Planorbis (Segmentina) nitidus* Müll. s. s. Von Sandberger und Pohlig von W. nachgewiesen.

XIX. Genus *Ancylus*, Geoffroy.

95. *Ancylus (Ancylastrum) fluviatilis* Müll. s. s. Von Sandberger und Pohlig jedenfalls nach Herbst citiert. Als grosse Seltenheit von mir in den untersten Schichten gefunden.

XX. Genus *Acme*, Hartmann.

96. *Acme polita* Hartmann h. = *Acicula polita* L. Pfr. Von W. durch Sandberger und Pohlig bekannt. Von T. neu.

XXI. Genus *Valvata*, Müll.

97. *Valvata (Cincinna) piscinalis* Müll. s. s. Nur in wenigen Stücken bei W. gefunden.

100. House majority would have to break ranks.
Rep. Mr. Gilman, Mr. Davis, Mr. Morris, Mr.
W. T. Bell voted.

100. House By Roll Call, Rep.

100. House majority voted to have Mr. Clark
Chairman and voting Chairman. Mr. W. H. Smith
and Mr. Gilman voted.

100. House both Reps. - 10 members they
are all against Reps. House Republicans' suggestion.

100. House of Commons' Committee to the Bank
Report was voted to be accepted. Mr. T. G. Long voted
to do it. In Mr. T. G. Long's opinion there was no objection
against it. Mr. Mr. Speaker will accept that it, from Mr.
Mr. Long's point of view, was not necessary. His friends say that the
other option should now

resist.

100. House Standing Com.

100. Standing up to the Bank Bill Standing Report
by R. Anderson.

100. House Rules Report.

100. The House Rules R. C. Mr. T. G. Long, Mr. Mr.
Long, Mr. Gilman, Mr. Davis, Mr. Morris, Mr. Morris
Long, Mr. Gilman, Mr. Davis, Mr. Morris, Mr. Morris
Long.

100. House Standing C. R.

100. Standing Committee Report 100. Mr. W. H. Smith
the motion carried and was passed by R. Anderson
R. - 10 members. Mr. W. H. Smith and T. G. Long

100. Standing Committee to the Bank Bill and T. G. Long

100. Standing Committee to the Bank Bill and T. G. Long

100. Standing Committee to the Bank Bill and

Mr. W. H. Smith, Mr. Gilman and Mr. Morris.

100. Standing C. R. Mr. W. H. Smith Standing Committee
the Bank Bill and Mr. Gilman and Mr. Morris and Mr. Morris
the Bank Bill and Mr. Gilman and Mr. Morris and Mr. Morris

benachbarte Tertiärschichten mit einer ähnlichen Form sind mir unbekannt. Das Vorkommen dieser marinen resp. brackischen Gattung, welche auch von Herrn Prof. Dr. O. Böttger als *Corbulomya* anerkannt wurde, ist jedenfalls auffallend und schwer zu erklären.

(Schluss folgt).

Specilegium Malacologicum.

Neue Binnen-Conchylien aus der Paläarktischen Region.

Von

Dr. Carl Agardh Westerlund.

V.

Gen. *Agriolimax* (Mörch) Simroth.

Corpus nunquam fasciatum, carina, si adest, concolor; clypeus postice rotundatus, longitudine $\frac{1}{3}$ ad $\frac{1}{2}$ longitudinis totius aequans).

Von diesem Genus leben im Norden folgende Formen:

Subgen. 1. *Chorolimax*. (Corpus parvulum, molle, pallidum, unicolor vel fuscomaculatum, forte carinatum, postice longe acuteque productum, sudore lacteo). *A. agrestis* Lin. u. var. *norvegicus* West. (Exposé critique 1871).

Subgen. 2. *Arctolimax*. Corpus parvum, firmum, dorso rotundatum, convexum, postice sat subito angustatum, cauda perbrevi compressa ac supra subcarinata; clypeus postice late rotundatus, antice crassus et forte dilatatus. Limacella oblonga, lateribus parallelis, antice truncata, postice oblique in apicem obtusum producta. *A. hyperboreus* West. (Sibirien Mollusken 1877).

Eine circumpolare Art, die in Nordamerika (in Alaska), in Nordasien (ganz Sibirien) und auf Island lebt; dass sie noch nicht in den nördlichsten Theilen des Festlandes von Europa entdeckt ist, beruht ganz gewiss auf Uebersehen.

Subgen. 3. *Hydrolimax* Malm. (Corpus parvum, firmum, brunneum, unicolor, cylindricum, non carinatum, postice brevissime acuminatum, sudore non colorato.) *A. laevis* Müll. — Var. *mucronatus* West. (Exposé critique 1871).

Hyalinia (Polita) subplana Bgt. in sc.

T. sat anguste umbilicata (umbilicus circularis, ne minime dilatatus), depressa, paulisper convexiuscula, rufocornea, subtus pallide cornea, dense striatula, nitidula; anfractus $5\frac{1}{2}$, omnes lente regulariter accrescentes, convexi, sutura profunda discreti, ultimus lentissime regulariter accrescens, demum subconstrictus, penultimo vix $\frac{1}{3}$ major, compresso-rotundatus; apertura horizontalis, ovalis, valde excisa, marginibus leviter curvatis. Diam. 10, alt. 5 mm.

Hab. Algerien in Oran. (Die Coll. moll. Cleveana in Upsala). Diese Art hat ihren systematischen Platz nächst der *H. pomeliana* Bgt.

Hyalinia (Polita) corcyrensis n. sp.

T. anguste umbilicata (umbilicus perspectivus, infra vix paullo dilatatus, $\frac{1}{6}$ latitudinis totius occupans), depressa, spira convexiuscula, laevis, pallide cornea, opaca; anfractus $5\frac{1}{2}$, inferi lente regulariter accrescentes, convexiusculi, sutura impressa, ultimus regulariter accrescens, bis et dimidia quam penultimus major, compressus, rotundatus, antice rectus; apertura obliqua, depresso-horizontalis, ovalis, excisa, marginibus aequi ac levissime arcuatis. Diam. 11; alt. 4 mm.

Hab. Griechenland in Corfu. (Coll. Clevean.) Gehört der Gruppe *H. obscurata*, *blauneri*, *meridionalis* u. s. w. zu.

Helix (Trichia) britannica n. sp.

T. intus perforata, subtus peranguste umbilicata et tamen umbilicus ab anfractu antepenultimo dilatatus, convexa, in anfractibus superis regulariter, in ultimo irregulariter striata, albescens, pilis raris albis obsita, apice perobtuso; anfractus 6, primi lente accrescentes, ultimi duo majores, parum inaequales, convexi, rotundati, ad suturam impressam obtuse angulati, ultimus peripheria pulchre rotundatus, subtus tumidulus, antice rectus; apertura magna, lunato-rotundata, intus forte albolabiata, peristomate rectiusculo, acuto. Diam. 10, alt. 7 mm.

Hab. England ad London.

Von dieser Schnecke habe ich nur ein einziges Exemplar gesehen, das ich in einer Sammlung der H. rufescens Penn. von Hr. J. Ponsonby gefunden habe. Sie ist doch

von allen mir bekannten Trichiaformen durch mehrere Kennzeichen so verschieden, dass ich sie als neu betrachten muss. Besonders zeichnet sie sich durch das unregelmässige Anwachsen der Umgänge, die eingedrückte Naht, den dicken, an der Peripherie gewölbtgerundeten letzten Umgang, und ihren Nabel aus.

Helix (Theba) dirphica (Blanc) Mts.

Var. *diploa* mh.

T. supra dense distineteque spiraliter lineata, subtus dense ruguloso-malleata, pilis parcis mollibus longis obsita, anfr. ultimus supra medium usque ad aperturam angulata, fascia peripherica alba, umbilicus perangustus sed apertus.

Hab. Griechenland im Pindus ad Takumerka (T. Krüper).

Helix (Campylaea) planospira Lam.

Var. *pavelii* Haz.

T. sat late umbilicata (umbilicus margine columellari superne reflexo paullo obiectus), convexa, tenuissime striata (non granulata nec spiraliter lineata), fusco-olivaceobrunnea, nitidissima, spira apice plana, anfr. $5\frac{1}{2}$, convexi, sutura impressa, primi regulariter accrescentes, ultimus penultimo plus quam duplo major, rotundatus, infra non convexior, antice profunde descendens, apertura ovato-rotundata, margine columellari brevissimo verticali, basali strictiusculo, peristoma album, superne rectum, deinde patulo-reflexum. Diam. 27, alt. 13 mm.

Hab. Ungarn, Mehadia. (Coll. Clevean.)

Helix (Campylaea) haetarea n. sp.

Peraffinis *H. trizonae* (Z.) Rossm., sed differt testa (etiam trifasciata) sculptura microscopicā tenuiore, umbilico multo latiore et aperto, infra dilatato, apertura lunato-circulare, peristomate simplice, marginibus ab insertionibus usque valde arcuatis, rectis vel columellari angustissime reflexo et superne breviter dilatato. Diam. 27, alt. 14—16 mm.

Hab. Griechenland im Oeta-Gebirge (T. Krüper).

Die nächste Verwandte dieser Art ist, wie gesagt, die bisher allein stehende, dem Nordgebiete des Balkan zugehörende *Helix trizona* (Z.) Rossm., welche doch mit ihrem viel engeren, mehr oder weniger, oft zur Hälfte be-

deckten Nabel, mehr in die Quere verbreiterten und vorn tiefer herabgebogenen letzten Umgang, ovaler Mündung, vorwärts gestreckten und sehr schwach gekrümmten Mundrändern, stark und breit zurückgebogenen Spindelrand, weiss verdickten Peristom u. s. w. ganz verschieden ist.

Helix (Eulota) fruticum Müll.

forma insularum mh.

T. anguste et margine columellari reflexo paullo obtekte umbilicata, conoidea, rufesceni-cornea, anguste fasciata, rarius concolor, epidermide saepius detrita. Diam. 15—16, alt. 13—15 mm.

Hab. Schweden auf kleinen Inseln im Baltischen Meer an den Küsten der Provinz Blekinge.

Helix (Xerophila) psammata Bgt. in sc.

T. anguste et semiobtekte perforata, globuloidea, spira depresso-conoidea, apice obtuso mamillato, obsolete striata, solida, calcarea, opaca, fasciis angustis pallide brunneis translucentibus; anfractus 4½ (5), primi lente, ultimi fortius accrescentes, convexi, ultimus rotundatus, subtus subinflato-convexior, antice lente descendens; apertura lunato-semiovata, obliqua, obtuse angulata inter marginem columellarem brevissimum subverticalem et marginem inferum leviter curvatum et peranguste reflexum, margine supero subpatulo subrecte oblique descendente, exteriore arcuato, peristoma intus labiatum. Diam. 18, alt. 13 mm.

Hab. Egypten ad Alexandria. (Coll. Clevean.) Gehört der Gruppe *H. seetzeni* Koch zu.

Helix (Xerophila) emigrata n. sp.

T. anguste umbilicata (umbilicus cylindricus, infra ne minime dilatatus), depressa, late convexiuscula, apice prominulo, irregulariter striatula, subtus obsolete spiraliter lineata, pallide cornea vel albida; anfractus 6, convexiusculi, lente regulariter accrescentes, sutura tenui discreti, ultimus compresso-rotundatus, fere medio obtuse angulatus, subtus paullo convexior, antice vix descendens; apertura obliqua, rotundato-ovata, pariete convexo lunata, intus sat forte albolabiata, margine superiore recto, basali brevissime expanso, columellari leviter supra umbilicum reflexo. Diam. 9½—10½, alt. 6½ mm.

Hab. Griechenland in M. Pindus ad Peristeri. (Th. Krüper).

Diese Art stellt sich sogleich in die kleine Gruppe der *Striatella*, welche bisher die Kreteischen *H. diensis*, *mesostina* und *psiloritana* mit den egyptischen *H. guimeti* und *tanousi* bilden. Unter diesen steht sie wohl der ersten, *diensis* Mz., am nächsten, von welcher sie sich doch unterscheidet durch einen wirklichen obwohl sehr engen, tiefen Nabel, der sich nicht im geringsten an der Mündung erweitert, sondern ganz cylindrisch ist, durch die Skulptur (diensis ist fast regelmässig fein aber scharf gestreift und ganz ohne Spiral-linien auf der Unterseite), durch den weit weniger scharfkantigen letzten Umgang, durch den weit stärker gebogenen Spindelrand u. s. w.

Ich will hier bemerken dass die offenbar sehr guten Abbildungen, welche Prof. E. v. Martens in seiner vortrefflichen Arbeit „Griechische Mollusken“ (1889) Taf. X. Fig. 10 angeblich von der „*H. mesostina* W.“ giebt, dieser Art nicht zugehören können. Sie stellen eine Schnecke dar, die nur eine feine Perforation besitzt, das ganze Gehäuse ist weit kugeliger, der Spindelrand weit höher hinaufgezogen, der letzte Umgang weit höher und bauchiger u. s. w. Alle Arten dieser Gruppe, und vor allen die *mesostina*, sind mehr in die Quere verbreitet und haben den letzten Umgang zusammengedrückt walzenförmig, was bei *mesostina* mehr in die Augen fällt durch die fast gänzlich fehlende Kante in der gerundeten Peripherie, welche Kante bei den übrigen mehr oder weniger ausgeprägt ist.

Helix (Arionta) arbustorum Lin.

Var. *gotlandica* m.

T. exumbilicata, grandis, tenuis, pellucida, rufobrunnea, valde ventricosa, unifasciata, parce leviterque stramineo-maculata; anfractus ultimus praeccipue subitus valde ventrosus; apertura magna, semicircularis, pariete forte excisa, peristomate tenui, limbato, margine columellari anguste reflexo, umbilicum claudente. Diam. 25, alt. 17 mm., apert. lat. lat. 13, alt. 13 mm.

Hab. Schweden bei Rosendal in Ins. Gotland.

Var. oelandica m.

T. semiobtecte umbilicata, pallide flaves ens, ubique dense flavomaculata, intus lactea, unicolor; aperiura margin'e exteriore et inferiore forte arcuatis, rectis, tenu'e labiatis, margin'e columellari brevi verticali, superne saper partem umbilici dilatato-reflexo. Diam. 20, alt. 16 mm.

Hab. Schweden bei Borgholm auf der Ins. Oeland.

Helix (Xerophila) allophylla n. sp.

T. late umbilicata (umbilicus fere $\frac{1}{8}$ vel haec latitudinis totius occupans), depressissima, spira vix prominula, dense regulariter striata et sub lente lineis densissimis spiralibus regulariter eleganter et forte ubique sculpta, fulvida, fasciis paucis brunneis angustis maculosis (raro superne etiam transversim strigata) vel subunicolor; anfractus $5\frac{1}{2}$, vix convexiusculi, ultimus supra medium alboangulatus, antice rectus; apertura lunato-circularis, tenu'e labiata. Diam. 13, alt. 6 mm.

Hab. Griechenland in M. Pindus. (Th. Krüper).

Diese durch ihren grossen Nabel, dichte und regelmässige Skulptur, weisskantigen letzten Umgang und Farbe ausgezeichnete Schnecke scheint am nächsten der *H. derbentina* verwandt zu sein.

Helix (Macularia) vermiculata Müll.

Var. pelogosana Stoss. in sc.

T. crassa, rugosa, alba, fasciis quatuor rufobrunneis. Diam. 21, alt. 14 mm.

Hab. Istrien auf Pelogosa. (Coll. Clevean.)

Helix (Tachea) vicaria n. sp.

T. exumbilicata, globosa, crassa, irregulariter striata, cretaceo-alba, fasciis 4-5, inferioribus tribus obscuris, latiusculis, superis angustis, rufis, prima in maculis soluta vel cum secunda confluente; spira producta, obtusa; anfractus $5\frac{1}{2}$, sat celeriter accrescentes, ultimus rotundatus, antice profunde deflexus; apertura perobliqua, semiovata, basi valde retusa, peristoma rectum, intus albomaculatum, margin'e exteriore regulariter arcuato, columellari perobliquo, brevi, stricto, tenu'e compresso. Diam. 15, alt. 13 mm.

Hab. Griechenland auf dem Türkenberge unweit Athen. (Th. Krüper).

Beim ersten Anblick gleicht diese neue Art täuschend einer *H. hortensis* Müll., aber bei einer näheren Untersuchung zeigt sie durch den viel grösseren Umkreis der Spira oberhalb des vorletzten Umganges, den geraden Mundsaum mit dem kurzen sehr schief gestellten Basalrande u. s. w., dass diese Gleichheit oberflächlich sei. Die nächste Verwandte dürfte wohl *Helix aimophilopsis* Verres sein, von welcher sie doch durch Farbe, Zeichnung, Skulptur und Mündung ganz verschieden ist.

Helix (Pomatia) nuclea Ffr.

Var. *cathara* mh.

T. perobsolete striatula, densissime et saepius obsolete spiraliter lineata, anfractu embryonali magno (duplo majori quam in typo), fasciis brunneis, in ultimo 5 vel 3 (1.—3.—5.) vel 2 (1.—5.) vel raro nullis, peristomate albolumbato et labiato, pariete concolori (omnino absque colore castaneo typo et varietatum hucusque cognitarum, pronubae et nuptiae). Diam. 27, alt. 27 mm.

Hab. Egypten bei Suez. (M. Chaper).

Buliminus (Chondrulopsis) retroplicatus Mts. in se.

T. rimato-perforata, cylindrica, apice conico, obtusiusculo, laevigata, albida; aufractus $8\frac{1}{2}$, vix convexiusculi, lente regulariter accrescentes, ultimus major, basi rotundatus, antice ascendens; apertura vix obliqua, parva ($\frac{1}{4}$ longitudinis totius), semiovata, basi rotundata, dente parietali compresso brevi lamelliformi profunde immerso praedita; peristoma calloso-incrassatum et albolabiatum, vix paullo patulum, marginibus remotis callo lato tenui conjunctis, aequaliter arcuatulis. Long. 12, lat. $3\frac{1}{3}$ mm, long. apert. 3 mm.

Hab. Turkestan bei Wjernoje in der Prov. Semiretschinsk.

Dieser *Buliminus*, den ich von Prof. v. Martens vor Jahren bekommen, aber niemals beschrieben gesehen habe, ist nächst verwandt mit *B. aptychus* Ane. und dessen Var. *capusiana* Ane., welche auch bei Wjernoje leben. Unsere Art unterscheidet sich von diesen auffallend durch ihre Form, (aptychus: long. 10, lat. 5 mm, capus.: long. $9\frac{1}{4}$, lat. $3\frac{3}{4}$ mm), grössere Anzahl von Umgängen (nicht $6\frac{1}{2}$ —7), kleine Mündung (nicht $\frac{1}{3}$ oder $\frac{2}{5}$ der Totallänge) u. s. w.

Buliminus (Chondrulus) mygdonicus n. sp.

T. perforata, periomphalo lato infundibuliformi, graciliter elongato-oblonga, infra medium cylindrica, supra medium conica, corneo-albescens, striatula; anfractus $9\frac{1}{2}$, superi convexit, caeteri convexiusculi, sutura impressula, ultimus extus planatus, albidus, basi carinato-angulatus circa periomphalum; apertura ad dextrum obliqua, semiovata, peristomate albo late plano-expanso, crasse labiato, marginibus callo tenuissimo ad marginem externum tuberculifero junctis, lamina valida brevi in pariete, denticulo fere obsoleto infra columellam et denticulo supra medium in margine exteriore. Long. $9\frac{1}{2}$, diam. 3 mm.

Hab. Griechenland bei Saloniki. (Th. Krüper).

Sowohl diese Art, wie die folgende habe ich unter dem Namen *B. westerlundi* bekommen, dessen notae essentiales doch ganz andere sind: T. cylindrica, cornea, sutura impressa, anfr. 9 vix convexiusculi, ultimus basi rotundatus, antice non foveolatus, apert. verticalis, peristoma vix expansiusculum, callo tenuissimo extus tuberculifero, dente marginali parvulo; long. $10\frac{1}{2}$, lat. vix 3 mm.

Buliminus (Chondrulus) munitus n. sp.

T. perforato-rimata, cylindrica, sursum lentissime in conum acutiusculum attenuata, corneo-brunnea, densissime obsolete striatula; anfractus 11, convexiusculi, sutura tenui, ultimus antice depresso, supra dentem marginalem foveata; apertura semiovata (vel e transverso cordiformis), verticalis, peristomate albo, incrassato, expansiusculo, marginibus callo valido, ad dextrum incrassato, junctis, dentibus 3: in pariete lamina longa humili, superne in columella lamina transversa valida sursum contorto-ascendente et in margine exteriore dente transversali forte, paucisper super plicam columellarem posito. Long. 14, lat. $3\frac{1}{4}$ mm.

Hab. Griechenland in M. Taygetos. (Th. Krüper).

Buliminus (Chondrulus) pindicus n. sp.

T. subperforato-rimata, oblonga, lente sursum attenuata, obtusa, calcareo-albida, saepe strigis brunneis obsoletis, solida, obsoletissime striatula; anfractus $7\frac{1}{2}$, convexiusculi, ad suturam impressam subangulati, ultimus basi subrotundus, superne ascendens; apertura truncato-ovalis, basi

rotundata, bidentata: dente parietali et dente supra medium marginis exterioris, nec non tuberculo parvo in pariete ad insertionem marginis; peristoma infra dentem marginalem incrassatum, album, reflexum. Long. 7—8, lat. $2\frac{1}{2}$ —3 mm.

Hab. Griechenland in Mts. Pindus. (Th. Krüper).

Nächstverwandt ist *B. diodon* Ret. in der Krim, welcher sich bei Vergleichung durch viel dünneres, hornfarbiges, schnell und stark zugespitztes Gehäuse, feine und deutlich berandete Naht, mehr Umgänge, stärker verdickten Mundsaum u. s. w. auszeichnet.

Pupa (Lauria) fagoti Chia in se.

T. semiobtecte perforata, obesa, subovata, peroibtusa, nitida, laevis, cornea; anfractus 5, superi lente regulariter accrescentes, convexi, ultimus penultimo duplo major, convexus, antice horizontalis; apertura semiovalis, margine exteriore regulariter-arcuato, columellari subverticali, superne dilatato et reflexo, plica longissima tenui parietali et dente acuto columellari. Long. $1\frac{3}{4}$, lat. $1\frac{1}{4}$ mm.

Hab. Spanien, Sarria unweit Gerona. (Coll. Clevean.)

Gehört der keinen Cylindraceagruppe zu.

Pupa (Oreula) transversalis m.

(Forte Var. *P. dolii* Drp.)

T. umbilicato-perforata, obesa, cylindrica, anfractibus tribus superioribus conum brevissimum formantibus: anfractus 9—10, lentissime accrescentes, transversales, convexiuseuli, sutura impressa ubique horizontali (exc. ad anfr. ultimum ubi forte ascendentē) disjuncti, ultimus brevis, ad aperturam superne dilatalis, basi rotundatus; apertura parva, sub-semiovalis, basi extus angustata, margine columellari substricto verticali, lamellis ut in *dolium*, omnibus marginalibus; peristoma rectum, acutum, simplex, callo lato in pariete conjunctum. Long. $6\frac{3}{4}$, lat. $2\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Griechenland bei Tschumerka in M. Pindus. (Th. Krüper).

Bisher ist keine Form der *P. dolium* auf der Balkanhalbinsel entdeckt und diese ist vom Typus so verschieden, dass man sich versucht fühlt, sie als eine eigene Species zu betrachten. Sie unterscheidet sich durch ihre dicke ganz cylindrische Form (bei *dolium* bilden wenigstens die 5 oberen

Umgänge einen verlängerten Kegel oder ist das ganze Gehäuse fast kegelförmig), die langsamer zunehmenden, ganz transversal gestellten Umgänge mit horizontaler Naht, was der Schnecke ein eigenthümliches Aussehen giebt, die kleine Mündung mit dem geraden einfachen Saum u. s. w.

Pupa (Torquilla) avenacea Brug.

Var. *abundans* m.

T. subturrito-attenuata, acuminata, rufescens, obsolete irregulariter striata; anfractus 8, convexi, praesertim superi, sutura impressa; apertura oblonga, basi rotundata, marginibus subparallelis, exteriore superne curvato, columellari longo, stricto, verticali, dentibus 8, palatali supero interno, brevissimo. Long. 8, lat. $3\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Griechenland bei Kylteni in Morea. (Th. Krüper).

Pupa (Torquilla) pulchella Bof.

Var. *manotiana* Bgt. in se.

T. umbilicata, oblongo-conica, costulato-striata, fusco-brunnea; anfractus $7\frac{1}{2}$, regulariter accrescentes, convexi, sutura profundiuscula separati, ultimus antice sensim ascendens; apertura ovalis, plica parietali prope ad insertionem marginis externi et plica parietali in medio, plica columellari et plicis 2 palatalibus, omnibus profundis, albis, brevibus altisque, nec non denticulo infra in columella; peristoma rectum, tenue, margine exteriore superne forte arcuato et ad columellarem approximante. Long. 6, lat. 2 mm.

Hab. Spanien. (Coll. Cleveana).

Pupa (Torquilla) krueperi n. sp.

T. rimata, cylindrica, apice conica, dense striatula, corneo-fulvida; anfractus $7\frac{1}{2}$, convexi, sutura impressula, forte marginata disjuncti, ultimus antice sensim lente ascendens; apertura ovalis, basi rotundata, marginibus arcuatulis, subparallelis, exteriore superne regulariter arcuato, plica pariet. 1, sat magna, mediana, obliqua, immersa, (pro plica angulari macula parva albida pone marginem exteriorem) plicis columell. 2, immersis, supera parva, infera minima, plicis palatal. 4, immersis, duabus mediis mediocreiter elongatis, exterioribus profundis, 1. sub suturam punctiformi, 4. inferne nodiformi, peristoma intus incrassatum, margini-

bus disjunctis, columellari leviter expanso. Long. 4, lat. 1 mm.

Hab. Griechenland bei Kolokytha in Attika. (Th. Krüper).

In Folge ihrer Form und Bezahlung (die oberste und die unterste der Gaumenfalten sind sehr kurz und tief gelegen) stellt sich diese neue griechische Art kühn an die Seite der südwesteuropäischen *P. brauni* Rm.

Pupa (*Alaea*) *celata* n. sp.

T. perforata, cylindraceo-conica, apice obtuse conica, dense striatula, rufocornea; anfractus $6\frac{1}{2}$, lente accrescentes, perconvexi vel tumido-convexi, sutura profunda ubique subhorizontali disjuncti, penultimus et antepenultimus aquales, ultimus vix vel paullo major, basi rotundus; apertura parva, semiovalis, omnino edentata; peristoma simplex, tenue, margine exteriore arcuato, recto, columellari strictiuseculo, toto forte reflexo. Long. $2\frac{1}{2}$, lat. 1 mm. (Deser. ad 7 specimina).

Hab. Schweden (aber der specielle Ort ist noch unbekannt.)

Gehört der kleinen Gruppe von *P. genesii* Gr., *eggeri* Gr., und *inermis*, W. zu, von allen schon durch ihre Form, die Anzahl und das verschiedene Anwachsen ihrer Umgänge verschieden.

Clausilia (*Albinaria*) *cephalonica* n. sp.

T. fusiformis, spira tenui producta, coerulecenti-albida, punctis fuscis nonnullis conspersa, apice fusca vel brunnea, superne distinete costulata, medio obsoletius et distanter costata (costis obtusis), in anfractu ultimo toto dense rugoso-costata (rugis flexuosis, crassis, multoties bifidis), pone aperturam dense striata; anfractus 11--12, planulati, ultimus infra angustatus, medio impressus, basi cristatus, sulco profundo longoque; apertura piriformis, lamella supera longa spiralem subtransgrediente, infera obliqua, antice stricta, incrassata, intus curvato-ascendente, plica principali et palatali supera longis, validis, parallelis, infera recta, longiuscula e lunella laterali prosiliente, plica subcolumellari pone ad lamellam inferam fere strictam oblique intuenti pro parte conspecta; peristoma continua, solutum. Long. 17--21, lat. $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Griechenland in Cephalonia. Ich habe fünf Exemplare in einer Parthei Cl. naevosa von H. Blane mitgetheilt gefunden.

Gehört der Gruppe *striata* Bttg. zu und wird hier der *bipalatalis* Mts. am nächsten stehen, ausgezeichnet durch ihre Skulptur, besonders die des Nackens, die laterale Lunella, die wenig sichtbare Spindelfalte d. h. den tief liegenden Clansilienapparat. Von *Cl. candida* Pfr. ist sie durch die sehr starke und lange obere Gaumenfalte, schwache Zeichnung, die Form und Skulptur des letzten Umganges, ihre Spindelfalte u. s. w. verschieden.

Clausilia (Albinaria) levisculpta n. sp.

T. turrito-fusiformis, spira sensim longe attenuata, cinereo-cornea, consertissime etiam sub lente obsolete capillaceo-striata, striis in anfractu ultimo undulatis; anfractus 11, planulati, ultimus ad aperturam lente declivis, basi obsolete gibboso-cristatus, sulco levissimo; apertura late ovato-piriformis, lamella supera humili spiralem transgrediviente, infera subtransversali, a basi intuenti antice angulata, medio longe recta, intus arcuate ascendentem, plica principali ultra lunellam inferne latam, brevissime calcaratam, superne angulatim recurvam non transgrediviente, plica palatali supera principali parallela, lunellam longe non attingente, plica subcolumellari aperta, ad lunellam geniculata, deinde ad basin producta; peristoma continuum, vix vel parum solutum, leviter expansum, albolabiatum. Long. 20, lat. $3\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Griechenland, Karpenisi in M. Veluchi. (Th. Krüper).

Gehört wie die vorstehende Art der Gruppe *Striata* Bttg. zu, steht aber der *Cl. arthuriana* (Bl.) Bttg. am nächsten.

Clausilia (Albinaria) profuga Ch.

Var. *collaris* mh.

T. multo gracilior, acute sat distanter costulata, anfractu ultimo infra perangustato, elongato, medio late depresso, basi subbieristato, profunde et anguste sulcato, crista inferiore forti, peristomate late expanso. Long. $14\frac{1}{2}$ —15, lat. $2\frac{1}{2}$ —3 mm.

Hab. Griechenland, Myli gegenüber von Nauplia. (Th. Krüper).

Clausilia (Albinaria) refuga n. sp.

T. fusiformis, rufo-cornea, ut farinosa, ubique, etiam in cervice, dense costulato-striata, costulis pallidis strictis;

anfractus 10, convexiusculi, duobus primis aterrimis, nitidis, tumidulis, ultimus basi obsolete gibboso-cristatus, extus rotundato-tumidulus, ante aperturam constrictus; apertura ovalo-piriformis, intus hepatica, lamella supera marginali, longa, spiralem attingente vel transgrediente, curvatulo-ascendente, subcolumellari inconspicua, plica principali longa, lunellam dorsalem, tenuem, strictiusculam, vix calcarea non transgrediente; peristoma continuum, solutum, reflexum, tenue, pallide hepaticum. Long. 16, lat. $2\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Griechenland, Tschumerka in Pindus. (Th. Krüper).

Diese der Gruppe *Profuga* zugehörende Form ist besonders durch ihre Embryonalumgänge, die Form des letzten Umganges, die fast ungespornte Lunella, die lange randständige Oberlamelle und die Farbe der Mündung ausgezeichnet.

Clausilia (Albinaria) argolina n. sp.

T. fusiformis, gracilis, pallide cornea, eleganter costulata, costis compressis, albidis, rectis, paullo distantibus, in anfractu ultimo extus *irregularibus, inaequalibus*; anfractus 10, convexiusculi, ad basin *angulati*, sutura immersa, ultimus *perangustatus*, attenuatus, medio impressus, basi longe et *sat forte cristatus*, sulco tenui; apertura rotundato-ovata, lamella supera extus *bifurcata* (ist ein Y), intus lamellam spiralem transgrediente, lamella infera superae approximata, profunda, subhorizontali, intus lata, plica principali fortis *longe intus producta*, lunella *supra medium plicae palatalis* posita, dorsali, recta, superne intus cum plica palatali supera breviuscula conjuncta, inferne cum plica palatali infera *sat longa convexa*; plica subcolumellari bene conspicua, extensa, a lamella infera *bene distante*; peristoma tenue, solutum, *subrectum*. Long. 12, lat. $2\frac{2}{3}$ mm.

Hab. Griechenland bei Argos in Morea. (Th. Krüper).

Durch die kursiv gedruckten Kennzeichen ist diese Art von den übrigen der *Profuga*-Gruppe gut verschieden.

Clausilia (Albinaria) orina n. sp.

T. fusiformis, gracilis, isabellina, sat dense costulata, costulis rectis *subrecticalibus*, in anfractu ultimo *densioribus et tenuioribus*; anfractus 11, convexiusculi, sutura impressa, ultimus extus impressiusculus, basi leviter cristatus; apertura

ovalis, intus nitens, fulvida, interlamellari *dilatato et depresso*, lamella supera breviuseula, non marginata, plicam spiralem parum transgrediente, lamella infera *antice crassa*, oblique ascendentem, postice breve arcuata, (*desuper intuenti fere tantummodo parte antica incrassata conspicua*), plica principali forti ultra lunellam dorsalem *sat longe producta*, plica palatali supera longiuseula lunellae intus adhaerente, plica subcolumellari oblique intuenti conspicua; peristoma continuum, *afficuum*, patulescens. Long. 13, lat. $2\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Griechenland, Koraki Besa im Oetagebirge. (Th. Krüper).

Ist auch eine der *Profuga*-Formen.

Clausilia (Albinaria) cytherae Bttg.

Var. *petronella* mh.

T. albido-coerulecens, hinc inde fuscostrigata, spira sensim longe attenuata; anfractus superi forte angusteque contorti, convexi, costulati, caeteri convexiusculi, obsoletius striati, ultimus secus suturam tumidus, medio depresso, basi cristatus et sulcatus, ubique costatus (costis longis superne bifidis vel aliis brevibus alternatis) apertura oblonga, lamella supera spiralem distantein vix attingente. Long. 11—14, lat. $2\frac{1}{2}$ —3 mm.

Hab. Griechenland in I. Cérigo. (Th. Krüper).

Clausilia (Albinaria) heterochroa n. sp.

T. fusiformis, ventricosa, apice sat celeriter attenuata, coeruleo-rufescens ad rufescenti-coerulea vel corneo-rufescens, obsoleto fuscostrigata, anfractus summi obsoleto costulati, medii laevigati, ultimus argute et forte costulatus; anfr. 10, convexiusculi, ultimus infra attenuato-angustatus, basi distincte cristatus et sulcatus; sutura marginata; apertura rotundato-ovata, intus fulva, lamella supera marginali et longa vel longissima, spiralem longe transiente, lamella infera profunda, perobliqua, antice incrassata et gibba, intus bifurcata, plica principali forti lunellam subdorsalem brevem vix transiente, plica palatali supera minima, intus lunellae conjuncta, plica subcolumellari non vel parum conspicua; periomphalum angustum; peristoma continuum et valde solutum, plus minus dilatatum vel expansum et alboincrassatum. Long. 15—19, lat. 4—5 mm.

Hab. Griechenland in Attica bei Stemnica, Chrysomitza und Apana Krepa. (Th. Krüper).

Mit *Cl. discolor* Pfr., welcher sie zweifelsohne am nächsten steht, hat sie kaum mehr als die Gruppencharaktere gemeinsam, nämlich die Form und den Kamm des letzten Umganges, die Mündungslippe, die lange Oberlamelle wie auch die Form und Stellung der Unterlamelle, dagegen zeichnet sie sich als eine selbstständige Art durch die Grösse, Bauchigkeit, Farbe, sehr lang eintretende Oberlamelle, fast verdeckte Spindelfalte u. s. w. aus.

(Schluss folgt).

Funde aus dem hannoverschen Oberharz.

Von
Hermann Löns, Hannover.

Die erste Hälfte des Monates Mai dieses Jahres machte ich eine Fusstour über den Theil des hannoverschen Harzes, welcher von Seesen, Grund, Osterode, Harzberg, Sieber, Andreasberg, Oderteich, Brocken, Altenau, Clausthal-Zellerfeld, Wildemann, Lautenthal und Goslar eingeschlossen wird. Der Fauna konnte ich keine ungetheilte Aufmerksamkeit schenken, da das Blatt, an dem ich arbeite, der „Hannoversche Anzeiger“, mir gestattet hatte, meine Erholungsreise auf seine Kosten zu machen, sofern ich durch einige Feuilletons über das oberharzer Volksleben ein Aequivalent böte. Grund, dieses Paradies für Sommerfrischler, ist aber ein so buntes Naturalienkabinet, dass ich dort suchen musste, Eines Abends hatte ich dort in den beiden Mühlenteichen den Schwimmübungen unzähliger Tritonen und den massenhaft umherkriechenden Salamandern zugesehen und die Stelle hatte mich so gefesselt, dass ich den nächsten Morgen dort wieder umherschlenderte. Links vom Wege, gegenüber dem zweiten Mühlenteiche, liegt eine Halde, die man jetzt bepflanzt hat, unterhalb eines aufgehobenen Stollens. Ich

suchte unter den Steinrümminern nach einigen hübschen, krystallbesetzten Handstücken; zwischen den Steinen sassen drei Arten Clausilien, *Tachea hortensis*, M., *Buliminus montanus*, Drap., *Chilotrema laticida*, L., *Helicogena pomatia*, L., alles reine Kalkthiere, *Arion empiricorum*, Fér., war gemein, aber es gab nur tiefschwarze Exemplare, während ich im Münsterlande dieses Thier nur am Rande des Moores schwarz, auf Kalk stets feuerroth gefärbt fand. Ueberhaupt fand ich während meiner ganzen Harzwanderung diese Nacktschnecke stets schwarz, wenn ausgewachsen, die kleinen Jungen stets einfarbig hell, nie gestreift. An den nassen Buchenstämmen sass häufig eine auffallend helle *Lehmannia arborum*, Bouch., was mir sehr auffallend war, denn im flachen Westfalen fand ich die Schnecke meist hell gefärbt, im Sauerlande immer tief dunkel gestreift. An der entgegengesetzten Thalseite sass unter der Rinde von Tannenstümpfen der nette *Limax tenellus*, Nils., recht häufig, in dem Keller eines Hotels erbeutete ich *Lehmannia variegata*, Drap. und *Agriolimax agrestis*, L. war in dem Städtchen nicht selten. Den besten Fund machte ich aber unter den eisenhaltigen Kalksteinen der oben erwähnten Halde. Ein prächtiger Hummelschwärmer, der unter einem Steine sich versteckte, veranlasste mich, den Kalkstein umzudrehen und ich fand darunter *Amalia marginata*, Drap., jene plumpe Schönheit, die ich vom Lengericher Klei schon kannte. Bei näherem Nachsuchen entdeckte ich noch 5 Stücke, gar keine schlechte Ausbeute für ein rein dilettantisches Suchen. Was ich aber nicht fand, das war *Limax cinereoniger*, Wolf, ein Thier, mir schon deswegen so interessant, weil ich ihn vergebens im ganzen Münsterlande und den von diesem eingeschlossenen Kalkhöhen suchte, wogegen er auf den Randbergen desselben häufig ist. Herr Lehrer W. Trenkner erwähnt ihn allerdings in seinem fesselnden Schriftchen: „Der Curort Grund am Harze“, Grosse'sche Buchhandlung in Clausthal. Auf meiner

ganzen Tour fand ich überall den schwarzen *Arion empiricorum*, den *Limax cinereoniger*, Wolf, etwas hellgestreift, nur in den Tannen bei Hahnenklee und zwischen diesem Curort und Goslar auf den Waldwegen. Am Oderteiche und am „Jues“, dem riesigen Erdsalle bei Harzberg, sah ich noch *Agriolimax laevis*, Müll. und zwischen Wildemann und Lautenthal den niedlichen *Arion minimus*, Simroth. Sein grosser Vetter, *Arion subfuscus*, Drap., den ich mehrfach, so bei Grund mit *A. Bourguignati*, Moqu. Tand., fand, hatte nie das dunkle Ansehn, wie ich erwartete, sondern war stets fast einfarbig, wie manchmal junge *A. empiricorum*. Zum Schlusse will ich allen Malakozoologen, die den Harz bereisen, Grund, besonders den Iberg, sehr empfehlen.

Literaturbericht.

Krause, Arthur, die nackten Landschnecken von Tenerifa.

In Sitz. Ber. Ges. naturf. Fr. 1894, p. 30.

Keine n. sp.

Proceedings of the Malacological Society of London. Vol. I
No. 2 March. 1894.

- p. 35. Sykes, E. R., Notes on the British Chitons. With pl. III. 12 Arten werden abgebildet.
- p. 38. Sowerby, G. B., on a specimen of *Xenophora pallidula* Reeve, taken off Port Blair (Andamans) at a depth of 188 fathoms, with attachment of Pleurotomidae including a new form. (*Neu Clathurella?* *rugidentata* t. 4 f. 2.)
- p. 39. Sowerby, G. B., on three new species of Shells from Deep-Sea Dredgings in the Indian Ocean (*Verticordia optima* t. 5 f. 3; *Syndesmia maxima* p. 40 t. 5 f. 5; *Glauconome sculpta* p. 40 t. 5 f. 4.)
- p. 41. Sowerby G. B. Descriptions of twelve new species chiefly from Mauritius. (*Ocinebra crouchi* t. 4 f. 9; *Oc. obtusa* t. 4 f. 8; *Fusus barclayi* t. 4 f. 13; *Tritonidea neglecta* p. 42 t. 4 f. 7; *Coralliphila latiaxidea* p. 42 t. 4 f. 6; *C. curta* p. 42 t. 4 f. 4; *Scalaria robilliardi* p. 42 t. 4 f. 5; *Terebra cernica* p. 43 t. 4 f. 1;

- being removed at this point, the following followed as the next few minutes continued on. At this point some minor editing was done.
- The meeting by the members from Alberta on pipeline issues is going to continue as long as there are any questions or comments to ask. At this point the meeting proceeded to the last of the remaining subjects in the agenda, the ultimate response to the proposed pipeline project. It was at this point that the audience responded to the last of the questions submitted to the panel.
 - The meeting by the provincial offices was adjourned apparently around 10:15 am. The group then went to the lounge area to have refreshments provided by the hotel.
 - At 11:00 am, Brian van Dijk, himself, opened the meeting at approximately 11:00 am with some brief remarks. He was then joined by Brian from Environment and Sustainable Development.
 - At 11:00 am, Brian began discussion of the proposed pipeline and the various benefits involved. In addition, he mentioned the following slides for the discussion of some pipeline issues in subsequent hours on the distribution of power.
 - The presentation, which was to follow, was not fully understood during comments given out from participants. This is discussed below.
 - The presentation, which was to follow, was fully understood from the Brian from Environment and Sustainable Development.
 - The presentation, which was to follow, was fully understood from Brian from Environment and Sustainable Development. Brian from Environment and Sustainable Development, who was present, did not provide any specific information on the proposed pipeline, other than the following:
 - The proposed pipeline would be the largest pipeline in North America.
 - The proposed pipeline would be designed to transport natural gas, crude oil, and refined products through the pipeline system.
 - The proposed pipeline would be the largest pipeline in North America.
 - The proposed pipeline would be the largest pipeline in North America. - The presentation, which was to follow, was fully understood from Brian from Environment and Sustainable Development. Brian from Environment and Sustainable Development, who was present, did not provide any specific information on the proposed pipeline, other than the following:
 - The proposed pipeline would be the largest pipeline in North America.
 - The proposed pipeline would be the largest pipeline in North America.
 - The proposed pipeline would be the largest pipeline in North America.

sconciensis t. 6 f. 13; *Vitrea leia* t. 6 f. 14; *Pupa multispirata* t. 6 f. 6; *Isthmia dubia* t. 6 f. 8; *Megaspira cylindrica* p. 73, mit Figur; *M. monodonta* p. 74 t. 6 f. 3; (beide schwerlich zu den amerikanischen *Megaspira* gehörend). *Cochlicopa headonensis* p. 74 t. 6 f. 4; *Limnaea headonensis* p. 74 t. 6 f. 2; *Pitharella rickmani* Edw. p. 75 t. 6 f. 7—9; *Planorbis incertus* p. 76 t. 6 f. 12; *Pl. euomphalus* Sow. p. 77 t. 6 f. 10. 11.

- The Journal of Malacology (Conchologist)* Vol. III. No. 1.
p. 1. Collinge, Walter E., Note on *Veronicella birmanica*, Theob.
p. 3. Smith, Edgar A., Dr. Paul Fischer (Necrolog).
p. 4. Sykes, E. R., Note on two varieties of *Arion rufus* L.
p. 5. Collinge, Walter E., on the validity of *Arion occidentalis* Ckll.,
a supposed new species. Die Art wird für ein Synonym von
Ar. hortensis erklärt.
p. 6. Hedley, Charles, Additions and Amendments to the Slug List.
Der Autor bestreitet entschieden, dass irgend ein *Limax* in
Australasien einheimisch sei, so häufig die Gattung auch in allen
europäischen Ansiedelungen eingeschleppt vorkommt.
p. 9—20. Current Literature. Wir machen unsere Leser auf die sehr
reichhaltige Bibliographie aufmerksam.

Martini-Chemnitz, Conchyliencabinet Ifg. 406. Achatinidae
von Kobelt.

Enthält hauptsächlich Limicolarien. Neu *L. togoensis* t. 23 f. 1, 2 und
L. rohlfsi Mts. mss. t. 23 f. 5, 6.

Philippi, R. A., die Mactra-Arten Chiles. In Annal Mus.
Nac. Chile 1893, 9 pg. mit 3 Taf. Non vidi.

Erlanger, R. von, zur Entwicklung von Paludina viripara.
Heidelberg 1893. 8°, 47 S., mit 2 Tafeln.

*de Gregorio, A., Iconographia Conchiologica Mediterranea vivente
e terziaria.* Fasc. III Muricidae, parte I. Illustrazione
del Triton gyrinoides (Broc.) de Gregorio (= nodi-
ferum Lam.). Palermo 1893. 4°. 22 p. con 5 tavole.

*Sinroth, H. Klassen und Ordnungen der Mollusca (Weich-
thiere), wissenschaftlich dargestellt in Wort und Bild.*
Leipzig. gr. 8°.

Von der zeitgemäßen Neubearbeitung von Kefersteins Mollusken in
Bronn's Klassen und Ordnungen sind bis Ende 1893 die sechs

ersten Lieferungen 192 S. umfassend, erschienen; sie werden jedem Malacologen willkommen sein.

Sturany, Dr. R., über die Molluskenfauna Centralafrikas.

In O. Baumann, durch Massailand zur Nilquelle. Berlin 1894, 26 S. mit Taf. 24 und 25.

Zur Bearbeitung gelangen besonders Formen aus dem Tanganyika-, Victoria- und Mangarasee. Der Verfasser hat vergeblich versucht, die ihm vorliegenden Exemplare unter die Bourguignat'schen Arten zu vertheilen, und gibt Abbildungen und Beschreibungen derselben, meist ohne sie neu zu benennen. Als neu beschreibt er nur *Spatha baumanni* p. 12 fig. 38, und *Sp. martensi* fig. 39, beide aus östlichen Zuflüssen des Victoriasees; — *Planorbis sudanicus* var. *magna* und *Lanistes affinis* var. *mangarana* beide aus dem Mangarasee; *Limicolaria rectistrigata* var. *minor* fig. 36, 37 aus der Umgebung des Victoriasees; — *Succinea baumanni* fig. 1, 6, 11, 15, 20, 21, 26 aus der Nyassasteppe und dem Gebiet des Kagera. Ueberhaupt gesammelt wurden 30 Arten und Varietäten. Sehr willkommen ist ein angehängtes vollständiges Literaturverzeichniss.

Smith, Edgur A., on a collection of Land and Freshwater transmitted by Mr. H. H. Johnston C. B., from British Central Afrika. In Proc. Zool. Soc. 1893 p. 632—641 pl. 59.

Neben Arten aus dem Tanganyika und Nyassa enthält die Sendung zum erstenmal Arten aus dem Mweru-See, die mit einer Ausnahme sämtlich neu sind, aber sich an die Fauna des Tanganyika anschliessen. Als neu beschrieben werden: *Ennea Johnstoni* p. 633 t. 59 fig. 1 vom oberen Shire; *E. karongana* p. 633 t. 59 fig. 2 von Karonga am Westufer des Nyassa-Sees; *Helix (Pella) rohytei* p. 634 fig. 3, 4. vom oberen Shire; *Viviparus mwerensis* p. 636 fig. 5, 6, nebst var. *pagodiformis* fig. 7; *V. crawshagi* p. 637 fig. 8; *Cleopatra johnstoni* p. 637 fig. 9; *Cl. mwerensis* p. 637 fig. 10, sämtlich aus dem Mwerusee; *Melania woodwardi* p. 638 fig. 11 aus dem Nyassa; *M. mwerensis* p. 639 fig. 12; *M. imitatrix* p. 639 fig. 13; *M. crawshagi* p. 639 fig. 14, alle aus dem Mwerusee; *Physa karongensis* p. 640 fig. 15 von Karonga; *Unio (Metaptera) johnstoni* p. 640 fig. 18—20 aus dem Mwerusee.

Smith, Edgar A., Descriptions of two new species of Shells of the genus Ennea. In Proc. Zool. Soc. London 1893 p. 642. (*Ennea [Ptychotrema] bassamensis* p. 642 von Grand Bassam, fig. 1: *Edentula longula* p. 643 von Mayotte).

Brusina, Sp., die fossile Fauna von Dubovac bei Karlstadt in Croatia. In Jahrb. k. k. geol. Reichsanstalt 1893, vol. 43 p. 369—376 Taf. 6. Als neu beschrieben werden *Congeria pieradovici* p. 373 fig. 2—4; *Dreissensia rossii* p. 374 fig. 5—7; ausserdem abgebildet *Congeria zagrabiensis* Br. und *simulans* Br.

Nehring, Prof., über Najaden von Piracicaba in Brasilien. In Sitz. Ber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1893 p. 159. Gibt im Auschluss an die Arbeit Iherings einige genauere Notizen über das Vorkommen der dort beschriebenen Muscheln im Piracicaba.

Martens, Ed. von, über einige den nördlichen und südlichen Kalkalpen gemeinsame Landschnecken. In Sitz. Ber. Ges. naturf. Fr. 1894 p. 47: Erörtert ausführlich das Vorkommen von *Campylaea preslia*, *Clausilia bergeri*, *Pomatias septemspiralis*, *Pupa pagodula*, *Helix rupestris*, welche in den nördlichen und südlichen Kalkalpen vorkommen und in der Centralzone fehlen.

The Journal of Conchology, Vol VII No. 10.

- p. 367. Taylor, John W., *Succinea oblonga* monstr. sinistr.
p. 368. Sowerby, G. B. Marine Shells of South Afrika. Neu *Bullia pristulosa* p. 368; *Latirus abnormis* p. 369; *Marginella perminima* p. 370; *Columbella kitchingi*; p. 370. *Mitrella pyramidalis* p. 370; *Natica queketti* p. 371; *Scalaria simplex* p. 371; *Aclis unilineata* p. 371; *Gibbula incineta* p. 372; *Volvatella laguncula* p. 373; *Basterotia obtusa* p. 374; *Pandora dissimilis* p. 374; *Psammobia burnupi* p. 375; *Macoma eandisata* p. 375; *Strigilla trotteriana* p. 376; *Mactra aequisulcata* p. 376; *Donax burnupi* p. 377; *Cardium turtoni* p. 377;

- p. 379. Marshall, J. T., Additions to „British Conchology“ Addenda.

Proceedings of the Malacological Society of London. Vol. I, No. 3.

- p. 84. Smith, Edgar A. on the Land Shells of Western Australia With pl. VII. Neu *Lamprocystis lissa* p. 86 t. 7 fig. 22, 28; *Chloritis*

millepunctata p. 88 t. 7 fig. 11; mit var. *cassimensis* fig. 12;
Chl. rectilabrum p. 88 t. 7 fig. 14; *Rhagada inconvicta* p. 90
t. 7 fig. 10; *Hadra obliquerugosa* p. 90 t. 7 fig. 17; *H. pru-*
dhoensis p. 91 t. 7 fig. 9; *H. burnerensis* p. 91 t. 7 fig. 8;
H. montalivetensis p. 91 t. 7 fig. 21; *H. sykesi* p. 92 t. 7 fig.
8; *H. umtata* p. 92 t. 7 fig. 15; *Trachia derbyana* p. 92 t. 7
fig. 19; *Tr. bathurstensis* p. 93 t. 7 fig. 20; *Tr. gascoynensis*
p. 93 t. 7 fig. 13; *Liparus Seenwinensis* p. 94 t. 7 fig. 27;
Coxiella n. gen. *Truncatellidarum*, für *Truncatella striatula* Mke.;
Helicina walkeri p. 99 t. 7 fig. 26.

- p. 100. Böttger, Dr. O. and B. Schmacker, Descriptions of new Chinese
Clausiliae. With pl. 8, 9. *Neu* (*Euphaedusa*) *tetsui* p. 102
t. 8 fig. 6 = *filippina* Gredler nec Heude; *saberi* p. 103 t. 8 fig. 7;
longurio p. 104 t. 8 fig. 2; *latilunellaris* p. 104 t. 8 fig. 3;
belemnites p. 105 t. 8 fig. 1; *broderseni* p. 106 t. 8 fig. 5;
(*Pseudonenia*) *recedens* p. 107 t. 8 fig. 9; *pseudobensonii* p. 108 =
Bensonii Bttg. nec A. Ad.; *Dextroformosana* n. subsect. Typus
Cl. semprini Gredler. (*Hemiphaedusa*) *basilissa* p. 113 t. 9
fig. 6; *imperatrix* p. 113 t. 9 fig. 4; *elamellata* p. 114 t. 9
fig. 5; *frankei* p. 115 t. 9 fig. 3.
- p. 118. Hedley, Ch. on the value of *Ancylastrum*. Bourguignats Typus
ist *Ancylus cumingianus*, nicht *Anc. fluviatilis*, die Gattung mit
Latia und Gundlachia verwandt.
- p. 119. Newton, R. Bullen and Geo. F. Harris, a revision of the british
eocene Cephalopoda. With. pl. 10.
- p. 132. Sykes, E. R., on the South African Pelyplacophora.
- p. 137. Smith, Edgar A. Note on the variation and distribution of
Buliminus oblongus Müll.
- p. 138. Murdoch, R., Notes on the variation of and habits of *Schizoglossa*
novoseelandica Pfr. Die Lieblingsnahrung der Raubschnecke
ist *Otoconcha dimidiata* Pfr.

Eingegangene Zahlungen:

Kinkel, F., 6 Mk.; — Simroth, G., 6 Mk.; — Miller, St., 6 Mk.;
— Borcherding, V., 6 Mk.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.,
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Berittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Die Conchylienfauna der altpleistocaenen Travertine des Weimarsch-Taubacher Kalktuffbeckens

und

Vergleich der Fauna mit æquivalenten Pleistocænablagerungen
von

Dr. phil. Arthur Weiss (Weimar).

(Schluss).

II. Vergleich mit ähnlichen Vorkommen.

In F. v. Sandberger's Arbeit „Ueber die pleistocaenen Kalktuffe der Fränkischen Alp nebst Vergleichungen mit analogen Ablagerungen“ (Sitzungsberichte der math.-phys. Classe der Königl. bayr. Academie der Wissenschaften, Band XXIII Heft 1, München 1893) ist über die hauptsächlichsten Pleistocænablagerungen berichtet und ich habe mich im ganzen an dieses Werkchen gehalten.

President there were his brothers, also well known scholars in literature both in Germany and Italy in universities famous throughout Europe, and especially popular there, independent men. But the educational aims are somewhat different now. Today between Italy and United States there is no interest in grammar now in the universities and there nothing much in the high schools independent courses. Separate and so far as the United States and France, Protestant schools offer one and English professors and English-speaking class are held in United States mostly in the New Haven, Boston, Baltimore, Memphis, Duluth, Detroit and Chicago. The same are taught in French class exclusively from the United. In Protestant we can manage English and German and no difficulties. The highest rank professor Protestant and English teacher from these countries independent class have no barriers, but when going to the other universities there great problem (problem) in our cities because the one among our teachers speak English and therefore confusing the French.

The same was true in our theological and also philosophical students, particularly in the United States. Separate also, says Prof. Ernest H. Gruening in *Protestant Church, State Education*, separation from the church by religious and secular thought separated Christians. Christians have no place in it. Those from China in the Universities had another difficulty, because they do not know anything about their language.

In addition Italy, nothing similar from all the Universities, especially those are in Florence and Rome. Under the Emperor and Cardinals often themselves, particularly the churches, prohibited them from going to the Universities. (See p. 28 in 1.)

Die Bornemann'schen Originale habe ich durch die Güte dieses Herrn zur Durchsicht bekommen und muss bemerken, dass dieselben genau bestimmt sind und dass daher das in Fragestellen gewisser Arten durch Pohlig gänzlich ungerechtfertigt ist.

Das Vorkommen von Cannstatt ist dem Weimaraner, wie ich mich selbst überzeugt habe, aequivalent, abweichend kommt dort noch vor: *Zonites acieformis* Klein, *Pomatias septemspiralis* Raz. (Noch recent in Süddeutschland.) Neu kommen dort nach meinen Untersuchungen noch vor: *Limax (Heyneannia) maximus* L., *Zonites verticillus*, var. *praecursor* Weiss und diverse andre, welche ich demnächst publicieren werde.

Mit dem Tufflager von Paschwitz bei Canth in Schlesien stimmt Weimar in allen Stücken überein.

Wahrscheinlich ist es auch, dass der Tuff von Halberstadt hierher gehört.

Das von Lomnicki erwähnte Tuffkalklager von Jazlowiec (Bezirkshauptmannschaft Buczacz) in Galicien (272 m üb. d. Meere) stimmt bis auf *Helix lutescens* Zieg., *Buliminus?* Hohenackeri Kryn., *Clausilia turgida* Zieg., *Succinea Hungarica* Haz. überein. *Clausilia cana* Held kommt an beiden Localitäten vor (in Deutschland zum erstenmal fossil nachgewiesen), dieselbe ist bis jetzt nur von diesen Fundstellen bekannt. Das galizische Lager hat dasselbe Alter wie das Weimaranische, von 22 dort aufgefundenen Arten sind 18 beiden gemeinsam. (Ueber dieses Lager vergleiche: Lomnicki Mieczaki zuane dolycheraz Z. pleistocenu galicyiskiego, Livow 1886).

Die Tuffe von La Celle bei Moret (Seine et Marne) und die von Joinville, Canonville, Montreuil und Deligny bei Paris haben, wie Weimar als Eigenthümlichkeit die Belgrandien. Wie in Cannstatt kommt dort auch *Pomatias septemspiralis* Raz. vor. (Ueber diese siehe: Catalogue des

Mollusques terrestres et fluviatiles des environs de Paris à l'époque quaternaire par M. I.-R. Bourguignat).

Was die Unterlage unserer Tuffe betrifft, so liegen sie auf Geröllen und Geschieben nordischen (?) und thüringischen Ursprungs, ich halte diese Kiese und Conglomerate für aequivalent den rheinischen Sanden von Mosbach, von Mauer im Elsenzthal bei Heidelberg, von Hangenbieten und Darmstadt und hoffe, dass ich in kurzer Zeit den Beweis durch Untersuchung der darin enthaltenen Fauna erbringen kann.

III. Statistik.

Von den 111 bei Weimar und Taubach fossil nachgewiesenen Arten sind:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 80 Arten (= 72,0 %) | Landschnecken, |
| 23 „ (= 20,7 %) | Süßwasserschnecken, |
| 7 „ (= 6,3 %) | Süßwassermuscheln, |
| 1 Art (= 0,9 %) | Brackwassermuschel. |

Von den 80 Landschneckenspecies sind:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 Arten (= 45,0 %) | von O. Schmidt für Weimar als lebend angegeben. |
| 11 Arten (= 9,9 %) | gehören der Mitteldeutschen Fauna an, sind aber bisher noch nicht bei Weimar gefunden worden. |

Es sind dies die Arten: 1. *Acme polita* Hartmann, 2. *Vitrina diaphana* Drp., 3. *Hyalinia hammonis* Ström, 4. *Helix striata* Müll., 5. *Vertilla pusilla* Müll., 6. *Orcula dololum* Brug., 7. *Trochulus fulvus* Müll., 8. *Clausilia plicatula* Drp., 9. *Succinea elegans* Risso, (nächster thüringer Fundpunkt ist Halle a. S.), 10. *Clausilia cana* Held, (vorwiegend östliche Art), 11. *Vertigo mouliniana* Drp.

15 Arten (= 13,5 %) sind ausgewandert, davon sind jetzt 7 typisch östliche Arten (= 6,3 %).

Diese sind: 1. *Hyalinia subrimata* Reinh., 2. *Patularia solaria* Mke., 3. *Tachea vindobonensis* C. Pfr., 4. *Clausilia filograna* Zgl., 5. *Clausilia retusta* Zgl., 6. *Clausilia densestriata* Rossm., 7. *Tachea sylvatica* Drp.

6 nordisch-alpine Arten. (= 5,4 %).

Es sind dies: 1. *Sphyradium edentulum* Drp., 2. *Patula ruderata* Stud., 3. *Vertigo alpestris* Ald. 4. *Vertigo substriata* Jeffr., 5. *Pagodina pagodula* Desm., 6. *Isthmia costulata* Nilss.

2 südliche Arten (= 1,8 %)

Diese sind: 1. *Hyalinia diaphana* Stud., 2. *Isthmia claustralis* Grdl.

3 Arten (= 2,7 %) sind ausgestorben, nämlich: 1. *Zonites verticillus* Fér. var. *praecursor* A. Weiss, 2. *Campylaea canthensis* Beyr., 3. *Tachea tonnensis* Sandberger, (letztere Species wurde vom Autor selbst dafür erkannt). Ausser diesen noch die Varietäten *Vallonia pulchella* var. *excentricoides* Sterki und *Sphyradium edentulum* var. *columellum* Benz.

Von den 23 Arten Süßwasserschnecken sind: 21 Arten (= 18,9 %) mitteldeutsche Species, 2 Arten (= 1,8 %) (*Belgrandia* und *Amphipeplea glutinosa* Müll.) gehören der westeuropäischen Fauna an. Belgrandia ist bis jetzt noch aus den Pleistocaen Englands und Frankreichs bekannt. Recent kommen Belgrandien nur noch in Portugal, dem südlichen Frankreich und Nordwest-Italien vor. Die 7 Süßwassermuscheln (= 6,3 %) gehören alle der Fauna Mitteldeutschlands an.

Die eine Art *Corbulomya* n. sp. ist jedenfalls eine aus dem Tertiär eingeschwemmte Species oder eine brackische Form, die sich dem Leben im Süßwasser angepasst hat. Ich behalte mir vor, über diese interessante Art näheres zu veröffentlichen, sobald ich ein reicheres Material aufgesammelt habe.

Das Verhältnis der recenten, noch im Gebiete lebenden zu den ausgewanderten Conchylien ist 100:24,5, zu den ausgestorbenen 100: 4,9 (mit Zuziehung der Varietäten von 100 : 8,1. Von den ausgewanderten Arten sind, wie wir oben gesehen haben, die meisten östliche Formen, wie sie in Siebenbürgen, Russland, dem Kaukasus etc. vorkommen. Die 3 ausgestorbenen Arten haben ihre nächsten Verwandten im Osten, so *Zonites verticillus* För. var. *praecursor* A. Weiss, in dem *Zonites croaticus* Partsch, nicht, wie Sandberger meint mit *Zonites smyrnensis* Roth. *Tachea tonnensis* Sandberger hat in *Tachea nemoralis* L., *Campylea canthensis* Beyr. in *Campylaea banatica* Partsch ihre nächsten Verwandten.

— 2 —

Specilegium Malacologicum.

Neue Binnen-Conchylien aus der Paläarktischen Region.

Von

Dr. Carl Agardh Westerlund.

V.

(Schluss.)

Clausilia (Albinaria) cathara n. sp.

T. fusiformis, gracilis, spira sensim attenuata, laevis (etiam apice), anfractu ultimo demum acute striata (striis simplicibus), alba, punctis nonnullis fuscis, apice pallide brunnea; anfractus 11, summi convexi, caeteri planiusculi, ad suturam angulati, ultimus attenuatus, vix penultimo longior, levissime cristatus et sulcatus; apertura ovalis, intus cum limbo pallide hepatica, fere absque sinulo, lamella supera parva, saepe punctiformis, a margine remota, lamella infera immersa, infra obliqua, intus extense sigmoidea, non furcata, lamella spiralis profundissima, tenuis, vix conspicua, plicae palatales superae 2 (principalis mediocris, longe a margine separata lunellam lateralem obsoletam non transgrediens, secunda brevissima, obliqua, lunellae adhaerens), infera nulla, subcolumellaris oblique intuenti conspicua;

peristoma continuum, breve solutum, subrectum, tenuer. Long. 15—16 lat. $2\frac{1}{2}$ —3 mm.

Hab. Griechenland bei Langadi am M. Taygetos. (Th. Krüper).

Diese Clausilia, in welcher ich keine schon beschriebene erkennen kann, scheint durch ihren sehr schwachen Nackenkiel und Furche, einfach gestreiften letzten Umgang, kleine zweite obere Gaumenfalte und zurückstehende Unterlamelle der Gruppe *Graja* Bttg. zugehören. Durch die fast punktförmige Oberlamelle und die weit zurücktretende kaum sichtbare Spirallamelle gleicht sie der *contaminata* (Z.) Rm. Ihre Hauptkennzeichen gegenüber allen ihren Verwandten sind das gänzlich bis auf den letzten Umgang (also auch die oberen Umg.) glatte Gehäuse, die einfache, gedrehte, innen oft subhorizontale, gut sichtbare Unterlamelle, die ovale Mündung, fast ohne Bucht und der gerade lippenlose Mundsaum.

Clausilia (Albinaria) violascens n. sp.

T. fusiformis, gracilis, violascens, apice brunneo, ubique subdistanter costata, costis obtusis, in anfractu ultimo densioribus et acutioribus; anfractus 10, convexiusculi, ultimus basin versus attenuatus, medio depresso-culus, inferne suberistatus, super cristam leviter sulcatus; apertura subovalis, lamella supera sat longa sed spiralem non attingente, infira parva, sat profunda, transversali, arcuato-ascendente, plica principali profunda; parvula vel mediocri, lunellam tenuem obsoletam non transiente, plica subcolumellari immersa, inconspicua; peristoma continuum, solutum, tenuer, margine exteriore expansiusculo, columellari expanso, dilatato. Long. $13\frac{1}{2}$ — $14\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{3}$ mm.

Hab. Griechenland in den Veluchigebirgen. (Th. Krüper).

Steht wohl in der Nähe der *Cl. naerosa* Fér., bildet aber wahrscheinlich eine eigne Gruppe.

Clausilia (Albinaria) menelaos Mts.

Var. *juncea* mh.

T. gracilis, aperturam versus dense costulata. Long. 13—14, lat. $2\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Griechenland am Taygetos. (Th. Krüper).

Clausilia (Papillifera) liradica n. sp.

T. fusiformis, cornea, superne obsolete striata, medio laevigata, in anfractu ultimo tenuissime densissimeque striatula; anfractus 10, summi convexi, medii planulati, ultimus basi obsolete cristatus; apertura ovali-rotundata, lamella supera longiuscula, non marginali, infera inferne stricta, obliqua, superne arcuata, plica principali nulla vel obsolete, lunella subdorsali, superne abbreviata et rectangulatim incurva, inferne plicam inferam sat validam et longam emittente, plica subcolumellari a lunella disjuncta, optime conspicua, ad basin lamellae inferae extensa; peristoma continuum, breve solutum, album, tenue, subrectum. Long. 15—15½, lat. 3 mm.

Hab. Griechenland, Livadia in Boeotien. (Th. Krüper).

Var. *scoliostoma* mh: anfractus 10, apertura plus minusve saepe forte ad sinistrum obliqua, lamella supera longa, peristoma late reflexum et albolabiatum; long. 17—19, lat. 3¼ mm.

Gehört der kleinen Gruppe von *Cl. confusa* Bttg. und *Cl. boeotica* Küst. zu.

Clausilia (Delima) allyphanta n. sp.

T. magna, ventrosulo-fusiformis, apice tenue attenuata, densissime striatula, *lineis densissimis spiralibus subobsoletis peculiariter sculpta, rufobrunnea*, sutura tenui non papillis sed *strigis albis tenuibus brevibusque ornata*; anfractus 11, planulati, ultimus extus distinctius striatus, plicis et lunella translucentibus fulvis notatus, extus medio depresso, basi obtuse cristatus et sat late sulcatus; apertura ovali-piriformis, lamella supera longa, non marginalis, spiralem vix transgrediens, infera magna, transversalis, subtus medio concava, sub superam intus extensa, arcuato-ascendens; plica principalis longe ultra lunellam validam dorsalem substrictam extensa, plicae superiores 2, breves, in fauce cum callo rufo obliquo extus adhaerentes, intus lunellam non attingentes, plica infera valida, alba, subverticalis, extensa, lunellae adhaerens, plica subcolumellaris infra lamellam inferam *strictè immersa*; super periomphalum plicula transversalis translucet; peristoma *continuum, subsolutum*, fusculo-limbatum. Long. 20—21, lat. 4½ mm.

Hab. — ?

Diese prächtige Art, deren Fundort mir leider unbekannt ist, weil ihr Namenzettel verloren gegangen ist, steht unmittelbar an der Seite der *gibbula* (Z.) Rm., von welcher sie sich doch so reichlich unterscheidet, dass sie gewiss als selbständige Species betrachtet werden muss.

Gen. *Succinea* Drap.

Succinea (Amphibina) *pfeifferi* Rossm.

Var. *subelegans* mh.

T. perangusta, elongata, tenui striata, pallide succinea; anfractus 3, ultimus basi longe attenuatus, longus, angustus, marginibus subparallelis, penultimus convexus, sursum conico-attenuatus; sutura inferne peroblique descendens; apertura longa, sursum attenuata, infra dilatata, columella subrecta in marginem columellarem transiens. Long. 7, lat. 3 mm., apert. long. $5\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Finnland bei Sässma. (Mus. Zool. in Helsingfors).

Man könnte entschuldigt sein, wenn man diese Form mit der *elegans* Risso verwechselte, die sich doch immer durch ihren vorletzten Umgang, der nie gewölbt, sondern abgeflacht, ausgezogen und aufwärts langsam konisch verschmächtigt ist, ausgezeichnet. Unsere *subelegans* steht zweifels ohne am nächsten der Var. *recta* Baud. von *pfeifferi*, ist aber noch viel schmäler, mit dem letzten Umgange unten (über der Mündung) sehr wenig gewölbt und aufwärts lang ausgezogen.

Gen. *Planorbis* Guett.

Planorbis (*Gyraulus*) *leptostoma* n. sp.

T. supra in centro impressula, infra in medio convexiuscula, lentiforme compressa, firma, corneo-brunnea, tenuissime striatula, absque lineis spiralibus; anfractus $3\frac{1}{2}$, celeriter accrescentes, vix convexiusculi, ultimus dilatatus, compressus, utrinque aequo convexiusculus, medio angulatus; apertura perobliqua horizontalis, oblongo-ovata, basi subcordata, marginibus callo tenui junctis. Diam. 3 mm.

Hab. Finnland bei Rautasalmi: (Mus. Zool. in Helsingfors).

Am nächsten dem Pl. *bourguignati* Mort. und dem *paladilhi* Mort. verwandt, welche aber ein fast geripptes Gehäuse haben, grösser sind (*bourg.* 6½, *palad.* 5 mm.) mit mehreren (4—4½) Umgängen, deren der letzte bei *bourguignati* gerundet ist.

Planorbis (Armiger) *dilectus* n. sp.

T. late umbilicato-concava (umbilicus ab initio regulariter dilatatus omnes anfractus bene praebet), subplano-depressa, dense tenuique costulato-striata, cornea, pellucens; anfractus perforte 3, vix convexiusculi, ultimus lente sed aperturam versus fortius accrescens, utrinque aequaliter compressa, medio obtuse angulatus, antice paullo descendens; apertura parum obliqua, horizontalis, prorsus ovalis, extus rotundato-obtusa, marginibus aequaliter leve arcuatus, in pariete sub angulo anfractus valde approximatis, sed tamen disjunctis. Diam. 2, alt. ⅔ mm.

Hab. Griechenland im See von Kumandures bei Daphni. (Th. Krüper).

Ein so kleiner *P. nautilus* Lin. hat nur höchstens zwei Umgänge, welche von Anfang an sehr schnell an Breite zunehmen, einen doppelt kleineren aber tieferen Nabel, ein sehr schiefe gerundete Mündung, mit dem Spindelrande stark gebogen u. s. w.

Gen. *Limnaea* (Brug.) Rang.

Limnaea (Lymnus) *stagnalis* Lin.

Var. *gotlandica* mh.

T. crassissima, albida, striatula; anfractus 7, ultimus superne humerosus, horizontalis, medio planatus, antice duplicatus, lamina interiore producta, supra medium forte arcuato-producta; peristoma rectum, acutum, margine columellari in laminam latam perforationem subtegentem reflexo, marginibus callo lato tenui junctis.

Forma 1. Spira productione, acuta, tenuis, apertura basi dilatata, margine columellari retrorsum arcuato; long. 36, lat. 20 mm., apert. long. 23, lat. inferne 15 mm.

Forma 2. Spira brevior, basi lata, sursum forte acuminata, apertura major, latior, superne dilatata, ad bassin angustata, margine columellari recto, verticali, anfractus

ultimus ventrosus; long. 39, lat. 25 mm., apert. long. 25, lat. medio 15 mm.

Hab. Schweden in Ins. Gotland. (G. Lindström in Coll. Cleveana).

Diese Schnecke gleicht merkwürdig mit ihren beiden Formen den Limnaea aus dem Goktscha-See in Hocharmenien, welche Kobelt abbildet und beschreibt in seiner Iconographie, N. F. unter den Fig. 172 und 173 und die ich in meiner Fauna palaearctica *armenica* benannt-unsere Forma 1. der Fig. 172 und Forma 2 der Fig. 173. Identisch können sie doch nicht sein, weil die armenischen Schnecken haben den Mundrand stark umgeschlagen, den letzten Umgang mit mehr oder weniger starken Spiralkanten und Reifen umzogen und in ihrer zweiten Form eine lebhafte gelbbraune Färbung.

• Var. *acicularis* mh.

T. tenuissima, fragillima, pollucida, inter lineas spirales elevatas obsoletiores dense malleata, spira gracillima, acutissima, obliqua, aperturae longitudine, sutura impressa, alba; anfractus 7—8, elongati, vix convexiuseuli, sursum attenuati, ultimus parum convexus; apertura margine columellari arcuato. Long. 30—31, lat. 15 mm.

Hab. Westsibirien bei Lensele. (Mus. Zool. in Helsingfors.)

Var. *nordmanni* mh.

T. non rimata, rotundato-ovata, irregulariter striata, tenuis sed solida, cornea, spira brevissima, late conica, breve acuminata; anfractus 5, ultimus maximam partem testae occupans, ventrosus; sutura usque ad aperturam horizontalis; apertura late ovata, margine exteriore ab insertione forte arenato, columellari curvato, pariete brevi, convexo. Long. 25, lat. 20 mm; apert. long. 20, spira long. 7 mm.

Hab. Finnland bei Walamo. (A. v. Nordmann in Mus. Zool. in Helsingfors).

Diese sehr interessante Form, ein vollkommener Gegen-
satz zu der vorstehenden *acicularis*, gleicht so täuschend
einer *orata* dass man sie gewiss dieser unterordnen möchte
wenn sie nicht die allen Stagnalisformen eigenthümliche
mehr oder weniger deutliche Skulptur (sehr dichte Quer-
streifen von dicht stehenden Spirallinien durchbrochen)

besonders auf den vorletzten Umgängen stark ausgeprägt hätte.

Var. *westerlundi* Loc. Forma *neréni* mh.

T. oblongo-turrita, cornea, striatula, spira producta, subulato-acuminata, quam apertura paullo brevior; anfractus $6\frac{1}{2}$ —7, superi planulati, ultimus oblongus, omnes strigis eburneis ornati; apertura peristomate intus late eburneo-labiato, margine exteriore supra medium exciso, infra medium forte arcuato-producto. Long. 46, lat. 20 mm, apert. long. 25, lat. infra medium 15 mm.

Hab. Schweden bei Skeninge frequens.

Limnaea (*Gulnaria*) *lagotis* Schr.

Var. *diploa* mh.

T. plus minusve aperte rimata, tenuis, sed firma, cornea, nitidula, spira elongata, celeriter acuta; anfractus 5, convexi, ultimus ventricosus, regulariter convexus, infra brevissime elongatus; apertura oblongo-ovata, basi rotundata, margine columellari reflexo, substricto, exteriore toto leviter curvato. Long. 24, lat. 14—15 mm., apert. long. 15—16 mm.

Hab. Deutschland* in einem kleinen stillen Nebengewässer im Breidenbacher Grund im Kreis Biedenkopf* (Kobelt im Jahrb. Nass. Ver., XXXIX, 1886, p. 17— im Sep. mit 9 f. 4, " *Limnaea auricularia* var.*"), Schweden bei Stehag in Skåne (Hjalmar Westerlund).

Limnaea (*Gulnaria*) *orata* Drp.

Var. *subinflata* mh.

Differt a var. *inflata* Kob. anfractu ultimo postice fortius ventroso, angulo profundo inter parietem aperturalem et columellam nec non margine exteriore apertura subverticali.

Hab. Deutschland, Oberitalien, Dänemark, Norwegen ad Kristiania, Finnland bei Mjatusova und Senrazärvi.

Diese Form, die ich früher mit var. *inflata* Kob. (Iconogr. f. 1257) verwechselt habe, weil Kobelt selbst die beiden Formen in der Iconographie zusammengeführt und erst in den Jahrb. des Nass. Vereins 1886 (Separ. p. 15 t. IX Fig. 1) die typische *inflata* in Wort und Bild hervorhebt,

muss ich als freistehend betrachten, besonders da die Var. *inflata* Kob. (Icon. f. 1256 und Jahrb. Nass. Ver.) niemals in den nördlichen Ländern gefunden ist. Diese letztere hat die Spindel gestreckt, ohne erkennbare Falte, und ihre sehr weite Mündung weicht, wie man namentlich in der Seitenansicht erkennt, unten stark nach hinten zurück.

Var. *raboti* mh.

T. *ovata*, *firma*, *sublaevis*, *flavida*, *rimata* vel *saepius* late *perforata*, *spira brevi*, late *conica* et *obtusa*; *anfractus* *convexi*, *ultimus maximus*, super *aperturam tumido-convexus*, postice *ventricosus*; *sutura lente descendens*; *apertura longa*, *anguste ovalis*, *margine exteriore verticali*, vel *infra paullo producto*, *leviter arcuato*, *pariete convexo*, *columella longa*, *subverticali*, *reflexa*. Long. 22, lat. 15—16 mm., apert. long. 17, lat. 10 mm. (Facie et forma bene cum fig. 1250 in Iconogr. Kobelti congruit).

Hab. Norwegen in Nordlands Amt bei Rånen und in Ostfinnmarken bei Paswig nec non in der Russischen Halbinsel Kola. (Ch. Rabot).

Var. *bulla* mh.

T. *subgloboso-ovata*, plus minusve aperte *rimata*, *tenuis* et *fragilis*, *flavida*; *anfractus valde ventrosi*, *ultimus infra vix attenuatus*; *spira lata*, *brevis*, *obtusa*; *apertura ampla*, *marginibus valde arcuatis*, *exteriore superne descendente*, *lamina lata alba adpressa conjunctis*. Long. 20, lat. 15 mm., apert. long. 15, lat. 11 mm.

Hab. Nördliches Finnland ad lacum Enare. (Ch. Rabot).

Gen. *Pomatias* Stud.

Pomatias (Auritus) diplestes n. sp.

T. fere exumbilicata, breve *conica*, *inferne lata*, apice *acutiuscula*, *violascenti-albida*, *grisea*, *unicolor*; *anfractus* $8\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{2}$ *supremi laeves*, *nitidi*, *proximi* $3\frac{1}{2}$ *dense costati*, *infimi* $2\frac{1}{2}$ *obsolete costulati vel laevigati*, *lineis spiralibus parallelis pluribus signati*, *omnes convexi*, *duo ultimi lati*, *subaequales*, *superi angusti*, *lentissime accrescentes*, *ultimus basi rotundatus*, *antice dilatatus*; *apertura rotundata*, *superne extus obtuse angulata*, *intus brunnea*; *peristoma subduplex*, *internum continuum*, *externum tenuer*, *extus intusque auri-*

culatum, auriculo exteriore triangulari acuto. Long. $10\frac{1}{2}$, lat. 5 mm.

Hab. Griechenland am Mte. Taygetos. (Th. Krüper).
Die nächstverwandte Art ist *P. tessellatus* (Wiegm.) Rm.

Gen. *Bythinia* Leach.

Bythinia tentaculata Lin.

Var. *intricata* Leach.

T. parva, operculo lineis concentricis incrementi omnibus valde elevatis, interstitiis densissime striatulis.

Hab. Schweden in Ins. Oeland ad Borgholm frequens.

Var. *gemina* mh.

T. operculo extus spatio lato laevi vel striatulo, lineis incrementi concentricis 3—5 internis forte elevatis.

Hab. Schweden, Ultuna unweit Upsala frequens.

Var. *villae* Sandr. in se.

T. distinete rimata, laevis; anfractus $5\frac{1}{2}$, ultimus et penultimus, praecipue sublus, supra aperturam, valde ventricosi, superi spiram minimam anfractu penultimo multo minorem formantes. Long. 7, lat. 5 mm.

Hab. Kärnthen. (Coll. Cleveana).

Gen. *Valvata* Müll.

Valvata (*Cincinnia*) *piscinalis* Müll.

Var. *scharffi* mh.

T, sat *aperte umbilicata*, (umbilicus infra dilatatus, sed margine columellari pro parte parvo obiectus), *conico-turbanata*, *apice prominente*, *dense striata et anfractu ultimo a medio ad aperturam dense subcostulata*, *lineis spiralibus tenuibus celeratis sat numerosis* (in anfractu ultimo 8—12) *praedita*; anfractus $4\frac{1}{2}$, cylindrici, sat celeriter a crescentes, sutura profunda disjuncti; apertura *subcircularis* peristomate *continuo*, superne obtussissime angulata et breviter affixa, margine columellari leviter expanso intusque incrassatulo. Diam. 5, alt. 5 mm. Operulum *planum*, *lineis spiralibus internis pereleratis, exteris tenuibus*.

Hab. Irland bei Dublin. (R. F. Scharff).

Valvata (Cincinnna) halopea n. sp.

T. late perspective umbilicata (umbilicus infra fere dimidiam anfractus penulti mi occupat), depresso conica, argute denseque striata, virescens; anfractus cylindracei, sutura perprofunda; apertura circularis anfractum penultimum vix tangit. Diam. 4, alt. 3 mm.

Hab. Finland in lacu Kallavesi par. Kuopio. (Coll. Mus. Zool. in Helsingfors).

Gen. *Corbicula* Mühl.

Corbicula (pusilla Phil. var.) *oralis* mh.

C. *oralis* (forma fere Sph. rivicolae vel Pis. amnici), subaequilatera, solida, umbonibus submedianis, latis et humilibus, apicibus *forte incurvis*, contiguis et integris, superne ventricosula, postice et *in umbonibus* striatula, deinde magis magisque compressula, valde costata, interstiiis sat latis striatulis, nitida, *virescenti-fulra*, *umbonibus coeruleis*, *intus obscure coerulescente-violacea*, margine intus extusque *brunneo*, parte auteriore et posteriore subaequaliter rotundatis, illo tamen acutiore, margine infero elongato-arcuato, antice fortius ascendentem; ligamentum breve, crassum. Long. 12, alt. 10, cr. 6—7 mm.

Hab. Egypten ad Cairo (v. Kimakovicz) et Alexandria (Lhotellerie).

Gen. *Anodonta* Guv.

Die folgenden nordischen Formen dieser proteischen Gattung sind freundlich vom Mr. H. Drouët in Dijon bestimmt nach Exemplaren von mir und zum grössten Theil schon von ihm in dem Journal de Conchyliologie 1893 beschrieben. Nach einem grösseren Material gebe ich hier neue etwas erweiterte Diagnosen.

Anodonta aeneolina Drt.

C. oblonga, parum convexa, tenuis, fragilis, extus et intus sulcato-costulata, olivacea, postice in rostrum attenuato-decurvatum vel truncatum, inframedianum producta, margine supero et infero fere parallelis, auteriore rotundato: nates depressae, plicatulae, rufescentes; crista humilis; impressiones internae superficiales; margarita caeruleo-aeneola

(infra caerulea, superne maculis saepissime maximis pallide hepaticis vel aeneis), nitida. Long. 72—84, alt. 37—46, cr. 22—26 mm.

Hab. Schweden in lacu Ringsjon prov. Skåne. (Herman Westerlund).

„Cette espèce tient de l' *A. Charpyi*, dont elle a la forme subaiguë et courbée du rostre, tout en étant plus exiguë et plus délicate; elle tient aussi de l' *A. tenella*, dont elle a la taille et la consistance fragile. La coloration bleuâtre-cuivrée de la nacre est très remarquable.“ (Drt. in Journ. Conch. 1893 p. 175).

Anodonta retziana Drt.

C. late ovata, convexo-compressula, sat solida, ad oras sulcata, medio laeviuscula, nitidula, pallide olivacea vel laete viridula, fuscoc-zonulata, postice in rostrum breve, surrectum, rotundato-subacuminatum, submedianum desinens, margine supero forte ascendentem arcuatim in marginem posticu m aequa forte sed longius descendente transiente, margine exteriore et inferiore forte arcuatis; nates depressae, plicatulae; crista dilatata, rotundata; margarita albida, postice irina. Long. 75—82, alt. 50—55, cr. 22—25 mm.

Hab. Deutschland in der Weser bei Vegesack; Schweden in dem südlichen Theile von Prov. Skåne.

„Cette espèce appartient au groupe de l' *A. piscinalis*.“ (Drt. l. c. p. 175).

Anodonta laerigata Drt.

C. ovata, oblique ventricosa, medio infra medium sat forte compressa, laevigata, nitida, rugis incrementi paucis (c. 5), distantibus, fuscis, antice rufescens, postice virescens, vel virescenti-cornea, superne inter umbones et rostrum radiis duobus fuscis, vel olivacea, postice fusca, umbonibus rufulis, margine supero arcuato, ventrali horizontali, postice ascendentem; pars postica in rostrum truncatulum medianum desinens; nates depressae; area impressa; crista media; margarita pallide coerulescens, polita. Long. 70—80, alt. 43—45, cr. 27—30 mm.

Hab. Schweden, „Tyska botter“ prope Drottingholm in lacu Nälaren. (V. Sandberg).

„Ses caractères saillants résident dans sa forme oblique-

ment ventrue, son épiderme lisse et brillant, et son rostre légèrement élevé et tronqué.“ (Drt. l. c. p. 175). „Se placera dans la groupe des *A. inornata*, *macula*, etc.“ (Drt. in lit.)

Anodonta baudoniana Drt.

C. oblongo-ovata, parum convexa, tenuis, postice in rostrum breviter truncatum, submedianum producta, brunneovirescens, margine dorsali arcuatulo, ventrali subaequaliter arcuatulo, postice lente ascendente, margine anteriore arcuato; nates depressae, plicatulae; crista longa, prominula; lamellulae filiformes; margarita antice albida, postice caeruleescens. Long. 80—100, alt. 45—50, cr. 23—25 („30—35“ Drt.) mm.

Hab. Schweden bei Hönsinge in Skåne; Westmanland in lacu Hellingen (V. Lundberg).

„Si on compare cette forme à l' *A. Rossmaessleriana*, on trouve qu'elle est proportionnellement moins allongée, plus renflée, moins lisse et d'un système de coloration distinct. Sa station est également différente.“ (Drt. l. c. p. 49).

Anodonta pulchella Drt.

C. oblonga, supra medium et postice ventrosula, infra ante medium compressa, tenuis at firma, striato-sulcatula, pallide castanea, parte posteriore limo calcareo valde adhaerente forte obiecta, postice in rostrum latum, medianum producta, margine dorsali arcuato, ventrali rectiusculo; nates depressae; crista prominula; impressiones internae vix conspicuae; margarita pallide caeruleescens. Long. 70—77, alt. 40—45, cr. 20—22 mm.

Hab. Schweden bei Lojsta in der Insel Gotland. (V. Lundberg).

„Appartient au groupe de l' *A. tenella*, espèce près de laquelle elle vient se placer, sans qu'il soit permis de les réunir.“ (Drt. l. c. p. 177).

Anodonta fuliginea Drt.

C. oblonga, supra medium oblique tumida, tenuis, fragilis, fusca, fuliginosa, striata, postice in rostrum sat angustum truncatulum producta, margine dorsali leviter arcuato, ventrali medio arcuato, postice lente longeque ascendente; nates

late decorticatae, fuligineo-brunneae, membranaceae, pellucidae, impressiones internae antice conspicuae, postice fere nullae; margarita coerulescens, livide maculata, polita. Long. 74—80, alt. 40—45, cr. 25—27 mm.

Hab. Schweden im See Långasjö bei Ronneby. (Hjalmar Westerlund).

„La place de l' *A. fuliginea* est dans la voisinage de l' *A. tenella*, dont il diffère par sa coloration sombre, sa grande fragilité, sa transparence, et surtout par le renflement des valves, souvent dans une direction oblique, des sommets à la base du rostre. Les jeunes sont, relativement, plus opaques que les adultes; ils sont verdâtres, avec les sommets teintés de rubigineux.“ (Drt. I. c. p. 178).

Anodonta macella Drt.

C. „oblongo-lanceolata“ vel subrhomboideo-ovata, lata, tumidula, tenuis, fragillima, ad oras striatula, olivacea, postice in rostrum breve medianum rotundatum, surrectum producta, margine superiore valde ascendente, posteriore forte descendente, inferiore convexiunculo, postice forte ascendente, parte anteriore lato truncatulo; crista alta, lata; nates depressae, parum erosae, translucidae, rubiginosae, impressiones internae superficiales; margarita caerulea, livide maculata, lucida. Long. 60—67, alt. ad umb. 35, ad crist. 45, cr. 17—18 mm.

Hab. Schweden im See Herrsjon bei Ronneby. (Hjalmar Westerlund).

„Appartient au groupe de l' *A. anatina*, dont notre espèce se différencie par son test très fragile, tumidule, par son rostre à direction ascendente, etc.“ (Drt. I. c. p. 173.)

Anodonta lanceolata Drt.

C. oblongo-lanceolata, tumidula, infra medio compressa, tenuis, ad oras squamosula, olivacea, postice superne obscura, in rostrum attenuato-truncatum producta, margine superiore leviter ascendente, posteriore subrecto sensim descendente, exteriore arcuato, ventrali rectiusculo, postice forte ascendente; crista humilis; nates depressae, erosae; margarita caerulescens, antice albida. Long. 70—85, alt. 40—43, cr. 27 mm.

Hab. Schweden im See Emmahultsjon zwischen Ronneby und Karlskrona (Hjalmar Westerlund); Finnland bei

Numejarvi in Nyland und Satacunta, in amne Ylána (Coll. in Mus. Zool. in Helsingfors).

„Cette espèce se rattache au groupe de l' *A. Rayi*, dont elle a la forme lancéolée mais son test est plus épais et surtout plus renflé, depuis les sommets jusqu'à l' extrémité du rostre.“ (Drt. l. c. p. 173).

Anodonta limbata Drt.

C. ovata, tumidula, tenuis, laeviuscula, nitida, olivacea, obsolete virideradiata, antice attenuata, postice in rostrum breve, attenuato-obtusum desinens, margine superiore longo ascendentem, posteriore forte descendente, ventrali regulariter arcuato; nates depressae, plicatulæ, rubiginosae; crista elata, dilatata; margarita lactea, peripheria distincte fusco-limbata. Long. 65—80, alt. 40—45, cr. 23 mm.

Hab. Schweden bei Skara in rivo Brunnsvobäcken (John Westerlund), in lacu Mälaren in der Bucht Aerstaviken (V. Lundberg).

„Cette espèce est remarquable par sa form convexe-bombée, brièvement ovale; elle est surtout caractérisée par sa nacre d' un blanc de lait, peu brillante, avec une bordure de teinte neutre (de 3 à 4 mill.) sur la peripherie interne, sauf an bord cardinal.“ (Drt. l. c. p. 174).

Anodonta planulata Drt.

C. ovalis, supra medium ventrosula, infra medium compressa, sat tenuis, olivacea, dimidio postico fusca, multiannulata, rugis tenuibus, acutis densis, margine dorsali toto ad rostrum latum obtusum subregulariter extense arcuato, ventrali retiuseulo, parte anteriore brevi, depresso-rotundato, posteriore triplo longiore; nates depressae, decorticatae, brunneomaculatae; crista longa, humilis; margarita albido-coeruleo-escens, livido-maculata, nitida. Long. 85, alt. 50, cr. 25 mm.

Hab. Finnland in lacu Kallevesi par. Kuopio und bei Korpo (K. M. Levander).

„Espèce que je ne puis rapprocher d'aucune autre forme d'Europe, et qui semble appartenir à un groupe particulier.“ (Drt. b. c. p. 48).

Anodonta viridiflava Drt.

C. ovata, supra medium convexa, infra medium complanata, medio compressa, tenuis, viridiflava, post umbones fusco-viridis, striis incrementi annularibus postice et infra densissimis, postice in rostrum inframedianum, obtusum, abbreviatum attenuato-producta, margine supero toto arcuato, infero rectiusculo vel medio retuso parte anteriore triplo breviore lato, declive rotundato; nates depressae, erosae; crista longa, humilis; ligamentum breve, flavidum; margarita albocoerulescens, aeneomaculata. Long. 70—80, alt. 40—50, cr. 25 mm.

Hab. Finnland in Satakunta und Kalavisi bei Kuopio (K. M. Levander); Russland in der Neva bei St. Petersburg.

„Espèce qui, dans la nomenclature, viendra se placer près des *Anod. convera*, *abbreriata* etc. Sa coloration et sa forme générale sont caractéristique. Il est digne de remarquer de voir les lacs de la Finlande donner asile à des bivalves aussi agréablement colorées que celles du bassin circumméditerranéen.“ (Drt. l. c. p. 48).

Anodonta gregalis Drt.

C. late ovalis, aequiconvexa, crassula, rugosula, castaneo-rubricata vel brunnea, antice late semicircularis, postice in rostrum attenuato-subacutum producta, margine dorsali arcuato-ascendente; nates depressae, sparse plicatulae rubiginosae; ligamentum crassulum; margarita candidula. Long. 80—100, alt. 45—60, cr. 30—32 mm.

Hab. Schweden im südlichen Theile von Prov. Skåne; bei Fingstäde in Ins. Gotland (V. Lundberg); Finnland ad Lojo in Nyland, in Aura bei Hällefors). bei Gorkvie und Torpby. (Coll. Mus. Zool. in Helsingfors).

Anodonta (*Pseudanodonta*) *acutalis* Drt.

C. ovalis, supra medium ventrosula, infra medium compressa, tenuis, laeviuscula, nitida, viridis vel fusca, postice in rostrum attenuato-subacutum inframedianum desinens, superne peracuta, margine supero arcuatulo ascendente, posteriore longe oblique descendente, inferiore subhorizontali; nates depressae, late erosae; margarita coeruleo-scens, livide

vel aeneo-maculata. Long. 50—55, alt. ad umb. 25, medio 33, cr. 13—16 mm.

Hab. Schweden in Brunnsjon in Prov. Dalarne (E. G. Andersson).

„Jolie espéce, caractérisée par sa taille exigue, son rostre aigu, sa forme très comprimée et très arquée superieurement. A placer près des *A. albica*, *microptera* etc.“ (Drt. in lit.)

Gen. *Pisidium* C. Pfr.

Pisidium (Fossarina) hibernicum n. sp.

C. supra medium ventricosissima, lateribus leviter convexis regulariter ad marginem inferum declivis, truncato-ovata, ubique sulcato-striata, marginibus omnibus regulariter arcuatis, parte posteriore brevissima, anteriore duplo longiore, ad margines compressa, sed obtusissima; umbones validi, lati, tumido- rotundati, prominentes. Long. $3\frac{1}{2}$, rect. $3\frac{1}{2}$, cr. $3\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Irland bei Gleengariff in Cork. (R. F. Scharff.)

Zur Molluskenfauna der Sulu-Inseln.

Von

Dr. O. von Möllendorff.

Seit der Veröffentlichung meiner kurzen Liste von Landschnecken der Insel Bongao, Tawitawi Gruppe, (J. D. M. G. XIV, 1887, p. 284—291) habe ich weiteres Material zur Fauna des Sulu-Archipels erhalten, und zwar einerseits von dem Orchideensammler C. Roebelen, welcher Bongao wiederholt besuchte, anderseits im Jahre 1889 von Herrn Roeseler, welcher in Diensten der Deutschen Borneo-Gesellschaft auf der Insel Sulu thätig war. Beide Sammlungen enthielten wieder einige Novitäten, deren Bearbeitung theils durch meine Heimreise 1890 theils in Folge des angesammelten Philippinen-Materials liegen geblieben ist. Inzwischen ist nun von Mr. E. Smith eine Arbeit über Landschnecken

des Sulu-Archipels erschienen (Ann. Mag. N. Hist. (6) XIII, Jan. 1894, p. 48—60, t. IV), welche auf eine Sammlung des Herrn A. Everett von den Inseln der Tawitawi Gruppe basirt ist und die Zahl der Arten auf 25 bringt. Da ich seiner Liste einige Novitäten und neue Fundorte hinzuzufügen habe, auch mit seinen Bestimmungen z. Th. nicht einverstanden bin, so halte ich es für richtig hier die Liste der bisher bekannten Arten vollständig zu wiederholen.

1. *Euplecta* (*Pareuplecta*) *angulata* Mlldff.

Macrochlamys angulata Mlldff. J. D. M. G. XIV 1887 p. 289 — Smith I. c. p. 51, t. IV f. 1. Bongao (Roebelen, Everett), Tawitawi, Sibutu (Everett).

var. *dimidiata* Mlldff. T. minor, angulo peripherico minus acuto, sculptura spirali tenuiore, radiali magis distineta, anfr. $5\frac{1}{2}$ nec 6, margine supero aperturae minus declivi, columellari magis curvato. Diam. 17, alt. 7,5 mm. Sulu (Roeseler).

Wegen der Kante und der Spiralfurche oberhalb des Kieles sicher nahe verwandt mit E. (*Pareuplecta*) *excentrica* Pfr. von Siquijor. Ich vermuthe, dass auch *Macrochlamys crebristriata* Semp. von Mindanao und Basilan zu dieser Gruppe gehört und mit E. *angulata* nahe verwandt ist.

2. *Trochonanina sylvana* Semp. & Dohrn.

Nanina sylvana Semp. & Dohrn Mal. Bl. V. p. 61. Nov. Conch. II p. 220, t. 58, f. 3,4. *Nanina* (*Trochonanina*) *sylvana* Tryon Man. Pulm. II, 1886, p. 49, t. 23, f. 69, 70. *Trochonanina conicoides* var. *crenulata* Mlldff. I. c. p. 289. *Trochonanina bongaensis* Smith I. c. p. 52, t. IV, f. 2—2 b. Bongao (Roebelen, Everett), Sibutu (Everett), Sulu (Roeseler).

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die von Everett gesammelte *Trochonanina* identisch ist mit der von Roebelen auf Bongao entdeckten, welche ich als var. *crenulata* mit einiger Reserve zu *conicoides* Metc. stellte. Wenn Mr. Smith sie zur Art erheben wollte, so konnte er recht wohl meinen Varietätnamen beibehalten, wie es in solchen Fällen üblich ist. Dass der Name nicht recht passend erscheint, weil wie

Smith sagt „die Crenulirung am Kiel so sehr schwach sei“, war kein Grund ihn zu verwerfen und ihn mit dem geschmackvollen Zungenbrecher „bongaoensis“ zu vertauschen, denn wenn jeder Name verworfen werden sollte, an dem sachlich oder sprachlich etwas auszusetzen ist, wieviel bliebe dann von der heute üblichen Nomenklatur geltig? Sehr passend ist der neue Name auch nicht, da die Form nicht auf die kleine Insel Bongao beschränkt ist, sondern auch auf den grösseren Sibutu und Sulu vorkommt.

Indessen löst sich diese Nomenklaturfrage sehr einfach dadurch, dass beide Namen mit dem älteren *sylvana* S. & D. zusammenfallen; wenigstens habe ich mich überzeugt, dass die Form des Sulu Archipels mit der Art, welche Semper bei Zamboanga und auf der Insel Basilan zwischen Mindanao und Sulu sammelte, zusammenfällt. Ob sie als Varietät abgetrennt werden muss, lasse ich dahingestellt sein, bis ich Originale von Sempers Art oder Exemplare von den Originalfundorten vergleichen kann: jedenfalls sind die Unterschiede gering und beruhen wohl hauptsächlich auf der Wahl der Ausdrücke in den Diagnosen.

3. *Kaliella doliolum* (Pfr.) — Mldff. J. D. M. G. XIV, 1887, p. 268. — *Sitala orchis* Godw. Aust. P. Z. S. 1891 p. 40, t. V, f. 3.—E. Smith l. c. p. 52. Sibutu (Everett).

Originalexemplare der neubenannten Art von Borneo, welche ich durch Mr. H. Fulton erhielt, kann ich von der philippinischen *K. doliolum* nicht unterscheiden; sie gehört wegen der verticalen, nicht spiralen Skulptur nicht zu *Sitala*, sondern zu *Kaliella*.

4. *Lamprocystis myops* Dohrn et Semper. Smith l. c. p. 51. Bilatan, Sibutu (Everett).

Von meinen Sammlern nicht gefunden. Da sie nicht blass auf Mindanao, sondern auch auf Balatanai bei Basilan vorkommt, so hat ihr Uebergreifen nach den Suluinseln nichts auffallendes. Smith citirt die Art nach Hidalgo auch von Balabac, die Quadras'schen Exemplare von dort gehören indessen zu *L. pseudosuccinea* m.

5. *Lamprocystis?* *pseudosuccinea* Mldff. J. Senck. 1893 p. 70.

Hierzu dürfte die von Smith (l. c. p. 52) als L. sp. ausgeführte Form von Bongao gehören.

6. *Lamprocystis gemmula* Mlldff. J. D. M. S. XIV 1887 p. 267, t. VIII, f. 5. Bongao (Roebelen).

7. *Trochomorpha repanda* Mlldff.

Helix metcalfei var. β . Pfeiffer Mon. Hel. I p. 121. — *Trochomorpha repanda* Hidalgo J. de Conch. 1887, p. 94, t. IV, f. 1 (non Semper) — *Tr. repanda* Mlldff. B. Senck. 1890. p. 211. — *Tr. metcalfei* var. *repanda* Hid. Obras 1890, p. 112. — *Tr. metcalfei* Smith l. c. p. 53. (non Pfeiffer) — cf. Mlldff., N. Bl. 1891, p. 123. Sulu (Quadras), Tawitawi, Bongao, Bilatan, Sibutu (Everett).

Mr. Smith erwähnt die über die gesammten Philippinen verbreitete *Tr. repanda* m., welche schon Quadras von der Insel Sulu erhielt, als *Tr. metcalfei* und macht zum Schluss die Bemerkung, dass er mir in der Trennung von *metcalfei* Pfr. und *boholensis* Semp. nicht beistimmen kann. Er hält mithin an dem von Hidalgo zuerst gemachten Irrthum, dass *Tr. boholensis* Semp. mit der schmalgebänderten Form, welche Pfeiffer mit seiner *metcalfei* vereinigte und die ich als *repanda* artlich abtrenne, identisch sei, noch fest, obwohl Hidalgo die Unrichtigkeit dieser Identificirung längst eingesehen und wenigstens theilweise verbessert hat. Die echte *boholensis* Semp., die ich jetzt von Bohol und Cebu kenne, ist von *metcalfei* recht gut geschieden. Mr. Smith meint dieselbe auch gar nicht, sondern eben die fälschlich so genannte *repanda*. Dass aber auch diese von typischer *metcalfei* artlich zu trennen ist, dafür darf ich auf meine mehrfachen Auseinandersetzungen (vergl. obige Citate) verweisen. Es wird Smith so ergangen sein, wie Hidalgo, nämlich dass er die grosse typische *metcalfei* von Cebu und Siquijor, welche in den Sammlungen selten ist, noch nicht kennt; meistens circulirt als *metcalfei* meine *repanda*, so dass dann allerdings von einer Trennung nicht die Rede sein kann. *T. repanda* steht *Tr. planorbis* Less. viel näher als der *Tr. metcalfei* Pfr. ex rec. Mlldff.

Es würde interessant sein die angebliche Varietät, welche Smith anführt, mit braunem mit den Bändern oben und unten zusammengelossenen Kielband auf ihre Artgültigkeit

wird überall eingehend erörtert. Unser Raum erlaubt leider nicht, genauer auf die Einzelheiten einzugehen. Als neu beschrieben werden: *Diplommatina stolli* p. 20 t. 1 fig. 19, von einer Plantage am Vulkan de Santa Maria im Distrikt Cholhuitz in Guatemala, (wohl eingeschleppt); *Helicina succinata* p. 36 t. 1 fig. 10, Guerrero im westlichen Mexico; *Hel. borealis* p. 40 t. 1 fig. 15, Durango, Mexico; *Glandina cuneus* p. 56 t. 3 fig. 1, Guerrero, Mexico; *Gl. mazatlanica* p. 60 t. 4 fig. 2.3, Mazatlan; *Gl. excavata* p. 67 t. 4 fig. 9, (=albersi Binney nec Pfr.), Mazatlan?; *Gl. lanceolata* p. 69 t. 4 fig. 1, Guerrero; *Gl. sulcifera* p. 74 t. 5 fig. 1, Jalisco, W. Mexico; *Streptostyla conulus* p. 94 t. 5 fig. 15, ebenda; *Str. obesa* p. 95 t. 5 fig. 12, Honduras; *Omphalina modesta* (=bilineata var. Grosse et Fischer und Streb) p. 110 t. 6 fig. 7, Jalapa; *Om. salliana* p. 112, (= veracruzensis Grosse et Fischer, nec Pfr.), Cordova; *Om. sculpta* p. 113 t. 6 fig. 10, Guerrero; *Hyalina glomerula* p. 115 t. 6 fig. 14, Nord Guatemala; *H. hoffmanni* p. 115 t. 6 fig. 11, Costarica; *Glypha-*
lina n. subg. für *Hyal. indentata* Say p. 117; *Guppyia championi* p. 119 t. 6 fig. 18, Costarica; *G. biolleyi* p. 121 t. 6 fig. 19, Guatemala, Costarica; *G. oroseiana* p. 123 t. 6 fig. 20, Costarica; Guatemala?; *Pseudohyalina cedariscus* p. 126 t. 7 fig. 1, Palenque, SüdMexico. *Helix* (*Oxychona*) *trigonostoma* var. *freytagiana* Dohrn mss. p. 155 Honduras; (*Ox.*) *altispira* Dohrn mss. p. 156 t. 9 fig. 10, Honduras; *Polygyra dissecta* p. 167 t. 7 fig. 7, Toluca, Central Mexico; *Pol. richardsoni* p. 168 t. 7 fig. 9, Sinaloa, Mexico; *Orthalicus macrurae* p. 188 t. 11 fig. 1—3, Nicaragua; *Otostomus trimarianus* p. 216 t. 13 fig. 17, Inseln tres Marias an der Küste von Nordmexico; *Ot. bugabensis* p. 218 t. 13 fig. 21, Süd-Panama; *Ot. championi* p. 222 t. 14 fig. 5, Guatemala; *Ot. moritinctus* p. 228 t. 14 fig. 9.10, Guerrero; *Bulimulus durangoanus* p. 246 t. 15 fig. 11, Durango.

Gallenstein, Hans von, die Bivalven Kärntens. Sep.-Abdr. aus dem Jahrb. naturh. Landesmus. Kärnten Heft XXIII.

Eine sehr dankenswerthe Arbeit, von der zu wünschen wäre, dass sie bald in verschiedenen Provinzen Deutschlands, namentlich in der seereichenen norddeutschen Ebene, Nachahmung finde. Der Verfasser hat in zwanzigjähriger Arbeit sämtliche von Mollusken bewohnte Seen und Wasserläufe Schritt für Schritt selbst durchforscht und ihre Bewohner und das Verhältniss der Form derselben zur Bodenbeschaffenheit und den Wasserverhält-

nissen untersucht. Er kommt dadurch zu dem Schluss, dass alle die zahlreichen aus Kärnten beschriebenen Najadeen nur Entwickelungsformen von *Unio pictorum* und *batavus*, andererseits von *Anodonta cygnea* und *piscinalis* sind, dass aber die beiden Anodonten gut verschieden und namentlich auch schon in ihren Jugendformen sicher zu trennen sind. Das Büchlein ist reich an interessanten Beobachtungen und für jeden Bivalvenforscher unentbehrlich.

Gallenstein, Hans von, Studien aus der Najadenfauna des Isonzogebietes. Sonderabdruck aus d. XXXIV. Jahresber. der St. Oberrealschule in Görz 1894. 8°. 49 S.

Auch diese Arbeit behandelt mit genauestem Eingehen auf das Detail die Najadeenfauna eines beschränkten Gebietes und schliesst sich der vorigen würdig an. Der Verfasser führt nach sorgfältigem Studium der Jugendformen die sämtlichen Bivalvenformen des Litorals auf drei Arten zurück: *Unio Requienii*, zu dem auch *Iijaeensis* trotz seiner anscheinenden Verwandtschaft mit *elongatus* gehört, und der sich nach der Wirbelskulptur stets sicher von *pictorum* scheiden lässt, *Microcondylaea bonellii* und *Anodonta cygnea*. Von jeder dieser Arten werden das Vorkommen und die verschiedenen Entwicklungsformen eingehend besprochen. Derartige Arbeiten sind für die Wissenschaft jedenfalls viel wichtiger, als die Aufstellung neuer Arten auf jede einigermassen abweichende Entwicklungsform.

Proceedings of the Royal physical Society of Edinburgh, Session 1892/93.

- p. 20. Bell, Alfred, the Glacial Fauna of King Edward, in Banffshire. -- 17 Arten sind neu für die fossile schottische Fauna.
- p. 22. Bell, Alfred, on a Deposit in Largo Bay.
- p. 148. Bennie, James and Andrew Scott, the Ancient Lake of Edie. Gibt das Verzeichniss einer reichen Binnengenchylienfauna aus den Ablagerungen dieses nun verschwundenen Sees.

Journal de Conchyliologie, Vol. 41, 1893, No. 4.

- p. 209. Crosse, H., Note préliminaire sur la Faune malacologique terrestre et fluviatile de la Nouvelle Zélande et sur ses affinités.
- p. 220. Suter, H., Liste synonymique et bibliographique des Mollusques terrestres et fluviatiles de la Nouvelle Zélande. Avec pl. IX. Die Artenzahl beläuft sich gegenwärtig auf 177 sichere Arten.
- p. 293. Crosse, H. et Fischer, Diagnoses Molluscorum novorum, reipublicae Mexicanae incolarum. — *Unio pigerrimus* p. 203; *U. alie-*

nigenus p. 204; — U. opacatus, computatus p. 295; — U. sphenorhynchus, tehuantepecensis p. 296.

p. 297. Cossmann, M., Revision sommaire de la Faune du Terrain oligocène marin aux environs d' Etampes.

Annaes de Sciencias Naturaes publicados por Augusto Nobre.
Primeiro Anno. 1894. Porto. No. 1 u. 2.

p. 17. Nobre, Aug., Observações sobre o sistema nervoso e afinidades zoologicas di alguns pulmonados terrestres. Mit Taf. 3, Anatomie von Arion lusitanicus.

p. 91. Nobre, Aug., sur la Faune malacologique des îles de S. Thomé et de Madère. — (Taf. 5). Neu: Tellina mariae fig. 1, T. Dautzenbergi fig. 2, Nanina molleri fig. 4.

Proceedings of the U. S. National-Museum. Vol. XVII.

p. 131. White, Charles A., Notes on the Invertebrate Fauna of the Dakota Formation, with Descriptions of new Molluscan Forms. With pl. 8. — Aus der oberen Kreide werden die Gattungen Unio, Corbula, Goniobasis, Viviparus und Pyrgulifera nachgewiesen.

p. 139. Stearns, Robert E. C., the Shells of the Tres Marias and other localities along the shores of Lower California and the Gulf of California. — 294 Arten, keine neu.

p. 89. Dall, W. H., Monograph of the Genus Gnathodon, Gray (Rangia Desmoul.). — With pl. 7. — Miorangia n. subg. für Gnathodon johnstoni Wall.

Proceedings of the Linnean Society of New South Wales (2)
Vol. VIII.

p. 422. Cox, J. C., Notes on the occurrence of a species of Plecotrema and of other species of Mollusca in Port Jackson. (Pedipes octan-fracta Jonas = bicolor Pfr. = consobrina Garr., mit Holzschnitt).

p. 504. Hedley, G., Description of Caecum amputatum, an undescribed Mollusk from Sydney Harbour (with fig.).

p. 506. Hedley, G., on the Australasian Gundlachia (with pl. 24).

The Journal of Malacology. (Conchologist). Vol. III, No. 2.

p. 21. Tye, G. Sheriff on a case of protective resemblance among slugs. Der Autor findet eine auffallende Ähnlichkeit zwischen Arion hortensis und Limax agrestis einerseits, und den Blüthenscheiden von Populus nigra andererseits.

- p. 23. Cockerell, T. D. A., and R. R. Larrin, on the Jamaican species of *Veronicella*.
p. 30. Hedley, C., Additions and Amendments to the Slug List. II u. III.
p. 34. Sykes, E. R., Note on *Limnaea auricularia*.
 Id. No. 3.
p. 45. Babor, J. B., Note on *Arion citrinus* Westerl. (With pl. i).
p. 48. Sykes, E. R., on two *Clausiliae* from Sangir and Tumbavo (*Pseudonenia recondita* n. mit Holzschnitt).
p. 49. Smith, Edgar A., Notes on the species of *Paludomus*, inhabiting . . . Borneo (*P. everetti* n. mit Holzschnitt).
p. 51. Collin e. Walter E., Note on a species of *Limax* from Ireland. (*hedleyi* n.)
p. 52. Cockerell, T. D. A., Description of *Urocyclus flavesceps* (Kef.).
Smith, Edgar A., on the Land-Shells of the Natuna Islands.
 In Ann. Mag. N. H. (6) XIII June 1894.

Die am Nordwestende von Borneo gelegene Inselgruppe ergab 34 Arten, davon 18 neu und eigenthümlich, 4 mit Malacca gemeinsam, 7 mit Borneo, 2 mit beiden. Die neuen Arten, sämmtlich auf Taf. 16 abgebildet, sind: *Microcystis bunguranensis* fig. 1; *Trochonanina affinis* fig. 2; *Tr. bunguranensis* fig. 3; *Trochomorpha natunensis* fig. 4; *Sitala sirhassenensis* fig. 5; *Patula persculpta* fig. 6; *Tornatellina natunensis* fig. 7; *Leptopoma natunense* fig. 8; *Lagochilus bunguranensis* fig. 9; *Lag. sirhasenensis* fig. 10; *Lag. natunensis* fig. 11; *Lag. exiguum* fig. 12; *Cyathopoma tricarinatum* fig. 13; *Cyclotus natunensis* fig. 14; *C. minor* fig. 15; *Pupina everetti* fig. 16; *Diplomatina strubelli* fig. 17; *D. congener*. fig. 18.

Smith, Edgar A., a List of the Bornean Species of the genus Opisthostoma and Descriptions of four new Species. In Ann. Mag N. H. (6) XIV. Oct. 1894, p. 269.

Fünfzehn Arten, davon neu *O. cookei*, *depauperatum*, *austeni* und *pumilio*.

Eingegangene Zahlung:

Schmacker, Br. Mk. 6.—.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwäbheim a. M.,
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

zu untersuchen. Die Stellung der Bänder ist in dieser Gruppe ganz ausserordentlich konstant und ein Zusammenfliessen derselben ist mir bei meinem nach vielen Hundertenzählenden Material niemals vorgekommen. Wohl aber kenne ich mehrere philippinische Trochomorphen, bei denen nur ein peripherisches braunes Band auf dem Kiel selbst vorkommt, und die ich nicht bloss dieses Charakters, sondern auch ihrer sonstigen Differenzen wegen als Arten auffassen muss.

8. *Obbina marginata* (Mll). var. *nana* Mlldff. B. Senck. 1893, p. 76. Sibutu (Everett), Sulu (Roeseler). Auch Mindanao (Quadras).

9. *Plectotropis squamulifera* Mlldff. J. D. M. G. XIV. 1887, p. 290. — Smith l. c. p. 53, t. IV, f. 3, 3 a. Bongao (Roebelen, Everett), Sibutu (Everett), Sulu (Roeseler).

10. *Chloritis sibutuensis* Smith l. c. p. 53, t. IV, f. 4, 4a. Sibutu (Everett).

11. *Chloritis suluana* Mlldff.

T. anguste sed perspective umbilicata, globoso-depressa, solidiuscula, opaca, corneo-fulva, supra medium castaneo-taeniata; spira conoideo-convexa lateribus convexiusculis apice obtuso. Aufr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura impressa submarginata discreti, setis brevissimis confertis in series regulares dispositis pilosi, ultimus ad peripheriam fere subangulatus, basi convexior, subinflatus, circa umbilicum obtuse angulatus, antice paullulum descendens, ad aperturum taenia diluta obscurior. Apertura parum obliqua, transverse late ovalis, modice excisa; peristoma sat expansum, margo basalis medio protractus, subreflexus, columellaris dilatatus, reflexus, umbilicum non obtegens.

Diam. maj. 24, alt. 16,5, apert. lat. 15, long. 12, alt. 11 mm.

Hab. in insula Sulu leg. cl. I. Roeseler.

Mit der vorigen sichtlich nahe verwandt, aber grösser und dabei flacher, sehr deutlich punktiert und kurz behaart, während Smith seine Art indistincte punctata nennt und

keine Behaarung erwähnt; Nabel offen, bei *sibutuensis* halbverdeckt, Mündung im Verhältniss zur Breite höher.

12. *Cochlostyla (Corasia) samboanga* (Hombr. et Jacq.) — *C. aegrota* Smith l. c. p. 54, t. IV, f. 5 (non Reeve). — Sibutu (Everett).

Die Bestimmung der *Corasia* von Sibutu als *aegrota* Rve. kann ich nicht als richtig anerkennen, vielmehr scheint mir die Identität derselben mit *C. samboanga* von Mindanao nach Smith's Beschreibung und Abbildung ganz sicher, wozu auch der Fundort vortrefflich passt.

13. *Cochlostyla (Hypselostyla) boholensis* (Brod.) Smith l. c. p. 55. Bilatan (Everett).

Die Entdeckung einer *Hypselostyla* auf den Sulu-Inseln ist höchst auffallend, da die Gruppe auf Mindanao bisher nicht nachgewiesen ist und solche Sprünge in der Verbreitung unsern bisherigen Erfahrungen widersprechen. Allerdings ist der westliche Theil von Mindanao, von Dapitan bis Zamboanga, noch gänzlich unerforscht; hier wären die Mittelglieder zu suchen, da der Osten von Mindanao durch Semper, Quadras und Roebelen genügend untersucht ist, um das Ueberschen einer *Hypselostyla* auszuschliessen. Vielleicht ist aber an eine Einführung, eventuell mit Abakapflanzen, die im Suluarchipel kultivirt werden, zu denken.

14. *Amphidromus roeseleri* Mlldff.

T. sinistrorsa, *semiobtecta perforata*, *ovato-conica*, *solida*, *transverse leviter striatula*. *lineis spiralibus tenuissimis et confertis*, *sed valde distinctis decussata*, *sericeina*, *alba*; *spira modice elongata lateribus convexiusculis apice obtuso*. *Anfr. 6 modice convexi*, *ultimus a latere medium altitudinem testae fere attingens*. *Apertura modice obliqua*, *subauriformis*, *peristoma latiuscule expansum*, *albolabiatum*, *reflexiusculum*, *columella recta*, *stricta*, *cum margine basali angulum subdistinctum formans*, *valde callosa*, *superne dilatata*, *revoluta*, *perforationem fere obtegens*.

Alt. 47, diam. 27, apert. long. 24,5 lat. 18 mm.

Hab. in insula Sulu leg. cl. I. Roeseler.

Ausgezeichnet durch die rein weisse Farbe, die sehr deutliche Spiralskulptur, den Seidenglanz. Von *A. maculiferus*,

zu dessen Gruppe *A. roeseleri* der Perforation wegen wohl gehört, ausserdem durch die kürzere, bauchigere Gestalt, die etwas mehr gewölbten Windungen, die verhältnissmässig breitere Mündung verschieden.

15. *Amphidromus maculiferus* (Sow.) var. —
Smith l. c. p. 55, t. IV, f. 9, 9a. Bilatan (Everett).

Die Abbildungen lassen allerdings darauf schliessen, dass diese Formen zu *A. maculiferus* gehören, obwohl namentlich f. 9a. eher zu der vorigen Art passt. Da Smith die Spiralskulptur nicht erwähnt, kann ich die Frage nicht entscheiden.

16. *Opeas gracile* (Hutt.) Sulu (Roeseler).

Besonders gross. 14: 3,75 mm.

17. *Clausilia (Pseudonenia) suluana* Mlldff.

T. breviter rimata, fusiformis, gracilis, solidula, nitida, brunnea; spira elongato-turrata, lateribus perparum convexis apice obtusulo. Anfr. 10, superi convexiusculi, inferi planiores, sutura sat profunda disjuncti, lente acercentes, striatuli, ultimus decrescens, leviter deflexus, basi planato-rotundatus. Apertura parum obliqua, basi subrecedens, piriformi-ovata, ad sinulum non impressa, peristoma undique solutum, leviter expansum et reflexum, vix sublabiatum. Lamellae compressae, supera obliqua, marginalis, valida, intus angulosa, ascendens, subcolumellaris alte sita emersa, fere marginalis. Plica principalis longissima, ventralis, palatales 7 laterales, longae, subparallelae, secunda, quarta et sexta longiores.

Alt. 22, lat. 4, apert. alt. 4. 25, lat. 3,12 mm.

Hab. in insula Sulu leg. cl. I. Roeseler.

Die nächste Verwandte dieser leider nur in einem todten Stück vorliegenden Art dürfte *Cl. borneensis* Pfr. sein. Bekanntlich ist von den Philippinen bisher nur *Cl. cumingiana* Pfr. bekannt, welche Koch und später Quadras auf der Insel Siquijor wiederentdeckt haben, während auf der Insel Mindanao noch keine Art gefunden wurde. Das Vorkommen auf Sulu hilft die auffallende Lücke in dem Verbreitungsgebiet der Gattung theilweise ausfüllen, und da inzwischen auch auf Celebes eine *Clausilia (moluccensis)*

v. Mart.) entdeckt worden ist, dürfen wir wohl mit Bestimmtheit das Vorkommen der Gattung auch auf Mindanao erwarten.

18 *Cassidula philippinarum* Hid. var. *nana* Mlldff.

Alt. 7,5, diam. 5 mm. Sonst nicht verschieden. Sulu (Quoras).

19. *Cyclotus (Platyrhaphis) bongaoensis* Smith
l. c. p. 57, t. IV, f. 8,8a. Bongao (Roebelen, Everett).

Smith macht mit Recht auf die grosse Verwandtschaft dieses kleinen Cyclotus mit *C. pusillus* Sow. von den Philippinen aufmerksam; die Unterschiede sind: geringere Grösse, der gelöste letzte Umgang, die entfernt stehenden Spirallinien und häutigen Querrippen. Mein grösstes Exemplar dieser Art, welche ich in jungen Stücken schon lange durch Roebelen von Bongao besass, aber erst später erwachsen erhielt, misst 5,5: 3,75 mm. und hat volle 4 Windungen, während Smith nur $3\frac{1}{2}$ angiebt.

Die Bedeckung mit Erde theilt die Art nicht nur mit *C. linitus* G. A. von Borneo, wie Smith hervorhebt, sondern mit allen mir bekannten Platyrhaphis-Arten.

20. *Cyclotus (Eucyclotus) variegatus* Swains. —
Smith l. c. p. 56 Bongao (Roebelen, Everett). var. *grandis* Mlldff. t. major, laetus maculata, sericina, perist. latius expansum, superne magis alatum, maj. 30 mm. Sulu (Roeseler).

Die Exemplare von Bongao sind wenig grösser als der Typus und können glatt zu demselben gestellt werden. Die von der Insel Sulu sind dagegen erheblich grösser, lebhafter gefärbt, seidenglänzend, der Mundsaum ist sehr stark ausgebreitet mit sehr entwickeltem Flügel.

21. *Cyclotus (Pseudocyclophorus) suluensis* Mlldff.

Mlldff. Jahresb. Senckenb. 1890, p. 270. (nomen) —
Cooke P. Z. S. 1892, p. 461. (nomen). — Smith l. c. p.
56, t. IV, f. 7. Sulu (Roeseler).

Durch den Verkauf der Hungerfordschen Sammlung sind Exemplare dieser Art, welche ich unter dem neuen Namen an Tauschfreunde mitgetheilt hatte, in das British Museum gerathen, so dass Mr. Smith mir mit der Publi-

kation zuvorgekommen ist. Prioritätsfanatiker mögen die Art mithin in Zukunft als *C. suluensis* Sm. oder (Mlldff.) Sm. citiren.

Smith macht mit Recht auf die grosse habituelle Aehnlichkeit mit *Cyclophorus exaltatus* (oder noch besser *C. martensianus* m.) aufmerksam; sie war es besonders, welche mich zur Wahl des Gruppennamens *Pseudocyclophorus* veranlasste. Die Gruppe erstreckt sich von Leyte und Cebu über Sulu nach Celebes, den Molukken und Timor; auf Borneo ist sie noch nicht nachgewiesen.

22. *Cyclophorus sowerbyi* Hid. J. de Conch. 1888, p. 80. — *C. philippinarum* Sow. (ex parte), Pfeiffer, Kobelt. — Smith l. c. p. 57. Bongao, Sibutu (Everett).

23. *Ditropis diminuta* Mlldff.

T. aperte umbilicata, deppressa, tenuis, subpellueida, subnitens, transverse subtiliter striatula, flava; spira breviter conoidea apice mucronato, valde obliqua. Anfr. 4 convexi, carinis binis valde exsertis et prominentibus cincti, ultimus non descendens, ad aperturam campanulatus, circa umbilicum carina fortiter exserta usque ad peristoma produeta munitus. Apertura parum obliqua, irregulariter pentagona, peristoma parum expansum, valde incrassatum, porectum.

Diam. 2, alt. 1,2 mm.

Hab. in insula Bongao leg. C. Roebelen.

Wieder eine erwünschte Ausfüllung der Lücke zwischen den philippinischen Fundorten (Leyte, Cebu, Siquijor, Mindanao) und den Molukken; die Gattung wird auf Borneo und Celebes noch aufzufinden sein. Auf der andern Seite bleibt freilich die Lücke zwischen Vorderindien und dem malayischen Archipel noch weit klaffend.

24. *Lagochilus quinqueliratum* Mlldff. J. D. M. G. XIV 1887, p. 286. — Smith l. c. p. 58, t. IV, f. 10, 10a. Bongao (Roebelen, Everett), Tawitawi, Sibutu (Everett).

25. *Lagochilus compressum* Mlldff.

T. sat aperte umbilicata, depresso turbinata, solidula, liris elevatis numerosis et striis transversis tenuibus sculpta, corneo-flava, strigis castaneis sat latis picta; spira modice

elevata lateribus paullulum concavis. Anfr. 5 sat convexi, sutura profunda subcanaliculata disjuncti, ultimus compressus, ad peripheriam angulatus. Apertura modice obliqua, subcircularis, peristoma duplex, externum paullum expansum, margine supero ad insertionem breviter recedente, internum subporrectum, continuum, superne adnatum, breviter excisum.

Diam. maj. 6, alt. 4.2 mm.

Hab. in insula Bongao leg. C. Roebelen.

Durch den zusammengedrückten, stumpfkantigen letzten Umgang ausgezeichnet.

26. *Leptopoma vitreum* Less. Bongao (Roebelen, Everett), Sibutu, Bilatan (Everett).

27. *Leptopoma atricapillum* Sow. — Smith l. c. p. 57. Bongao, Bilatan, Sibutu (Everett).

28. *Pupina ottonis* Dohrn. var. *compressa* Mlldff. J. D. M. G. XIV 1887, p. 288. Bongao (Roebelen, Everett), Tawitawi (Everett), Sulu (Roeseler).

29. *Alycaeus excisus* Mlldff. J. D. M. G. XIV p. 287. — Smith l. c. p. 57. Bongao (Roebelen).

30. *Diplommatina roebeleni* Mlldff. l. c. p. 287. — Smith l. c. p. 58, t. IV, f. 11, 11a. Bongao (Roebelen, Everett).

31. *Helicina (Geophorus) lazarus* Sow. — Smith l. c. p. 59. — Bongao, Sibutu, (Everett).

32. *Helicina (Pleuropoma) sp.* — *H. contermina* Smith l. c. p. 59. t. IV f. 6,6a (non O. Semp.) Sibutu, Bilatan (Everett).

Soweit ich aus der Abbildung und Smith's Bemerkungen schliessen kann, ist diese *Helicina* nicht mit *H. contermina* O. Semp. von Nordluzon identisch, sondern gehört zur Gruppe von *H. dichroa* m.

33. *Helicina (Sulfurina) martensi* Issel. Bongao (Roebelen, Everett), Tawitawi, Sibutu (Everett), Sulu (Roeseler), Labuan, Borneo.

Was nun den Gesamtcharacter dieser sicherlich noch unvollständig bekannten Fauna anbelangt, so muss ich Smith völlig darin beistimmen, dass er die Schlussfolgerungen, welche Mr. A. H. Cooke (P. Z. S. 1892 p. 461) auf meine erste Liste von Bongao basirt, gänzlich verwirft. Cooke wollte die Fauna von Bongao entschieden als bornensisch und deutlich nicht-philippinisch betrachten, was schon damals ein unrichtiger Schluss war, aber durch den seither bekannt gewordenen Zuwachs sich noch entschiedener als unhaltbar erweist. Die Fauna von Borneo und die der Philippinen greifen deutlich in einander über; *Cochlostyla* ist noch in einigen Arten auf Borneo vertreten, während umgekehrt das Vorkommen von *Trochonanina* in Mindanao und Paragua, von *Opisthoporus* auf Paragua und den Calamianes als ein Uebergreifen der Borneo Fauna nach der Philippinen anzusehen ist. Es ist daher kein Wunder, wenn die beiden Inselbrücken, welche von Paragua im Westen, von Mindanao im Osten zu Borneo überleiten, Anklänge an beide Faunen darbieten. Ueberwiegend ist aber in der Fauna der Suluinseln, wie Smith richtig hervorhebt, entschieden das philippinische Element. Wenn wir die *Plectotropis* und *Chloritis* Arten, *Opeas*, *Pseudocyclophorus*, *Platyrhaphis*, *Lagochilus*, *Leptopoma vitreum* und *Alycaeus* als Indonesien und den Philippinen gemeinsam ausscheiden, so bleiben als rein philippinisch:

Pareuplecta angulata, *Kaliella doliolum*, *Lamprocystis myops*, *gemmaula*, *Trochomorpha repanda*, *Obbina marginata*, *Cochlostyla samboanga*, *boholensis*, *Amphidromus maculiferus*, *Cassidula philippinum*, *Cyclotus variegatus*, *Cyclophorus sowerbyi*, *Ditropis diminuta*, *Leptopoma atricapillum*, *Pupina ottonis*, *Diplomatina roebeleni*, *Helicina lazarus*,

also mehr als die Hälfte der überhaupt bekannten Arten. Nur *Clausilia suluana*, *Helicina martensi* und die *Trochonanina* sind als Anklänge an die Fauna von Borneo zu betrachten.

Zur Verbreitung der *Pupa ronnebyensis* Westerl. in Norddentschland.

Von
W. Pässler.

Pupa Ronnebyensis, die bisher nur von Tegel bei Berlin und von Spechthausen bei Eberwalde bekannt war, habe ich in diesem Jahre bei Oderberg in der Mark aufgefunden. Herr A. Protz, der die Art seinerzeit für Spechthausen entdeckte, (cfr. Nachrichtsbl. 1890 S. 142) theilt mir mit, dass er gelegentlich einer zoologischen Forschungsreise, die er im Auftrage des westpreussischen Provinzial-Museums unternommen, die Schnecke auch im Oscher Walde (Kreis Schwetz) in Westpreussen gefunden habe. Es sind sonach vier ziemlich zerstreut liegende Fundorte der *P. Ronnebyensis* in Norddeutschland festgestellt; an sämmtlichen Stellen lebt die Schnecke in gemischtem Walde unter Moos und Laub. — Es kann nach der geographischen Lage der aufgeführten Fundorte als sicher gelten, dass die Art in der Norddeutschen Ebene eine weitere Verbreitung hat und bei genauer Durchforschung noch an mancher geeigneten Lokalität gefunden werden wird.

Literaturbericht.

Martens, Ed. von, Mollusca. In Godman et Salvin, Biologia Centrali-americana. Zoologia. London Gr. 40.

Von der Molluskenabtheilung der grossartig angelegten *Biologia Centrali Americana* der Herren Godman und Salvin, deren Bearbeitung unser verehrtes Mitglied übernommen hat, sind seit dem Beginn des Erscheinens (Mai 1890) bis jetzt zwölf ausgezeichnet ausgestattete Lieferungen erschienen, welche eine der werthvollsten Bereicherungen der conchologischen Literatur der neueren Zeit darstellen. Der Verfasser hat in gewohnter sorgsamer und gründlicher Weise alles zusammengestellt, was wir heute über die Mollusken Centralamerikas wissen, und die Bestimmung der von dort stammenden Arten durch Bestimmungstabellen, welche alle Hauptkennzeichen berücksichtigen, und durch ausgezeichnete Abbildungen sehr erleichtert. Neben den sicheren sind auch die zweifelhaften Arten berücksichtigt, die Synonymie

1015
227

Nachrichtsblatt

der Deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Siebenundzwanziger Jahrgang.

Redigirt
von
Dr. W. Kobelt
in Schwanheim (Main).



FRANKFURT AM MAIN.
Verlag von MORITZ DIESTERWEG.
1895.

Inhalt.

	Seite
<i>Böttger, Prof. Dr. O.</i> , Die marinen Mollusken der Philippinen. IV. Die Pleurotomiden.	141
<i>Krause, Dr. Arthur</i> , Mollusken von Tenerife	20
<i>Hortzschansky, Dr. A.</i> , Miscellen zur deutschen Molluskenfauna	30
<i>Kobelt, Dr. W.</i> , Diagnosen neuer Arten	33
<i>Wehner, C.</i> , Ein neuer Fundort für <i>Hel. striata</i> var. <i>nilssoniana</i>	35
<i>Gallenstein, H. von</i> , Das Vorkommen von <i>Cl. Grimmeri</i> in Kärnthen	63
<i>Quadras, et Möllendorff</i> , Diagnoses specierum novarum ex insulis Philippinis	73, 104, 121
<i>Goldfuss, Dr. O.</i> , Die Molluskenfauna der Umgegend von Lahn in Schlesien	89
<i>Pautz, L. A.</i> , <i>Campylaea intermedia</i> Zgl. in Tirol	98
<i>Goldfuss, Dr. O.</i> , Ein neuer Fundort der <i>Pupa ronnebyensis</i> West. in Norddeutschland	100
<i>Rolle, H.</i> , Eine neue <i>Achatina</i>	100
<i>Ihering, H. von</i> , Die Gattung <i>Paludestrina</i>	122
<i>Rolle, H.</i> , Beitrag zur Fauna von Mexico	129
<i>Thiele, Dr. Joh.</i> , <i>Hemitrichia guimarasensis</i> n. sp.	131
<i>Strubelt, B.</i> , Diagnosen neuer Arten	150
<i>Möllendorff, Dr. O. von</i> , Pilsbry's neue Eintheilung der Heliciden	153, 169
<i>Martens, Ed. von</i> , Neue Land- und Süßwasserschnecken aus Ost- Afrika	175
<i>Kobelt, Dr. W.</i> , Hugh Cuming	187
<i>Scharff</i> , Zur Molluskenfauna der Schweiz	191
 Kleinere Mittheilungen	36, 200.
Literaturbericht	36, 72, 100, 132, 165.



Druck von Peter Hartmann, Schwanheim a. M.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Siebenundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Die marinen Mollusken der Philippinen (IV)

nach den Sammlungen des Herrn José Florencio Quadras
in Manila.

Von

Prof. Dr. O. Boettger in Frankfurt (Main).

(Fortsetzung zu Nachr.-Blatt d. d. Mal. Ges. 1893 pag. 97—115,
153—167 und 185—193).

IV. Die Pleurotomiden.

Diese in ihren kleineren Formen sehr schwierige Familie ist in den philippinischen Meeren überaus reich entwickelt. Haben wir auch in Reeve's trefflichen Bildern der Cuming'schen Ausbeute für viele der grossen und mittleren Arten feste Anhaltspunkte, so fehlt es doch bei den kleinen und kleinsten Formen vielfach an scharfen Diagnosen und

namentlich an genauen Massangaben, die für die Beurtheilung der Species oft von grossem Werthe sind. Was aber besonders verwirrt, ist die Unsicherheit der generischen Abtrennung. So schliessen sich gewisse Bellardiellen der deckellosen Gattung *Clathurella* in der Schalenform eng an Arten der deckeltragenden Gattung *Drillia* an, und besonders schwierig ist die Trennung der Gattung *Clathurella* von *Mangilia*. Offenbar liegt der Hauptmangel unserer heutigen Eintheilung darin, dass wir bisher zu viel heterogene Formen namentlich in die Gattung *Clathurella* gesteckt haben. Ich will mich bemühen, in den folgenden Zeilen durch Zusammenfassung verwandter Arten unter subgenerische Benennungen die verwirrte Gruppeneintheilung übersichtlicher zu machen. Bei dieser Arbeit hat mich Herr Prof. Dr. Ed. von Martens in Berlin mehrfach in dankenswertester Weise mit seinem bewährten Rathe unterstützt.

Gen. I. *Pleurotoma* Lmk.

Sect. 1. *Pleurotoma* Weinkff.

1. *Pleurotoma* (*Pleurotoma*) *babylonia* (L.)

Inseln Siquijor (Cuming, var. *venusta* Rve.), Cebú (von Moellendorff 1890) und Mindanao und Tagana-an auf Mindanao (coll. Quadras No. 5021). — Mauritius (Tryon), Molukken (Reeve, coll. Boettger 1884), Timor (Tryon) und Port Dorey, Neuguinea (Kiener).

2. *Pleurotoma* (*Pleurotoma*) *garnonsi* Rve.

Inseln Cebú (Cuming) und Balabac bei Paragua (coll. Quadras No. 5026). — Mauritius (Robillard), Querimba (Peters), Sansibar (v. d. Decken, coll. Boettger 1889), Rothes Meer (Jickeli), Java (v. Martens), Neukaledonien (P. Fischer).

Die philippinischen Stücke sind wesentlich schlanker als die von Sansibar. — Alt. $65\frac{1}{2}$, diam. max. 16 mm.

3. *Pleurotoma (Pleurotoma) crispa* Lmk.

Insel Masbate (Cuming).

Ist nach Weinkauff wahrscheinlich nur Varietät von *Pl. grandis* Gray, die von den Philippinen bis China und Japan und bis zu den Fidjis verbreitet ist.

4. *Pleurotoma (Pleurotoma) tigrina* Lmk.

Philippinen (Reeve, Mus. Berolin., coll. Boettger 1883), Naujan auf Mindoro, Insel Alabat der Prov. Tayabas, Luzon, Insel Balabac bei Paragua und Dalawan auf Balabac, Inseln Masbate, Cebú und Sarangani an Südmindanao (coll. Quadras No. 5018 und 5027). — Madagaskar (Kiener), Fidjis (Garrett) und Upolu auf Samoa (Mus. Godeffroy).

Diese Art besitzt bald kürzeren Kanal und 8—10 sehr feine Spiralreifen zwischen dem punktierten Nahtkiel und dem doppelten Schlitzband auf der konkaven Oberseite der Umgänge, bald schlankere Gestalt, längeren Kanal und nur (3—) 5—7 sehr kräftige Spiralreifen auf der konkaven Oberseite der Windungen zwischen dem 3—5kieligen Nahtwulst und dem Schlitzband.

5. *Pleurotoma (Pleurotoma) spectabilis* Rve.

Inseln Ticao (Cuming) und Balabac bei Paragua (coll. Quadras No. 5025). — Mauritius (Robillard) und Neukaledonien (P. Fischer).

In die Synonymie dieser Art gehört die *Pl. variegata* Tryon, non Kiener von den Philippinen. Weinkauff so gut wie Tryon haben diese schöne Species verkannt. Sie steht nicht der *Pl. babylonia* (L.), sondern der *Pl. variegata* Kien. am nächsten und zwar so nahe, dass Tryon sie überhaupt miteinander verwechselt hat. Von *Pl. variegata* scheidet sie sich aber scharf dadurch, dass grobe, feinere und feine Spiralkiele bei ihr abwechseln, während bei der echten *Pl. variegata* Kien. nur Spiralkiele zweiter und dritter

Stärke auftreten, und dass die grobe Fleckung der Schale unserer Art nie in Vertikalstreifung übergeht.

6. *Pleurotoma (Pleurotoma) picturata* Wkff.

Insel Balabac bei Paragua (coll. Quadras No. 5028 und 5029).

Leicht an den wie bei *Pl. tigrina* doppelten Schlitzbandkielen von der vorigen Art zu unterscheiden. Die Schnabelspitze ist bei einem lebend gesammelten Stück aussen tiefbraun, die Färbung und Zeichnung sonst die der *Pl. tigrina*. — Alt. 33, diam. max. $10\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. 15 mm.

7. *Pleurotoma (Pleurotoma) marmorata* Lmk.

Cebú (v. Moellendorff 1890 und coll. Quadras) und Dapitan auf Mindanao (No. 5022). — Rothes Meer (Jickeli), Straits Settlements (coll. Boettger 1883) und Malakka (Reeve), Insel Bangka (coll. Boettger 1890), Australien (Tryon), Polynesien (Mus. Godeffroy), Upolu auf Samoa (Weinkauff), Japan (Dunker).

8. *Pleurotoma (Pleurotoma) undosa* Lmk.

Insel Masbate (Cuming). — Rothes Meer (Jickeli), Pondichery, Vorderindien (Reeve), Timor (v. Martens).

9. *Pleurotoma (Pleurotoma) cingulifera* Lmk.

Philippinen (Reeve). — Madagaskar (Reeve, coll. Boettger 1883), Mauritius (Liénard), Rothes Meer (Kiener), Madras (coll. Boettger 1886), Neukaledonien (P. Fischer), Rarotonga (Garrett), Tahiti (Mus. Godeffroy) und Sandwichs-Inseln (Weinkauff).

10. *Pleurotoma (Pleurotoma) abbreriata* Rve.

Insel Masbate (Cuming und coll. Quadras No. 1159). — Mauritius (Liénard), Rothes Meer (Mc'Andrew), Timor und Flores (v. Martens), Südsee (Mus. Godeffroy), Fidjis (Tryon).

Das von Masbate vorliegende Stück misst alt. 21, diam. max. $9\frac{1}{2}$ mm.

11. *Pleurotoma (Pleurotoma) cryptorhapha* Sow.

Inseln Masbate (Cuming) und Cebú (coll. Quadras No. 5023). — Molukken (v. Martens).

Das Stück von Cebú misst alt. 77, diam. max. 19 mm.

12. *Pleurotoma (Pleurotoma) fascialis* Lmk.

Inseln Ticao und Masbate (Cuming), Marinduque, Cebú und Naujan und Quinuguitan auf Mindanao (coll. Quadras No. 5024). — Rothes Meer (Kiener).

Hat bei Cebú alt. 58, diam. max. 22 mm.

13. *Pleurotoma (Pleurotoma) brevicaudata* Rve.

Inseln Ticao (Cuming) und Cebú (coll. Quadras No. 724). — Rothes Meer (Mc' Andrew).

Tryon, der diese Schnecke als Jugendzustand zur vorigen Art zieht, übersieht, dass ihr Gewinde an den Seiten mehr konvex ist, dass der Kiel unter der Naht stärker entwickelt und wulstförmig erscheint und dass sie unter diesem Kiele nicht geschultert ist wie *Pl. fascialis* Lmk. Auch ist die Färbung wesentlich heller, hellgelb, der Schnabel tiefbraun. — Alt. 27, diam. max. $10\frac{1}{2}$ mm.

14. *Pleurotoma (Pleurotoma) violacea* Hinds.

Philippinen (Cuming). — Rothes Meer (Jickeli), Persischer Meerbusen (Tryon), Madras (coll. Boettger 1889), Meerbusen von Siam (L. Morlet), Makassarstrasse und Neuguinea (Hinds), Australien (Tryon), Neuseeland (E. A. Smith), Japan (Tryon).

Sect. 2. Gemmula Weinkff.

15. *Pleurotoma (Gemmula) monilifera* Pse.

Inseln Balabac bei Paragua (coll. Quadras No. 128) und Cebú (No. 29). — Oahu, Sandwichs-Inseln (Pease).

16. *Pleurotoma (Gemmula) armillata* Rve.

Philippinen (Cuming). — Mergui-Archipel (v. Martens), Australien (Brazier).

Gen. II. *Dolichotoma* Bellardi.

17. *Dolichotoma atractoides* (Watson).

Watson, Journ. Linn. Soc. London, Zool. Bd. 15, 1881
pag. 407. (*Genota*).

Oestlich von den Philippinen, in 375 Faden (Watson).
— Port Blair, Andamanen (G. B. Sowerby).

Gen. III. *Drillia* Gray.

Sect. 1. *Brachystoma* Swains.

18. *Drillia (Brachystoma) tayloriana* (Rve.)

Insel Cebú (coll. Quadras No. 726). — Bombay, Tranquebar und Singapore (Tryon), Meerbusen von Siam (L. Morlet), Australien (Tryon).

Das Stück von Cebú misst alt. $37\frac{1}{2}$, diam. max. $10\frac{1}{2}$ mm.

19. *Drillia (Brachystoma) alabaster* (Rve.)

Inseln Siquijor (Cuming) und Cebú (coll. Quadras No. 725). — Darnley-Insel, Australien (Brazier).

Die Stücke von Cebú zeigen 11—13 Vertikalrippen auf dem vorletzten, 12—15 auf dem letzten Umgang; 8 Spiralkiele, die abwechselnd gröber und feiner sein können, stehen auf dem vorletzten Umgange. Die Farbe wechselt von weissgelb bis rothgelb. — Alt. 26—31, diam. max. 10—12 mm.

20. *Drillia (Brachystoma) cagayanensis* (Rve.)

Cagayan, Prov. Misamis, Mindanao (Cuming) und Insel Balauan bei Mindanao (coll. Quadras No. 56).

Das von Balauan vorliegende Stück zeigt 10 stumpfe Vertikalfalten auf dem vorletzten Umgang und misst nur alt. $10\frac{1}{2}$, diam. max. $4\frac{1}{2}$ mm.

21. *Drillia (Brachystoma) vibicina* (Helbling).

— *Drillia interrupta* Lmk., non Brocchi teste v. Martens. Mariveles auf Luzon (leg. Jagor, Mus. Berolin.) — Japan (Dunker).

Sect. 2. Clarus Montf.

22. *Drillia (Clarus) auriculifera* (Link.)

Philippinen (Cuming), Cebú (coll. Quadras No. 39 und 5019, O. Koch No. 71). — Palau-Inseln (Sutor), Neukaledonien (P. Fischer).

Zeigt konstant 8 Dornhöcker auf dem letzten Umgang.

23. *Drillia (Clarus) unizonalis* (Lmk.)

Philippinen (leg. Meyen, Mus. Berolin.), Inseln Masbate (Cuming, typ.), Catanduanes (coll. Quadras No. 31, var. *becki* Rve.), Luzon (coll. Boettger 1886, var. *becki*) und Bauang auf Luzon (coll. Quadras, var. *becki*), Punta Balabac auf Balabac bei Paragua (No. 120, var. *becki*), Insel Romblon (No. 1734 und 1774), Laon auf Bohol (leg. O. Koch 1894, typ. und var. *becki*), Cebú (No. 1487, typ.) und Insel Calumangan bei Mindanao (No. 18, var. *becki*). — Rothes Meer (Jickeli), Neukaledonien (P. Fischer, var. *ridua* Rve.), Fidji- und Samoa-Inseln (Graeffe), Japan (Dunker, var. *ridua*).

Die Art ist im Querschnitt meist siebeneckig. Tryon rechnet, wahrscheinlich mit vollem Recht, auch *Dr. ridua* Rve. (= *nigrozonata* Wkff. von Masbate) zu ihr.

24. *Drillia (Clarus) pulchella* (Rve.)

Inseln Capul und Mindoro (Cuming). — Mauritius (coll. Boettger 1890) und Cooks-Inseln (Garrett).

Die Identificierung Tryon's von *Dr. bilineata* Rve. mit dieser Art halte auch ich für wahrscheinlich.

25. *Drillia (Clarus) nitens* (Hinds).

Insel Cebú (von Moellendorff 1890). — Mergui-Archipel (v. Martens), Malakka, Makassarstrasse und Neuguinea (Hinds), Nordaustralien (Tryon).

Liegt von Cebú nur in einem Stücke vor, das 10 spitze Querfalten auf der Schulter trägt.

26. *Drillia (Clavus) formosa* (Rve.)

Insel Capul (Cuming). — Agat auf Guajan, Marianen (coll. Quadras).

Am letzteren Orte mit 14 Fältchen auf der Schlusswindung. — Alt. 8, diam. max. $2\frac{3}{4}$ mm.

27. *Drillia (Clarus) vittata* (Rve.)

Philippinen (E. A. Smith).

28. *Drillia (Clavus) pica* (Rve.)

Insel Capul (Cuming). — Mauritius (Robillard).

29. *Drillia (Clarus) coffeea* Smith.

E. A. Smith, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) Bd. 10, 1882 pag. 209.

Philippinen (E. A. Smith), Magallanes auf Sibuyan (coll. Quadras No. 1695), Inseln Lugbon bei Romblon (Quadras), Cebú (von Moellendorff 1890), Bohol (O. Koch 1894) und Balauan bei Mindanao (No. 37).

30. *Drillia (Clarus) exilis* Pease.

Inseln Siquijor (von Moellendorff 1890) und Balabac bei Paragua, sowie Costa de Calatrava al Salado auf Tablas (coll. Quadras No. 1325). — Fidji-, Cook- und Paumotu-Inseln (Pease).

Vorletzter Umgang mit 16–19 Vertikalfalten. — Alt. 5–6, diam. max. $2-2\frac{1}{4}$ mm.

Sect. 3. Crassispira Sicains.

31. *Drillia (Crassispira) cerithina* (Anton).

= *Drillia digitatis* Rve. teste v. Martens.

Insel Bureas (Cuming), Manila (leg. Meyen, Mus. Berolin.) und Moron, Prov. Bataan auf Luzon, Gasan auf Marinduque und Lugar Agcalatao bei Badajoz auf Tablas (coll. Quadras No. 1471), Cebú (No. 5020). — Mauritius und Samoa-Inseln (Weinkauff).

32. *Drillia (Crassispira) cantharis* (Rve.)

Sibonga auf Cebú (Cuming), Balabac bei Paragua (coll. Quadras No. 126 und 1364), Romblon und Lugar Agcalatao bei Badajoz auf Tablas (No. 1775).

Auch sämmtliche vorliegende Stücke sind so schlecht erhalten wie das von Reeve abgebildete Originalexemplar.

Sect. 4. Drillia Tryon.

33. *Drillia (Drillia) spectrum* (Rve.)

Puerto Galero auf Mindanao (Cuming).

34. *Drillia (Drillia) putillus* (Rve.)

Calapan auf Mindoro (Cuming). — Chinesisches Meer (Adams & Reeve), Nordanstralien (Brazier).

Macht ganz den Eindruck, als wäre sie ein Jugendzustand der vorigen Art.

35. *Drillia (Drillia) sinensis* (Hinds).

Philippinen (Dunker), Cebú (coll. Quadras No. 110) und Dapitan auf Mindanao (No. 108). — Madras (coll. Boettger 1890), Port Blair, Andamanen (G. B. Sowerby), Borneo (coll. Boettger 1890), Makassarstrasse und Neuguinea (Hinds), Australien (Angas, Brazier), Chinesisches Meer (Sowerby), Japan (Dunker).

Die Anzahl der Vertikalfalten auf dem vorletzten Umgange schwankt zwischen 11 und 13.

36. *Drillia (Drillia) varicosa* (Rve.)

Calapan auf Mindoro und Insel Corrigidor (Cuming). — Australien (Tryon).

37. *Drillia (Drillia) corrusca* (Rve.)

Insel Capul (Cuming).

38. *Drillia (Drillia) opalus* (Rve.)

Cagayan, Prov. Misamis, Mindanao (Cuming).

39. *Drillia (Drillia) quadrasi* n. sp.

T. clavato-fusiformis, solidissima, nitida, laete rufa vel castanea, interdum taenia spirali clariore obsoletis-

sima incisionem sequente sub sutura ornata; spira exakte turrita; apex acutissimus. Anfr. 10 subgradati, ad suturam parum profundam, appressam constrictiusculi, subtus convexi, costis convexis subverticalibus hebetibus — 9—10 in anfr. penultimo — ornati, caeterum laeves, ultimus superne tumidulus, subtus angustatus, basi liris circa 7 cingulatus, costa verticali ante aperturam sita caeteris multo validiore instructus, $\frac{3}{7}$ altitudinis testae subaequans. Apert. angusta subtriangularis, basi acuminata, castanea saucibus albis, incisione lata et profunda, a sutura limine crasso nodulum semiglobosum ferente separata, labio dextro acuto, areuatim valde protracto et basi denuo emarginato, intus laevi, columella recta et stricta, laevis, canalis fere nullus, brevissime dextrorsus. — Alt. $17\frac{1}{2}$, diam. max. $6\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. $7\frac{1}{2}$, lat. apert. 3 mm.

Fundort: Gebú (von Moellendorff 1890 und coll. Quadras No. 107). Scheint nicht selten zu sein.

Bemerkungen: Gehört in die Verwandtschaft der fossilen *Dr. sigmoidea* Brönn und der lebenden *Dr. ebur* (Rve.) und *opus* (Rve.), ist aber doppelt so gross wie die letztere, die Rippen breiter, nicht stumpfwinkelig oder höckerartig vortretend und nicht so streng eine unter die andre gesetzt, auch die Färbung wesentlich abweichend.

40. *Drillia (Drillia) mindanaensis* Smith.

E. A. Smith, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) Bd. 19, 1877 pag. 493.

Mindanao (E. A. Smith.) — 29 mm lang, 9 breit.

41. *Drillia (Drillia) nodilirata* Smith.

E. A. Smith, l. c. pag. 494.

Philippinen (E. A. Smith). — 25 mm lang, 8 breit.

42. *Drillia (Drillia) intertincta* Smith.

E. A. Smith, l. c. pag. 497.

Philippinen (E. A. Smith.) — Chinesisches Meer (E. A. Smith). — 28 mm lang, 8 breit.

Gen. IV. *Borsonia*.

43. *Borsonia armata* n. sp.

Char. T. parva gradato-fusiformis, solida, opaca, alba; spira turrita, gradata; apex acutus. Anfr. $7\frac{1}{2}$ lente accrescentes, sutura impressa undulata disjuncti, embryonales angulati, cacteri convexi, liris spiralibus elevatis sat validis distantibus — 2 in anfr. penultimo, 9—11 in ultimo — nec non costis verticalibus, e sutura incipientibus acutis, compressis — 9 in anfr. penultimo, 8—9 in ultimo — reticulati, punctis intersectionum leviter granuliferis, ultimus infra suturam leviter angulatus, tum convexus, basi breviter angustatus et acutatus, altitudine spiram haud aequans. Apert. parvula vix obliqua, linearis, superne leviter sinuata, labio dextro acuto, extus subvaricoso, varice spiraliter lirato, intus denticulis 2 armato, superiore validiore, margine basali breviter effuso, columella longa, recta et stricta, superne plica transversa valida, hebeti instructa. — Alt. $5\frac{3}{4}$ — 6, diam. max. $2\frac{3}{8}$ mm; alt. apert. $2\frac{3}{4}$, lat. apert. $1\frac{1}{8}$ mm.

Fundort: Manila auf Luzon, häufig, von Herrn J. Flor. Quadras zuerst gefunden (9 Nummern).

Bemerkungen: Diese merkwürdige Schnecke, die äußerlich an *Rhaphitoma* erinnert, aber die stumpfe hochgelegene Spindelfalte von *Borsonia* besitzt, weicht von der fossilen Gattung nur durch die zwei am oberen Innenrande der rechten Mundlippe liegenden Zähne ab. Man kann sich ein Bild von ihr machen, wenn man sich die *Mangilia pyramidalis* Rve., die vielleicht auch zu *Borsonia* gehört, von oben zusammengeschoben denkt. Was Tryon für lebende Borsonien hält, sind mit Ausnahme zweier westindischer, von Watson beschriebener Arten Clathurellen der Sect. *Lienardia*.

Gen. V. *Surcula* H. & A. Ad.

44. *Surcula australis* (Roissy).

Philippinen (Weinkauff). — Chinesisches Meer (Weinkauff).

45. *Surcula cincta* (Lmk.)

Insel Paragua (coll. Quadras No. 1363). — Mauritius (Weinkauff, coll. Boettger 1882), Insel Annaa (Cuming) und Fidjis (Garrett).

46. *Surcula bijubata* (Rve.)

Insel Bureas (Cuming), Philippinen (coll. Boettger 1883), Punta Balabac auf Balabac bei Paragua (coll. Quadras No. 1363). — Mauritius (Robillard), Salomonsinseln (E. A. Smith), Fidjis (Garrett) und Upolu auf Samoa (coll. Boettger 1890).

Gen. VI. *Mangilia* Risso.

47. *Mangilia reeveana* (Desh.)

Deshayes, Cat. Moll. Ile de la Réunion 1863 pag. 106, Taf. 12, Fig. 5—7 (*Pleurotoma*); Tryon, Man. Conch. Bd. 6, 1884 pag. 291, Taf. 19, Fig. 56, 75 (*Clathurella*).

Insel Lugbon bei Romblon (coll. Quadras No. 1696). — Bourbon (Deshayes) und Mauritius, Andamanen, Fidji- und Paumotu-Inseln (Garrett).

Ich stelle diese Art, die bei Lugbon nur alt. 6, diam. max. $2\frac{1}{2}$ mm erreicht, sammt der verwandten *Pleurotoma cyclophora* Desh. nicht wie Tryon zu *Clathurella*, sondern zu *Mangilia*. Sie bilden in dieser Gattung eine Gruppe von tropischen Formen, die sich durch tiefen, kreisrund umwallten Einschnitt, glatte Spindel, aber leicht gekerbten Innenrand der Aussenlippe auszeichnen.

48. *Mangilia edentula* n. sp.

Char. T. breviter fusiformis, solidissima, alba, opaca; spira conico-turrita lateribus convexis; apex mucronatus, summo sat acutus. Anfr. 7 convexiusculi, sutura parum distincta, late appressa disjuncti, zona infrasuturali plana

vel leviter compressa, laevi, costis obliquis, subsigmoideis, latis, parum compressis — 11 in anfr. penultimo, 9 in ultimo — nec non liris spiralibus validis costas transgreditibus, ad intersectiones scabriuseculis — 5 in anfr. penultimo, 13 in ultimo — reticulati, ultimus convexior, media parte inflatus, basin versus spiraliter constrictus et liris nonnullis haud granuliferis cinctus, dimidiam testae altitudinem aequans. Apert. irregulariter linearis, basi protracta, incisione angusta, profundissima limine nodifero a sutura separata, labio dextro acuto, arcuatim protracto, extus varice validissimo, compresso, lirato cincto, subtus in regione stricturae emarginato, intus edentulo, canali brevi lato, subtus dilatato, columella leviter torta, haud rugosa. — Alt. $6\frac{1}{4}$, diam. max. $2\frac{3}{4}$ mm; alt. apert. $3\frac{1}{4}$, lat. apert. $1\frac{1}{2}$ mm.

Fundort: Insel Balauan bei Mindanao (No. 38), nur in einem Stücke von Herrn J. Flor. Quadras eingeschickt.

Bemerkungen: Unterscheidet sich von der Mangiliengruppe der *M. reeveana* (Desh.) durch die fehlende Bewehrung der rechten Mundlippe und gehört zu einer Reihe miocaeiner noch unbeschriebener Arten, von denen eine bei Lapugy in Siebenbürgen vorkommende, rauh skulptierte Art ihr sehr nahe steht, sich aber durch tiefer eingedrücktes Nahtband und noch kräftigere Längsskulptur unterscheidet.

49. *Mangilia vitrea* (Rve.)

Insel Mindanao (Cuming). — Singapore (Cuming).

50. *Mangilia angulata* Rve.

Manila (Cuming, coll. Quadras, sehr häufig, zahlreiche Nummern). — Cap York, Australien (Brazier), Hongkong (leg. B. Schmacker).

Die Schulterkante wechselt bei dieser Art von deutlicher Ausprägung bis zu gänzlicher Verrundung; die Schlusswindung wird von vier weitläufig gestellten braunen Spirallinien umzogen. Oben auf dem Innenrande der Aussenlippe stehen

1—2 Zähnchen; der flache Ausschnitt ist nach unten von dem obersten dieser zahnartigen Knötchen begrenzt. Die grössten vorliegenden Stücke haben 8—10 Vertikalrippen auf der vorletzten, 7—9 auf der letzten Windung und messen alt. $4\frac{3}{4}$ —6, diam. max. $2\frac{1}{2}\frac{3}{8}$ mm.

51. *Mangilia cavernosa* Rve.

Insel Ticao (Cuming). — Neusüdwales (Cox).

Diese und die folgenden Arten No. 51 — No. 65 incl. sind echte *Mangilia*-Arten von Habitus unserer Mittelmeerformen und ohne Zähnelung an Lippe und Spindel.

52. *Mangilia funebris* Rve.

53. *Mangilia livida* Rve.

54. *Mangilia pallida* Rve.

Auch diese 3 Arten stammen von der Insel Ticao (Cuming).

55. *Mangilia pura* Rve.

Insel Balauan bei Mindanao (coll. Quadras No. 75). — Südaustralien (Angas).

Stimmt gut mit Reeve's Abbildung und Angas' Beschreibung dieser Art überein, hat 10—11 Vertikalrippen auf dem vorletzten Umgang und alt. 8, diam. max. $3\frac{1}{4}$ mm.

56. *Mangilia castanea* Rve.

Insel Burias (Cuming).

57. *Mangilia cincta* Rve.

Inseln Bohol und Mindanao (Cuming), Manila (coll. Quadras No. 321 und 341), Insel Bisucay, Calamianes (No. 73). — Hongkong (leg. B. Schmacker).

Von dieser Art liegen Stücke vor von alt. $3\frac{5}{8}$ — $5\frac{1}{4}$, diam. max. $1\frac{7}{8}$ — $2\frac{3}{8}$ mm, die sich durch ein braunes Fleckenband unter der Naht und ein Spiralband auf der Mitte des letzten Umgangs auszeichnen und je 8—9 Vertikalrippen auf dem vorletzten und auf dem letzten Umgange zeigen. Die Mündung ist vollkommen zahnlos.

Meiner Ansicht nach mit Recht stellt Tryon *M. nana* Rve. von Mindanao in die Synonymie dieser Art.

58. *Mangilia maculata* Rve.

Insel Ticao (Cuming). — Darnley-Insel, Nordaustralien (Brazier).

59. *Mangilia lemniscata* [Nevill].

Nevill, Journ. Asiat. Soc. Bengal 1875 II, pag. 92, Taf. 7, Fig. 11 [*Clathurella*].

Insel Bauluan bei Mindanao [coll. Quadras No. 2265].
— Mauritius und Ceylon [Nevill].

60. *Mangilia abyssicola* Rve.

Insel Mindanao [Cuming].

61. *Mangilia pessulata* Rve.

Philippinen [Cuming], Ternate, Prov. Cavite, Luzon [coll. Quadras No. 42], Insel Lugbon bei Romblon [No. 57], Insel Balauan bei Mindanao [No. 58] und Dapitan auf Mindanao [109].

12—14 Rippen auf dem vorletzten Umgang, die dichte Spiralskulptur nur unter der Lupe erkennbar; Lippe und Spindel ohne Spur von Zahnfältchen. — Alt. 8½—11, diam. max. 3⅓—4⅓ mm.

62. *Mangilia trizonata* Smith.

E. A. Smith, Ann. Mag. Nat. Hist. [5] Bd. 10, 1882 pag. 215.

Sibonga auf Gebú [Cuming].

Weiss, Gewinde mit zwei, Schlusswindung mit drei braunen Spiralbinden. — Alt. 8½, diam. max. 3⅓ min.

63. *Mangilia quadrasi* n. sp.

Char. T. minima ovato-fusiformis, tenuiuscula, unicolor albescens, pellucida, sericina; spira gradato-conica lateribus convexiusculis; apex acutus. Anfr. 7 tabulati, prope suturam angulati, tum planulati, sutura perdistineta disjuncti, costis verticalibus angustis crebris — 13—14 in singulo anfractu

— nec non lirulis spiralibus numerosis — 8 in anfr. penultimo et circa 18 in ultimo — densissime reticulati et in intersectionibus levissime granulati, ultimus subtriangularis, basi decrescens, dimidiam testae altitudinem aliquantulo superans. Apert. irregulariter linearis, subaequilata, edentula, incisione lata, modice profunda, labio dextro substicto acuto, media parte arcuatim protracto, extus varice valido, compresso, lirato cincto, canali brevi latiusculo, columella longa stricta, haud rugosa. — Alt. $3\frac{1}{2}$ —4, diam. max. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{5}{8}$ mm; alt. apert. $2\frac{1}{8}$, lat. apert. $\frac{3}{4}$ mm.

Fundort; Inseln Catanduanes [coll. Quadras No. 33] und Balabac bei Paragua [No. 121], in je einem Stück von Herrn J. Flor. Quadras gesammelt und ihm zu Ehren benannt.

Bemerkungen: Erinnert an die fast doppelt so grosse *M. debilis* [Pse.], die übrigens nur 10 Vertikalrippen trägt.

64. *Mangilia angicostata* Rve.

Insel Jinituan bei Mindanao [coll. Quadras No. 43]. — Neukaledonien [Souverbie, coll. Boettger 1882] und Fidjis [Garrett].

Die Art besitzt mindestens vier deutliche Querfältchen auf der braunen Spindel, während die Innenseite der Aussenlippe unbewehrt bleibt, resp. nur ein stumpfes oberes Höckerchen trägt. Die philippinischen Stücke tragen nur fünf Winkelfalten auf der Schlusswindung, haben aber die charakteristische Färbung und Zeichnung der Art. — Alt. $8\frac{1}{2}$, diam. max. 4 mm.


Tryon's Synonymie dieser Art halte ich für richtig.

65. *Mangilia hexagonalis* [Rve.]

Loay auf Bohol [Cuming]. — Neuguinea, Nordaustralien [Tryon].

66. *Mangilia semen* [Rve].

St. Nicolas auf Cebu (Cuming).



Dies ist schwerlich überhaupt eine *Mangilia*; doch lässt sich nach der kurzen Beschreibung und der Dorsalansicht der Schale leider keine sichere Entscheidung treffen.

67. *Mangilia pyramidalis* Rve.

Insel Mindoro (Cuming).

Gehört ihrer Form nach wahrscheinlich zu *Borsonia* Bell.

Gen. VII. *Cithara* Schum.

Betreffs dieser Gattung schreibt mir Herr Prof. Dr. Ed. von Martens in Berlin, dass er auf meine Anregung hin die *Cithara*-Arten im dortigen Museum besonders auf die Zähnelung des Mündungsrandes angesehen habe, und dass es ihm scheine, als ob dieselben danach in vier Abtheilungen gruppiert werden können:

a. Normales. Columellarand mit deutlichen, ziemlich langen, von innen nach aussen schief aufsteigenden Falten; Aussenrand gezähnelt.

citharella Lmk.

annae Jouss.

funiculata Rve.

marginelloides Rve.

Letztere unterscheidet sich von den andern durch viel kürzeres Gewinde; der Aussenrand ist dick, aber innen sehr schwach gekerbt, oft so schwach, dass man die Schnecke erst gegen das Licht halten und hin und her drehen muss, um die Andeutung der Kerben zu erkennen: in der Dunker'schen Sammlung ist daher auch eine derselben als var. *laevislabris* bezeichnet. Der betreffende Mundrand ist dabei so dick, dass man wohl annehmen darf, das Individuum sei noch nicht völlig ausgebildet. Die Exemplare von *C. citharella* haben eine gut ausgebildete Zähnelung, aber ich kann mir wohl denken, dass es ein oder das andere Stück in einer Sammlung (wie es Reeve zeichnet und Tryon als charakteristisch annimmt) geben könnte, an dem der Aussenrand eben noch in der Entwicklung begriffen, schon etwas verdickt, aber noch

nicht gezähnelt ist, indem das Thier vor seiner völligen Ausbildung gesammelt und getötet wurde.

b. Subnormales. Columellarand und Aussenrand gezähnelt, aber die Zähne des Innenrandes nicht schief aufsteigend.

aa. Mit kürzerem Gewinde.

<i>antillarum</i> Rve.	<i>typica</i> E. A. Smith.
<i>hanleyi</i> Desh.	<i>planilabris</i> Rve.
<i>angostoma</i> Pse.	<i>guestieri</i> Sow.
<i>tenebrosa</i> Rve.	(<i>stromboides</i> Rve.)
<i>reticulata</i> Rve.	(<i>reerei</i> Tryon)

bb. Zwischenräume zwischen den Rippen auffällig spiralgestreift (*decussatae*).

<i>columbelloides</i> Rve.	<i>marmorosa</i> Rve.
<i>conohelicoides</i> Rve.	<i>decussata</i> Pse.
<i>capillacea</i> Rve.	

c. Abnormes. Columellarand glatt, Aussenrand gezähnelt.

<i>cylindrica</i> Rve.	<i>turricula</i> Rve.
<i>bicolor</i> Rve.	<i>paucicostata</i> Pse. (mit kurzem Gewinde).

d. Spuria. Columellarand und Aussenrand glatt.

aa. Mit längerem Gewinde.

fusiformis Rve.

bb. Mit kürzerem Gewinde.

<i>compta</i> Rve.	<i>bella</i> Ad. Ang.
<i>zonata</i> Rve.	

Durch welchen Charakter man diese letzteren von den europäischen Mangilien unterscheiden soll, weis ich nicht, und doch sind sie von den vorhergehenden dem Habitus nach nicht gut zu trennen, so dass Reeve mit der Vereinigung von *Cithara* und *Mangilia* doch vielleicht nicht so Unrecht hat.*

Leider fehlt mir die Kenntniss aller von Herrn v. Martens zu den *Citharae aberrantes* gerechneten Arten, doch glaube ich, dass sie besser in Zukunft bei den *Mangilia* ihren Platz finden, mit denen sie auch in Habitus gut übereinstimmen: die Gruppe der *Citharae spuriae* aber rechne ich glatt zu *Mangilia*. Dabei ist zu bemerken, dass Herrn von Martens offenbar eine unausgewachsene *M. zonata* Rve. vorgelegen hat, da diese Art nach Reeve's Abbildung zum mindesten gekerbten Aussenrand besitzt, während das Quadras'sche Exemplar gezähnelten Aussen- und Innenrand zeigt.

Sect. 1. Cithara s. str.

68. *Cithara [Cithara] citharella* [Link.]

Inseln Siquijor [typ.] und Ticao [var. *lyra* Rve., Cuming], Philippinen (typ., coll. Boettger 1886). — Salomonsinseln [Tryon].

Erwachsen zeigt die Art meines Wissens stets Fältelung der Innen- wie der Aussenlippe, ist also eine echte *Cithara*, keine *Mangilia*, wie Tryon will.

69. *Cithara [Cithara] marginelloides* [Rve.]

Insel Burias und Baclayon auf Bohol [Cuming], Philippinen [Mus. Berolin.], Mariveles bei Manila [von Moellendorff 1887] und Ternate, Prov. Cavite [coll. Quadras No. 1066] auf Luzon, Insel Luban bei Luzon [v. Moellendorff 1887] und Dapitan auf Mindanao [No. 111]. — Neuguinea und Neukaledonien [Tryon].

70. *Cithara [Cithara] columbelloides* [Rve.]

Insel Bohol [Cuming], Philippinen [Mus. Berolin., coll. Boettger 1886]. — Neukaledonien [coll. Boettger 1882].

Von *C. marginelloides* [Rve.] durch gerundete Schulterkante, weniger Vertikalrippen [10–11], deutlichere Spiralskulptur, weniger ansteigende Mündung, Schalenform und Grösse scharf unterschieden. — Alt. $9\frac{1}{2}$ – $10\frac{1}{2}$, diam. max. 5– $5\frac{1}{2}$ mm.

71. *Cithara [Cithara] reticulata* [Rve.]

Insel Ticao [Cuming], Philippinen [Mus. Berolin.]. —
Salomonsinseln, Neukaledonien, Fidjis [Tryon].

72. *Cithara [Cithara] obesa* [Rve.]

Insel Ticao [Cuming].

73. *Cithara [Cithara] ponderosa* [Rve.]

Insel Burias [Cuming]. — Nordaustralien [Brazier].

Schluss folgt.

Landschnecken von Tenerifa.

Nach Sammlungen von Dr. Aurel Krause.

Von

Dr. Arthur Krause.

Hierzu eine Tafel.

Während eines kurzen Aufenthaltes auf Tenerifa (Anfang Februar bis Mitte April 93) brachte mein Bruder eine Sammlung der dortigen Landschnecken zusammen, deren nähere Bestimmung und Bearbeitung er mir überliess. Nach den Mittheilungen meines Bruders ist die Schneckenfauna von Tenerifa durchaus nicht reich an Individuen; abgesehen von den weit verbreiteten und in grosser Menge auftretenden eingewanderten Arten sind die meisten sehr sparsam vertreten und namentlich lebende Stücke gar nicht so leicht zu erhalten. Die reichste Ausbeute lieferten die Barrancos und die stets feuchten Steilhänge an der Küste; auf den Besuch der Hochregionen und der Wälder hat mein Bruder leider nur ganz kurze Zeit verwenden können, so dass das Fehlen mancher für diese Gegenden characteristischen Arten nicht auffallen darf.

Die Landschnecken der canarischen Inseln sind schon mehrfach ausführlich bearbeitet worden, namentlich von Mousson [Revision de la Faune Malacologique des Canaries,

1872], von Wollaston [Testacea Atlantica, 1878] und von J. Mabille [Nouv. Arch. du Mus. 2. Ser. VII]. In der Auffassung der Species folge ich in dem folgenden Verzeichnisse grösstentheils Wollaston, da ich die vielen neuen Arten von Mabille ohne Vergleichsmaterial nicht wiedererkennen kann. Ueber die Nacktschnecken der vorliegenden Sammlung ist schon an anderem Orte [Sitzungsberichte der Ges. naturf. Freunde Berlin 1894, pag. 30] vorläufig berichtet worden, so dass über diese in der folgenden Aufzählung der beobachteten Arten nur wenig nachzutragen ist.

1. *Limax variegatus* Drap. = *canariensis* d'Orb. — Ein grosses ausgewachsenes Stück vom Barranco del Castro und ein junges von der Südseite der Insel.

2. *Limax arborum* Bouch.

a) *forma typica*. — Drei Stück von Puerto. In der Radula fand ich 109 Längsreihen und 112 Querreihen. Die Zähne sind länger und spitzer als bei hiesigen Exemplaren; der Mittelzahn und die Seitenzähne sind jederseits mit einem Zähnchen versehen und die äussersten Randzähne sind an der Seite mit 3—5 Zähnchen besetzt. Dieselben Verhältnisse beschreibt B. Esmark [Nyt Mag. for Naturv. 1883 p. 95—96] für jüngere Individuen unserer Art; der Befund der Genitalien zeigte jedoch, dass das untersuchte Stück von Puerto völlig geschlechtsreif war. — Zu dieser Art gehört wahrscheinlich auch der *Limax Poirieri* J. Mabille [Nouv. Arch. 2. Sér. VII, 214] von Gran Canaria.

b) *var. valentianus* Fér. — Vier Stück von Puerto.

3. *Agriolimax agrestis* L. und *Agr. Drymonius* Simroth [non Bourg.]. Von beiden Formen zusammen sieben Stück aus der Umgegend von Puerto. Die anatomische Untersuchung dreier äusserlich nicht unterscheidbarer Exemplare zeigte, dass zwei derselben zu *A. agrestis*, das dritte aber zu dem von Simroth näher characterisierten *A. Drymonius*

zu rechnen sind. Die Radula stimmte bei allen dreien mit der hiesiger typischer *agrestis* überein. — Bourguignat hat mit seinem *Drymonius* aus Madeira (Amén. malac. 1860 p. 143) die Art bezeichnet, welche Lowe als *Limax agrestis* und Albers als *L. gagates* anführen. Mabille (l. c. p. 215) stellt ihn zu *Amalia* (*Milax*).

4. *Amalia gagates* Drap. = *Limax carenatus* d'Orb. — Zwölf Stück, namentlich aus der Umgegend von Orotava aber auch höher hinauf und weit von Gärten und Anlagen entfernt. Bei zweien derselben ragte noch die grosse bemerkenswerthe Spermato phore (Fig. 1) zusammen mit dem Reizkörper aus dem Atrium hervor. Das hintere Ende der Spermatophore stak noch im Penis und in der Patronenstrecke. Die Wände der letzteren zeigen tiefe Gruben, in welche die Stacheln der Spermatophore (Fig. 1, a) hineinpassen und in denen sie offenbar gebildet werden. Im Magen fand ich nur Pflanzenreste, und zwar von Gefässcryptogamen und Dicotyledonen. — Mabille beschreibt (l. c. pag. 215—216) ausser der *Lallemantia polyptyela* Bourg. = *Limax carenatus* d'Orb noch zwei Milaxarten *M. Verneui* u. *M. Gaimardi* von Tenerifa, die ich ebenfalls zu *gagates* Drap. ziehe.

Durch die Freundlichkeit des Herrn G. Schacko erhielt ich zu Weihnachten 1893 eine typische *Amalia gagates* lebend aus Mentone, die in Form und Färbung ganz mit den canarischen Exemplaren übereinstimmt. Mitte Januar legte das Thier gegen 25 längliche Eier (3.6 mm lang und 2.6 mm breit) und ging bald darauf ein; am 10. Februar schlüpften die ersten Jungen hervor, die schon einen deutlichen Kiel zeigten, aber bis auf die schwarzblauen Augenträger ganz farblos waren. Zwei Tage später prägte sich auf dem Schild eine hufeisenartige Binde aus, die der Furche des Schildes folgt. (Vergl. Simroth: Zeitschr. wiss. Zoologie 1885, pag. 338) und eine kürzere centrale Binde; der ganze Körper war mit Ausnahme des Kiels mit feinen grauen Punkten bedeckt, die seitdem an Zahl und Intensität zugenommen haben. Im Ganzen erhielt ich trotz mangelhafter Pflege aus den Eiern 9 lebende Thiere, die Salat,

Kohl und Mohrrüben gerne annehmen. Am 6. März maassen sie 20 mm im ausgestreckten Zustande, am 16. März 24 mm.

5. *Testacella Maugei* Fér. — Zwei Schalen von Puerto.

6. *Gibbulina dealbata* Webb & Berth. — Zahlreich von St. Cruz, Puerto, Vilaflor und Adeje, aber nur von letzterer Localität ein lebendes Exemplar, was jedenfalls mit der nächtlichen Lebensweise dieser Raubschnecke zusammenhängt. — Schlundkopf und Zunge sind ganz, wie sie von Pfeffer (Jahrbücher Mal. Ges. V pag. 62) bei *Ennea* geschildert sind. Ich zähle 70 Querreihen und 31 Längsreihen auf der Radula (Fig. 2); der Mittelzahn ist rudimentär, die ganz ungezähnelten Seitenzähne nehmen von innen nach aussen bis zum zehnten an Länge zu, um dann wieder abzunehmen. Der Penis (Fig. 3. p.) besteht aus zwei Abschnitten, einem kürzeren unteren röhrenförmigen und einem oberen, der auf der Innenseite eine regelmässige netzförmige Zeichnung aufweist. An seinem oberen Ende heftet sich terminal ein langer Refractor, dicht unter demselben mündet seitlich das *var. deferens*, dessen Verlauf deutlich zu verfolgen war. Weniger sicher bin ich über die Deutung von *r s* als Stiel des *receptaculum seminis*. Die Samenblase war abgerissen und der Verlauf des Stieles nicht ganz sicher zu verfolgen; auch die Zwitterdrüse fehlte.

7. *Vitrina Lamarckii* Fér. — Siebzehn Exemplare von Puerto, Agua Manza und Mercedes.

8. *Hyalina circumessa* Shuttl. — Elf Stück von Laguna und Agua Manza.

9. *Hyalina cellaria* Müll. Sechsundzwanzig Stück von Puerto und aus dem Bar. del Castro.

10. *Hyalina vermiculum* Lowe. — Zwanzig Stück von Puerto.

11. *Hyalina crystallina* Müll. — Zwei Stück von Puerto.

12. *Patula pusilla* Lowe. — Siebenundzwanzig Stück von Puerto und Realejo.

13. *Patula textilis* Shuttl. — Zwei leere und schon verwitterte Schalen von Adeje. Die Art war bisher von Tenerifa nicht bekannt.

14. *Helix pulchella* Müll. — Sechs Stück von Agua Manza.

15. *Helix cuticula* Shuttl. — Eine leere Schale aus den Mercedeswaldungen.

16. *Helix lactea* Müller. — Zahlreich von St. Cruz, sehr verschieden in Form und Färbung. Nach J. Mabille gehören die Stücke von Tenerifa zu *H. Axia*.

17. *Helix Pouchet* Fér. (*Adansoni Webb*) — Achtundzwanzig Stück von St. Cruz und Puerto, die in der Form und Grösse des Gehäuses sehr variiren. Leider enthielt nur ein Exemplar, dessen Mundsaum noch nicht völlig ausgebildet war, das Thier. Bei den Genitalien (Fig. 4) ist bemerkenswerth das Fehlen eines Divertikels am Blasenstiel und die geringe Grösse der wenig verzweigten Schleimdrüsen an der Mündung des Pfeilsackes; vielleicht war das Thier noch nicht geschlechtsreif.

18. *Helix plicaria* Lam. — Achtzehn Stück von St. Cruz. Sie ist im allgemeinen kleiner als die vorige Art und variiert gleichfalls beträchtlich in den Grössen — und Formverhältnissen, wie auch in der Stärke der Beippung. Die Genitalien gleichen, soweit sie bei einem unvollkommen erhaltenen Thier untersucht werden konnten, denen von H. Pouchet. Der Pfeil zeigt die gewöhnliche vierkantige Form der Schneide.

19. *Helix malleata* Fér. — Zweiundzwanzig Stück von Puerto, Laguna und St. Cruz, darunter mehrere lebend. Die Genitalien, Kiefer und Pfeil (Fig. 6—8) sind ähnlich wie bei unseren heimischen *Tachea*-Arten. — Kiefer und Zungen der drei zuletzt erwähnten Arten sind sehr übereinstimmend und fast ganz wie bei unseren *Tachea*-Arten. Es sind 83—91 Längsreihen, der Mittelzahn ist ohne Seitenzähnchen.

die erst beim achten oder neunten Lateralzahn an der Aussenseite und beim zwölften bis sechzehnten auch an der Innenseite auftreten.

20. *Helix consobrina* Fér. — Vier Stück von Adeje.

21. *Helix pisana* Müll. — In vielen Farben- und Bänder-variäten von Puerto, Laguna und St. Cruz.

22. *Helix canariensis* Shuttl. — Zahlreich von Laguna, St. Cruz und Puerto. Wollaston zieht die Art zu *H. lineata* Ol. = *maritima* Drap., in deren Formenkreis sie ja sicher gehört; sie stimmt am besten zu *H. turbinata* Jan. ist nur bedeutend grösser als diese.

23. *Helix conspureata* Drap. — Drei Stück von Agua-Manza.

24. *Helix lancerottensis* Webb et Berth. —

a. *forma typica*. — Zahlreich von Puerto und Agua-Manza.
b. var. *d'Orbignii* Webb & Berth. — Zahlreich von Puerto.
c. var. *mitigata* Mouss. — Zwölf Stück von St. Cruz.

25. *Helix hispidula* Lam. — Zweiundzwanzig Stück von St. Cruz, Laguna, Puerto und Adeje. Die Untersuchung der Genitalien und des Kiefers bei einem Exemplar (Fig. 5) zeigte die Zugehörigkeit der Art zu *Gonostoma*. Namentlich steht ihr *H. Rangiana* Fér. (Moquin Tandon, Hist. nat., Tab. 10, fig. 17—22) in anatomischer Beziehung sehr nahe.

26. *Helix fortunata* Shuttl. — Neun Stück von St. Cruz.

27. *Helix lenticula* Fér. — Zahlreich von St. Cruz, Puerto und Adeje.

28. *Helix phalerata* Webb & Berth. — Siebzehn Stück von St. Cruz, Puerto und Adeje.

29. *Helix persimilis* Shuttl. — Zahlreich von Puerto; steht der vorigen Art sehr nahe und ist vielleicht besser mit ihr zu vereinigen.

30. *Helix monilifera* Webb. & Berth. — Sieben Stück von Puerto.

Von den weiter unten aufgezählten Arten des Genus *Buliminus* konnten leider nur von vieren, nämlich von *variatus*, *badiosus*, *helvolus* und *flavoterminatus*, die Thiere untersucht werden. Danach stimmen dieselben sehr untereinander überein: sie haben alle (Fig. 9) einen langen Penisanhang und kein Divertikel am Blasenstiel, gehören danach in die Verwandtschaft von *B. obscurus* oder zu *Napaeus*, wozu die drei ersten Arten schon früher nach den Charakteren der Schale gerechnet wurden, während der vierte von Wollaston mit *B. Consecoanus* Fritsch zu *Chondrulus* gestellt wurde. Der untere Theil des Penisanhanges ist dick und um den Penis herumgeschlungen; weiter nach oben geht er plötzlich in einen langen dünnen Stiel über, der bei *badiosus* allmälig, bei *helvolus* und *variatus* plötzlicher in einen länglich-keulenförmigen Körper übergeht. Penis und Penisanhang sind bald nach ihrer Trennung mit je einem Retractor versehen, der beim Anhang etwas höher sitzt als beim Penis. Einen weiteren Retractor finde ich am Ende des Penis, dicht neben dem seitlich eingefügten *vas deferens*. Kiefer und Radula sind im allgemeinen sehr übereinstimmend, dennoch lassen sich artliche Verschiedenheiten feststellen.

Wegen ihrer nahen Verwandtschaft sind die canarischen *Buliminen* schwer zu identificiren. Zum Glück konnte ich im hiesigen Museum einige Originalexemplare von Shuttleworth vergleichen; auch hatte Herr Smith in London die Freundlichkeit einige Bestimmungen zu revidiren, so dass ich hoffen kann, dass die meisten derselben zuverlässig sind.

31. *Buliminus variatus*, Webb & Berth.

a. forma typica. — Vierzehn Stück von Puerto. Die Radula zeigte bei zwei Exemplaren bei ca. 130 Querreihen 57 und 59 Längsreihen. Schon der erste Seitenzahn hat am äusseren Rande unten ein kleines Zähnchen, der fünf-

zehnte zwei bis drei solcher und die äussersten Randzähne besitzen deren vier bis fünf.

b. var. *roccellicola* Webb & Berth. — Drei Stück von St. Cruz.

32. *Buliminus helvolus* Webb & Berth. — Vierundzwanzig Stück von St. Cruz und Puerto, von letzterer Lokalität sehr gross, bis 19 mm lang. Bei den Genitalien, (Fig. 10) ist der intere Theil des Penisanhanges etwas anders gebildet als bei *badiosus*. Die Radula zeigte 145 Querreihen und 67 Längsreihen: erst der achte Seitenzahn hat aussen am Grunde ein kleines Zähnchen; sonst wie bei voriger Art.

33. *Buliminus badiosus* Fé. — Zahlreich von St. Cruz. Die Radula hat ca. 180 Querreihen und 63—65 Längsreihen, gleicht sonst der von *helvolus* (Genitalien Fig. 9).

34. *Buliminus propinquus* Shuttl. — Fünf Stück von Vilaflor.

35. *Buliminus nanodes* Shuttl. — Im ganzen fünf Stück von St. Cruz, Vilaflor und Agua Manza. Die Form der Gehäuse ist selbst von denselben Fundorten nicht ganz übereinstimmend.

36. *Buliminus baeticatus* Fé. — Ein ausgewachsenes Stück von St. Cruz und zwei jugendliche von Puerto.

37. *Buliminus Tarnierianus* Grasset. — Drei Stück von Mercedes und Agua Manza, die aber in ihrer Form nicht ganz übereinstimmen.

38. *Buliminus flavoterminalis* Woll. — Sechs Stück von St. Cruz. Für diese Art habe ich weder Vergleichsmaterial noch Abbildungen zu Rathe ziehen können; vielleicht gehört der *B. delendus* von J. Mabille (l. c. taf. 17, fig. 5) hierher. Von den Genitalien konnte nur der Penis mit einem Anhang zur Ansichtung gebracht werden; der erstere hat ungefähr in der Mitte ein kleines Divertikel, so lang wie der Penis an der Stelle breit ist. Die Radula

zeigt ca. 120 Querreihen und 71 Längsreihen. Schon der erste Seitenzahn zeigt, wie bei variatus, ein Zähnchen unten am Aussenrande, aber die letzten Randzähne sind schmäler als bei den anderen untersuchten Arten und haben infolgedessen nicht so viel Seitenzähnchen.

39. *Stenogyra decollata* L. — Zahlreich bei St. Cruz, wurde aber bei Orotava nicht beobachtet.

40. *Pupa umbilicata* Drap. var. β . *anconostoma* Lowe. — Zahlreich von Puerto und Agua Manza, namentlich unter Steinen.

41. *Ferussacia folliculus* Gron. = *F. Reissii* Mousson. Zahlreich von St. Cruz. Ich finde keinen Unterschied von typischen Exemplaren aus Sicilien; Schleimporus am hinteren Körperende, Kiefer und Radula waren vollkommen übereinstimmend.

42. *Auricula aequalis* Lowe. — Dreizehn Stück von Puerto.

43. *Alexia Firmini* Payr. — Zwei Stück von Puerto.

44. *Pedipes afra* Gmel. — Zwei Stück, mit den beiden vorigen am Strande von Puerto. — Die letzten beiden Arten sind neu für Tenerifa.

45. *Physa acuta* Drp. — Zahlreich von Puerto und Adeje in den Behältern der Wasserleitungen.

46. *Ancylus striatus* Q. et Gaim. — Zahlreich von Puerto, St. Cruz und Adeje.

47. *Cyclostoma canariense* d'Orb.

a. var. β *rericostata* Woll. — Vier Stück von Puerto.

b. var. γ *inaequalis* Woll. — Sechs Stück von St. Cruz und Adeje.

48. *Hydrocaena gutta* Shuttl. — Zehn Stück, von feuchten Felsen im Bar. del Castro. Deckel und Radula zeigten das typische Verhalten.

49. *Pisidium canariense* Müll. — Zwölf Stück von Puerto.

Eine vollständige Sammlung der in obigem Verzeichniss erwähnten Arten ist dem Berliner Zoologischen Museum übergeben worden.

Arthur Krause, Berlin, im März 1894.

Figurenerklärung.

- Fig. 1. *Amalia gagates*, Drap: Spermatophore, 5 ×; a, ein Stachel 30 ×.
Fig. 2. *Gibbulina dealbata* Webb & Berth; halbes Glied der Radula, 130 ×.
Fig. 3. *Gibbulina dealbata*; Genitalien, 8 ×.
Fig. 4. *Helix Pouchet* Fér; Genitalien, 3½ ×.
Fig. 5. *Helix hispidula* Lam; Genitalien, 6½ ×.
Fig. 6. *Helix malleata* Fér; Genitalien 3 ×.
Fig. 7. , , ; Pfeil 6 ×.
Fig. 8. , , ; Kiefer 16 ×.
Fig. 9. *Buliminus badiosus* Fér; Genitalien, 6 ×.
Fig. 10. *Buliminus helvolus* Webb & Berth; unterer Theil des Penis und seines Appendix 6 ×.

In allen Figuren bedeuten:

ap	— Appendix des Penis	ra	— Retractor des Appendix
cl	— Cloake.	rs	— Receptaculum seminis
d	— Divertikel am Blasenstiel	p	— Penis
e	— Eiweissdrüse	pf	— Pfeilsack
fl	— Flagellum am Penis	u	— Uterus
gm	— Schleimdrüsen	v	— Vagina
r	— Retractor des Penis	vd	— Vas deferens.
r'	— Endretractor des Penis		

Miscellen zur deutschen Molluskenfauna.

Von

Dr. A. Hortzschansky.

1. Zur Fauna der Hainleite.

Bei einem achttägigen Aufenthalte in Hainrode an der Hainleite, Pfingsten 1894, wurden folgende Mollusken in der Umgegend, besonders am Gatterberge und der Webelsburg beobachtet: *Vitrina pellucida* Müll., *Hyalina nitidula* Drap., *pura* Ald., *contracta* West., *fulva* Müll., *Patula pygmaea* Drap. und *rotundata* Müll., *Helix aculeata* Müll., *costata* Müll., *laticida* L., *obvoluta* Müll., *strigella* Drap., *incarnata* Müll., *hispida* L., *ericorum* Müll., *candidula* Stud., *hortensis* Müll., *nemoralis* L., *pomatia* L. *Bulimus montanus* Drap. u. *obscurus* Müll., *Pupa muscorum* L. *Clausilia laminata* Mont., *ventricosa* Drap., *plicatula* Drap., *dubia* Drap., *nigricans* Pult., *parvula* Stud., *Succinea Pfeifferi* Ross., u. *oblonga* Drap., *Acme polita* Hm. (Ein Stück gesiebt). *Garychium minimum* Müll.

Von *Helix hispida* fanden sich vereinzelt albine Stücke von milchweisser Farbe u. mit starker Mundsaum-Lippe, fast ohne Behaarung und von *H. laticida* waren weisse Stücke häufig. Daneben fand sich ein Exemplar von *laticida* mit der gewöhnlichen Farbe, aber völlig ohne Kiel aufgerollt, daher so klein und hoch gewölbt, dass ich es im Dunkel des dichten Buchenwaldes am Gatterberge für einen Augenblick für eine *H. personata* hielt, der es in der Gehäuseform sehr nahe kommt. Eine kaum noch sichtbare Verletzung, die das Thier in seiner Jugend erhalten hat, dürfte die Ursache dieser abnormen Bildung sein. *Helix nemoralis* u. *hortensis* traten beide in sehr kleinen Formen auf, in einem Falle wurde das Vorspiel der Begattung zwischen diesen beiden Arten beobachtet.

Von Wassermollusken fand ich nur *Limnaea ovata* Drap., Trümmer von *Unio batavus* Lam. (vielleicht durch Vögel verschleppt), und im Schlosspark von Hainrode *Pisidium pulchellum* Jen. und *ovatum* Cless., letzteres von besonderem Interesse. Herr O. Goldfuss in Halle — dem ich für freundliche Aushilfe bei der Bestimmung von Pisidiens vielfach zu danken habe, hatte diese Species schon vor Jahren im Harze unweit der Lauenburg gefunden u. sich selbst fand sie 1889 in Thüringen, in Bächen unweit des Trippsteins, hoch über der Schwarza. Der Fundort in der Hainleite verbindet nun die früheren Fundorte. Gelegentliches Austrocknen scheint die Art zu überstehen. In Bächen der Mittelgebirge, die starkes Gefälle haben aber frei von groben Geröll sind, dürfte sie sicher weitere Verbreitung haben.

2. Aus dem Glatzer Schneegebirge.

Veranlasst durch Reinhardts für die Sudeten grundlegende Schrift (O. Reinhardt, über die Molluskenfauna der Sudeten. Berlin 1874. Auch in Archiv f. Naturgeschichte, 40 Jahrg.) sammelte ich Ende August 1894 eine Woche auf allerdings recht beschränktem Gebiete, zwischen dem Wölfelsfall u. der Gipfelplatte des Glatzer Schneeberges. An den feuchten Hängen des Schneeberges, am Mittelberge, im Feueressenloche, in etwa 2500 – 2800 Fuss Höhe fand sich *Vitrina diaphana* Drap. sehr zahlreich, daneben vereinzelt *V. elongata* Drap. und 11 Exemplare von *V. kotulae* West., deren Bestimmung auf Grund der Vergleichung mit einem Originalexemplare Westerlunds erfolgt ist, das Herr Prof. von Martens die Güte hatte mir auf meine Bitte aus der Sammlung des Berliner zoologischen Museums vorzulegen. Für das Deutsche Reich ist die Art neu, der Fundort liegt freilich auch nicht allzuweit von der Reichsgrenze, die über die Gipfelplatte des Schneebergs läuft. Das Vorkommen dieser der Tatra angehörenden Species im Glatzer

Schneegebirge bildet einen weiteren Beleg für Reinhardts Satz, dass der Charakter des Riesengebirges arktisch-alpin, dagegen der des Gesenkes und des Glatzer Schneegebirges karpathisch alpin sei. Von *Helix holoserica* Stud., die am Wölfelsfall in sehr grosser Form auftritt, findet sich an den Gehängen des Schneeberges schon eine der var. *minor* Scholtz sehr nahe Form. Aehnlich variiert auch *H. personata* von diesen beiden Fundorten. Stücke aus dem Feueressenloch haben nur wenig über die Grösse der Thüringer *H. bidens* Chemn. *Clausilia tumida* Zieg. führt sowohl Reinhardt als auch Merkel (E. Merkel, Molluskenfauna von Schlesien. Breslau, Kern 1894) nur nach der alten Angabe bei A. Schmidt (Krit. Gruppen der europäischen Clausilien Leipzig 1857) als am Wölfelsfall vorkommend auf. Sollte die Art später nicht mehr gefunden worden sein, so möge mitgeteilt werden, dass sie auch heute noch am alten Fundorte zu finden ist.

Nachgetragen sei endlich noch das Vorkommen von *Ancylus fluviatilis* Müll. in der Wölfel, hart oberhalb des Falles.

3. Aus der Mark Brandenburg.

Lythoglyphus naticoides Fer. fand ich zuerst im Sommer 1892 und seitdem ständig im Finowkanale in der Nähe von Eberswalde. Die Fundorte für diesen Eindringling dürften in den nächsten Jahren sich wohl stark vermehren. *Planorbis riparius* West. in moorigen Gräben bei Riesenthal. *Bythinella steinii* von Mart. hat allmählich eine so grosse Zahl märkischer Fundorte, dass ich den Fundort im Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal nur der Fangmethode halber mitteile. Das Aussuchen an Ort und Stelle kostet viel Zeit und das Spülen des Schlammes und der Pflanzen in mitgebrachten Wasserbehältern lohnt sich nicht, da die kleinen Thiere mit Vorliebe in den Blattwinkeln der Wasserpest

stecken und sehr fest haften. Nimmt man aber auf gut Glück eine grössere Portion Wasserpflanzen bei warmer Wassertemperatur mit nach Hause und wirft das Pflanzenbündel in einen Eimer voll Wasser, dann kriechen die Thiere in den nächsten Tagen von selbst am Gefässrande in die Höhe. Ich erhielt so bis vierzig Stück aus einem Eimer voll Pflanzen. *Pisidium pallidum* Jeff. (siehe Goldfuss) aus der Schwärze bei Spechthausen, zuerst von Herrn A. Protz vom Berlner zoologischen Museum gefunden. Typisches *Pisidium supinum* Schmidt erbeutete ich im Sommer 1894 im Storkower See und zugleich damit eine Anzahl *Pisidium rivulare* Gless., die von Glessinschen Originalexemplaren, sowohl des Berliner Museums als der Sammlung O. Goldfuss nicht zu unterscheiden sind. Für Norddeutschland ist das wohl der erste Fundort von *P. rivulare* Gless.

—
Diagnosen neuer Arten.

Von

Dr. W. Kobelt.

1. *Helix (Lerantina) eliae* n.

T. globoso conoidea, angustissime perforata vel omnino exumbilicata, solida, ponderosa ruditer striato-costata, sculptura spirali nulla, sub vitro fortiore quoque vix subtilissime granulata, nitidula, griseo-albida, apicem versus fuscescens, seriebus 4 macularum sagittiformium ornata. Spira convexoconoidea, apice magno, obtuso, laevi. Anfractus $4\frac{1}{2}$ regulariter crescentes, superi $2 - 2\frac{1}{2}$ distincte carinati, ad carinam exsertam suturam sequentem impressi, sequentes convexi. sutura linearis albomarginata discreti, ultimus parum dilatatus, obsoletissime subangulatus, angulo versus aper- turam evanescente, basi convexus, antice profunde deflexus, costis incrementi distantibus sculptus. Apertura obliqua.

ovata, vix lunata, intus fuscescens, maculis translucentibus; peristoma album, incrassatum, undique expansum et late reflexum, marginibus conniventibus, callo crasso interdum leviter fuscescente limbato junctis, columellari concavo ad insertionem valde dilatato et incrassato.

Diam. maj. 39, min. 32, alt. 28 mm.

Aufenthalt in der Höhle Burdsch-en-Nisr am Oberlauf des syrischen Krokodilflusses (Nahr-el Zerka) südlich vom Karmel.

Eine prächtige Form, welche ohne Spiralskulptur ist, aber durch den ausgeprägten Kiel der obersten Windungen doch zur Sippschaft der *Helix spiriplana* verwiesen wird.

2. *Helix (Phania) kükenthali* n.

T. late sed obtecte umbilicata vel omnino exumbilicata, lentiformis, acutissime carinata, fere aequaliter utrinque convexa, solidula, confertim costulato-striata, in anfractu ultimo malleata et rugis obliquis super carinam sculpta, unicolor saturate fusco-rufa; spira tectiformis apice parvo, obtusulo. Anfractus 5 leniter et regulariter crescentes, primi $1\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura linearis, sequentes plani, carina plus minusve exserta suturam sequente, ultimus haud latior, acutissime carinatus, carina utrinque compressa subundulata, sub vitro fortiore subtilissime spiraliter lineatus, basi convexus, circa umbilicum gibboso-inflatus, antice leniter descendens. Apertura perobliqua, extus angulata, ovato-triangularis, valde lunata, fere securiformis; peristoma undique late reflexum, sanguineum, marginibus distantibus, vix callo tenuissimo junctis, basali parum arcuato, columellari breviter ascende, plica tuberculiformi plus minusve distincta armato, supra dilatato, sulco spirali definito, umbilicum interdum omnino, interdum $\frac{1}{2}$ tantum occludente.

Diam. maj. 68, alt. 30 mm.

Hab Halmahera Moluccorum, leg. cl. Kükenthal.

Durch den scharfen Kiel und die flachen Umgänge von *Helix brunonis* und *laupas* genügend verschieden, aber doch vielleicht mit beiden (und dann wohl auch mit *pyrostoma*) durch Zwischenformen verbunden.

**Ein neuer Fundort für *Xerophila striata* M.
var. *Nilsoniana*.**

Von
G. Wehner.

Ende September des verflossenen Jahres unternahm ich einen Sammelausflug nach Ochsenfurt und besuchte hierbei aufs Geradewohl auch eine, in der Nähe des Bahnhofs gelegene Kiesgrube, die vom Damme eines Bahngleises begrenzt ist.

An der inneren Seite dieses Damms fand ich einige Exemplare lebender Schnecken, die mir bis dahin noch nicht zu Gesicht gekommen waren, weshalb ich dieselben Herrn Clessin zur Bestimmung vorlegte. Nach seinem Urteil waren es *Xerophila striata* var. *Nilsoniana* B., jedoch in aussergewöhnlich grossen Exemplaren. Als ich acht Tage später die Fundstelle wieder aufsuchte, bemerkte ich auf den links von der Strasse zur Kiesgrube gelegenen Kleefeldern gleichfalls diese Varietät in einzelnen Stücken. In sehr grosser Anzahl jedoch traf ich die Schnecke an der äusseren Seite des Damms in Gesellschaft einer Menge von *Xeroph. ericetorum* und unter diesen auch mehrere wohl ausgebildete var. *lutescens*.

Auffallend ist, dass unter den vielen Exemplaren der Varietät *Nilsoniana*, welche ich bei Ochsenfurt einsammelte, sich kein einziges der Art selbst befand. Bei dem völlig isolirten Auftreten der v. *Nilsoniana* vermuthe ich, dass die Thiere mit Futterpflanzen oder Sämereien eingeschleppt

wurden, und möchte ich, da meines Wissens die mehr erwähnte Schnecke in Unterfranken bis jetzt noch nicht beobachtet wurde, diesen neuen Fundort hiermit constatirt haben.

Kleinere Mittheilungen.

In der Sitzung der Société zoologique de la France theilte Herr L. Joubin mit, dass er in dem Magen eines im Mittelmeer gefangenem Delphins folgende Cephalopoden gefunden habe: *Enoploteuthis marginifera*, *Chiroteuthis veranyi*, *Loligo vulgaris*, *Todarodes sagittatus*, *Onychoteuthis lichtensteini* und *Ctenopteryx cyprinoides* n., also eine wahre Sammlung von Raritäten.

Hedley hat beobachtet, dass auf den australischen Austerbänken *Ricinula marginata* Blainv. die Austern anbohrt und erheblichen Schaden anrichtet.

Im Journal of Malacology theilt Hedley mit, das in China eine *Paludina* (wahrscheinlich *chinensis* Gray) verwendet wird, um das Wasser in welchem die Rohseide geröstet wird, algenfrei zu halten. Die Schnecken weiden sowohl die Gefässwände als auch die Seide ab, ohne letztere zu schädigen.

Aus dem Nautilus entnehmen wir, dass sich in Long Beach (California) ein wie es scheint hauptsächlich aus Damen bestehender Conchologischer Club unter dem Titel the Long Beach (California) Conchological Club gebildet hat, welcher sich die specielle Erforschung von Los Angeles County zum Ziel gesetzt hat. Vorsitzende ist Miss I. M. Shepard. Die Damen sind zur Anknüpfung von Tauschverbindungen bereit.

Literaturbericht.

L'Échange, Revue Linnaéenne IX.

No. 104. p. 86. Locard, Arnould. Notices Conchyliologiques. XXIV.
Description de quelques *Helix* nouveaux pour la faune fran-
caise. (*Niepeei* n. neben *niciensis*; -- *subfruticum* n. neben
fruticum; -- *opimata* n. neben *incarnata*; -- *falsani* n. neben
bidens; *avarica* n. neben *carthusiana*).

No. 105. id. XXV. Sur le genre *Tropidocochlis*. (für *Hel. explanata* und *elegans* nebst Verwandten).

No. 106. id. XXVI. Description de quelques *Hyalinies* nouvelles. — (*Hyal. disculina*, *terveri*, *recta* aus der Gruppe der *septentrionalis*, *exaequata* aus der der *pseudohydatina*).

Le Naturaliste Vol. XVI. No. 174.

p. 120. Jousseaume, le Dr., Description d'un Mollusque nouveau (*Ampullaria tenuissima* aus Ecuador).

p. 131. — —, Descriptions de Mollusques nouveaux. — *Dosinia spaldingi* aus dem rothen Meer; — *Mactra zellwegeri* (mit Holzschnitt) von Sansibar.

p. 136. — —, *Phengus Gouldi*, mit Holzschnitt (= *Cochl. evanescens* Brod).

p. 167. — —, *Gancilla Innesi* von Aden, *G. Beyerlei* von den Andamanen, mit Holzschnitt.

p. 186. — —, Description d'une Coquille nouvelle (*Axina beloni*), mit Photographie.

p. 201. — —, Descriptiou de Coquilles nouvelles (*Daetylus tripartitus* und *Scalptia Mac Conkeyi* von Aden).

p. 227. — —, Descriptions de Mollusques nouveaux (*Malvafundus irregularis* und *Pinna epica* von Japan).

Smith, Edgar A., Natural History Notes from H. M. Indian Marine Survey Steamer „Investigator“ Commander C. F. Oldham, R. N. Series II No. 10. Report on some Mollusca dredged in the Bay of Bengal and the Arabian Sea.

In Ann. Mag. N. R. (6) XIV p. 159 pl. 3—5. — *Neu Conus coromandelicus* t. 4 fig. 1, 2; — *Pleurotoma* congener t. 3 fig. 4, 5; — *Surecula subeorpulenta* t. 3 fig. 6; — *Murex malabaricus* t. 3 fig. 3; — *Nassaria coromandelica* t. 4 fig. 3; — *Latirus andamanicus* t. 3 fig. 9; — *Lacuna indica* t. 4 fig. 7; — *Sigaretus tener* t. 4 fig. 8; — *Capulus lissus* t. 4 fig. 4—6; — *Turbo indicus* (von peloritanus kaum zu trennen) t. 4 fig. 13; — *Scaphander andamanicus* t. 4 fig. 15; — *Lepidopleurus similis* t. 4 fig. 9—12; *Dentalium profundorum* t. 4 fig. 18; — *D. usitatum* t. 4 fig. 16; — *D. insolitum* t. 4 fig. 17; — *Caryatis pudicissima* t. 5 fig. 3, 4.

Friedel, E., zur Weichthierkunde der Provinz Brandenburg.
(Aus den Sammelkästen des Märkischen Museums).

In Brandenburgia No. 6. September 1894.

Enthält Bemerkungen über *Valvata macrostoma*, über die Weichthiere der Umgebung von Berlin, über Landschnecken von Pankow, über Aussetzungsversuche mit *Helix austriaca* und *candicans*, über *Unio crassus* Retz., *batavus* Lam., Mülleri Rossm., *Lithoglyphus naticoides*, eine linksgewundene *Hel. pomatia*, *Helix candicans* Zgl. ein von S. Futh verfasstes Verzeichniss der Weichthiere um Königsberg in der Neumark, und über Dreissena polymorpha, welche im Volksmunde dort den Namen Schafklaue erhalten hat und so häufig geworden ist, dass man sie zum Kalkbrennen verwenden kann.

Babowski, T., Museum Dzieduszycki. Mieczak (Mollusca) Edidit A. M. Loninicki. Lwow. 1893. 204 pg. cum 13 tab. partim coloratis. Polnisch. Mir nicht zu Gesichte gekommen.

Kobelt, Dr. W., Zweiter Nachtrag zur Fauna der nassauischen Mollusken. In Jahrb. nass. Verein f. Naturkunde Jahrg. 47 p. 85—89 pl. 4.

(*Unio battonensis* n. aus der oberen Eder, *Lithoglyphus naticoides* und Varietäten von *Limnaea peregra*).

Pilsbry, Henry A., List of Port Jackson Chitons collected by Dr. J. C. Cox, with a revision of Australian Acanthochitidae. In Proc. Acad. Philad. 1894 p. 69—89 pl. 2—4.

Die neuen Arten sind schon im Nautilus vorläufig beschrieben. Zum erstenmal abgebildet werden *Acanthochites retrojectus* t. 2 fig. 12—15; — *asbestoides* Carp. t. 3 fig. 16—20; — *coxi* t. 2 fig. 7—11; — *speciosus* H. Ad. t. 4 fig. 31—33; — *mathewsi* Bedn et Psbry. t. 4 fig. 27—30. — *Chiton Coxi* n. p. 85; — *Liolophura gaimardi queenslandica* p. 87.

Hedley, C., on some naked Australian marine Mollusca. Part I. — In Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX p. 126 pl. VII. *Oscanius hilli* n.

Hedley, C., the Faunal Regions of Australia. In Rep. Adelaide Meeting Australas. Assoc. f. Adv. of Science 1894. Der älteste Bestandtheil der australischen Fauna ist der autochthone, vielleicht über Timor und jedenfalls schon vor der Kreidezeit eingewandert, dann folgte der eurynotische, der auf eine süd-

amerikanische Quelle hinweist und Tasmanien vielleicht erst in der Miocänzeit erreichte, schliesslich wanderte in der späteren Tertiärzeit das papuanische Element nach Queensland ein.

Hedley, C., Description of Calliostoma purpureocinctum, a new australian Shell. In Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX p. 35. Woodcut.

Henn, Arnold U. List of Mollusca found at Green Point, Watsons Bay, Sidney, with a few remarks upon some of the most interesting species and descriptions of the new species by John Brazier. In Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX p. 105—182 pl. 14.

Neu Peristernia rudolphi p. 166 fig. 1: — Marginella nympha p. 168 fig. 2: — Clathurella edwini p. 168 fig. 3: — Vanicoro gracilis p. 169 fig. 4: — Turbonilla scalarina p. 170 fig. 5: — Eulimella pulchra p. 170 fig. 6: — Odostomia indistincta p. 171 fig. 7: — Od. henni p. 171 fig. 8: — Bittium variegatum p. 172 fig. 9: — Triforis graniferus p. 473 fig. 10: — Rissoa (Apicularia) strangei p. 173 fig. 11: — R. (Alvinia) ochroleuca p. 174 fig. 12: — Homologyra pulcherrima p. 175 fig. 13: — Glyphis watsoni p. 177 fig. 15: — Puncturella henniana p. 177 fig. 14.

Babor, J. F., über den Cyclus der Geschlechtsentwicklung der Stylommatophoren. In Verh. deutschen zoolog. Gesellsch. 1894 p. 55. Zahlreiche Nacktschneckenarten sind anfangs nur weiblich, werden dann Zwitter und schliesslich durch Verkümmерung der weiblichen Organe reine Männchen.

Haller, Dr. Bela, Studien über rhipidoglosse und docoglosse Prosobranchier, nebst Bemerkungen über die phyletischen Beziehungen der Mollusken untereinander. Leipzig, Engelmann 4. Mit 12 Tafeln und 6 Textfiguren.

Journal de Conchyliologie. Vol. XLII No. 1.

- p. 5. Crosse, H., Paul Fischer (avec portrait).
- p. 13. Fischer, H., Note sur le bras hectocotylisé de l' Octopus vulgaris Lam.
- p. 19. Vayssiére A., Etude zoologique de la Scissurella costata var. laevigata.

Bulletino della Società malacologica italiana. Vol. XVIII. 1893.

Fogl. 8—10 (10 Aug. 1894.)

- p. 113. Picaglia, L., Aggiunte al Catalogo dei Molluschi terrestri e fluviali viventi nelle provincie di Modena e Reggio.
- p. 118. Fucini, A., Nuovi Fossili della Oolite inferiore del Capo S. Vigilio sul Lago di Gardo. (*Neu Lima Taramellii*, *Modiola Boehmi*, *Pholadomya Vigilii*, *Cardium benacense*, *Gonomya Paronai*, *Emarginula? Vigilii*, *Trochus paealpinus*, *Tinetoceras Gemellarii*, *Atiactites? Beneckeii*).
- p. 129. Sacco, Federico, le Variazioni dei Molluschi.

Sterki, Dr. V., the Land- and Freshwater Mollusca in the Vicinity of New Philadelphia. A Contribution to the Natural History of Tuscarawas Co., Ohio.

151 sp., keine neu, mit Ausnahme eines unbenannten Pisidium.

Regel, Dr. Fr., Thüringen, ein geographisches Handbuch.
Kap. 15. *Die Weichthiere (Mollusca).* Jena 1894.

Enthält sehr interessante Untersuchungen über die geographische Verbreitung zahlreicher Arten und ist auch über die Grenzen Thüringens hinaus von Interesse. Aufgeführt werden 137 Arten, bei den seltneren auch die speciellen Fundorte.

Proceedings of the Malacological Society of London. Vol. I
No. 4.

- p. 141. Smith, Edg. A., Non marine Shells from Arabia. Acht Arten vom Dschebel Akthar im Inneren von Oman: *Helix derbentina*, *Bul. omanensis* n., *B. jousseaumi* n., *B. insularis* Ehrbg., *Melania tuberculata* Müll., *M. elegans* Bens. und *Limnaea arabica* n.
- p. 143. Woodward, M. F., on the anatomy of *Pterocera*, with some notes on the crystalline style. — (pl. XI).

Eingegangene Zahlungen:

Goldfuss, H., 6 Mk.; — Riemenschneider, N., 6 Mk.; — Schmid, W., 6 Mk.; — Seibert, E., 6 Mk.; — Kinkel, F., 6 Mk.; — Salm-Salm, A., 6 Mk.; — Frühstorfer, B., 6 Mk.; — Fulton, L., 6 Mk.; — Rosen, A., 6 Mk.; — Ponsonby, L., 6 Mk.; — Metzger, M., 6 Mk.; — Strubell, F., 6 Mk.; — v. Martens, B., 6 Mk.; — Fietz, St., 6 Mk.; — Paessler, B., 6 Mk.; — Tschapeck, W., 6 Mk.; — Wehner, W., 6 Mk.; — Arndt, B., 6 Mk.; — Löbbecke, D., 6 Mk.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Siebenundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Die marinen Mollusken der Philippinen (IV)
nach den Sammlungen des Herrn José Florencio Quadras
in Manila.

Von

Prof. Dr. O. Boettger in Frankfurt (Main).

(Fortsetzung zu Nachr.-Blatt d. d. Mal. Ges. 1893 pag. 97—115
153—167 und 185—193).

IV. Die Pleurotomiden. (Schluss.)

74. *Cithara (Cithara) conohelicoides* (Rye.)

Dalaguete auf Cebu (Cuming), Philippinen (Mus. Berolin.).

75. *Cithara (Cithara) planilabroides* Tryon.

Insel Ticao (Cuming), Bacon, Prov. Albay, Luzon (coll.
Quadras No. 52).

Von dieser Art liegt nur ein abgerolltes Stück vor mit 11 Vertikalfalten auf der vorletzten, 10 auf der letzten Windung. — Alt. 8, diam. max. $3\frac{1}{8}$ mm.

76. *Cithara (Cithara) planilabrum* (Rve.)

Sibonga auf Cebu (Cuming). Philippinen (Mus. Berolin.).

77. *Cithara (Cithara) cithara* (Gould).

Puerto Princesa auf Paragua (coll. Quadras No. 3) und Inseln Luchan (No. 11) und Balauan bei Mindanao (No. 2264). — Fidjis (Gould) und Paumotu-Inseln (Pease).

Vorletzter Umgang mit 10 — 11 Vertikalrippen. Mit zahlreichen braunen Spiralzonen umgürtet und überdies mitunter der Rückentheil des letzten Umgangs mit einem breiten dunkelbrauen Oberbande, das auch in der Mündung sichtbar ist. — Alt. $8\frac{1}{2}$ — 10, diam. max. $3\frac{5}{8}$ — $4\frac{1}{4}$ mm. — Der Gehäuseform nach ist es eine *Mangilia*, der Zähnelung beider Mundlippen wegen eine echte *Cithara*.

78. *Cithara (Cithara) zonata* (Rve.)

Ticao (Cuming). Philippinen (Mus. Berolin.). Insel Balabac bei Paragua (coll. Quadras No. 5). — Salomons-Inseln (E. A. Smith).

Die $7\frac{1}{4}$ mm lange, $3\frac{1}{8}$ mm breite Art hat 8 — 9 Rippen auf dem letzten Umgange, sehr feine, etwas ungleiche Spiralskulptur und Zahnfältchen auf beiden Lippen, steht aber, wie die vorige Art, im Habitus *Mangilia* entschieden näher als der Gattung *Cithara*.

79. *Cithara (Cithara) compressicosta* n. sp.

Char. Aff. *C. citharae* (Gould), sed t. minore, unicoloore, ovato-oblonga, subtus latiore, costis compressis 6 — 8 in anfr. ultimo, columella non plicatula discrepans. — T. ovato-oblonga, solida, opaca, alba; spira elate conica lateribus convexis; apex acutissimus. Anfr. 8 contubulati, ad suturam profundam undulatam convexi, tum plani, penultimus basi

fere angustatus, exceptis embryonalibus lineolis spiralibus tenuissimis regularibus nec non costis verticalibus angustis compressis — 8—10 in anfr. penultimo, 6—8 in ultimo — ornati, ultimus initio lateribus subparallelis, deorsum parum angustatus, $\frac{4}{7}$ altitudinis testae aequans. Apert. anguste fusiformis, superne recedens et leviter canaliculata, sinu distineto instructa, labio dextro acuto, extus compresse varicoso, varice lato plano, spiraliter lineolato, intus serie denticulorum munito, canali fere nullo, basi leviter emarginato, columella longa obliqua, substricta, haud plicatula. — Alt. $6\frac{3}{4}$ — $8\frac{1}{4}$, diam. max. $2\frac{3}{4}$ — $3\frac{1}{4}$ mm; alt. apert. $3\frac{3}{4}$ — $4\frac{1}{2}$, lat. apert. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{5}{8}$ mm.

Fundort: Siquijor (von Moellendorff 1890) und Ulugan auf Paragua (coll. Quadras No. 28). — Omata-Merizo (No. 23) und Retillan (No. 2967) auf Guajan, Marianen.

Bemerkungen: Diese, abgesehen von der Bezahlung der rechten Mundlippe ganz an die typische Mangiliensform erinnernde Art ist der *C. cithara* (Gould) nächstverwandt, weicht aber von ihr ab durch die schärferen, weniger zahlreichen, weitläufiger gestellten Vertikalrippen, die an der Basis weniger eingezogene letzte Windung und den Mangel der Zähnelung des linken Mundrandes.

80. *Cithara (Cithara) gracilis* (Rve.)

Insel Ticao (Cuming) und Placer auf Mindanao (coll. Quadras No. 1934). — Mauritius (Paetel), Réunion (Deshayes), Fidjis (Garrett).

Gehört in die Gruppe der vorigen Art. — Das Stück von Mindanao hat bei $8\frac{1}{2}$ Umgängen $9\frac{1}{2}$ mm Länge und $3\frac{1}{4}$ mm Breite, 13 Vertikalrippen auf dem vorletzten und 10 auf dem letzten Umgang.

81. *Cithara (Cithara) capillacea* (Rve.)

Insel Burias (Cuming), Philippinen (Mus. Berolin.). — Salomonsinseln (E. A. Smith), Nordaustralien (Brazier).

82. *Cithara (Cithara) stromboides* (Rve.)

Inseln Bohol (Cuming) und Balauan bei Mindanao (coll. Quadras No. 2271). — Rotes Meer (Rüppell).

Das grösste vorliegende Stück misst alt. $15\frac{1}{2}$, diam. max. 7 mm.

83. *Cithara (Cithara) elegans* (Rve.)

Insel Mindoro (Cuming).

84. *Cithara (Cithara) pulchella* (Rve.)

Insel Ticao (Cuming) und Magallanes auf Sibuyan (coll. Quadras No. 1723).

Das noch nicht ganz erwachsene Stück von Sibuyan zeigt eine Länge von nur 9 mm.

85. *Cithara (Cithara) rexillum* (Rve.)

Philippinen (Cuming).

86. *Cithara (Cithara) lamellata* (Rve.)

Iloilo auf Panay (Cuming).

87. *Cithara (Cithara) reevei* Tryon.

Inseln Ticao und Bohol (Cuming), Luban (coll. Quadras No. 2273), Magallanes auf Sibuyan (No. 1723), Cebú (Cuming, v. Moellendorff 1890), Pinamonajan auf Cebú (No. 25), Siquijor (von Moellendorff 1890), Dapitan auf Mindanao (No. 112), Insel Rita bei Paragua (No. 1367). — Neukaledonien (coll. Boettger 1882).

Die Art ist meist leicht an dem hellen Flecken auf der Schulterkante am Ausschnitt der Mündung kenntlich. Stücke von Cebú messen alt. $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$, diam. max. 3 bis $3\frac{1}{2}$ mm, solche von Luban $10\frac{1}{2}$ und $4\frac{1}{2}$, die aus Neukaledonien $12\frac{1}{2}$ und $5\frac{1}{4}$ mm.

Die kleinere und schärfster spiralgestreifte Form von Cebú hat Reeve *Mangilia cebuensis* genannt; sie ist durch Uebergänge mit dem Typus verbunden.

88. *Cithara (Cithara) diconus* n. sp.

Char. Aff. *C. reevei* Tryon sed zona infrasuturali subexcavata, verticaliter non costata. — T. fusiformi-biconica, solida, opaca, unicolor alba; spira elate conica lateribus convexiusculis; apex acutissimus. Anfr. 8 superne planati vel leviter excavati, subtus subangulati et levissime gradati, ad angulum nodulosi, nodulis in singulo anfractu 12—13, subtus in costas verticales angustas, parum altas, basin versus evanescentes prolongatis, et lineolis spiralibus minutissimis, crassitudine alternantibus undique cincti, ultimus supra medium acute angulatus, zona umbilicali subexcavata, basi regulariter attenuatus, $\frac{3}{5}$ altitudinis testae aequans. Apert. angusta linearis, superne canaliculata, incisione lata, parum profunda instructa, labio dextro acuto, extus varice lato compresso cincto, intus denticulis 11 munito, canali fere nullo, basi leviter emarginato, columella longa, subobliqua, superne leviter excavata, undique undatim transversim plicatula. — Alt. $10\frac{3}{4}$, diam. max. $4\frac{7}{8}$ mm; alt. apert. $6\frac{3}{4}$, lat. apert. $2\frac{1}{2}$ mm.

Fundort: Bis jetzt von Herrn J. Flor. Quadras nur bei Retillan auf Guajan, Marianen (coll. No. 24) gefunden.

Bemerkungen: Leicht von der nächstverwandten *C. reevei* Tryon durch die schärfere Schulterkante zu unterscheiden, auf der spitze Höckerchen stehen, die nach unten hin in Vertikalfalten auslaufen, während die breite, leicht ausgehöhlte Nahtzone davon freibleibt.

89. *Cithara (Cithara) interrupta* (Rve.)

Insel Ticao (Cuming). — Mauritius, Rothes Meer, Ceylon, Sandwichs-Inseln (Tryon).

90. *Cithara (Cithara) gibbosa* (Rve.)

Insel Ticao (Cuming) und Badajoz auf Tablas (coll. Quadras No. 1723). — Schwanenfluss, Westaustralien (Tryon).

Von Tablas nur ein abgeriebenes Stück von alt. 10, diam. max. $4\frac{1}{2}$ mm.

91. *Cithara (Cithara) tririttata* (Ad. Rve.)

Philippinen (Adams & Reeve und Mus. Berolin.). — Darnley-Insel, Nordaustralien (Brazier).

92. *Cithara (Cithara) funiculata* (Rve.)

Inseln Ticao und Masbate (Cuming), Philippinen (Mus. Berolin.), Cebú (coll. Quadras No. 106, O. Koch 1895).

Stücke von Cebú messen alt. 18, diam. max. 7 mm.

93. *Cithara (Cithara) cylindrica* (Rve.)

Cagayan, Prov. Misamis, Mindanao (Cuming). — China (Paetel, Mus. Berolin.).

94. *Cithara (Cithara) fusiformis* (Rve.)

Insel Corrigidor (Cuming), Philippinen (Mus. Berolin.).

Ueber diese Art wage ich kein Urtheil; es ist vielleicht eine nicht völlig erwachsene *Cithara*, bei der die Kerbung der Aussenlippe noch nicht ausgebildet ist.

95. *Cithara (Cithara) tenebrosa* (Rve.)

Cagayan, Prov. Misamis, Mindanao (Cuming), Philippinen (Mus. Berolin.).

96. *Cithara (Cithara) lyrica* (Rve.)

Insel Burias (Cuming).

97. *Cithara (Cithara) turricula* (Rve.)

Insel Ticao (Cuming), Philippinen (Mus. Berolin.). — Mauritius (Tryon).

98. *Cithara (Cithara) bicolor* (Rve.)

Insel Ticao (Cuming), Philippinen (Mus. Berolin.). — Darnley-Insel, Nordaustralien (Brazier).

Sect. 2. Citharopsis A. Ad.

99. *Cithara (Citharopsis) solida* (Rve.)

Insel Burias (Cuming).

Gen. VIII. Clathurella Carp.

In dieser Gattung vereinige ich sehr verschiedenartige Schalen, die ich nach dem Habitus in einige mehr oder weniger gut begrenzte Sectionen gruppiere, es der Zukunft überlassend, ob dieselben Anspruch auf generische Anerkennung haben.

Sect. 1. *Bellardiella* P. Fischer.

Die Arten der Gruppe der *Pleurotoma cardinalis* Rye., die von Tryon als *Mangilia* aufgefasst worden sind, während ihre tertiären Vorläufer *Pl. subtilis* Ptsch., *juliana* Ptsch., *luisae* Semp., *crassivaricosa* Bell., *scrobiculata* Michti., *sassii* Bell. u. a. allgemein als Clathurellen (Bellardi's Sect. 1 von *Clathurella*) betrachtet werden, unterscheiden sich von der typischen Form der Sektion. *Bellardiella gracilis* (Mtg.) des Mittelmeers, nur durch den etwas kürzeren Kanal und eine leichte Querfaltung der Spindel. Gemeinsam ist allen Arten dieser Gruppe, dass das Gewinde länger ist als der letzte Umgang — meist $1\frac{1}{2}$ bis 2 mal länger — und dass die Spiralskulptur aus sehr zarten, schmalen und oft gleichstarken Fäden besteht, die immer um das Vielfache schwächer sind als die Vertikalrippen. Unmittelbar vor der Mündung setzt diese Vertikalskulptur häufig aus, um sich schliesslich zu einem bemerkenswerth kräftigen, kantig vortretenden, vertikalen Nackenwulst zu erheben. Die immer scharfe und schneidende Ausenlippe ist stark vorgezogen und pflegt die Mündung erheblich zu verengern; am Innenrande der Ausenlippe stehen Fältchen oder Zähne. Der tiefe Ausschnitt ist von der Naht durch eine vorn zu einem Knötchen verdickte Auflagerung mehr oder weniger deutlich nach abwärts gedrückt; die Spindel ist (bei der typischen und bei einigen fossilen Arten) glatt oder (bei den tropischen und gewissen fossilen Arten) mit einigen schwachen Querfältchen besetzt.

100. *Clathurella (Bellardiella) cardinalis* (Rve.)
Insel Negros (Cuming).

101. *Clathurella (Bellardiella) crassilabrum* (Rve.)
Inseln Ticao und Masbate (Cuming) und Balauan bei
Mindanao (coll. Quadras No. 56). — Darnley-Insel, Nord-
australien (Brazier), Hakodade, Japan (Schrenck).

Von Balauan liegt ein farbloses Stück mit 10 Vertikalfalten auf dem letzten Umgang vor. — Alt. $10\frac{1}{2}$, diam. max. $4\frac{1}{4}$ mm.

102. *Clathurella (Bellardiella) arctata* (Rve.)
Insel Corrigidor (Cuming). — Darnley-Insel, Nord-
australien (Brazier).

103. *Clathurella (Bellardiella) rava* (Hinds).
Mindanao (Cuming) und Insel Balabac bei Paragua
(coll. Quadras No. 127).

13 Vertikalfalten auf dem vorletzten Umgang und 6
Zahnleisten auf der Innenseite der Aussenlippe. — Alt. $8\frac{1}{2}$,
diam. max. 3 mm.

104. *Clathurella (Bellardiella) quadrasi* n. sp.
Char. T. parva elongato-turrita, solida, alba; spira-
fere exacte turrita lateribus vix convexiusculis; apex acutus
mammillatus, laevis. Anfr. 8, embryonales angulati, caeteri
ad suturam undulatam appressam leviter declives, tum con-
vexi, costis modice obliquis, leviter compressis, prope aper-
turam evanescitibus — 15 in anfr. penultimo — et liris
spiralibus distinctis costas transgredientibus, crassitudine
alternantibus, sublus validioribus, ad intersectiones sebris
reticulati, ultimus infra medium angulatus, costis angulum
sublus haud transgredientibus, prope canalem constrictus,
ante aperturam dilatatus et crista verticali validissima,
compressa cinctus, $\frac{1}{3}$ altitudinis testae vix superans. Apert.
anguste ovalis, incisione lata et profunda limine nodulifero

a sutura separata, labio dextro acuto arcuatim valde protracto, intus liris circa 8 crenulato, suprema et infima dentiformibus, canali brevi recurvo et ad basin profunde exciso, columella pliculis transversis obsoletissimis corrugata. — Alt. $7\frac{1}{2}$ —8, diam. max. 3— $3\frac{1}{4}$ mm; alt. apert. 3, lat. apert. $1\frac{1}{2}$ mm.

Fundort: Inseln Jinituan (coll. Quadras No. 35) und Calumangan (No. 47) bei Mindanao, je ein von Herrn J. Flor. Quadras erbeutetes Stück.

Bemerkungen: Diese schlanke Form gehört in die nächste Verwandtschaft der vier vorhergenannten Arten, zeigt aber eine kräftige Einschnürung unter der winkelig abgesetzten Oberhälfte des letzten Umganges gegen den Schnabel hin und ist auch wesentlich kleiner als alle genannten Arten. Sie gehört zu dem engeren Kreise der tertiär so verbreiteten Gruppe der *Cl. luisae* Semp. und *subcostellata* (d'Orb.).

Sect. 2. *Lienardia* Jouss.

Ueber diese ebensogut wie die vorige begrenzte Gruppe, die die schönstgefärbten Arten der kleinen Pleurotomiden umfasst, und deren Vertreter Tryon in ganz willkürlicher Weise unter *Glyphostoma* bei den Mangilien unterbringt oder unter *Borsonia* und *Clathurella* beschreibt, hatte ich an Herrn Prof. von Martens einige vorläufige Mittheilungen gemacht und insbesondere erwähnt, dass ich den Typus dieser Section, *Pleurotoma rubida* Hinds, nicht als ein *Glyphostoma* Gabb anerkennen könne. Daraufhin bemerkte v. Martens in seiner Antwort:

„*Pl. rubida* Hinds halte auch ich nicht für ein *Glyphostoma*; unser Museum besitzt zwar leider keine sichere Art von *Glyphostoma*, aber nach den Abbildungen der typischen Arten scheinen mir diese einen ganz anderen Habitus zu besitzen. Dagegen hat Joussæumne eben für

107. *Clathurella (Lienardia) nigrocincta* (Montr.)

Bacon, Prov. Albay (coll. Quadras No. 10) und Bagac, Prov. Bataan (No. 40) auf Luzon, Insel Balauan bei Mindanao (No. 76). — Andamanen (Nevill), Neukaledonien (Montrouzier, coll. Boettger 1882).

Stücke aus Luzon haben nur alt. 6—6½, diam. max. 2⁵/₈—3 mm, während meine Exemplare aus Neukaledonien z. Th. alt. 10¹/₄, diam. max. 4³/₄ mm messen.

Tryon ist sehr im Irrthum, wenn es diese ausgesprochenen Clathurellen der *rubida*-Gruppe zur Gattung *Borsonia* Bell. stellt, die er offenbar nicht aus eigener Anschauung kannte.

108. *Clathurella (Lienardia) marmorosa* (Rve.)

Insel Balauan bei Mindanao (coll. Quadras No. 2263 und 2270).

Die vorliegenden Stücke sind nur 5—5½ mm lang, haben aber sonst alle Kennzeichen der Art, die gedrungene, rauh skulptierte Schale und die halsartige Abschnürung vor dem Schnabel. Die Knötelchen des zweiten und des sechsten Spiralkiels der Schlusswindung sind röthlichbraun gefärbt.

109. *Clathurella (Lienardia) grayi* (Rve.)

Punta Balabac auf Balabac bei Paragua (coll. Quadras No. 1323), Bagac, Prov. Bataan, Luzon (No. 1566), Cebú (von Moellendorff 1890) und Pinamonajan auf Cebú (No. 1322). — Südafrika (G. B. Sowerby).

110. *Clathurella (Lienardia) vultuosa* (Rve.)

Backayon (Cuming) und Laon (O. Koch 1894) auf Bohol, Inseln Lugbon bei Romblon und Gayauan bei Mindanao (coll. Quadras No. 1690).

Rothbraun, häufig mit etwas hellerem Spiralband in der Mitte des letzten Umganges. — Alt. 9—16½, diam. max. 4—6¹/₄ mm.

Pleurotoma compta Rve. ist eine kleinere (9 mm), heller gefärbte, anscheinend etwas rauher skulptierte Varietät von Baclayon auf Bohol.

Sect. 3. *Hemilienardia* n. sect.

Diese Gruppe umfasst die übrigen kleinen bunten indopacifischen Clathurellen, die sich von der vorigen durch noch geringere Grösse und durch den Mangel der Querfältchen auf der Spindel unterscheiden. Während die im folgenden an den Anfang gestellten Arten noch den Habitus mit *Lienardia* theilen, zeigen sich die Verwandten der *Pleurotoma felina* Hinds gestreckter, mehr spindelförmig und vermitteln auf diese Weise den Uebergang zur Sect. *Paraclathurella*. Als Typus der neuen Section betrachte ich *Pleurotoma malleti* Recl.

111. *Clathurella (Hemilienardia) apiculata* (Montr.).

Ulugan auf Paragua (coll. Quadras No. 51) und Insel Panaon auf Leyte (No. 15). — Ceylon und Andamanen (Nevill). Neukaledonien (Montrouzier).

Sehr ähnlich der *Cl. (Lienardia) purpurata* Souv., aber ohne Spindelfältchen und der letzte Umgang unter der Mitte etwas erweitert, winkelig abgesetzt und gegen den Schnabel hin schärfer eingezogen. 8 Umgänge. Je 10 bis 12 Vertikalrippen auf dem vorletzten und letzten Umgang. 3–4 Zähne auf der rechten Lippe. — Weisslich mit feinen opakweissen Fleckchen längs der Naht und einer breiten opakweissen Spiralbinde auf der Mitte des letzten Umgangs, über der eine bis zwei, unter der eine Spiralreihe mikroskopischer schwarzbrauner Längsfleckchen in den Zwischenräumen der Vertikalrippen häufig sichtbar sind. Die Doppelreihe feiner dunkler Fleckchen zeigt sich auch auf dem Gewinde. — Alt. $6\frac{1}{4}$ — $9\frac{1}{2}$, diam. max. 3–4 mm.

112. *Clathurella (Hemilienardia) cavernosa* (Rve.)

Philippinen (Cuming). — Fidji-Inseln (Garrett).

113. *Clathurella (Hemilienardia) malleti* (Recl.)

Puerto Princesa auf Paragua (coll. Quadras No. 59) und Insel Balabac bei Paragua (No. 1324), Bagac, Prov. Bataan (N. 1564) und Ternate, Prov. Cavite (No. 34) auf Luzon, S. Juan auf Siquijor (No. 32), Visita Hinayangan auf Leyte (No. 82 und 83), Inseln Balauan (No. 66 und 70), Batauan (No. 67), Calumangan (No. 65), Gayauan (No. 63 und 2267) und Sangnisi (No. 48) bei Mindanao und Salay, Prov. Cagayan de Misamis, Mindanao (No. 26). — Andamanen (Nevill), Amboin (leg. Ad. Strubell, coll. Boettger 1890), Samoa- und Fidji-Inseln (Garrett).

Innenrand der Aussenlippe mit 3—7 Höckerzähnen. Das weisse Mittelband nimmt 2—3 der spiralen Körnerreihen ein; die Grundfarbe ist mitunter weisslich und das Spiralband in diesem Fall opakweiss. — Alt. $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm.

114. *Clathurella (Hemilienardia) purpurascens* Dkr.

Insel Romblon (coll. Quadras No. 71), Bacjauan bei Badajoz auf Tablas (No. 1694) und Himalalud auf Negros (No. 2825). — Fidji-Inseln (Dunker).

Aehnlich der vorigen, aber schlanker und mit 13—14 (bei *Cl. malleti* mit 10—11) Vertikalrippen auf dem vorletzten Umgange. Die vorliegenden philippinischen Stücke zeigen nur 3 kräftige Zähne auf der Innenseite der Aussenlippe. — Alt. $4\frac{1}{4}$ — $5\frac{1}{2}$, diam. max. $1\frac{5}{8}$ — $2\frac{1}{8}$ mm.

115. *Clathurella (Hemilienardia) felina* (Hinds).

Ulugan auf Paragua (coll. Quadras No. 53), Bagac, Prov. Bataan, Luzon (No. 1563), Insel Lugbon bei Romblon (No. 14), Magallanes auf Sibuyan (No. 1562 e) und Inseln Balauan (No. 41), Calumangan (No. 2269) und Jinituan (No. 68) bei Mindanao. — Neuirland (Hinds), Neukaledonien (Montrouzier).

Die philippinische Form dieser Art zeigt 10—11 Vertikalrippen auf dem letzten Umgang, 6 Zähnchen auf dem

Innenrand der Aussenlippe und ist quincunxartig mit braunen Längsflecken gewürfelt. — Alt. 5—8 mm.

116. *Clathurella (Hemilienardia) maculosa* (Pse.)

Currimao, Prov. Ilocos Norte (coll. Quadras No. 7) und Bagac, Prov. Bataan (No. 1563) auf Luzon, Inseln Bisucay, Calamianes (No. 61) und Lugbon bei Romblon (No. 1693). — Upolu auf Samoa (Pease).

Sehr ähnlich der vorigen Art, aber konstant kleiner, die Grösse von 4 $\frac{1}{2}$ mm nicht überschreitend. Das Stück von Romblon hat schwache röthliche Flecken und dickeres Embryonalende als gewöhnlich, doch wage ich auf dies eine Stück hin keine Abtrennung als Art.

117. *Clathurella (Hemilienardia) subtilirata* n. sp.

Char. T. fusiformi-ovata, solidissima, flavidula, in interstitiis lirarum aurantiaco-cingulata, opaca; spira elate conica lateribus convexiusculis; apex acutus. Anfr. 6 parum convexi, sutura impressa undulata disjuncti, costis verticalibus latis, parum compressis — 7 in anfr. penultimo, 9 in ultimo — nec non liris spiralibus validissimis, compressis, costas transgradientibus, ad intersectiones nodosis — 2 in anfr. penultimo, prima infrasaturali geminata, 7 in ultimo, prima infrasaturali latissima triplice — reticulati, interstitiis lirarum profunde impressis, ultimus convexior, media parte inflatus. basin versus leviter constrictus, dimidiam altitudinem testae aequans. Apert. irregulariter triangularis, verticalis, incisione lata, sat profunda limine nodifero a sutura separata, labio dextro acuto, media parte arcuatim protracto, extus varice modico lirato cincto, intus 3-dentato, canali brevi latiusculo, columella convexa, haud rugosa, cum basi testae angulum efficiente fere rectum. — Alt. 3 $\frac{1}{2}$, diam. max. 1 $\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. 1 $\frac{5}{8}$, lat. apert. $\frac{3}{4}$ mm.

Fundort: Insel Balauan bei Mindanao (No. 74), nur in einem Stücke von Herrn J. Flor. Quadras eingeschickt.

Bemerkungen: Eine Art aus der näheren Verwandtschaft der *Cl. felina* (Hinds) und *maculosa* (Pse.), ausgezeichnet namentlich durch die tiefen Spiralrinnen zwischen den breiten, auf den Kreuzungspunkten mit den Radialrippen quergeknoteten Spiralleisten. Von diesen Rinnen sind zwei auf den jüngeren Windungen und vier auf der Schlusswindung orangeroth gefärbt.

118. *Clathurella (Hemilienardia) masoni* (Nev.)

Insel Balabac bei Paragua (coll. Quadras No. 123). — Andamanen (Nevill).

Das vorliegende Stück zeigt ein breites bräunliches Spiralband in der Mitte, ein schmäleres an der Basis des letzten Umganges. — Alt. 3 $\frac{1}{2}$ s., diam. max. 2 mm.

Sect. 4. Eucyclotoma n. sect.

Die Arten dieser schönen Gruppe zeigen auffallend feste, weisse Schalen mit senkrecht gestellter, in der Mitte nicht vorgezogener, ungezähmter Mündung. Die Incisur liegt auf dem Dach der Schlusswindung und besteht aus einer zirkelrunden, mit dem Außenrande nur durch einen schmalen Schlitz verbundenen Perforation. Die oberen Umgänge sind mit einem, der letzte mit 2—3 auffallend hohen und scharfen Spiralkielen umgürtet, gegen die die Entwicklung der Radialskulptur sehr zurücktritt. Ausser den folgenden typischen Arten mag nur noch *Cl. fusiformis* (Garrett) zu dieser Section gehören.

119. *Clathurella (Eucyclotoma) tricarinata* (Rve.)

Inseln Corrigidor (Cuming) und Balauan bei Mindanao (coll. Quadras No. 2268a). — Fidji-Inseln (Garrett), Japan (Dunker).

Das Stück zeigt alt. 8 $\frac{1}{2}$, diam. max. 4 mm.

120. *Clathurella (Eucyclotoma) bicarinata* (Pse.)

Insel Balauan bei Mindanao (coll. Quadras No. 2268).

— Kingsmill-Inseln (Pease).

Das Stück hat alt. 6, diam. max. 3 mm.

Sect. 5. Pseudorhaphitoma n. sect.

Zu dieser besonders in den chinesischen Meeren reich vertretenen Section rechne ich dickschalige, thurinförmige, im Querschnitt 6—8eckige, einfarbige Arten mit wenigen, meist regelmässig über einander gestellten Radialwülsten und einer Mündung, die nur den dritten Theil der Schalenhöhe oder weniger beträgt. Die Incisur ist schmal und seicht; die rechte Lippe trägt innen eine Reihe von Zahnfalten, deren oberste meist als besonders kräftiger Zahn entwickelt ist; die Spindel ist ungefaltet. Als Typus der Section betrachte ich *Cl. fairbanki* (Nevill); sonst gehören ausser der folgenden Art noch zu dieser Gruppe *Drillia fortilarata* E. A. Smith von Japan und mehrere wahrscheinlich noch unbeschriebene Arten meiner Sammlung von Hongkong.

121. *Clathurella (Pseudorhaphitoma) obeliscus* (Rve.)

Insel Corrigidor (Cuming).

Tryon ist meiner Ansicht nach im Unrecht, wenn er diese gezähnte Art mit der meines Wissens stets ungezähnten *Mangilia hexagonalis* Rve. zusammenwirft.

Sect. 6. Paraclathurella n. sect.

Zu dieser neuen Section, als deren Typus ich *Pleurotoma gracilenta* Rve. betrachte, rechne ich eine Reihe indopacifischer, mir meist nur aus Abbildungen bekannter Arten, die sich von *Mangilia* und *Cithara* durch schlankeren Habitus und dünneren Schale auszeichnen, deren Skulptur aus feinen Radial- und Spiralstreifen oder aus blossen Spiralreisen besteht und deren Incisur gewöhnlich nicht ganz so tief ist wie bei den Sectionen *Bellardiella* und *Lienardia*. Sie zeigen immer eine Reihe von Zähnchen oder Zahnfalten auf der Aussenlippe der verhältnissmässig hohen und schmalen Mündung.

122. *Clathurella (Paraclathurella) gracilenta* (Rve.)

Loay auf Bohol und Mindanao (Cuming). — Nordaustralien (Tryon), Japan (Dunker).

E. A. Smith, Dunker und Tryon dürfen im Recht sein, wenn sie zu dieser Art *Pl. fusoides* Rve. als Synonym stellen; von der folgenden Form aber scheint sie sich doch trennen zu lassen.

123. *Clathurella (Paraclathurella) contracta* (Rve.)

Cagayan, Prov. Misamis, Mindanao (Cuming), Bagac, Prov. Bataan, Luzon (coll. Quadras No. 1565), Inseln Luban (No. 17), Balagnan (No. 64) und Calumangan (No. 69) bei Mindanao.

Das Stück von Luban misst nur alt. $6\frac{1}{2}$, diam. max. $2\frac{1}{4}$ mm, das von Calumangan alt. $5\frac{1}{4}$, diam. max. $1\frac{7}{8}$ mm; letzterem fehlen auch die Zähnchen der Aussenlippe.

124. *Clathurella (Paraclathurella) insculpta* Ad. Ang.

Manila (coll. Quadras No. 55). — Südaustralien (Adams & Angas).

Das todt gesammelte Stück zeigt alt. $4\frac{3}{4}$, diam. max. $1\frac{5}{8}$ mm.

125. *Clathurella (Paraclathurella) subula* (Rve.)

Insel Corrigidor (Cuming). — Darnley-Insel, Nordaustralien (Brazier).

126. *Clathurella (Paraclathurella) eximia* (Rve.)

Insel Masbate [Cuming].

127. *Clathurella (Paraclathurella) axis* (Rve.)

Philippinen [Cuming].

128. *Clathurella (Paraclathurella) lirata* (Rve.)

Inseln Luzon und Mindanao [Cuming].

129. *Clathurella (Paraclathurella) rissoides* (Rve.)

Insel Ticao [Cuming].

Sect. 7. *Pseudodaphnella* n. sect.

Die Arten, die ich zu dieser Gruppe rechne, unterscheiden sich von den echten Clathurellen durch den etwas weniger tiefen, vorn wie hinten gleichbreiten Ausschnitt, die weite Mündung mit kurzem Kanal und die meist regelmässige, feinere oder gröbere Gitterung, in der oft die Spiralskulptur überwiegt. Die Aussenlippe ist stumpf und mit feinen Fältchen oder Leistchen belegt. Von *Daphnella* trennt sich die Section scharf durch den tiefen Ausschnitt. Auch zur europäischen Section *Cordieria* Monteros. und zu der fossilen Gruppe *Homoforma* Bell. lassen sich Beziehungen finden. Die Färbung ist fast stets ein Gemisch von Weiss und Rothgelb oder Rothbraun. Als Typus der Section betrachte ich *Cl. philippinensis* (Rve.).

130. *Clathurella (Pseudodaphnella) albibalteata* (Rve.)

Insel Ticao (Cuming).

131. *Clathurella (Pseudodaphnella) tritonoides* (Rve.)

Baüs auf Negros [Cuming].

132. *Clathurella (Pseudodaphnella) nexa* (Rve.)

Inseln Luzon und Masbate [Cuming], Insel Sanguisi. Prov. Surigao, Mindanao [coll. Quadras No. 2262]. — Fidji-Inseln [Garrett].

Die Grösse dieser Art beträgt alt. 22, diam. max. 10 mm [nicht alt. 12—15 mm, wie Tryon nach Reeve angibt].

133. *Clathurella (Pseudodaphnella) tessellata* (Hinds).

Bagac, Prov. Bataan, Luzon [coll. Quadras No. 1562b] und Insel Luban [No. 20]. — Makassarstrasse [Hinds].

Zeichnet sich durch einen starken zahnartigen Vorsprung an der Basis der rechten Mundlippe aus, da wo diese den Kanal begrenzt. — Alt. 6—8, diam. max. 2—2 $\frac{1}{2}$ mm.

134. *Clathurella (Pseudodaphnella) philippinensis* (Rve.)

Inseln Luzon und Masbate [Cuming], Balabac [coll. Quadras No. 1563a] und Lugbon bei Romblon (1562a), Insel Panaon bei Leyte [No. 19], Badajoz auf Tablas [No. 1722], Insel Balauan bei Mindanao [No. 2266] und Cagbabatan bei Placer, Mindanao [No. 2262]. — Neukaledonien [coll. Boettger 1882].

12—15 Vertikalrippen auf dem letzten Umgange. Variiert sehr in der Grösse; ich kenne Stücke von alt. 8—12 mm.

135. *Clathurella (Pseudodaphnella) clarocincta* n. sp.

Char. Differt a *Cl. granicostata* (Rve.) t. tenuiore, costis et liris multo crebrioribus, subtilius granulatis, taenia spirali clariore medio in anfractu ultimo sita, a *Cl. philippinensi* (Rve.) columella subito truncata. — T. conico-ovata, tenuiuscula, flava, in anfr. junioribus taenia spirali lata unica fuscula, in anfr. ultimo duabus, zonam clariorem includentibus ornata: spira conico-turrita lateribus vix convexiusculis; apex acutissimus fuscus. Anfr. 8 superne magis quam inferne convexi, sutura linearis profunda disjuncti, costis verticalibus angustis compressis — 12 in anfr. antepenultimo, 16 in penultimo, 20 in ultimo — nec non liris spiralibus filiformibus — 4 in anfr. antepenultimo, 8 in penultimo, 16 in ultimo — reticulati, punctis intercisionum scabris leviterque granuliferis, ultimus inflatus, basi leviter constrictus, $\frac{1}{2}$ altitudinis testae aequans. Apert. anguste ovata, intus obscure bizonata, incisione supera profunda latiuscula, a sutura limine tuberculifero separata, margine dextro recto strictoque, extus varice modico cincto, denticulato, intus multilirato, canali brevi lato recurvo, columella concava laevi, basi quasi dentata, oblique subito excisa. — Alt. 11, diam. max. 5 mm; alt. apert. 6, lat. apert. 2 $\frac{1}{2}$ mm.

Fundort: Insel Romblon (No. 1019), von Herrn J. Flor. Quadras mir in einem Stück eingeschickt.

Bemerkungen: Schon die Skulptur und Färbung unterscheidet diese in Form, Grösse und Abstützung der Spindel der *Cl. granicostata* (Rve.) ähnliche und ihr jedenfalls nächstverwandte Schnecke.

136. *Clathurella (Pseudodaphnella) granicostata* (Rve.)

Inseln Cebú und Jinituan bei Mindanao (coll. Quadras No. 1019). — Mauritius [Robillard], Fidji-Inseln [Garrett].

Der letzte Umgang zeigt 10, der vorletzte 4, der drittletzte 3 Spiralreihen von Querknötchen, die bis auf die von der Naht aus dritte, weissgefärbte Spiralreihe braun gefärbt sind. — Alt. 12, diam. max. 5½ mm.

Gen. IX. *Daphnella* Hinds.

137. *Daphnella limnaeiformis* (Kiener).

Bolinao auf Luzon [Cuming], Philippinen [coll. Boettger 1882]. — Mauritius [Kiener, coll. Boettger 1886], Australien (Tryon).

Dass Tryon auch *D. patula* (Rve.) von Luzon mit dieser Art vereinigt, halte ich für korrekt.

138. *Daphnella fragilis* (Rve.)

Insel Rita bei Paragua [coll. Quadras No. 1440]. — Australien [Angas], Japan [E. A. Smith].

Auch die vorliegenden Stücke erreichen bei 7 Umgängen nur alt. 9½, diam. max. 3 mm, mögen aber noch nicht ganz erwachsen sein.

139. *Daphnella boholensis* (Rve.)

Insel Bohol [Cuming]. — Fidji-Inseln [Garrett].

140. *Daphnella aureola* (Rve.)

Luzon [Cuming].

141. *Daphnella fenestrata* (Rve.)

Insel Mindoro [Cuming].

142. *Daphnella saturata* [Rve.]

Insel Corrigidor [Cuming]. — Kiushiu, Japan [Dunker].

143. *Daphnella tessellata* Garrett.

Bacjauan bei Badajoz auf Tablas [coll. Quadras No. 8].
— Paumotu-Inseln (Garrett).

Das Stück von Tablas misst alt. $7\frac{1}{2}$, diam. max. $2\frac{1}{2}$ mm.

144. *Daphnella quadrasi* n. sp.

Char. Aff. *D. tessellatae* Garr., sed minor, gracilior, anfr. ultimo et apert. brevioribus, colore diversa. — T. fusiformis gracillima, solidiuscula, subdiaphana, corneo-flavida, albido-variegata, anfr. ultimo taeniis 2 albidis hic illie interruptis cincta; spira elongato-turrita lateribus vix convexiusculis; apex acutissimus. Anfr. 9 convexiusculi lente accrescentes, sutura impressa disjuncti, embryonales $4\frac{1}{2}$ minutissime granulati, laete rufi, caeteri liris spiralibus minutis — 6 in anfr. penultimo, 20—22 in ultimo — nec non costulis verticalibus creberrimis, in punctis intersectionum leviter granuliferis — 40—50 in anfr. penultimo — reticulati, ultimus media parte levissime inflatus, basi lente angustatus, spiram altitudine aequans. Apert. anguste fusiformis, ad suturam sat anguste et profunde incisa, labio dextro sat acuto, crenulato, extus leviter incrassato sed non varicoso, intus lirato, canali brevi, leviter exciso, columella longa, stricta, superne concaviuscula. — Alt. $6\frac{1}{2}$ —7, diam. max. $2\frac{1}{2}$ mm, alt. apert. $3\frac{1}{4}$, lat. apert. $1\frac{1}{8}$ mm.

Fundort: Insel Lugbon bei Romblon (No. 1562), wenige Stücke von Herrn J. Flor. Quadras entdeckt und ihm zu Ehren benannt.

Bemerkungen: Eine auffallend schlanke, spindelförmige Art, die Schlusswindung nach unten allmählich verschmälert, die Vertikalskulptur doppelt so eng wie die Spiralskulptur, die Gehäusespitze scharf abgesetzt dunkel rothbraun.

145. *Daphnella hindsi* (Rve.)

Baclayon auf Bohol [Cuming], Ulugan auf Paragua

[coll. Quadras No. 5030] und Insel Cagauan bei Mindanao (No. 2272).

Das grösste vorliegende Stück misst alt. 8 $\frac{1}{2}$, diam. max. 3 $\frac{1}{2}$ mm.

146. *Daphnella lactea* (Rve.).

Bolinao auf Luzon und Gindulman auf Bohol (Cuming), Bohol (coll. Boettger 1886). — Réunion (Deshayes lapsu calami „candida“ Rve.). Japan (Dunker).

Wahrscheinlich ist *D. carinulata* Souv. von Neukaledonien synonym.

147. *Daphnella inquinata* (Rve.)

Gindulman auf Bohol (Cuming).

148. *Daphnella pluricarinata* (Rve.)

Insel Burias (Cunning).

149. *Daphnella ticaonica* (Rve.)

Insel Ticao (Cuming).

150. *Daphnella crebriplicata* (Rve.)

Bolinao auf Luzon (Cuming). — Port Jackson, Australien (Angas).

151. *Daphnella butleri* Smith.

E. A. Smith, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) Bd. 10, 1882 pag. 303.

Insel Capul (Cuming). — Weiss, 13—14 schmale Längsrippchen und 24 Spiralkiele auf der Schlosswindung. — Alt. 9 $\frac{1}{2}$, diam. max. 3 mm.

Gen. X. *Raphitoma* Bell.

152. *Raphitoma pessulata* (Rve.)

Bolinao auf Luzon (Cuming). — Australien (Brazier).

153. *Rhaphitoma exquisita* (E. A. Smith).

Luzon [Cuming, E. A. Smith], Manila [coll. Quadras No. 6, 78, 285, 324]. — Warrior-Insel, Australien [Brazier].

Den von Manila vorliegenden todt gesammelten Stücken fehlen die dunklen Spiralbinden; die Mündung ist beiderseits unbewehrt. — Alt. $9\frac{3}{4}$, diam. max. $3\frac{1}{4}$ mm.

Das Vorkommen von *Cl. Grimmeri* Parr. in Kärnten.

Von
H. v. Gallenstein.

Den interessanten Berichten über das Auftreten der *Cl. Grimmeri* in *Steiermark*, welche uns *H. Tschapeck* in diesen Blättern brachte, (Nachrichtsblatt d. deutsch. Malakozoolg. Gesellsch. XI. Jhrg. [1879] p. 29 u. XVIII. Jhrg. [1886] p. 179—183.) will ich einige Notizen aus dem Nachbarlande *Kärnten* hinzufügen.

Die ersten und einzigen Andeutungen, dass ein Vorkommen dieser schönen Ausbildung von *Cl. dubia Drp.* in Kärnten den früheren heimatlichen Forschern nicht ganz unbekannt war, erhielt ich zufällig durch ein Exemplar von *Gallenstein Verzeichnis der Conchylien Kärntens*, dem von der Hand des fleissigen Conchylologen *L. v. Hueber* spärliche Fundnotizen eigener oder fremder noch nicht veröffentlichter Erfahrung beigegeben waren. Hier fand ich die kurze Angabe: „*Cl. Grimmeri* Parr. bei St. Georgen (Dr. Ressmann) u. Trixen (Kokeil).“ — Sonderbarerweise erwähnt *Dr. Ressmann* selbst in seinem Fundberichte aus jener Gegend (Malakologische Fauna der gräfl. Egger'schen Herrschaft St. Georgen am Längsee, von Dr. S. Ressmann. Nachrbl. d. deutsch. Malakozoolg. Gesellsch. VIII. Jhrg. p. 87—90) — weder der *Cl. Grimmeri* Parr. noch ihrer

dort fast allerorts häufigen Stammesverwandten *Cl. dubia var. vindobonensis A. Sch.* — Auch *Kokeil* hat, so viel mir bekannt, nichts über den von ihm erforschten Fundort veröffentlicht. So blieb das kärntnerische Vorkommen dieser schönen Schnecke, obwohl es schon seit vielen Jahrzehnten entdeckt war, bisnun verborgen. —

Mit grossem Interesse verfolgte ich die erlangte Spur und hatte die Freude, nicht allein obige Angabe zum grössten Theile bestätigt zu finden, sondern auch ein ausgedehnteres Nachbargebiet für die gleiche Eigengestaltung zu erschliessen, ja sogar eine neue Form in den Kreis derselben Anpassung eintreten zu sehen.

Liegt das steirische Vorkommen im Gebiete der *palaeozoischen Kalke* und scheint geradezu an den *Kalk* gebunden, so muss es uns überraschen, weitab von ähnlicher Ausgestaltung der Schnecke, im Reviere des häufigen Auftretens ihrer Stammesverwandten, der *Cl. dubia var. vindobonensis*, auf dem *Schiefer-felskegel* der Ruine *Obertrixen* einem ganz entschiedenen Beginn der Sonderbildung zu begegnen.

Ziemlich steil senken sich hier die Vorberge der Sanalpe zur Niederung und lassen bald da, bald dort in Wiese, Busch und Wald den nackten Fels zutage treten. Doch selbst der Kalkstein dieser Zone von Carbonbildungen bringt *Cl. dubia Drp.* nicht zum Aufgeben ihrer feinen Ruppenstreifung, und wir finden sogar häufig Ausbildungen, welche durch die Feinheit derselben an die *var. Schlechti Zel.* erinnern. Auf einem bewaldeten Felsrücken, welcher der den Kalken hier vorliegenden Schieferzone der Carbonbildungen angehört, thront die stattliche Ruine *Weisenburg*. Ihre aus chloritischem Thonschiefer geschichteten Mauern beherbergen aber *Cl. dubia Drp.* mit entschiedener Ausbildung ihrer Varietät *vindobonensis*, selbe sogar mit etwas gröberer Ruppenstreifung.

An der kaum eine Viertelwegstunde entfernten Ruine

Obertrixen, welche auf Thonglimmerschiefer steht und aus solchem erbaut ist, fand ich sowohl im schattigen Innenraume des Turmes, der nur wenige Quadratmeter deckt, als auch ausserhalb desselben an den Mauern und unter Steinen die Schnecke mit auffallend verstärkter Rippung. Die Gehäusedimensionen sind 11—14 mm L. und 3 mm B. bei 11 Umgängen und die kräftig ausgeprägten Rippen, wovon 45—60 auf dem vorletzten Umgange stehen, sind schon fast ihrer ganzen Länge nach weissrückig. Die Gaumencharaktere gleichen denen von *Cl. dubia* var. *vindobonensis* Sch.; auch die Mondfalte ist noch stark kenntlich. Prof. Dr. O. Boettger, welcher die Güte hatte, diese Funde genauest zu bestimmen, bezeichnete obige Form als in der Mitte liegend zwischen der typischen *Cl. Grimmeri* Parr. und der *Cl. dubia* var. *vindobonensis* Sch.

Die Nachbarruine *Mittertrixen*, welche kaum mehr als einen Kilometer östlich auf einem isolirten Felskegel des *Kohlenkalkes* thront, beherbergt doch wieder wenig stärker als normal rippenstreifige *Cl. dubia* var. *vindobonensis* Sch. —

Ungefähr 14 Kilometer in nordwestlicher Richtung von diesem Fundorte beginnt das zweite ungleich reichhaltigere Vorkommen in einem gegen Nordost gerichteten Zuge triadischer Kalkfelsen, welche auch in geognostischer Hinsicht unser Interesse erwecken. Südlich und südwestlich von St. Georgen am Längsee richtet sich ein Waldberg bis zu etwa 200 m relativer (800 m abs.) Erhebung auf, um gegen Westen und Süden mit stolzen Felsgalerien, welche aus dem Steilwalde hervorragen, zu prangen. Eine den ganzen Höhenzug überquerende Einsattlung trennt den gegen Westen gewendeten Flügel mit seinen schönen Felszinnen als „*Oticinskogel*“ von dem östlichen, dem „*Hasenkogel*“ mit der „*weissen Wand*“ und dem „*Puchkogel*“.

Das Gestein dieser Erhebung ist *Gutensteinerkalk*, ein weissgrauer, mehr oder minder kurzklüftiger und dolomitischer

Kalkstein, der theils in grösseren Blöcken, theils als feinsplitteriger Schutt von den Steilbrüchen in den Wald gestürzt ist und im letzteren Falle denselben in wüste Karrenfelder zu verwandeln droht.

Der *Otwinskogel*, welcher weniger kurzklüftigen Kalk führt und seinen Waldboden nur mit grossen, nun bemoosten und überwachsenen Blöcken besät hat, ist eine Heimstätte der schönen Sondergestaltung *Cl. Grimmeri Parr.* Hier findet sie sich mit den gleichen Lebenseigenthümlichkeiten, wie selbe ihr Wiederentdecker *H. Tschapeck* in diesen Blättern schilderte. Auch da ist sie in Felsklüften, an den Moos- und Grasbüscheln der Felsen, nie aber an Bäumen, unter Steinen nur als leeres Gehäuse zu treffen. Am ganzen Fundorte bleibt sie dieser Eigenart der Lebensweise treu, und wenn auch nicht gerade häufig, ist sie doch die Herrscherin hier neben ihren nicht allzuzahlreichen Genossen. Als Mitvorkommen erwähne ich:

Limax cinero — niger Wolf.

Hyalina nitens Mich.

Hyalina Villae Mort.

Patula rupestris Drp.

Putula rotundata Müll.

Vallonia pulchella Müll.

Trigonostoma holoserica Stud.

Fruticicola strigella Drp.

Tachea nemoralis L.

Tachea austriaca Mühlf.

Buliminus obscurus Müll.

Torquilla frumentum Drp.

Torquilla frumentum Drp. *forma curta* Rossm.

Torquilla arenacea Brug.

Pupilla muscorum L.

Balea perversa L. (an einer beschatteten Felsgruppe am Gipfel des Otwinskogels).

Marpessa laminata Montg.

Pyrostoma plicatula Drp.

Pyrostoma filograna Zgl.

Obwohl die Intensität der Rippenbildung an unserer Clausilie im Reviere des Otwinskogels sich durchaus nicht constant zeigt und die Rippenzahl am vorletzten Umgang zwischen 28 und 27 schwankt, so gelang es mir trotz sorgfältigster Suche nicht, an irgend einer Stelle des Otwinskogels den *Beginn* der Sonderentwicklung von der noch unveränderten *Cl. dubia var. vindobonensis* A. Sch. ab, — denn diese ist hier zweifellos die Grundform — zu entdecken. Besonders auffallend zeigt sich die Isolirung der *Grimmeri*-Bildung da, wo wir am sichersten eine gleiche Ausgestaltung der Schnecke vermuten: in der Fortsetzung des Höhenzuges nach Osten. Hier erweist sich jene oben erwähnte Einsattlung mit dichterem Jungwalde, einigen Gehöften und ihren Culturen als strenge Scheidegrenze, denn während drüben an den aus dem Walde aufragenden Felsen noch kräftigst gerippte Formen herrschen, finden sich herüber an den gleich günstigen Felsgruppen nur feinrippenstreifige Individuen unserer Schliessmundschnecke vor.

Das Intensitätsmaximum der Rippung fand ich an keine bestimmte Localität des Revieres gebunden, nur deutlich erkennbar, dass ihm ziemlich exponirte, theilweise bemooste Felsen in grösserer Höhe des Steilwaldes entsprechen.

Durch die Güte des Hrn. *Tschapeck* war ich in den Stand gesetzt, meine Funde vom Otwinskogel mit Exemplaren der typischen *Cl. Grimmeri* Parr. aus Steiermark vergleichen zu können und sowohl Hr. *Prof. Dr. O. Böttger* als Hr. *Tschapeck* selbst, welchen ich von meinen Funden mittheilte gaben mir das Urtheil: die Ausbildung der *Cl. dubia* am Otwinskogel ist zwar entschieden ähnlich der typischen *Grimmeri*, aber doch deutlich von ihr verschieden.

In Parallel zum steirischen Typus der Bildung ist sie

fast ausnahmslos bauchiger gestaltet: sie zeigt das Dimensionsverhältnis 9—11 : 2¹/₂—3 mm bei 9—10 Umgängen gegen das des Typus 9—12 : 2¹/₂ bei 10—12 Umgängen. Die Rippen sind seltener rein- als bräunlichweiss bis hellbräunlich, gegen die des Typus, also in der Regel dunkler, die Mündung grösser und mehr rundlich als bei diesem und der Gaumenwulst weniger stark ausgeprägt, ja oft fast fehlend. Demnach stellt sich die Diagnose dieser Ausbildung, welche ich *Cl. Grimmeri Parr. var. Otrinensis de Gallenstein* nennen will:

Gehäuse bauchig-spindelförmig, dunkelhorngelb bis braun, mit scharfen, dünnen weissen, oder bräunlichweissen ziemlich getrennten Rippen; Umgänge 9—10, die 2—3 ersten von gleicher Höhe; Mündung schief rundlich mit grosser runder Bucht: Unterlamelle innen einfach, S förmig gebogen, vorne etwas verdickt oder mit einem Knötchen unten; Gaumenwulst stark bis fast fehlend, untere Gaumenfalte lang und kräftig, Spindelfalte bogig neben der Rinne vortretend. L. 9—11, Br. 2¹/₂—3 mm. — Thier dunkelgrau bis schwarzbraun. —

Durch die mehr oder minder kräftige Rippung erscheinen die Gehäuse fahl braungrau bis matt braun und sind dadurch an den ähnlich gefärbten Felsen schwer zu entdecken, ein Umstand, der neben einer *Schutzverstärkung* auch an eine *Schutzfärbung* denken lässt. —

Wenden wir uns nun zu jenem früher erwähnten Nachbarvorkommen von *Cl. dubia* auf demselben Höhenzuge, d. i. auf dem durch die Einsattlung getrennten östlichen Theile des Bergrückens. Auch hier ragen steile Kalkfelsen aus dem anfangs noch dichteren Walde; weiter nach Osten, der Ortschaft *Launsdorf* gegenüber, wird das Steilgehänge immer felsiger und streckenweise ist der Waldboden hoch überflutet von Steinsplittern. Schon an den westlichsten Felsgruppen dieses Bergtheiles finden wir keine Spur mehr von stärkerer Rippung an der hier nicht seltenen *Cl. dubia var. rindobonensis*, welche in Dimensionen mit ihrer interessanten Nachbarin noch gleichgeblieben ist. Stellenweise aber hat

sie mitunter ihr Gehäuse auffallend verkürzt, so dass sogar Gehäuse mit 8 Umgängen und 8 mm L. : 2 $\frac{1}{2}$ mm Br. zwischen der Mehrzahl von solchen mit den Dimensionen 9 : 3 mm und 9 Umgängen anzutreffen sind. Solche Gestalten unserer veränderlichen *Cl. dubia Drp.* nähern sich nun augenfällig ihrer Varietät *Runensis Tschpk.* Die Mitvorkommnisse bleiben fast gleich; Herrscherinnen des Terrains aber sind hier *Torqu. frumentum* und *arenacea*.

Jenseits des *Gurkflusses*, welcher hier aus der engen Pforte des Krapfeldes rauscht, steigt der dichtbewaldete Rücken des *Zöppelgupfes* an. Schon an seinem Fusse entragen dem Waldboden zahlreiche bemooste Felsen des Gutensteinerkalkes. Sie beherbergen jedoch nicht, wie wir vermuten, *Cl. Grimmeri*, sondern ziemlich schlanke, normalfeinrippige Gestalten von *Cl. dubia var. vindobonensis*. — Diesen vereinzelten Felskuppen folgt südwärts im ansteigenden Walde eine mässig hohe, aber lange Wand aus demselben Gestein mit zu Füssen gestürzten grossen Blöcken. Hier treffen wir die Schnecke in ihrem ziemlich spärlichen Vorkommen wieder mit mehr oder minder kräftiger, stets deutlich verstärkter Rippung. Weiter südwärts streckt sich ein oberhalb nur dünn bewaldeter Bergrücken, aus dessen Waldboden, der vor nicht langer Zeit noch dichteren Fichten- und Föhrenbestand zum Schutze hatte, Felsen und Blöcke von Gutensteinerkalk ragen. Dort wo selbe noch nicht ganz der weichen Moosdecke entbehren, findet sich unsere Clausilie gleichfalls vor, wiewohl nur ziemlich selten und mit interessantem Schwanken der Rippungsintensität. Trotz des günstig scheinenden Terrains kommt hier eine constante Ausbildung der Subspecies *Grimmeri Parr.* noch nicht auf, ja es bleiben einerseits hochentwickelte Exemplare derselben an diesen Felsen fast selten, wie anderseits in unmittelbarer Nachbarschaft die Rippungsintensität wieder zurück sinkt und sich fast zu der von *var. vindobonensis A. Sch.* ab-

schwächt. Gleichwohl wollte es mir nicht gelingen, ausser den schon erwähnten und auch von Hrn. *Tschapeck* constatirten Lebensverhältnissen die bedingenden Umstände für die interessante Sonderentwicklung mit Sicherheit zu erschliessen. — Da an diesem Fundorte die Ausbildung von schlankeren und längeren Formen der *Cl. dubia* ihren Anfang nimmt, bleiben auch die Gestalten der *Cl. Grimmeri* durch diesen Gehäusecharakter dem steirischen Typus ähnlicher; Anklänge an die *var. Otrinensis* sind durchaus selten.

Nach einer Unterbrechung durch dichter bewaldete Berghöhen setzt sich das Vorkommen der in Rede stehenden Sonderentwicklung unserer Schliessmundschnecke an der felsigen Höhe des nordöstlich gelegenen *Golikofels* fort und folgt damit wieder dem *Gutensteinerkalke* in seinen festeren, nicht allzusplitterigen Lagen, wo die Ausgestaltung zur *Grimmeri* begünstigt erscheint durch die zahlreichen in den gelichteten Wald gestürzten Blöcke. Die Schnecke gleicht hier fast vollständig dem Typus und zeigt auch, wie im oben beschriebenen Vorkommen, genau die Eigenthümlichkeiten der Lebensweise desselben; sie ist aber durchwegs nicht häufig und empfängt da einen neuen Lebensgefährten, der das Aufkriechen an Baumstämme, was *Cl. Grimmeri* stets verschmäht, sehr gerne ausführt: *Strigillaria vetusta* Zgl. Im Moose der Felsen sind hier beide zu treffen. —

Der spärliche Moos- und Graswuchs an den grotesken Felsgalerien des östlichen Bergabhangs beherbergt unsere nun fast selten gewordene *Cl. Grimmeri* in kleineren Formen, welche nicht mehr so kräftig gerippt, dagegen bauchiger sind und damit wieder an Exemplare der *var. Otrinensis* mit schwächerer Rippung erinnern. Dazu gesellen sich im weiteren Verlaufe des Bergabhangs, an der Ostseite der „*Gutschen*“, wo die Zinnen an den Felsmauern des Gutensteinkalkes zu den abenteuerlichsten Gestalten ausgewittert

sind, Gehäuseformen der Schnecke, welche in den Dimensionen und Mündungscharakteren schon der steirischen Varietät *Runensis Tsch.* von *Cl. dubia Drp.* gleichen, in der Rippungsintensität aber genau die Mitte halten zwischen der subspec. *Grimmeri Parr.* und der var. *rindobonensis A. Sch.* — Hiezu kommt noch, dass an einigen Exemplaren die Rippung schon entschieden die Stärke der ersteren erreicht, an anderen aber zu der von *Cl. dubia var. Runensis Tsch.* abgeschwächt ist. Ich gebe im folgenden ein genaueres Bild dieser Ausgestaltung:

Gehäuse klein und bauchig verkürzt, dunkel hornbraun, mit ganz oder zum theil weisslichen oder hellbraunen meist ziemlich dicht stehenden Rippen (35 — 63 auf dem vorletzten Umgange); Umgänge 8, gewölbt, mit tiefer Naht eingeschnürt, die zwei ersten glatt und gleich hoch, die nächsten gerippt und rasch erweitert, der letzte etwas eingezogen; die zwei letzten nehmen mehr als die Hälfte der Gehäuselänge ein; Mündung rundlich birnförmig, gelippt und losgelöst, aber kaum erweitert; innere Mundungscharaktere mit denen von *Cl. Grimmeri Parr.* übereinstimmend. — L. $7\frac{1}{2}$ — 9 mm, Br. $2\frac{1}{2}$ — 3 mm.

Von *Cl. dubia var. Runensis Tsch.*, welcher die Schnecke in Gestaltung fast vollständig gleichkommt, unterscheidet sie sich durch stärkere Wölbung der Umgänge und Schnürung derselben, wie durch die meist auffallend stärkere Rippung, welche in ihrem ganzen Verlaufe weisslich oder hellbräunlich ist, — von der var. *Otrinensis* durch die noch stärker gedrungene Form des Gehäuses mit schlanker, glänzender Spitze, wie auch die Rippung nie so scharf und weitläufig wird, als an dieser. Vom Typus der *Cl. Grimmeri* ist die Übergangsgestaltung ganz auffallend verschieden durch das dickbauchige verkürzte Gehäuse und wohl auch durch die engere, nie *rein* weisse Rippung desselben. — In der Lebensweise scheint sie noch strenger an den spärlichen

Pflanzenwuchs und Humus der Felsspalten gebunden und das splitterbrüchige und deshalb unsichere freie Gestein zu meiden. Ihre Gefährten sind dieselben wie die der *Runensis*-Gestaltung von *Cl. dubia* an den Felsen ober *Launsdorf*; — *Strigillaria vetusta* Zgl. folgt ihr nicht in dieses Felsenlabyrinth.

Jenseits des *Görtschitzbaches* begegnen wir der *Cl. dubia Drp.* gleichfalls, und zwar dem eben beschriebenen Fundorte gegenüber an einer aus Glimmerschieferplatten aufgeföhrten Bruchsteinmauer zur Seite der Thalstrasse, und eine kleine Strecke thalaufwärts an den Kalkfelsen und Mauern der Ruinen *Hornburg*. Aber an beiden Stellen findet sich nur mehr die reine Form der Varietät *vindobonensis* A. Sch. mit ihrer schwachen Rippenstreifung, welche Ausbildung von *Pyrostoma dubia Drp.* wir als die in Kärnten vorherrschende betrachten dürfen. Als ihre Abkömmlinge lernten wir im besprochenen Gebiete Kärntens *Cl. Grimmeri* und *Runensis* kennen.

Literaturbericht.

The Journal of Malacology. Vol. III No. 4 Decbr. 1894.

- p. 64. Smith, Edgar A., a list of the Recent Species of the Genus *Pyrula* Lam. with notes respecting the synonymy (9 sp., neu P. *investigatoris* von Ostindien).
p. 70. Collinge, Walter E., on the Generative Anatomy of *Amalia marginata* Drp., and some Notes on the Genus.
-

Neues Mitglied:

Herr Hans Taurer, R. von Gallenstein, K. K. Professor in Görz.

Eingegangene Zahlungen:

Paar, R., Mk. 6; — Dalla Torre, J., Mk. 5.92; — Hofer, Mk. 6; — Mela, H., Mk. 30; — Schmacker, Sh., Mk. 6; — Gysser, Str., Mk. 6; — Taurer v. G., G., Mk. 6; — v. Monsterberg, B., Mk. 6; — Miller, St., Mk. 6; — Krause, L., Mk. 6; — Schedel, J., Mk., 6; — Arnold, N., Mk. 6; — Wiegmann, J., Mk. 6; — v. Heimburg, O., Mk. 6.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M., Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft.

Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Diagnoses

specierum novarum ex insulis Philippinis auctoribus

J. F. Quadras et O. F. von Moellendorff.

(Fortsetzung.)

114. *Ennea (Diaphora) cylindrica* Quadr. et Mlldff.

T. rimata, cylindrico-turrita, tenuis, pellucida, alba, costulis confertis sculpta, sericina: spira sursum vix attenuata apice obtuso obliquo glabrato. Anfr. 9 planiusculi, infra suturam profundam subangulati, ultimus sat ascendens. Apertura fere verticalis rotundato-tetragona, peristoma continuum, superne solutum, profundiuscule sinuatum, modice expansum, labiatum, margine dextro superne subito attenuato. Lamella parietalis sat valida, alta, longe intrans, cum callo

marginis externi sinulum circularem fere claudens,
columellaris parvula a margine remota.

Alt. 4, 2, diam. vix 1 mm.

Hab. prope vicum Palanoc insulae Masbate.

115. *Vitrinoidea quadrasi* Mlldff.

T. interna, discoidea, tenuis, nitens, glabra, corneo-virescens.

Anfr. $3\frac{3}{4}$ rapidissime accrescentes, ultimo antice
valde arcuato, medio sat protracto.

Diam. maj. 17,5, min. 12,5, alt. (approx.) 8,5.

Chlamys omnino clausa, tenuis, subtiliter granulosa,
irregulariter nigromaculata. tergum pedis sat latum,
planiusculum medio sulcatum, latera rugis oblique
decurrentibus induta, margo basalis angustissimus,
solea distinete tripartita, zona mediana alba, laterales
paullo angustiores nigrae. Pes acuminatus.

Long. (spec. conserv.) 35, a testa ad caudam 17 mm.

Hab. ad vicum Baleno insulae Masbate.

116. *Helicarion papillifer* Quadr. et Mlldff.

T. vix rimata, depressa, tenuissima, pellucida, subtilissime
plicato-striatula, valde nitens, pallide virescenti-flavida;
spira fere plana apice vix prominulo. Anfr. $3\frac{3}{4}$
celeriter accrescentes, sutura appressa latiuscule
marginata discreti, planiusculi, ultimus basi convexus,
tumidulus. Apertura sat obliqua, late elliptica, fere
circularis, valde excisa, peristoma simplex, acutum.
margine columellari superne brevissime reflexo.

Diam. max. 15, alt. 9 mm.

Animal fere unicolor cinereofuscum, glandula caudalis
profunda, tergum pedis valde compressum in cornu
supra glandulam curvatum desinens, chlamidis appen-
dices testam animalis vivi omnino obtengentes, dexter
4—7, sinister 1—3 papillas validiusculas in margine
superior gerentes.

Hab. in monte Bulalacao prope vicum San Agustin insulae Masbate.

117. *Hemitrichia velutinella* Quadr. et Mlldff.

T. globoso-depressa, tenuis, brunneo-castanea; spira sat elevata, convexo-conoidea, fere semiglobosa, apex acutiusculus fulvescens. Anfr. fere 6 convexusculi, lente accrescentes, sutura impressa sat profunda discreti, lineis spiralibus et striis radialibus valde confertis minute granulati, granulis pilos breves flavidos — circa 64 in 1 □ min — gerentibus, ultimus infra peripheriam lateraliter subcompressus, regione sculpta a basi laevigata nitida per lineam subelevatam separata, regione umbilicali zona lata lutea cincta. Apertura parum obliqua, transverse ovalis, valde excisa, peristoma simplex acutum, margine columellari calloso, sursum paullum dilatato, reflexo.

Diam. max. 25, alt. 16, apert. lat. 14, long. 10, alt. 9 mm.
Hab. ad vicos Mobo, Palanoc, Naro, Baleno, Magdalena insulae Masbate.

118. *Bensonia (Glyptobensonia) diplotropis* Quadr. et Mlldff.

T. modice umbilicata, umbilico pervio fere cylindrico $\frac{1}{6}$ diametri adaequante, depresso-conoidea aut conoideo-depressa, tenuiscula, subpellucida, radialiter plicato-striata, superne liris elevatis 8, quarum una pone carinam major, sculpta, subopaca, luteo-cornea; spira plus minusve elevata lateribus fere strictis apice plano. Anfr. 6 convexusculi, sutura profunda, fere canaliculata discreti, ultimus ad peripheriam sat acute carinatus, infra carinam subexcavatus, tum convexior, ad umbilicum declivis, basi lineis spiralibus subtus evanescentibus et striis aliquantulo minoribus sculptus, subnitens. Apertura parum obliqua, subrotundato-securiformis, peristoma rectum, obtusum, margine basali bene

arcuato, calloso-incrassato, columellari sinuoso, haud reflexo.

Diam. 13, alt. 6,5

, 12, " 6,5

, 9,5 " 5,5

Hab. ad vicos Palanoc, Mobo, Naro et Magdalena insulae Masbate.

119. *Aulacospira triptycha* Quadr. et Mlldff.

T. sat aperte umbilicata, discoidea, tenuis, striis pliciformibus arcuatis tenuiter sculpta, ? cornea; spira breviter conoidea, subgradata. Anfr. $4\frac{1}{2}$ planulati. ad suturam profundam subsoluti. ultimus ad peripheriam obtuse carinatus, supra carinam leviter impressus. basi subplanus. Apertura fere horizontalis, oblique ovalis, dentibus 3, 1 in pariete, 1 basali et 1 columellari lamelliformi horizontali, coarctata. Peristoma continuum, superne appressum, margine supero recto, externo et basali breviter expansis, columellari reflexiusculo.

Diam. max. 4, alt. 1,75 mm.

Hab. in monte Bathuan prope vicum Palanoc insulae Masbate.

120. *Blauneria quadrasi* Mlldff.

T. sinistrorsa, elongate fusiformis, tenuis, hyalina, laevigata, nitens. Anfr. 8 plani, sutura vix impressa discreti, ultimus spiram subaequans. Apertura elongate guttiformis, peristoma rectum, acutum basi intus labiatum, columella subtus torta, truncato-excisa, plica parvula oblique intuenti conspicua munita. Lamella parietalis valida, spiraliter recedens.

Alt. 5,25, diam. 1,75 mm.

Hab. in insula Masbate.

Cylindrotis Mlldff. n. gen. *Auriculidarum*.

T. fere cylindrica, apertura angusta, peristoma rectum.

obtusum intus labiatum, lamella parietalis una, columella valde torta, truncata, plicae palatales 2. Typ. *C. quadrasi* Mlldff.

121. *Cylindrotis quadrasi* Mlldff.

T. dextrorsa, fere cylindrica, decollata, solidula, subtilissime striatula, valde nitens, virescenti- flava. Anfr. qui supersunt 4 plani, sutura appressa sublacerata discreti, ultimus paullum convexiusculus, basi attenuatus. Apertura perangusta, subauriformis, peristoma rectum, obtusum, margine dextro medio protracto, intus labiato. Columella valde spiraliter torta, basi exciso-truncata, superne plica oblique intuenti conspicua munita. Lamella parietalis modica, subhorizontalis, plicae palatales 2 longe intrantes.

Alt. 10,25, diam. 3 mm.

Hab. in insulis Masbate, Negros et Culion.

122. *Stenothyra decollata* Mlldff.

T. minuta, ovata, solidula, vix striatula, lutea, irregulariter brunneo-taeniata et strigata; spira erosa. Anfractus qui supersunt 2—2½ convexiusculi, ultimus antice paullum applanatus, ad aperturam valde coarctatus. Apertura parum obliqua, oblique ovalis, superne leviter angulata, peristoma subduplex, parum incrassatum.

Alt. 1,5, diam. 1,3 mm.

Hab. ad vicum Bislig insulae Mindanao leg. cl. O. Koch.

123. *Assiminea quadrasi* Mlldff.

T. rimata, turrito-conica, solida, tenuissime striatula, valde nitens, fulvo-cornea, taeniis 2 castaneis parum distinctis ornata; spira valde elevata lateribus vix convexiusculis, apice acuto. Anfr. 7 fere plani, infra suturam submarginatam parum impressam lirula elevata cincti, ultimus ad peripheriam confuse angulatus. Apertura

parum obliqua, oblique acuminato-ovalis, peristoma rectum, obtusum, columella calloso incrassata; peri-omphalum crista validiuscula parum remota cinctum.
Alt. 3,5, diam. 2,3 mm.

Hab. ad vicos Palano e, Mobo et Naro insulae Masbate.

124. *Ditropis pusilla* Quadr. et Mlldff.

T. minuta, modice sed pervie umbilicata, turbinata, tenuis, levissime striatula, nitens, flavescentia; spira gradata apice obliquo obtuso. Anfr. $4\frac{1}{2}$ perconvexi, sutura profunda discreti, carinula bene exserta acutula cincti, ultimus carina altera infra peripheriam et tertia circa umbilicum carinatus. Apertura modice obliqua, subcircularis, peristoma simplex obtusum.

Diam. 2, alt. 1,75 mm.

Hab. prope vicum Baleno insulae Masbate.

125. *Cyclophorus aëtarum* Mlldff.

T. anguste et fere omnino obtekte umbilicata, turbinata, persolida, transverse levissime striatula, carinis 4 bene exsertis cincta, in interstitiis minutissime decussata, nitidula, castanea strigis flaminulatis flavidis pecta, infra medium taenia lata fusca ornata. Spira modice elevata, fere regulariter conica. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, ad suturam vix impressam late applanati, ultimus basi fere laevigatus, unicolor castaneo-fulgens. Apertura subcircularis, peristoma haud aut vix expansum, incrassatum, intus valde labiatum, marginibus callo crasso junctis, columellari valde dilatato, appendice appresso umbilicum fere omnino obtegente.

Diam. maj. 47, alt. 41, apert. lat. (intus) 19, c. perist. 29 mm.

Hab. in montibus altioribus provinciae Morong legi ipse.

126. *Cyclophorus coronensis* Mlldff.

T. anguste et semiobtekte umbilicata, depresso turbinata, solida, transverse striatula, carinulis validiusculis

fortiter exsertis et in interstitiis lirulis spiralibus sculpta, nitidula, flava strigis fulguratis perlatis castaneis picta. Spira conoidea lateribus fere strictis. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, ad suturam parum impressam sat late applanati. Apertura sat obliqua, subcircularis, peristoma distincte duplicatum, sat late expansum, incrassatum, marginibus callo valido junctis.

Diam. 22,5, alt. 20, apert. lat. 13,5, long. 12, alt. 11 mm.
Hab. in insula Coron archipelagi Calamianes dicti leg.
coll. indigena.

127. *Lagochilus tumidulum* Quadr. et Mlldff.

T. anguste perforata, conico-globosa, tenuiuscula, subpellucida, carinulis 5 majoribus et in interstitiis liris spiralibus sculpta, pilis brevibus undique hirsuta, fulvida, strigis flammulatis castaneis et ad suturas serie regulari macularum fuscarum picta; spira turbinata, apice acuto. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, ultimus tumidus. Apertura modice obliqua, ampla, subcircularis, peristoma parum expansum.

Diam. 14, alt. 13, apert. diam. 7,5 mm. f. major: diam.
19, alt. 16 mm. f. minor: diam. 12,5, alt. 11,75 mm.

Hab. in insulis Negros et Masbate.

128. *Lagochilus euryomphalum* Mlldff.

T. late et pervie umbilicata, umbilico fere $\frac{1}{3}$ diametri adaequante, conoideo-depressa, sat tenuis, subpellucida, striis transversis et lineis spiralibus valde confertis granulatis sculpta, carinulis 5 parum prominentibus cincta, in carinulis setis longiusculis hirsuta, fulva, castaneo-strigata. Spira breviter conoidea, apice acutulo, glabrato. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, ad suturam valde impressam subplanati, ultimus antice paullatim descendens. Apertura valde obliqua, subcircularis,

peristoma parum expansum, ad insertionem breviter excisum. Operculum normale.

Diam. 14,5, alt. 9,5 mm.

Hab. prope vicum *Loquilocon* insulae *Samar* leg. coll. indigena.

129. *Lagochilus cagayanicum* Quadr. et Mlldff.

T. perforata, turbinata, solidula, oblique striatula, costulis membranaceis valde deciduis confertis et lineis spiralibus tenuissimis sculpta, pilis brevissimis undique pilosula, ad peripheriam subangulata et 2 series pilorum longiorum gerens, tertia ad suturam et quarta circa umbilicum additis, alternatim fusco- et luteo strigata. Spira subregulariter conica apice acutulo. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, sutura valde impressa discreti, ultimus vix descendens, ad aperturam campanulatus. Apertura valde obliqua, fere circularis, peristoma duplex, externum sat expansum, interruptum, margine externo ad insertionem breviter recedente, internum continuum, brevissime porrectum, vix expansum, superne adnatum et excisum. Operculum normale.

Diam. 6,5—7,6, alt. 6—7 mm.

Hab. prope viros *Lallo* et *Buguey* provinciae *Cagayan*.

130. *Lagochilus scalare* Quadr. et Mlldff.

T. modice umbilicata, turbinata, solidula, strigis flaminulatis castaneis picta. Spira gradata, apice acutulo. Anfr. $5\frac{1}{2}$ angulato convexi, sutura profunda canaliculata discreti, transverse striatuli, carinis 2 bene exsertis et lineis spiralibus confertis sculpti, ultimus basi carinulis elevatis, quarum una circa umbilicum fortior, cinctus, antice breviter descendens. Apertura diagonalis, subcircularis, peristoma vix expansum, incrassatulum, superne leviter excisum.

Diam. 5,25, alt. 5,25 alt. 5,25 mm.

Hab. ad oppidum *Surigao* nec non prope vicum *Jabonga* insulae Mindanao.

131. *Lagochilus polytropis* Quadr. et Mlldff.

T. anguste umbilicata, turrito-turbinata, tenuis, subpellucida, sericina, flavida, strigis latiusculis flammulatis castaneis picta; spira valde elevata, fere regulariter conica apice acuto. Anfr. $6\frac{1}{2}$ perconvexi, sutura profunda discreti, carinulis 6 bene exsertis pilos breves valde deciduos gerentibus sculpti, transverse leviter striatuli, ultimus basi carinulis 8—9 usque in umbilicum cinctus. Apertura sat obliqua, subcircularis, peristoma rectum, obtusum, intus calloso-incrassatum, superne breviter excisum.

Diam. 4,5, alt. 5 mm.

Hab. prope vicum *Placer* insulae Mindanao.

132. *Leptopoma poecilum* Quadr. et Mlldff.

T. anguste perforata, globoso-conica, tenuis, pellucida, subtiliter striatula, lineis spiralibus microscopicis decussatula, liris elevatis 6 supra peripheriam cineta, brunnescens, maculis albis in lineas radiales dispositis picta; spira sat elevata, subregulariter conica, acuta. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, ad suturam subapplanati, ultimus infra peripheriam subglabratus, nitidulus, circa umbilicum pallescens. Apertura valde obliqua, subcircularis, peristoma angulatum reflexum, patens, igneum, marginibus approximatis, callo tenui junctis, columella sat profunde sinuata, lateraliter sat excisa, cum margine basali angulum subdistinctum fere alaeformem formans.

Diam. max. 11, alt. 11,5 mm.

Hab. prope vicum *Baleno* insulae Masbate.

133. *Cyclotus (Platyrhaphis) anthopoma* Mlldff.

T. latissime umbilicata, umbilico $\frac{3}{5}$ diametri adaequante, discoidea, solidula, transverse striatula, plicis subtilibus

sat distantibus et lineis spiralibus microscopicis sculpta, pallide lutescens; spira plana, apice mucronato, prominulo. Anfr. $4\frac{1}{2}$ teretes, ad suturam profundam alboplicosi, ultimus longe et valde deflexus. Apertura diagonalis, subcircularis, peristoma duplex, externum breviter expansum, superne ad insertionem valde recedens, internum continuum, superne excisum. Operculi lamina interna fere plana sulco valde profundo ab externa calcarea separata, externa valde elevata, lamellis floris instar convergentibus munita.

Diam. maj. 16,5, min. 13,5, alt. 8,5 mm.

Hab. in montibus provinciae Morong insulae Luzon legi ipse.

Var. media Mlldff. spira altiore, anfractu ultimo magis deflexo, testa paullo minore.

Hab. in monte Limutan ejusdem provinciae.

Var. minor Mlldff.

Diam. 11,5—13,5, alt. 6—6,5 mm.

Hab. in provinciis Morong et Bulacan.

134. *Cyclotus (Platyrhaphes) anocamptus* Mlldff.

T. latissime et aperte umbilicata, discoidea, solidula, transverse leviter striatula et plicis latiusculis sat distantibus nec non lineis spiralibus tenuissimis maxime confertis sculpta, luteo-brunnea. Spira fere plana, apice oblique mucronatim prominulo. Anfr. 4 teretes, rapide accrescentes, ad suturam profunde impressam pliculosi, ultimus a medio paullatim ascendens, tum valde deflexus et breviter solutus. Apertura diagonalis, circularis, peristoma rectum, acutulum. Operculum terminale, lamina externa valde concava, anfr. 8 marginibus lamellatim prominentibus.

Diam. maj. 14, min. 11,5, alt. 6,5, apert. diam. 6 mm.

Hab. prope vicum Calbayoc insulae Samar leg. coll. indigena.

135. *Porocallia canalifera* Quadr. et Mlldff.

T. oblique ovalis, streptaxidiformis. solidula, laevigata, lubrica, oleo-nitens, carneo-lutescens. Anfr. 5 fere plani, supremi 3 spiram subregularē efficientes, ultimi valde distorti, ultimus ventre applanatus, antice sat ascendens. Apertura parum obliqua, circularis, peristoma rectum, continuum, valde calloso-incrassatum. A columella canalis recurvatus omnino testa obtectus sed pellucens pone aperturam in foramen minutum, apertum desinens.

Long. 5, diam. 4, axis 4,25 mm.

Hab. in insula Catanduanes.

136. *Alycaeus quadrasi* Mlldff.

T. aperte umbilicata, subconoideo-depressa, solidula, costulis valde confertis et lineis spiralibus microscopicis sculpta, pallide lutescens aut rarius rubella; spira valde depressa apice obliquo, glabrato, mammillari. Anfr. 4 convexi, ultimus subcompressus, a medio valde tumidus, circa 2 mm. pone aperturam sat constrictus, tum denuo tumidulus, valde deflexus, campanulatus, sculptura evanescente. Tubulus suturalis valde productus, ca. 2 mm. longus. Apertura maxime obliqua, fere horizontalis, subcircularis, peristoma duplex, internum continuum, paullum expansum, superne subexciso-sinuatum, externum late expansum, superne ad insertionem attenuatum et recedens, ad umbilicum abrupte truncatum. Operculum cartilagineum, extus sat concavum, intus papilla centrali valida munitum, circa papillam excavatum.

Diam. max. 6,25, alt. 3,8 mm.

Hab. prope vicum Buguey provinciae Cagayan.

137. *Helicomorpha globulus* Quadr. et Mlldff.

T. modice sed pervie umbilicata, conoideo-globosa, tenuis, valde confertim costulata, sericina, albida; spira globoso-conoidea, apice subobliqua, obtuso. Anfr. 4 valde convexi, sutura profunda discreti, ultimus quarta parte ab apertura levissime constrictus, tum subcampanulatus. Apertura parum obliqua circularis. peristoma duplex, externum brevissime expansum, internum valde porrectum, superne subsolutum.

Diam. 1,25, alt. 1 mm.

Hab. in insula Busuanga.

138. *Arinia calathiscus* Quadr. et Mlldff.

T. rimata, subcylindracea, tenuis, subpellucida, fulvoflava; spira fere cylindrica, superne fere plana apice obliqua vix prominulo. Anfr. 5 turgidi, sutura valde impressa disjuncti, primi 3 costulis acutis sat distantibus sculpti, penultimus costulato-striatus, ultimus laevigatus, paullum devians. Apertura verticalis circularis. peristoma distinete duplex, internum vix expansum, valde porrectum, externum latiuscule expansum, patens.

Alt. 3,25, diam. 2 mm.

Hab. prope vicum Guihungua insulae Negros (Quadr. No. 3106).

139. *Arinia (Leucarinia) contracta* Quadr. et Mlldff.

T. aperte perforata, ovato-conica, solidula, costulis filiformibus sat distantibus sculpta, albescens. Anfr. 5 perconvexi, superi spiram convexo-conoideam apice obliqua obtusulo efficientes, penultimus sat prominens, ultimus valde devians, antice longe ascendens. Apertura retrorsum inclinata, rotundato-rhomboidea, peristoma duplex: externum sat late expansum, interruptum, internum continuum, superne callo lato crassiusculo

sursum protracto appressum, ad angulum superiorem et ad columellam profundiuscule sinuatum.

Alt. 1,5, diam. 1,25 mm.

Hab. prope oppidum Surigao insulae Mindanao.

140. *Palaina catanduanica* Quadr. et Mlldff.

T. sinistrorsa, vix rimata, fere cylindrica, tenuis, pellucida, sat confertim costulata, albida; spira superne breviter conoidea apice obtuso. Anfr. 6 convexi, ultimus penultimo haud angustior, paullum devians, antice breviter ascendens. Apert. verticalis, circularis, peristoma duplex, externum ab interno sulco profundiuseulo separatum, utrumque expansum, patens.

Alt. 1,5, diam. 0,75 mm.

Hab. in insula Catanduanes.

141. *Palaina deformis* Quadr. et Mlldff.

T. sinistrorsa, anguste perforata, oblongo-globosa, tenuis, subpellucida, costulis elevatis sat distantibus sculpta, albida. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, supremi 3 spiram fere planam apice obliquo glabrato mammillatim prominente efficienes, quartus paullum ascendens, tum valde deflexus, devians, ultimi angustiores, valde deviantes, ultimus valde ascendens penultimum fere obtegens. Apertura retrorsum inclinata, subcircularis, peristoma duplex, externum sat expansum, interruptum, internum valde porrectum, tum expansum, superne callo lato appressum.

Alt. 1,6, diam. 1,25 mm.

Hab. in insula Catanduanes.

142. *Diplommatina masbatica* Quadr. et Mlldff.

T. vix rimata, graciliter conico-turrita, tenuis, corneo-fulva, costulis tenuissimis valde distantibus — 15 in anfractu ultimo — sculpta; spira valde elongata, fere regulariter conica. Anfr. 8 convexi, ultimus paullum

decrescens, vix distortus, brevissime ascendens. Apertura parum obliqua, sat parva, subauriformis, peristoma subduplex, sat late expansum. Lamella columellaris parva, subauriformis, peristoma subduplex, sat late expansum. Lamella columellaris parva, obliqua.

Hab. in monte Batuhan prope vicum Palanoc insulae Masbate.

143. *Diplommatina goniocampta* Quadr. et Mlldff.

T. non rimata, oblonga, gracilis, tenuis, pellucida, confertim costulata, albida: spira turrita lateribus paullum concavis, apice acutulo. Anfr. $7\frac{1}{2}$ perconvexi, ad peripheriam subangulati, penultimus lateraliter prominens, ultimus parum devians, antice brevissime ascendens. Apertura paullum obliqua, subcircularis, peristoma duplex, externum breviter expansum, interruptum, internum longe porrectum, denique expansiusculum, superne callo sat lato appressum. Lamella columellaris humilis.

Alt. 1,9, diam. 0,8 mm.

Hab. prope oppidum Surigao insulae Mindanao (Quadr. No. 2719).

144. *Diplommatina elegantissima* Quadr. et Mlldff.

T. rimata, graciliter turrita, tenuis, pellucida, costulis tenuibus sigmoideis valde distantibus (verosimiliter in alas productis) sculpta, hyalina; spira gracilis, valde elongata apice obtusulo. Anfr. $7\frac{1}{2}$ perconvexi, fere angulati, ultimus initio modice constrictus, tum tumidulus, parum devians, brevissime ascendens. Apertura sat obliqua, rotundato-tetragona, peristoma duplex, externum late expansum, internum breviter porrectum. Lamella columellaris humilis obliqua.

Alt. 2,6, diam. 1,2 mm.

Hab. prope vicum Canóan insulae Siquijor.

145. *Diplomatina (Sinica) mindanarica* Quadr. et Mlldff.

T. rimata, conico-turrita, tenuis, subpellucida, corneo-fulva, costulis valde obliquis, valde distantibus sculpta. Anfr. 7 convexi, ultimus parum devians, antice brevissime ascendens. Apertura modice obliqua, oblique ovalis, peristoma late expansum, duplex, internum subporrectum. Lamella columellaris valde humilis, palatalis brevis, horizontalis.

Long. 2,5, diam. 1,25 mm.

Hab. prope oppidum Surigao insulae Mindanao.

146. *Diplomatina (Sinica) diploloma* Quadr. et Mlldff.

T. vix rimata oblonge ovato-conica, solidula, subpellucida, pallide flavescentia, costulis filiformibus valde distantibus sculpta; spira sat elevata, fere regulariter conica, apice obliquo glabrato obtusulo. Anfr. 7 convexi, ultimus paullum distortus, antice breviter ascendens. Apertura paullum obliqua, oblique ovalis, peristoma duplex, extermum late expansum, internum valde incrassatum et porrectum, denique breviter expansum, superne callo lato crassiuseulo appressum. Lamella columellaris humilis, palatalis longa, supra columellam conspicua.

Alt. 2,5, diam. 1,2 mm.

Hab. prope oppidum Surigao insulae Mindanao (Quadr. No. 2717).

147. *Diplomatina (Sinica) cyrtochilus* Quadr. et Mlldff.

T. subrimata, elongate ovato-conica, solidula, confertim costulata, corneo-flavescentia. Anfr. 7 perconvexi, ante-penultimus maximus, penultimus paullum, ultimus valde distortus, antice sat ascendens. Apertura fere verticalis, irregulariter auriformis, peristoma sat expansum, valde incrassatum, quasi multiplicatum, margo exterius sinuosus, superne protractus, callo tuberculati-

formi munitus. Lamella columellaris sat valida, palatalis modica, parietalis validiuscula remota.

Alt. 2,25, diam. 1 mm.

Hab. in insula Busuanga.

Paradianeta Mlldff. n. sect. Dianetae v. Mart.

T. dextrorsa, anfr. penultimus fere initio constrictus, lamella palatali longiuscula munitus, columella lamella longe intrante armata. Typ. *Dianeta philippinica* Quadr. et Mlldff.

Hab. Ins. Philippinae et Borneo (D. everetti et irregularis E. Sm.).

148. *Dianeta (Paradianeta) philippinica* Quadr. et Mlldff.

T. dextrorsa, rimata, irregulariter turrito-oblonga, tenuis, pellucida, costulis tenuibus filiformibus sat distantibus sculpta, nitens, hyalina. Anfr. 8 convexi, primi 6 spiram elatam, subregulariter conicam formantes, penultimus fere initio constrictus, decrescens, valde devians, ultimus amplior, fere tumidulus, ascendens. Apertura sat obliqua, rotundato-rhomboidea, peristoma duplex, exterrum paullum expansum, reflexiusculum, internum valde incrassatum, callo lato appressum. Lamella columellaris valida, sat alta, subhorizontalis, palatalis sat longa, in anfractu penultimo pone stricturam perlucens.

Alt. 2,5, diam. vix 1 mm.

Hab. in insula Siquijor.

149. *Georissa coccinea* Quadr. et Mlldff.

T. imperforata, globoso-conica, solida, laevigata, nitidula, coccinea; spira modice elevata lateribus convexiusculis. Anfr. 4 sat convexi, ultimus antice levissime descendens. Apertura valde obliqua, ovalis, peristoma rectum, obtusum, margo columellaris valde dilatatus, incrassatus, calloso-reflexus.

Alt. 1,75, diam. 1,5 mm.

Hab. ad vicum Palanoe insulae Masbate.

Die Molluskenfauna der Umgegend von Lähn in Schlesien.
Von
Otto Goldfuss.

Im vergessenen Frühjahr erschien in Breslau bei J. U. Kern's Verlag ein Werkchen über die Molluskenfauna Schlesiens von E. Merkel, Lehrer am Realgymnasium „zum heiligen Geist“ daselbst.

Dieses Werkchen behandelt in sehr ausführlicher und eingehender Weise die bisher in Schlesien beobachteten Land- und Wassermollusken. Tabellen zur Bestimmung der verschiedenen Gattungen werden beigefügt und besonders auf die speciellen Unterschiede der einzelnen Species unter einander Bezug genommen, Mittheilungen über den innern und äussern Bau der Mollusken gemacht und Anleitungen gegeben über das Sammeln, Reinigen und Determiniren der Weichthiere, so dass dies Werkchen, sowohl in den Händen des Fachmannes, als auch für den Anfänger ein schätzenswerthes Handbuch wird.

Durch einen vorübergehenden Aufenthalt zu Pfingsten 1893 und namentlich bei einem längeren Verweilen im Sommer 1894 in dem an Naturschönheiten so reichen Boberthale bei Lähn, wurde mir durch obiges Werkchen Veranlassung gegeben mich eingehend mit dem Sammeln der Mollusken dortiger Gegend zu befassen, da die Umgegend von Lähn in malakozoologischer Hinsicht bisher noch nicht durchforscht sein dürfte.

Obgleich mein Aufenthalt nur nach Wochen bemessen, war meine Sammelausbeute doch eine überreiche. Der von mir erforschte Bezirk war nur ein beschränkter, aber die feuchten engen Thäler, meist von forellenreichen Gewässern durchströmt, waren für das Leben und Gedeihen der Mollusken günstig, die reich bewaldeten Basaltberggipfel, die sogenannten Spitzberge, gaben reichliche Ausbeute an Ge-

häuseschnecken, auch die Gebirgsgewässer und deren Ufer, sowie die vielen Waldquellen lieferten dankenswerthe Funde.

Durch den Mangel an grössern sumpfartigen Gewässern waren die Wassermollusken verhältnissmässig nur in geringer Anzahl vertreten. Najaden in dem schnellfliessenden Bober und in dem steinigten Flusslaufe desselben konnte ich nicht entdecken, doch dürfte deren Vorkommen an geeigneteren Oertlichkeiten nicht ausgeschlossen sein.

Mögen nachstehende Aufzeichnungen nicht allein den Malakozoologen zum Besuche des auch in geologischer Beziehung so interessanten Boberthales veranlassen, sondern auch den Freund von Naturschönheiten, den Touristen dazu ermuthigen.

Die entzückende Aussicht von Burg Lehnhaus auf den Kamm des Riesengebirges mit der Koppe, der reizende Matzdorfer Grund, die Bernskenstein in dem wild romantischen Kemnitzthale werden dem Besucher unvergessliche Erinnerungen zurücklassen.

Jedem der sich für die dortige Gegend interessiren sollte, kann ich den Führer durch Lähn von W. Patschovsky (Schweidnitz bei Georg Brieger) angelegentlichst empfehlen.

Bei Lähn und in dessen nächster Umgebung wurden von mir die nachstehend verzeichneten Mollusken aufgefunden:

A. Gastropoda.

I. Inoperculata.

a. Stylommatophora.

Familie Testacellidae.

Genus Daudebardia.

rufa Drp. (Endaudebardia). In einer engen feuchten Schlucht am Breitensteg, unter Steinen und Laub nicht selten.

Familie Vitrinidae.

Genus Limax.

maximus L. (Heynemannia).

var. *cinereo-niger* Wolff.

In den Waldungen der Umgegend von Lähn sehr häufig.

var. *cinereus* List.

Am Backhaus zu Lehnhaus in Mauerspalten.

var. *unicolor* Heynem. An Gemäuer auf dem Dominialhof zu Lehnhaus.

Zu erwähnen habe ich noch eine eigenthümliche Varietät, die in dem Kartoffelkeller auf dem Dominialhofe zu Lehnhaus gefunden wurde.

Die Grundfarbe des Körpers war dunkel braunroth, (ähnlich wie bei den jungen Individuen) mit durchscheinenden Kielstreifen und Stammbinde, Kiel gelblich, Schild schwärzlich grau. Sohle schmutzig weiss mit dunkleren Seitenfeldern. Länge des ausgestreckten Thieres 170 mm. Die betreffende Schnecke ist jeden Falls in obiger Localität zur Ausbildung gelangt und niemals in die freie Atmosphaere gekommen, wodurch sie sich den ausfärbenden Einflüssen entzog. Professor Dr. Simroth beschreibt in der Zeitschrift für Wissenschaftliche Zoologie Band X. L. II. Heft II. Seite 303 ein ähnliches Exemplar und bildet solches auf Taf. VII unter Fig. 5 I E. ab.

tenellus Nilss. (Heynemannia). In wenigen Exemplaren am Rande des Spörnerteiches, häufiger an den Ufern des Engelbaches.

arborum Bouch. (Simrothia). Sehr häufig namentlich an Buchenstämmen.

Genus Agriolimax.

laevis Müll. Im Schloss- und Dominialgarten zu Lehnhaus.

agrestis L. Allgemein verbreitet in sehr variabler Färbung.

Genus Amalia.

marginata Drp. Burg Lehnhaus, am Breitensteg, auch im Matzdorfer Grunde von mir aufgefunden.

Genus Vitrina.

diaphana Drp. (Semilimax).

var. *Jetschini* Wstld.

Häufig an den Ufern des Kupferbachs bei Schiefer, Matzdorfer Grund, Kemnitzufer in der Nähe der Bernskenstein.

elongata Drp. (Semilimax). Am Breitensteg und auf Burg Lehnhaus nicht selten.

pellucida Müll. (Phenocolimax). In Gesellschaft von voriger Species.

Genus Hyalina.

contorta Held. (Vitrea) = *diaphana* Wstld. non *diaphana* Stud. Burg Lehnhaus, Breitensteg, Schiefer, Matzdorfer Grund und Probstthainer Spitzberg.

crystallina Müll. (Vitrea). In Gesellschaft mit voriger Species.

nitida Müll. (Zonitoides). Allgemein verbreitet an den Ufern fast aller Gewässer.

lenticula Held. (Polita). Nur in typischer Form bei Schiefer und am Breitensteg.

hammonis Ström. (Polita). Vereinzelt im Husswald, Jaegerfleck, Schiefer, Matzdorfer Grund.

glabra Stud. (Polita). In einem vollständig ausgebildeten Exemplare unter Mauerschutt auf Burg Lehnhaus.

cellaria Müll. (Polita). Am Humprich bei Schiefer.

var. *silvatica* Mörh.

Burg Lehnhaus, Breitensteg, Probstthainer Spitzberg. Von der typischen Form durch höheres Gewinde und gewölbtere Umgänge unterschieden.

nitidula Drp. (Polita). In Gesellschaft von voriger Species.

nitens Mich. (Polita). Burg Lehnhaus und nächster Umgebung.

Familie Arionidae.

Genus Arion.

empiricorum Fér. Allgemein verbreitet in sehr grossen und tief schwarz gefärbten Exemplaren.

subfuscus Fér. Spörnerteich, Matzdorfer Grund, Breitensteg, Buchholz bei Löwenberg.

Bourguignati Mab. Dominialgarten zu Lehnhaus.

hortensis Fér. Allgemein verbreitet.

Familie Helicidae.

Genus Helix.

pygmaea Drp. (Punctum). Burg Lehnhaus.

rotundata Müll. (Patula). Allgemein verbreitet.

costata Müll. (Vallonia). Sehr häufig auf Burg Lehnhaus.

pulchella Müll. (Vallonia). Dominialgarten Lehnhaus.

personata Lm. (Gonostoma). Burg Lehnhaus, Breitensteg, Boberufer auf dem Wege nach dem Loreleyfelsen, Probsthainer Spitzberg.

lapicida L. (Chilotrema). Um Lähn in Buchenwaldungen, Bernskenstein, Probsthainer Spitzberg.

hispida L. (Trichia).

var. *septentrionalis* Cl.

Dominialgarten zu Lehnhaus, Typus bisher nicht beobachtet.

sericea Drp. (Trichia). Burg Lehnhaus, Schiefer, Humprich. Ich glaubte anfangs die so sehr nahe verwandte *H. rubiginosa* Zglr. vor mir zu haben. Die Untersuchung des Thieres ergab aber 2 Liebespfeile, während bekanntlich *H. rubiginosa* nur 1 Pfeil besitzt.

incarnata Müll. (Monacha). Allgemein verbreitet.

arbustum L. (Arianta). Engelbachthal, Kemnitzthal, Probsthainer Spitzberg.

fruticum Müll. (Eulota). In der Nähe des Backhauses in sehr schön gefärbten Stücken von rein weisser bis dunkel rother Färbung, auch in gebänderten Exemplaren.

nemoralis Müll. (Tachea). In den Gärten von Lähn nicht gerade häufig, theils gebändert, theils einfarbig in allen Farbenabstufungen.

hortensis Müll. (Tachea). Burg Lehnhaus, daselbst auch ein albines Exemplar mit hyalinen Bändern. Engelbachthal, Boberufer.

var. *castanea* Borch.

Am Breitensteg in dunkel kastanienbrauner Färbung. Gehäuse sehr dünnchalig.

var. *fuscolabiata* Kregl.

Mit braunrotem Mundsaum. Ufer der Kupferbachs bei Schiefer.

pomatia L. (Pomatia). Auf Burg Lehnhaus in schön dunkel gefärbten Exemplaren. Am Spörnerteich und nächster Umgebung meist ohne Epidermis in Riesenexemplaren bis zu 50 mm Grösse.

Genus *Buliminus*.

montanus Drp. (Napaeus). Im Kupferbachthal bei Schiefer.

var. *major* Rss. = *elongatus* Kregl.

Burg Lehnhaus, Breitensteg, Hedwigsteg. Lang ausgezogen, der grösste Theil der Exemplare hatte eine Länge von 18 mm.

obscurus Müll. (Napaeus). Ueberall häufig.

Genus *Pupa*.

doliolum Brug. (Oreula). Unter Schutt und Gerölle sehr häufig auf Burg Lehnhaus.

muscorum Müll. (Pupilla). Mit voriger Species.

edentula Drp. (Sphyradium). Mit voriger Species.

minutissima Hartm. (Isthmia). Mit voriger Species in ausserordentlicher Anzahl.

pygmaea Drp. (Alaea). Dominialgarten zu Lehnhaus.

antivertigo Drp. (Alaea). Brücke am Humprich.

pusilla Müll. (Vertigo). Burg Lehnhaus, sehr häufig.

Genus *Clausilia*.

laminata Mont. (Clausiliastra). Allgemein verbreitet.

orthostoma Mke. (Clausiliastra). Burg Lehnhaus und an der Friedhofsmauer daselbst sehr häufig.

plicata Drp. (Alinda). Burg Lehnhaus.

biplicata Mont. (Alinda). In der Umgegend von Lähn sehr verbreitet, auf Burg Lehnhaus auch ein albinus Exemplar.

filograna Zglr. (Graciliaria). Nicht selten auf Burg Lehnhaus, auf dem Probstthainer Spitzberg desgleichen in mehreren Exemplaren aufgefunden.

parrula Stud. (Kuznicia). Burg Lehnhaus.

pumila Zglr. (Kuznicia). Im Kupferbachthal bei Schiefer.

ventricosa Drp. (Pirostoma). Schiefer, Engelbachthal, Kemnitzthal.

Genus *Cionella*.

lubrica Müll. (Zua). Allgemein verbreitet.

Familie Succinidae.

Genus *Succinea*.

putris L. (Neritostoma). Spörnerteich, Schiefer, Engelbachthal.

var. *limnoidea* Pic.

Kupferbachthal bei Schiefer.

var. *subglobosa* Pase.

Gehäuse sehr bauchig und mit verkürztem Gewinde, besonders characteristisch im Matzdorfer Grund ferner im Kemnitzthal, bei Schiefer und am Boberufer.

elegans Riss. (Amphibina). Im Engelbachthale und am Boberufer bei Mauer in schönen typischen Exemplaren mit röthlichem Anfluge.

Pfeifferi Rss. (Amphibina).

var. *brevispirata* Baud.

Engelbachthal.

b. Basommatophora.

Familie Auriculidae.

Genus *Garychium*.

minimum Müll. Allgemein verbreitet.

Familie Limnaeidae.

Genus *Limnaea*.

stagnalis L. (Lynnus). Im Spörnerteich und in einem Tümpel bei Märzdorf in wenig characteristischen Exemplaren.

lagotis Schr. (Gulnaria).

var. *janoviensis* Kröl.

Im Spörnerteich in wenigen Stücken.

peregra Müll. (Gulnaria). Kupferbach, Engelbach, Jägerfleck.

var. *excerpta* Hart.

Im Spörnerteich in ausserordentlich grossen Exemplaren bis zu 27 mm Höhe und 15 mm Breite. Glessin in seiner Molluskenfauna von Oesterreich-Ungarn und der Schweiz giebt dagegen nur 12—14 mm Höhe und 7—8 mm Breite an.

var. *curta* Gless.

Husswald.

truncatula Müll. (Fossaria). Kupferbach, Schiefer, Mauer.

Genus *Planorbis*.

vortex L. Gyrorbis), und

leucostoma Mill. (Gyrorbis). In Wiesengräben am Fusse des Humprich.

Genus *Acylus*.

fluvialis Müll. (*Ancylastrum*) Engelbach, Kemnitz und in einem Wasserlaufe bei Löwenberg. (Löwenberger Schweiz).

var. *cornu* Cless.

Im Kupferbach bei Schiefer. Die Fundstücke stimmen genau mit meinen Exemplaren aus der Provinz Sachsen auch in der immer nur hellen Färbung überein.

Zu Pfingsten 1893 fand ich diese Varietät sehr häufig und in ausgebildeten Exemplaren am angegebenen Fundorte. Im Sommer vorigen Jahres beobachtete dagegen nur ganz junge Individuen und scheinen jeden Falls um diese Zeit die ältern Stücke abzusterben.

II. Operculata.

Familie *Cyclostomidae*.

Genus *Acme*.

polita Hart. (*Acicula*). Am Breitensteg und auf Burg Lehnhaus wurde dieses seltene Schnecken in 8 Exemplaren von mir aufgefunden.

B. *Accephala*.

Familie *Sphaeriidae*.

Genus *Pisidium*.

pulchellum Jen. (*Fossarina*). Kupferbach am Fusse des Humprich.

fontinale C. Pfr. (*Fossarina*). Jägerfleck am Kynberg, Husswald und Kupferbach bei Schiefer.

obtusale C. Pfr. (*Fossarina*). Jägerfleck am Kynberg und in Quellen des Husswaldes.

pusillum Gm. (*Fossarina*). Im Abflusse des Spörnerteichs und in Wiesengräben bei Schiefer.

Familie *Unionidae*.

Genus *Anodontia*.

gastrodia Bgt. Dominial-Fischteich zu Mauer. Vorstehende Najade aus dem Formenkreise der *A. ventricosa* C. Pfr.

wurde mir von Prof. Dr. Boettger in Frankfurt a. M. als solche determinirt.

anatina L. Mit voriger Species in fast typischer Form.

Nach dieser meiner Aufstellung wurden demnach in der Umgegend von Lähn von mir beobachtet:

85 Species incl. Varietäten

hiervon für Schlesien neu resp. in dem Werkchen von Merkel nicht speciell aufgeführt:

Hyalina cellaria Müll. var. *silvatica* Mörch.

Helix sericea Drp.

Helix hortensis Müll. var. *fuscolabiata* Kregl.

Buliminus motanus Drp. var. *major* Rss.

Succinea putris L. var. *limnoidea* Pic.

Succinea putris L. var. *subglobosa* Pasc.

Succinea Pfeifferi Rss. var. *brerispirata* Baud.

Limnaea peregra Müll. var. *excerpta* Hart.

Ancylus fluviatilis Müll. var. *cornu* Cless.

Pisidium pulchellum Jen.

Anodonta gastroda Bgt.

Anodonta anatina L.

Zu weitern Forschungen der schlesischen Molluskenfauna mögen meine Sammelergebnisse hiernit Veranlassung geben.

Halle a. S. im Februar 1895.

Campylaea intermedia, Zgl. in Tirol.

Von

Ludwig August Paar.

Schon im Jahre 1888 sammelte ich diese zierliche Schnecke nicht selten in der Umgebung von Miss. Bezirk Primiero. Obwohl Herr S. Clessin in seiner Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns ex 1887 diese Art nur in Krain und im Friaul sein lässt, beachtete ich meinen damaligen Fund

doch nicht weiter in der guten Hoffnung, dass dieselbe aus Tirol vielleicht nicht mehr unbekannt sein dürfte. Nachdem aber auch unser unermüdlicher, vaterländischer Forscher, Direktor P. Gredler, *Campylaea intermedia*, Zgl. in seinem neuen Verzeichnisse der Conchylien von Tirol u. Vorarlberg (Vgl. Gymnas. Programm, Bozen ex 1894) ebenfalls nicht aufführt, und ich dieselbe im abgewichenen Sommer 1894 bei Tezze, Valsugana, knapp an der Tiroler-Grenze neuerdings zahlreich sammelte, kann ich nicht umhin, die obgenannten neuen Fundorte dieser auf tirolischem Boden bisher unentdeckt gebliebenen Species zu veröffentlichen.

An beiden Orten lebt sie gemeinschaftlich mit *Campylaea aemula*, Rssm. und *Delima cincta*, Brum., doch ist ihr Auftreten bei Miss ein spärliches zu nennen, während sie bei Tezze ihre Verwandte, *Camp. aemula*, völlig vertritt, so dass letztere daselbst nur mehr vereinzelt — wenigstens an jenen Stellen, wo ich zu sammeln Gelegenheit hatte — vorkommt.

Gleichwie *Campylaea cingulata*, Stud. bei Luserna glanzlos und rauh, so hat auch unsere *intermedia* bei Tezze, wo sie auf Mauern und Felspartien in der Richtung gegen Castell Tesino massenhaft zu treffen, einen meist rauen, glanzlosen, weisslichen Habitus, während dieselbe bei Miss ihrer friaulischen Nachbarin aufs Haar ähnlich ist.

Einfarbige, bänderlose Exemplare sind an beiden Fundpunkten, namentlich bei Tezze, nicht selten; desgleichen finden sich auch Gehäuse, deren mittleres Band sehr intensiv ausgeprägt, hingegen die zwei seitlichen nahezu verloschen sind.

Der Verbreitungsbezirk dieser Art dürfte sich dem nach wohl noch auf andere Oertlichkeiten im südöstlichen Grenzgebiete Tirols erstrecken.

Reutte, im Januar 1895.

Noch ein Fundort der Pupa ronnebyensis Wstld.
in Norddeutschland.

Von
Otto Goldfuss.

Zur weitern Verbreitung dieser Species (vergl. Nachrichtsblatt 1894 S. 216) kann ich noch einen neuen Fundort hinzufügen. Ich besitze *P. ronnebyensis* schon seit dem Jahre 1889 aus der Umgegend von Cladow (Neumark) bei Landsberg a. Warthe und ist somit diese Localität ein Verbindungsglied zwischen den bisher bekannten Fundorten: Tegel bei Berlin, Spechthausen bei Eberswalde, Oderberg in der Mark und vom Oscher Walde (Kreis Schwetz) in Westpreussen. Meine Exemplare stimmen vollständig überein mit denjenigen, die aus den Händen Westerlund's und von Tegel bei Berlin besitze.

Von Cladow erhielt ich ausserdem noch eine andere in Norddeutschland wenig bekannte, im übrigen Deutschland fehlende Species und zwar *Clausilia latestriata* Blz. var. *septentrionalis* Bttgr. Von Clessin in seiner Deutsch. Excursions-Mollusken-Fauna wird *Clausilia latestriata* var. *septentrionalis* nur von Ostpreussen bei Neukahnen im Samlande, bei Krug Babenthal und Kahlbude bei Danzig angegeben, während der Verbreitungsbezirk der typischen Form mehr dem Süden: Mähren, Galizien, Siebenbürgen, Nord-Ungarn und dem Banate angehört.

Eine neue Achatina.

Von
H. Rolle.

Achatina usambarensis m.

T. ovata, solidula, ruditer costato-striata, costis aperturam versus majoribus, irregularibus, spiraliter irregulariter impresso-sulcata, strigis luteo castaneis fulminulatis

in anfractibus superis angustioribus in inferis latis maculisque transversis interdum sagittiformibus ornata. Spira conica apice obtusulo. Anfractus 8—9 convexiusculi, sutura impressa inter inferos crenulata discreti, ultimus subelongatus celerius descendens, $\frac{3}{5}$ altitudinis occupans. Apertura ovata, supra acuminata, intus albido-coerulea strigis translucentibus; columella callo tenuissimo nitido in pariete aperturali vix conspicuo induita, basi exciso-truncata, basin testae haud attingens.

Alt. 110, diam. 55, alt. apert. obl. 60 mm.

Hab. Usambara Africæ orientalis, circa Nguëlo.

Im Habitus der Ach. fulica ähnlich, aber durch Färbung und Skulptur gut verschieden.

Literaturbericht.

Sturany, Dr. Rudolf, zur Molluskenfauna der europäischen Türkei. Nebst einem Anhang betreffend die Nacktschnecken von Dr. H. Simroth. Mit 3 Tafeln. Sep. Abz. aus Annalen k. k. Naturhistorischen Hofmuseums IX. 3. 4.

Der Autor hat in Begleitung des Ichthyologen Steindachner in verschiedenen sonst noch unbekannten Seen der europäischen Türkei gesammelt und den Landschnecken nur wenig Aufmerksamkeit widmen können. Trotzdem bringt er zwei neue Clausilien: *Alinda distincta* p. 373 t. 18 fig. 1—4 vom Ostufer des Ochrida Sees; — *Papillifera lophauchena* p. 374 t. 18 fig. 5—8 von Ostrovo und Dragomir; — ferner an Süßwasserarten ausser einigen interessanten Seeformen unserer Limnaen: *Planorbis (Gyrorbis) macedonicus* p. 379 t. 18 fig. 15—17 aus dem Ochridasee; *Pl. paradoxus* p. 389 t. 18 fig. 18—20 aus dem Ochridasee; — *Valvata rhabdota* p. 381 t. 19 fig. 18—20 von ebendort; — *Hydrobia steindachneri* p. 383 t. 18 fig. 28, 29. — Von grossen geographischen Interesse ist das Vorkommen von zwei *Pyrgula*, die mit *annulata* und *thiesseana* identifiziert werden, im Ochrida-See. Von den Nacktschnecken beschreibt Simroth eine neue unbekannte *Amalia* von Athen, welche zwischen *gagates* und *marginata* in der Mitte steht und drei auf anatomische Unterschiede hin aufgestellte *Agriolimax* (*turcicus*, *sturanyi* und *murinus*).

Dall, W. H., the mechanial cause of folds in the aperture of the shell of Gastropoda. In the American Naturalist Vol. XVII. 1894 p. 335.

Der Autor sucht die Ursache der Faltenbildung in der Mündung darin, dass beim Zurückziehen des Thieres sich der Mantel naturgemäß faltet und dass in die Höhlung der Falten sich dann Schalenmasse ablagert. Die Ablagerung erfolgt nur in den Pausen zwischen dem Ausbau der Schale, wo überschüssiges Material vorhanden ist. Bei allen Arten mit ausgesprochenen Falten sitzt der Spindelmuskel hoch oben an und erfolgt deshalb beim Zurückziehen eine stärkere Faltung; sitzt der Muskel weiter unten, so kommt es nur zur Bildung von Zähnen. Wo Falten, Zähne und Furchen ganz fehlen, handelt es sich um Arten, die sich nicht ganz oder überhaupt nicht in die Schale zurückziehen können.

Dall, W. H., Notes on the Miocene and Pliocene of Gay Head, Marthas Vineyard, Mass., and on the Land Phosphate of the Ashley River District, South Carolina. In American Journal of Science Vol. 48 Act 1894 p. 296.

Neu Nucula schaleri und Macoma lyelli.

Dall, W. H., Cruise of the Steam Yacht Wild Duck in the Bahamas, January to April 1893 in charge of Alexander Agassiz. II. Notes on the shells collected. In Bull. Mus. Comp. Zoology Vol. XXV. No. 2. October 1894 With plate.

Aus der Lagune auf Watling Island werden als neu beschrieben *Anomalocardia leptalea* fig. 5; — *Tornatina parviplicata* fig. 8; — *Cerithium septemstriatum* var. *degeneratum* fig. 11. Aus ihrer Umgebung *Auricula?* (*Microtralia*) *minuscula* fig. 7 und *Chondropoma watlingense* fig. 6 — aus äolischen Schichten der Insel: *Cerion* (= *Strophia*) *agassizii* fig. 9.10. Die Gattung *Strophia*, für welche der Name *Cerion* Bolten angenommen wird, zerlegt Dall in der Untergattungen *Stropiops*, Typus *C. decumana*; — *Maynardia*, Typus *C. neglecta* Mayn.; — *Diacerion*, Typus *C. dalli* Mayn., — und *Eostrophia* für die fossile *C. anodonta* Dall.

The Nautilus Vol. VII.

p. 13. Sterki, Dr. V., some notes on Zonitidae.

p. 17. Simpson, T. Chas., a review of von Iherings Classification of the Unionidae and Mutelidae.

- p. 21. Cockerell T. D. A., the small grey slug in Jamaica (*Agriolimax agrestis*, mit Pflanzen aus Europa eingeschleppt).
- p. 22. Simpson Chas. T., a reply to Prof. Wheeler.
- p. 37. Pilsbry, H. A., on the Orthalicus of Florida.
- p. 39. Dall, W. H., Synopsis of the Mactridae of North America, South to Panama.
- p. 43. Wetherby, A. G., a few notes on *Helix tridentata*.
- p. 45. Pilsbry, H. A., on Chiton Hartwegii Cpr. and its allies.
- p. 47. — —, Notices of new Japanese Mollusks (*Stereophaedusa Stearnsi*).
- p. 49. — —, Remarks on the Status of Species and Subspecies.
- p. 52. Simpson, Chas. T., Types of *Anodonta dejuncta* rediscovered.
- p. 53. Pilsbry, H. A., Descriptive Notices of new Chitons.
- p. 61. — — —, the American Species of *Garychium*.
- p. 63. Squyer, Homer, List of Shells from the vicinity of Mingusville Montana.
- p. 66. Taylor, Geo. W., Note on *Helecioniscus nigrisquamatus* Reeve sp.
- p. 67. Pilsbry, H. A., *Perostylus* the embryo of *Megalatractus*.
- p. 69. Prime, H., Catalogue of Land Shells of Long Island, N. Y.
- p. 73. Dall, W. H., Description of a new *Doridium* from Puget Sound. (D. *adelae*).
- p. 74. Johnson, Chas. W., Letter from Alabama.
- p. 75. Gardner, A. H., *Polygyra hirsuta* on Long Island.
- p. 78. Winkley, Henry W., Eastport Notes.
- p. 79. Willcox, Jos., the habits of Florida littoral Mollusks.
- p. 81. Pilsbry, H. A., new Forms of Western Helices (Epiphragmophora *ellipsostoma* von San Juan del Norte).
- p. 85. Hedley, G., a Shell Hunt forty feet under sea.
- p. 89. Sterki, Dr. V., *Vertigo morsei* n. sp.
- p. 90. Dall, W. H., a new Chiton from California (*Lepidopleurus percrassus*).
- p. 91. Simpson, Chas. T., *Patella (Helecioniscus) nigrisquamata* Rve.
- p. 92. Cockerell, T. D. A., the Virginia Colong of *Helix nemoralis*.

Tijdschrift der Nederlandse Dierkundige Vereeniging. 2de Serie Deel 4. 1893—94.

- p. 35. Loman, Dr. J. C. C., Aanteekening over twee voor de Nederlandse Fauna nieuwe Nudibranchiata.
- p. 57. Hoek, P. P. C., Aanteekeningen over de Cephalopoden, aanwezig in de verzameling van het Zoologisch Station te Helder
- p. 66. Schepman, M. M., a new Cerithidea (tenkatei von Londoë.)

Hedley, C., the Land Molluscan Fauna of British New Guinea.
Second Supplement. With 3 plates. In Pr. Linn. Soc.
N. S. Wales (2) IX p. 384.

Enthält die Fauna des Thals des Purari (Wickham oder Queens Jubilee River) der unter $145^{\circ} 10'$ E. L. in den Golf von Papua fällt. Neu *Sitala anthropophagorum* t. 24 fig. 1, 3 und *Otopoma macgregoriae* t. 24 fig. 5, 8. Letzteres gleicht ganz dem *O. naticoides* und würde, wenn wirklich papuanisch — woran kaum zu zweifeln — eins der merkwürdigsten geographischen Räthsel sein. Ausserdem wird vom Mt. Manes (oder Dayman) noch eine sehr schöne neue *Papuina* (*secans* t. 24 fig. 8, 9) beschrieben und die Anatomie mehrerer schon bekannter Arten gegeben. Ferner werden folgende Synonyme nachgewiesen. *Hel. meditata* Tapp. = *sicula* Braz.; — *Nanina orbiculum* Tapp. = *Thalassia annula* Braz.; — *Nanina bruijni* Tapp. = *Microcystina sappho* Braz.; — *Helicina dentoni* Pilsbry = *solitaria* Smith; — *Hel. agnocheilus* Smith = *tomasinelliana* Tapp.; — *Hel. hixonii* Braz. = *Brazierae* var.

Eingegangene Zahlungen:

Heise, N., Mk. 6; — Puppe, W., Mk. 6; — Hesse, V., Mk. 6; — Gloyne, L. B., Mk. 12; — Shepman, R., Mk. 6; — v. Koch, Br., Mk. 6; — Museum, Zoolog., Berlin, Mk. 6; — Rolle, B., Mk. 6; — Roos, K., Mk. 6; — Schacko, B., Mk. 6; — Scholvien, H., Mk. 6; — Jetschin, P., Mk. 6; — Konow, T., Mk. 6; — Petersen, H., Mk. 6; — Retowski, Th., Mk. 6; — Andreae, H., Mk. 6; — Niglutsch, Tr., Mk. 6; — Pfeffer, H., Mk. 6; — Nägele, W., Mk., 6; — Institut, Zoolog., Kiel, Mk. 6; — Friedel, B., Mk., 6; — Protz, B., Mk. 6; — Boog Watson, C., Mk. 25.50; — Pfeiffer, K., Mk. 6; — Otting, M., Mk. 6; — v. Fritsch, H., Mk. 18; — Merkel, B., Mk. 6; — Gude, L., Mk. 6; — Weiss, W. Mk. 6.

40 Arten Pleistocän-Conchylien von Weimar-Taubach,
sowie miocäne von Steinheim (Württemberg) vertauscht
gegen recente, pleistocene und tertiäre Mollusken.

Weimar,
alte Marktstr. 19.

Dr. phil. A. Weiss.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Siebenundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn** in Berlin zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Diagnoses

specierum novarum ex insulis Philippinis
auctoribus

J. F. Quadras et O. F. von Moellendorff.

Ennea (Diaphora) cuspidata Mlldff.

T. anguste perforata, graciliter turrita, subfusiformis, tenuis, pellucida, hyalina; spira primum subcylindrica, tum sensim attenuata, ad apicem acuminata. Anfr. $8\frac{1}{2}$ modice convexi, ad suturam bene impressam costulati, costulis ad suturam inferiorem evanescientibus, ultimus a tertia parte solitus, porrectus et deflexus, lateraliter valde compressus, basi crista valida compressa fortius costata munitus. Apertura subverticalis,

rotundato-triangularis, peristoma sat expansum, vix reflexum, valde incrassatum. Lamellae parietalis et columellaris validissimae, marginales.

Diam. 1,75, alt. 5,75 mm.

Var. holopleuris Mlldff. — Paullo minor, anfr. $7\frac{1}{2}$ paullo convexiores, pertolum costulati, apertura paullo magis obliqua, angustior, crista anfr. ultimi minus distincta.

Hab. prope vicum eundem.

Ennea (Diaphora) euryomphala Mlldff.

T. late, cylindrice et pervie umbilicata, ventrosulo-turrita, tenuis, pellucida, hyalina, valde nitens; spira elongata, subfusiformis, apice acutulo. Anfr. 8 convexiusculi, laevigati, interdum ad suturam subtiliter crenulati, ultimus a quarta parte solitus, porrectus et deflexus, maxime compressus, basi crista bene exserta, confertim acute costulata cinctus. Apertura verticalis, subpiriformis, peristoma expansum, reflexiusculum, albo-labiatum, ad sinulum recedentem attenuatum. Lamella parietalis valida, marginalis, columellaris a margine remota, sat humilis.

Diam. 2, alt. 6,5 mm.

Hab. cum praecedente.

Ennea (Diaphora) aptycha Mlldff.

T. anguste perforata, subcylindrica, confertim costulato-striata, alba, sericina; spira sensim attenuata apice fere plano. Anfr. $10\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura profunda disjuncti, ultimus basi crista crassula cinctus, ab ultima tertia parte solitus, porrectus et deflexus, distinctius costulatus. Apertura sat ampla, fere verticalis, rotundato-rhomboidea, peristoma parum expansum, vix labiatum; lamella parietalis humillima, brevis, columellaris nulla.

Diam. 2,5, alt. 12,8 apert. long 2,25, lat. 1,5 mm.

Hab. in insula Tangat archipelagi Calamianes.

Ennea (Diaphora) homalogyra Q. et Mlldff.

T. anguste perforata, subcylindrica, tenuis, pellucida, hyalina, laevigata, ad apicem semiglobosum denuo accrescens. Anfr. 11—11 $\frac{1}{2}$, fere plani, ad suturam crenulati, ultimus breviter solutus et porrectus, in parte soluta costulatus, superne valde compressus, cristatus, basi crista compressa bene exserta et pone illam sulco non valde distincto cinctus. Apert. verticalis, rhomboidea, peristoma sat expansum, valde reflexum, albolabiatum, sinulus oblongus, recedens. Lamella parietalis valida, longe intrans, columellaris profunda, modica, dentibus 2 humilibus in palato oppositis.

Diam. 2,5, alt. 11,5, apert. long. 2,5, lat. 2 mm.

Hab. in insula Calauit prope Busuanga leg. coll. indigena.

Ennea (Diaphora) euphoria Q. et Mlldff.

T. sat aperte et pervie umbilicata, fere cylindrica, tenuis, pellucida, hyalina, fere laevigata, valde nitens; spira sursum vix attenuata apice obtuso. Anfractus 8 valde convexi, sutura profunda anguste crenulata disjuncti, ult. basi valde compressus, crista percompressa, valde elevata, altera supra illam breviore et minus distincta cinctus, antice breviter solutus et deflexus, pone aperturam costulatus. Apertura fere verticalis, rhomboidea, peristoma late expansum, valde incrassatum, margo externus modice sinuatus, superne attenuatus et recedens. Lamella parietalis valida, subhorizontalis, marginem externum fere attingens, columellaris valde profunda, humilis.

Diam 2,5, alt. 8, ap. long. 2,1, lat. 1,5 mm.

Hab. in insulis Calamianes dictis leg. coll. indigena.

Ennea (Diaphora) anctostoma Q. et Mlldff.

T. sat aperte et pervie umbilicata, subcylindrico-ovalis, tenuis, pellucida, hyalina, laevigata, nitens. Spira subcylindrica, sursum paullum attenuata apice obtuso. Anfr. $6\frac{1}{2}$ fere angulatim convexi, sutura valde profunda, subcrenulata discreti, ultimus basi crista validissima compressa cinctus, a tertia parte solutus, plus minusve deflexus et porrectus, lateraliter maxime compressus, pone aperturam costulato-striatus. Apertura fere verticalis, perangusta, elongata rhomboidea. peristoma modice expansum, reflexiusculum, sinulus valde retrorsum inclinatus, margo externus superne sat protractus, tum sinuosus. Lamella parietalis modica longe intrans, columellaris nulla.

Diam. 2,25—2,5 alt. 5—6,25 mm.

Hab. in insulis Calamianes dictis leg. coll. indigena.

Ennea (Diaphora) dilophia Q. et Mlldff.

T. aperte et pervie umbilicata, oblonge ovalis, tenuis, pellucida, hyalina, laevigata; spira sensim attenuata, apice obtuso. Anfr. 7 modice convexi, sutura crenulata discreti, ultimus basi crista valde compressa et altera minus elevata, sulco distinto ab illa separata bicuspidatus, a tertia parte solutus et costulatus, lateraliter valde compressus, superne subcarinatus. Apert. verticalis, valde oblique piriformis, sinulo fere horizontali; peristoma late expansum, reflexiusculum, valide labiatum. Lamella parietalis sat humilis, columellaris valde profunda, oblique intuenti vix conspicua.

Diam. 3,25, alt. 7,25 mm.

Hab. in insulis Calamianes dictis leg. coll. indigena.

Ennea (Diaphora) pleistogyra Q. et Mlldff.

T. anguste sed pervie umbilicata, subcylindrica, tenuis, pellucida hyalina, fere laevigata; spira primo fere cylindracea, tum subito coarctata, sursum denuo cylindrica apice semigloboso. Anfr. 20 lentissime accrescentes, sutura crenata disjuncti, planulati, 2 ultimi costulati, ultimus circa umbilicum cristato-compressus, a medio solutus, deflexus, antrorum porrectus, superne compressus et cristatus, dorso profundiuscule sulcatus. Apertura verticalis, horizontaliter piriformis, peristoma late expansum, albolabiatum, undique reflexum, ad sinulum recedentem subattenuatum. Lamella parietalis valida, longe intrans, dente brevi profundo in palato opposito.

Diam. max. 2,5, alt. 10,2 mm.

var. contracta minor, brevior, anfr. 13—15, ultimus minus solutus, alt. 7—8 mm.

Hab. in insula Elet archipelagi Calamianes leg. coll. indigena.

Euplecta unicarinata Q. et Mlldff.

T. angustissime perforata, subconoideo-depressa, tenuis, pellucida, superne confertim costulato-striata, corneo fulva; spira parum elevata, convexo-conoidea apice plano. Anfr. fere 6 convexiuseculi, lente accrescentes, sutura per carinam exsertam distinete marginata, subcanaliculata disjuncti, ultimus carina crassula, bene exserta cinctus, basi bene convexus, striatulus. Apertura parum obliqua, angulato-lunaris, peristoma rectum, obtusulum, margine columellari superne brevissime reflexo.

Diam. may. 11, min. 10,5, alt. mm.

Hab. in montibus Mariveles insulae Luzon legerunt autores.

Coneuplecta decussatula Q. et Mlldff.

T. angustissime et fere obtecte perforata, subdepressa conoidea, tenuis, pellucida, subtiliter striatula et lineis spiralibus sat confertis, minutis decussata, fulvo-cornea : spirā modice elevata lateribus fere strictis, apice obtusulo. Anfractus 6 convexiusculi, ultimus ad peripheriam obtuse angulatus, basi paullo convexior. Aertura sat obliqua, elliptica, sat excisa, peristoma rectum, acutum, margine columellari superne breviter sed valde reflexo.

Diam. may. 6,5, alt. 4,5 mm.

Hab. in montibus Mariveles insulae Luzon legerunt autores.

Kaliella microtholus Mlldff.

T. anguste et semiobtecte perforata, globoso-conoidea, tenuis, subpellucida, superne tenuiter striata, nitidula : corneo-brunnea ; spiraconvexo-conoidea apice obtusulo. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexitati, sutura per carinam exsertam filomarginata disjuncti, ultimus carina acutula filiformi cinctus, basi magis nitens, lineis spiralibus minutissimis decussatulus. Apert. modice obliqua, rotundato-trapezoidea, peristoma simplex acutum, margine columellari calloso-incrassato, superne brevissime reflexo, cum basali angulum obtusum forinante.

Diam. 2,2, alt. 2,2 mm.

Hab. prope vicum Caramuan provinciae Camarines leg. coll. indigena.

Kaliella stylodonta Q. et Mlldff.

T. vix rimata, depresso-globoso-conica, tenuis, subpellucida, tenuiter striatula, lineis spiralibus maxime confertis microscopicis undique decussata, brunneo-cornea ; spira convexo-conoidea. Anfr. 5 convexiusculi, ultimus ad peripheriam obtuse angulatus. Aertura sat obliqua,

late elliptica, sat excisa, peristoma rectum, acutum, columella calloso-incrassata, medio tuberculo dentiformi valido munita.

Diam. 2, alt. 1,2 mm.

Hab. in insula Catanduanes.

Lamprocystis purpureofusca Q. et Mlldff.

T. angustissime et semiobtecte perforata, conoideo-depressa, tenuis, pellucida, fere laevigata, valde nitens, purpureofusca; spira paulum elevata, fere exacte conica. Anfr. $4\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura latiuscule appressa, distincte marginata disjuncti, ultimus supra medium confuse subangulatus, basi paulo convexior, apertura sat obliqua, late elliptica, valde excisa, peristoma rectum, acutum, margine columellari superne calloso, latiuscule reflexo.

Diam. 5,3, alt. 3,1 mm.

Hab. in montibus Mariveles insulae Luzon legerunt autores.

Lamprocystis montana Q. et Mlldff.

T. rimata, depressa, tenuis, pellucida, hyalina, superne subtiliter striatula, nitens; spira parum elevata, depresso-conoidea. Anfr. $4\frac{3}{4}$ planiusculi, lente accrescentes, ultimus lateraliter subcompressus. Apertura fere verticalis, late elliptica, valde excisa, peristoma rectum, acutum, margine columellari superne brevissime reflexo.

Diam. 2,2, alt. 1,2 mm.

Hab. in cacumine montis Parang prope Mariveles insulae Luzon legit O. de Moellendorff.

Lamprocystis masbatica Q. et Mlldff.

T. peranguste perforata, discoidea, tenuis, superne sat distincte striatula, nitens, lutescenti-hyalina. Spira parum elevata, apice plano. Anfr. $4\frac{1}{2}$ lente accrescentes, planiusculi, sutura sat impressa submarginata

discreti, ultimus lateraliter leviter compressus, basi laevigatus. Apert. sat obliqua, late elliptica, valde excisa, peristoma simplex, acutum, margine columellari superne dilatato, calloso.

Diam. 2, alt. 1,2 mm.

Hab. ad vicum Mobo insulae Masbate.

Lamprocystis leucoclimax Mlldff.

T. anguste perforata, conoideo-depressa, tenuis, pellucida, sere laevigata, pallidissime flavescenti-hyalina; spira breviter elevata, subgradata. Anfr. $5\frac{1}{2}$ sat convexi, lente accrescentes, sutura bene impressa, anguste marginata disjuncti, ultimus a latere subcompressus. Apertura modice obliqua, subcircularis, valde excisa, peristoma rectum, acutum, margine columellari superne dilatato, reflexo.

Diam. maj. 10,75, min. 10, alt. 6,5, apert. lat. 5,5, long. 4,75, alt. 4,25 mm.

Hab. prope vicum Garamuan provinciae Camarines leg. coll. indigena.

Hemitrichia flava Mlldff.

T. rimata, globuloso-depressa, sat tenuis, superne usque ad peripheriam fortiter granulosa, granulis 36 in 4 mm., in parte granulosa, enticula tenuissima decidua flava obtecta, basi laevigata, nitens, virescenti-flava, supra peripheriam plusminusve diluta ornata. Spira parum elevata, convexo- conoidea, apice haud inueronata, plano. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus bene convexus, basi planiusculus, medio paullum excavatus. Apert. modice obliqua, late elliptica, valde excisa, peristoma rectum, acutum, basi et ad columellam valde calloso-incrassatum, columella brevissima, sensim ad basin oblique descendens.

Diam. 31, alt. 18,5, apert. lat. 18, long. 12, alt. 11 mm.
Hab. ad vicum Caramuan leg. coll. indigena.

Inozonites bathyrhaphes Mlldff.

T. sat late et pervie umbilicata, discoidea, solidiuscula, vix striatula, valde nitens, flavescenti-cornea; spira vix prominula. Anfr. 6 sat convexi, lente accrescentes, sutura valde profunda, subcanaliculata disjuncti, ultimus supra peripheriam confuse subangulatus. Apert. fere verticalis, late elliptica, modice excisa, peristoma rectum, obtusum, intus sat incrassatum, margo superus ad insertionem recedens, tum protractus, columellaris vix dilatatus, paullum sinuatus.

Diam. maj. 7,5, alt. 3,5 mm.

Hab. ad vicos Libmanan et Caramuan provinciae Camarines leg. coll. indigena.

Obs. *H. orthostoma* Pfr., *Vitrinococonus suturalis* Mlldff., *Euplecta azpeitiæ* Hid. eidem generi Pfefferiano, cuius typus *J. filocinctus* Pfr., adnumerandae sunt.

Inozonites hyalinus Mlldff.

T. anguste umbilicata, discoidea, tenuis, pellucida, fere laevigata, nitens, hyalina; spira brevissime conoidea. Anfr. $5\frac{1}{2}$ lentissime accrescentes, sutura sat impressa disjuncti, convexiusculi, ultimus lateraliter subcompresso, basi convexior. Apertura verticalis, subcircularis, valde excisa, peristoma rectum, obtusum, leviter calloso-incrassatum, margo superus ad insertionem paulisper recedens.

Diam. maj. 5, min. 4,5, alt. 1,75 mm.

Hab. prope vicum Caramuan leg. coll. indigena.

Inozonites nematotropis Mlldff.

T. anguste sed aperte umbilicata, discoidea, tenuis, pellucida, superne subtiliter costulato-striata, nitens, pallide corneo-fulva; spira vix prominula. Anfr. $5\frac{1}{4}$

convexusculi, lente accrescentes, sutura filomarginata disjuncti, ultimus supra peripheriam carina filiformi parum exserta cinctus, basi bene convexus, laevigatus. Apertura verticalis, elliptica, valde excisa, peristoma rectum, obtusum, margo superus superne subcrecens, basalis et columellaris subexpansi, callosi.

Diam. maj. 5,5, alt. 2,8.

Hab. cum praec.

Trochomorpha (Videna) melinotropis Q. et Mlldff.

T. modice sed profunde et subcylindrice umbilicata, umbilico vix $\frac{1}{6}$ diametri adaequante, depresso turbinata, solidula, confertim et tenuiter striatula, minutissime granulosa, opaca, quasi pruinosa, fusca, sursum pallescens. Spira pro sectione sat elevata, lateribus convexiusculis. Anfr. 6 planulati, lente accrescentes, sutura per carinam exsertam flavidо-mARGINATA disjuncti, ultimus basi vix convexior, carina acuta bene exserta pallide flava carinatus. Apert. diagonalis, late securiformis, peristoma rectum, acutum, basi et ad umbilicum paullum incrassatum.

Diam. maj. 19, min. 18, alt. 8,5, apert. lat. 8,5, long. 7, alt. 4 mm.

Hab. in insula Tablas.

Trochomorpha (Videna) mindoroana Q. et Mlldff.

T. late et aperte umbilicata, umbilico infundibuliformi $\frac{1}{4}$ diametri adaequante, discoidea, tenuis, pellucida, confertim curvatim striatula, lineis spiralibus minutissimis decussata, fulvocornea. Spira parum elevata lateribus fere strictis. Anfr. $5\frac{1}{2}$ lente accrescentes, sutura sat impressa, marginata disjuncti, convexiusculi, ultimus carina acuta utrimque late exserta crenulata carinatus, basi paullo convexior, ad umbilicum declivis. Apert. diagonalis, late securiformis, peristoma simplex, acutum, margine supero antrorum curvato.

Diam. maj. 12.5, min. 11, alt. 4.5, apert. lat. 5, long. 3.75, alt. 2.5 mm.

Hab. ad Lala uigan prope vicum Margarin insulae Mindoro nec non in insula Ilin.

Satsuma catocyrtia Q. et Mlldff.

T. anguste et fere omnino obtekte perforata, elate turbinata, solidula, subpellucida, subtiliter striatula et lineis spiralibus sub lente fortiore vix conspicuis decussatula, nitens, pallide flavescescens, taeniis 2, una angustiore prope suturam, altera latiore supra peripheriam castaneis ornata; spira valde elevata lateribus fere strictis, apice obtusulo. Anfr. 7, primi 5 fere plani, penultimus convexiusculus, ultimus convexior, ad peripheriam obtuse subcarinatus, basi tumidus, gibber, pone aperturam contractus, breviter valde deflexus. Apertura maxime obliqua, truncato-elliptica, peristoma modice expansum, basi reflexiusculum, margine columellari superne valde dilatato subrecurvato, perforationem fere omnino obtegente.

Diam. maj. 17—18, alt. 17.5—19, apert. lat. 11—12, long. 9.5—10.5, alt. 5.75—6 mm.

Hab. in insula Malagom archipelagi Calamianes leg. coll. indigena.

Cochlostyla (Helicostyla) leucauchen Mlldff.

T. subconoideo-globosa, crassa, transverse subtiliter striatula, fere laevigata, valde nitens, pallide olivacea, taeniis 2 castaneofuscis supra et infra peripheriam ornata, interdum infera aut utraque evanescente, aut castanea, zona peripherica olivacea picta; spira breviter convexo-conoidea apice obtuso. Anfr. 5 convexiusculi, sutura anguste appressa, suberemulata disjuncti, ultimus tumidus, basi subgibber, antice vix aut non descendens, pone aperturam abrupte cuticula destitutus, zona

verticali alba latiuscula circumdatus. Apertura sat obliqua, ampla, truncato-ovalis, peristoma late expansum, vix reflexum, crasse albolabiatum.

Diam. 47.5, alt. 41, apert. lat. 32, long. 32, alt. 24.5 mm.
Diam. 50 alt. 42, apert. lat. 32.5 long. 33, alt. 25 mm.

Cochlostyla caillaudi Hidalgo. J. de Conch. 1887,
p. 131, t. V, f. 2 Obras Mal. Atlas, t. XLIV f. 2,
Tryon Man. Puhn, VII, t. 52, f. 26 (non Deshayes).

Hab. prope vicum Caramuan provinciae Camarines
leg. cl. C. Micholitz et coll. indigena.

Rhombocochlias Mlldff. n. sect. Cochlostylae.

T. turbinata, opaca, plus minusve pruinosa, columella
torta, interdum dentata.

Typ. *C. turbo* Brod.

Cochlostyla (Rhombocochlias) lamellicostis Mlldff.

T. globosa aut globoso-conoidea aut turbinata, solidula,
transverse subtiliter plicato-striata, lineis spiralibus
rugulosis valde confertis decussata, costulis membrana-
ceis lamelliformibus, sat deciduis obducta, valde serico-
nitens, castaneo-fulva, sursum pallescens: spira plus
minusve elevata, convexo-conoidea. Anfr. 5—5½
convexi, ultimus tumidus, ventre denudatus. Apertura
fere diagonalis, ovalis, sat excisa, peristoma sat late
expansum, vix labiatum, brunnescens, columella valde
torta, subtus plus minus dentata, albocallosa.

Diam. 46, alt. 44, apert. lat. 27, long. 30, alt. 24 mm.

Diam. 46, alt. 51, apert. lat. 28, long. 32, alt. 24 mm.

Hab. prope vicum Caramuan provinciae Camerines leg.
coll. indigena.

Cochlostyla (Orthostylus) intercedens Mlldff.

T. conoideo-ovata, solidula, leviter striatula, atrofuscata,
sursum castanea, cuticula hydrophana nigrescenti-

cinerea, interdum spiraliter taeniata, rarius pallide strigata obducta. Spira modice elevata lateribus convexiusculis, apice obtuso. Anfractus 6 sat convexi, sutura sat impressa anguste marginata disjuncti, ultimus spira multo brevior, antice breviter descendens. Apertura valde obliqua, late elliptica, parum excisa, peristoma modice expansum, vix reflexiusculum, nigrolabiatum, columella stricta, obliqua, cum margine basali angulum obtusum formans, purpurascens, sursum alba, callo lato appressa.

Diam. 38, alt. 50, apert. lat. 24, long. 26, alt. 21 mm.

Hab. ad vicum Libmanan provinciae Camarines insulae Luzon leg. coll. indigena.

Obs. Species quasi intermedia inter *C. ticaonicam*, *pithogastram* et faustum.

Tornatellina camarinica Mlldff.

T. imperforata, graciliter oblongo-ovalis, tenuis, vix striatula, flavescenti-cornea. Anfr. $4\frac{1}{2}$ convexiusculi, apertura fere verticalis, acuminato-ovalis, peristoma rectum, acutum. Lamella parietalis emersa, validiuscula, longe intrans, columella valde spiraliter torta, plicae instar spiraliter recedens.

Diam. 1,5, alt. 3 mm.

Hab. prope vicum Caramuan provinciae Camarines leg. coll. indigena.

Hapalus scalaris Q. et Mlldff.

T. rimata, ventricosulo-turrita, tenuis, transverse levissime striatula, lineis spiralibus valde confertis decussata, pilis brevissimis sub lente fortiore conspicuis hirsuta, sericina, pallide straminea; spira valde elongata, regulariter conica, gradata, apice obtuso. Anfr. 8 modice convexi, sutura profunde impressa discreti. Apert. parum obliqua, elongata rotundato-rhomboidea,

peristoma simplex, rectum, margo externus modice arcuatus, columellaris superne dilatatus, reflexiusculus.
Diam. 7,5, alt. 18,5.

Hab. in insula Catanduanes leg. J. Quadras, ad vicum Caramuan insulae Luzon coll. indigena.

Hapalus decurtatus Q. et Mlldff.

T. imperforata, ovato-conica, tenuis, pellucida, subtilissime curvatim striatula, nitens, flavescenti-albida; spira convexo-conoidea apice obtuso. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi. sutura appressa, distinete marginata discreti, ultimus tumidulus, altitudinem spirae aequans. Apertura parum obliqua, rotundato-rhomboidalis. peristoma rectum, acutum, margine dextro arcuato, superne recedente, columella callosa, subtorta.

Diam. 6, alt. 10,5 mm.

Hab. in montibus Mariveles insulae Luzon legerunt autores.

Opeas suberenulatum Mlldff.

T. rimata, graciliter subuliformis, tenuis, subpellucida, maxime confertim sed distinete striatula, sericina, pallide flavescens; spira sensim attenuata, gracilis, apice obtuso. Anfr. $9\frac{1}{2}$ convexiusculi, medio applanati, ad suturam profunde impressam distinctius striati. Apertura parum obliqua, rotundato-rhomboidea. peristoma rectum, acutum, margine columellari reflexo, appreso.

Diam. 3, alt. 11,5 mm.

Hab. prope vicum Caramuan provinciae Camarines leg. coll. indigena.

Auricula quadrasi Mlldff.

T. hand rimata, subcylindraceo-fusiformis, tenuis, subtiliter striatula, opaca, pallide olivacea; spira sat elevata lateribus convexiusculis, apice subinueronato acuto. Anfr. 9 plani, sutura appressa, lacerata discreti, ultimus

$\frac{3}{5}$ altitudinis aequans aut superans, paullatim descendens, basi subsaccatus. Apertura parum obliqua, anguste ovalis, peristoma superne rectum, latere dextro et basi subexpansum, intus labiatum. Lamella parietalis mediocris, obliqua, spiraliter recedens, columella valde torta, basi truncato-excisa, superne lamella humili induta.

Hab. in insulis Masbate et Leyte.

Amphipeplea quadrasii Mlldff.

T. subglobosa, tenuis, transverse plicato-striatula, nitens, pellucida, pallide lutescens; spira vix prominula apice mucronato. Anfractus 4 pone suturam profunde impressam obtuse angulati, ultimus superne planiusculus, tum obtuse angulatus, denique tumidus. Apertura parum obliqua, amplissima, peristoma rectum, acutum, margo superus ab insertione paullum ascendens et protractus, columellaris paullum incrassatus, vix plicatus.

Diam. 20, alt. 27, apert. diam. 16, alt. 23,5 mm.

Hab. in provinciis Manila, Laguna et Pampanga insulae Luzon.

Var. lamellifera Mlldff. margine columellari fortiter lamellatim incrassato. Diam. 22,5, alt. 30 mm.

Hab. in insulis Cebu et Leyte.

Ameria quadrasii Mlldff.

T. sinistrorsa, vix rimata, oblonga, tenuis, subpellucida, leviter striatula, lineis spiralibus confertis undique decussata, pallide straminea, plerumque taeniis angustis, castaneis plus minusve numerosis picta. Anfr. $3\frac{1}{2}$ —4 (apice plerumque eroso) convexi, rapide accrescentes, sutura valde impressa, subcanaliculata disjuncti. Apert. parum obliqua, oblonge ovalis, superne et inferne acuminata, peristoma rectum, acutum, margine columellari paullum dilatato, callo sat lato appresso.

Diam. 8,5, alt. 19,5, apert. diam. 4,5, long. 12 mm.
Hab. in lacu Mainit insulae Mindanao. (Q. 2733).

Ameria hildalgoi Q. et Mlldff.

T. sinistrorsa, imperforata, ovato-conica, solidula, transverse striatula et sulcis confertis spiralibus exarata. unicolor brunnea aut fusca aut lutescenti-cornea taeniis latiusculis castaneis ornata. Anfr. 4 modice convexi, supra medium sat acute carinati, infra carinam spiraliter impressi. Apertura parum obliqua, spiriformis, peristoma rectum, acutum, columella valde calloso-incrassata, subtorta, intus superne subdentata.

Diam. 5, alt. 9, apert. long. 5,5, lat. 3 mm.
Hab. in lacu Mainit insulae Mindanao.

Planorbis (Hippeutis) luzonicus Mlldff.

T. late et aperte umbilicata, discoidea, solidula, subpellucida, sat distincte striatula, corneo-lutea; spira plana. Anfr. 5 lente accrescentes, sutura distincte marginata, profunda discreti, convexiusculi, ultimus basin versus sat acute angulatus, basi fere planus. Apertura diagonalis, lanceolata, peristoma rectum, acutum.

Diam. maj. 10,5, min. 9, alt. 3 mm.

Hab. prope vicum Libmanan provinciae Camarines insulae Luzon leg. coll. indigena.

Amphibola quadrasi Mlldff.

T. anguste umbilicata, conicoglobosa, tenuiuscula, subpellucida, leviter et irregulariter plicato-striata, irregulariter malleata, pallide lutea aut luteo-brunnea aut brunnea, interdum taeniis castaneis 3 picta; spira sat elevata, subregulariter conica. Anfr. $4\frac{1}{2}$ convexit, celeriter accrescentes, sutura valde impressa disjuncti, ultimus superne confuse angulatus, ad umbilicum sub-

excavatus. Apert. fere verticalis, late ovalis, peristoma rectum, acutum, margine externo ante insertionem sinuato, medio protracto.

Diam. 12.5—13.5, alt. 13—14 mm.

Hab. prope Manila.

Amphibola sanchezi Q. et Mlldff.

T. sat aperte umbilicata, conico-globosa, tenuiuscula, subpellucida, consertim plicato-striatula, brunnea; spira modice elevata, convexo-conica, apice obtusulo. Anfr. 4 perconvexi, ad suturam profunde impressam applanati et lira elevata cincti, ultimus superne subangulatus, ad perforationem sat excavatus et zonula castanea cinctus. Apert. fere verticalis, late ovalis, peristoma rectum, obtusum. Operculum tenuie, cornuum, anfr. 2, nucleo basali.

Diam. 9.5, alt. 10 mm.

Hab. prope oppidum Dapitan insulae Mindanao leg.
Rev. P. Sanchez.

Tricula quadrasi Mlldff.

T. rimata, turrito-conica, tenuis, levissime striatula, pallide corneo-lutescens; spira elongata, lateribus fere strictis, apice obtuso. Anfr. $5\frac{1}{2}$ parum convexit, sutura appressa latiuscule marginata discreta, ultimus circa rimam crista brevi parum distincta cinctus. Apert. verticalis, oblique ovalis, peristoma parum expansum, sublabiatum, marginibus callo crasso junctis.

Diam. 1, alt. 2 mm.

Hab. in insula Busuanga. (Q. 2613).

Die Gattung **Paludestrina**.

Von

H. v. Thering.

In einer vor Jahren begonnenen und noch immer unbeendeten Arbeit über die Binnenconchylien von Rio Grande do Sul habe ich u. A. die oben angeführte Gattung eingehend besprochen. Neuere Untersuchungen veranlassen mich hier die hauptsächlichen Resultate kurz mitzutheilen.

Es ist nur von einer der in Betracht kommenden Arten die Anatomie bekannt, und dies Wenige ist falsch. *A. d'Orbigny* (*Voyage Am. mer. Mollusques* Pl. 47 fig. 8) stellt das Thier von *P. lapidum* Orb. mit einem der Länge nach gespaltenem Penis dar. Diese Darstellung „verge complètement bifide“ hat *P. Fischer* in seinem trefflichen Manuel (p. 750) reproduziert, obwohl ich schon früher eine richtige Beschreibung gegeben (Kenntniss d. Gattung *Lithoglyphus* Malak. Bl. VII. 1885 p. 96—99). Der Penis ist danach ein kegelförmiger, rechts im Nacken gelegener, vom *vas deferens* durchsetzter Lappen, dessen schlankere Spitze sich aus dem dickeren Haupttheile wie eine vom Praeputium umfasste Glans erhebt. Die falsche Zeichnung bei *d'Orbigny* stammt ohne Zweifel von einem unbeabsichtigten Messer- oder Scheerenschnitte her, welcher den Penis halbierte.

Ich kann in dieser Hinsicht ziemlich sicher urtheilen, denn ich habe schon dreimal Serien dieser Art untersucht, zweimal in Rio Grande do Sul (Taquara, Camaquam), einmal in S. Paulo (Iguape). Der Penis war stets identisch, nicht so die Radula, da die Zahl der basalen Dentikel an der Mittelplatte sich variabel erwies. Ich traf davon jederseits 4—5 bei den Exemplaren von Iguape, 2—3 bei jenen des Camaquam, 2 bei jenen von Taquara. Man beachte dieses Resultat wohl, denn es lehrt uns, charakteristische anatomische Variationen kennen innerhalb einer Species und entsprechend den weit getrennten Fundorten.

P. australis d'Orb. ist in Rio Grande d. S. sehr gemein in Brackwasser wie in Süßwasser. Die Mittelplatte der Radula hat basal jederseits 2 starke Dentikel. Ueber den Penis notirte ich: „Er liegt hinter dem Nacken in der Kiemenhöhle und fällt durch seine weisse Farbe auf. Er ist hakenförmig gebogen, stark, und nahe der convexen Seite vom vas deferens durchbohrt, das, wenigstens in seiner Endhälfte, ebenso wie die conische Penisspitze selbst mit Flimmerepithel bekleidet ist. Weiter nach hinten flimmert das Epithel des Penis nicht. Derselbe trägt an seiner convexen Seite 6—7 runderliche Höcker, und einen starken Höcker an der concaven Seite hinter der glatten Spitze. Es schien mir als ob dieser Höcker an seinem vorderen Umfange vertieft sei und somit wie ein Saugnapf wirken könnte. Ein Flagellum fehlt.“

P. piscium d'Orb. Der Penis ist in der Mitte geknickt. Er ist glatt, resp. nur mit einigen wenigen sehr kleinen Höckern versehen. Die Glans ist sehr stark und dick, sie nimmt fast die Hälfte der ganzen Länge des Penis ein. Die Mittelplatte der Radula hat an der Schneide 9 Dentikel und basal jederseits 4 von oben nach unten an Grösse abnehmende Dentikel.

P. charuana d'Orb von Iguape hat an der Schneide der Mittelplatte 11 Dentikel, aber basal jederseits nur einen sehr starken Dentikel. Der Penis hat eine ziemlich lange schlanke Glans, die an der convexen Seite eine Warze trägt. Im hinteren dickeren Theile des Penis stehen viele solche Warzen und zwar eine oder zwei an der concaven, 11 bis 12 an der convexen Seite. Diese Warzen oder Papillen sind hoch resp. lang und tragen am freien Ende eine grubenförmige Einsenkung. Man muss sie danach als Sangwarzen bezeichnen, bestimmt zur Festheftung des Penis in der Vagina während des Coitus. Sie erfüllen somit denselben

Zweck wie die bei Nudibranchien nicht seltene Bewaffnung des Penis mit Stachel oder Haken.

Es ergiebt sich danach, dass ein zweitheiliger Penis (*verge bifide*) nirgends bei *Paludestrina* vorkommt, dass dagegen *P. charuana* denselben Penis hat wie *Littorinida* *Gaudichaudi*, Souleyet. Leider ist die Radula letzterer Art nicht bekannt, doch darf es als höchst wahrscheinlich gelten, dass sie mit jener von *Paludestrina* übereinstimmt, und ist jedenfalls durchaus kein Moment gegeben, welches es rechtfertigen könnte, beide Gattungen zu trennen.

Sehr viel schwieriger ist die Frage in welcher Weise denn *Paludestrina* begrenzt werden soll. Fischer hält die Gattung für unumstösslich aus verschiedene Elementen komponirt. *P. Auberiana* d'Orb. sei nahe verwandt mit *Hydrobia*, was beim Mangel anatomischer Details kaum zu entscheiden sein dürfte. Andre, wie *P. culminea* d'Orb., Typus der Gattung *Heleobia* Stünps., hätten die Radula von *Hydrobia*, d. h. also am Mittelzahn jederseits nur einen Basal-Dentikel. Wollten wir diese Trennung der Arten je nach der Zahl der basalen Dentikel gut heissen, so würde von den von uns untersuchten Arten *P. charuana* zu *Heleobia* zu stellen sein und die nahe stehende Art *P. australis* zu *Paludestrina*, da letztere 2, erstere 1 Basal-Dentikel*) jederseits hat.

Bedenkt man wie diese beiden Arten sowohl conchyliologisch wie anatomisch einander sehr nahe stehen, so ist ohne Weiteres das Künstliche dieser Eintheilung klar. P. Fischer theilt die Familie der Hydrobiidae daher (l. c. p. 723) ganz falsch ein. Von den 6 Untergruppen sind die 3. und 4. im Wesentlichen nur nach der Zahl der Basal-Dentikel geschieden; einen bei ersterer, mehrere bei letzterer Gruppe.

*) Auch bei den Arten mit nur einem Basal-Dentikel sieht man häufig neben dem starken Dentikel noch eine kleinere aber nicht constante Spitze, so dass an derselben Radula also abwechselnd Zähne von *Paludestrina* und von *Heleobia* zu beobachten sind.

Beide Gruppen fallen daher zunächst zusammen, um nach anderen Prinzipien weiter eingetheilt zu werden. Die Bithiniinae und Stenothyrinae sind durch den kalkigen Deckel, die Pomatiopsinae durch den getheilten Fuss charakterisirt, die Baicaliinae durch den Mangel an Basaldentikeln. Letzteres Merkmal kann indess kaum als ein entscheidendes gelten. Troschel, der es zuerst verwandte, hat die Eintheilung nur als eine provisorische angesehen. *Dybowsky* traf bei den Hydrobiinen des Baikalsees nahe verwandte Formen mit oder ohne Basalzähne. So haben die Benedictia-Arten in der Regel Basalzähne, welche indess bei *B. fragilis* fehlen.

Meines Erachtens liegt das entscheidende Moment für die Hauptabtheilungen der in viel zu zahlreiche Gattungen eingetheilten Familie der Hydrobiidae in der Anwesenheit oder dem Mangel eines Flagellum am Penis. Dadurch unterscheiden sich *Hydrobia* und *Paludestrina* scharf. Die Existenz des Flagellum steht fest für *Hydrobia*, für die Bythiniinen und vermuthe ich, dass es auch *Lithoglyphus* zukommen wird. Bei *Paludestrina* resp. *Litorinida* sowie, wenn ich *Dybowsky* richtig versteh'e, bei den Hydrobiiden des Baikalsees fehlt das Flagellum. Dieses Verhältniss, sowie die Beschaffenheit von Fuss und Deckel werden, glaube ich, zur Begrenzung der Gattungen in Verbindungen mit den conchyliologischen Charakteren hinreichend sein, die geringere oder grössere Zahl der Basaldentikel hingegen kann höchstens für die schärfere Kennzeichnung der Arten mit in Betracht kommen. Jedenfalls dürfen hiermit diejenigen Merkmale aufgeführt sein, deren genauere Kenntniss uns erst eine natürliche Gruppierung der Arten innerhalb der Familie wird ermöglichen, sowie die Entscheidung darüber, ob diese Familie eine natürliche ist oder ob etwa alle Formen mit Flagellum und gespaltenen Penis in eine Familie zu vereinen sind, der Rest mit einfachem Penis in eine andere.

Von diesen Untersuchungen hängt es auch ab, wie weit oder wie eng für *Paludestrina* und Verwandte der Gattungsbegriff zu fassen ist. Dass *Amnicola*, *Potamopyrgus* etc. andere Gattungen seien, ist im Grunde seither nicht sicher erwiesen. Am eingehendsten haben sich mit dieser Frage *Grosse et Fischer* (*Etudes sur les Mollusques de Mexique*. 268 ff.) befasst, und es ist auch hieraus deutlich, dass bei allzuempfindlichem Mangel anatomischer Daten jeder Versuch der Classifizirung nur ein provisorischer sein kann. Von *Amnicola* ist nur eine Species, *A. porata* Say, durch *W. Stimpson* untersucht. Der Penis ist am Ende zweitheilig, das schlanke Ende, wohl die Glans, ist um das kürzere zum Theil spiralig herumgebogen. Die Mittelplatte hat 4 basale Dentikel. Bei *Amnicola coronata* L. *Pfeiffer* hat nach *Schaeck* die Mittelplatte jederseits 3 basale Dentikel.

Ob *Amnicola* am Penis ein Flagellum hat, ist zur Zeit nicht bekannt, aber die Beschreibung dieses bitiden Penis lässt vermuten, dass er jenem von *Hydrobia* etc. gleiche. In Bezug auf den Penis stellt dann *Littorinida* einen anderen Typus dar, indem der meist ziemlich deutlich in Basis und Glans gegliederte Penis mit Papillen resp. Saugwarzen besetzt ist, die jedoch in einzelnen Fällen sehr reduziert sein können. Bei *P. lapidum* fehlen die Saugwarzen, die Glans ist sehr klein und basal von einem Kragen umfasst, dem praeputium. Vielleicht ist dieser Typus mit dem vorausgehenden durch Uebergänge verknüpft, vorläufig aber können wir immerhin einigen Werth darauf legen, weil diese Unterschiede mit solchen der Schale zusammen fallen.

Ich schliesse mich daher *Grosse* und *Fischer* an, welche nach Abtrennung der marinischen *Hydrobia*-artigen Formen, sowie einiger mit *Amnicola* zu vereinigender Arten (*P. Candeana* d'Orb., und *P. Auberiana* d'Orb.) innerhalb der Gattung *Paludestrina* zwei Sektionen unterscheiden. *Paludestrina s. str.* für *P. peristomata* d'Orb. und *lapidum*

d'Orb. und *Heleobia Stimp.* für *P. culminea* d'Orb., *P. Parchappei* d'Orb. und andere Arten mit nur je einem basalen Dentikel der mit stark vorspringendem Basallappen versehenen Mittelplatte. Der Name *Paludestrina* muss aber der ersten Gruppe bleiben, weil d'Orbigny nicht nur in seiner *Voyage Am. mer.* sondern auch 1835 im *Mag. de Zool.* den Namen *Paludestrina* verwandt und dabei als erste Art *P. peristomata* beschrieben hat.

Ich bin daher der Meinung, dass *Paludestrina* auf diese Arten mit kugeliger Schale und einfaches Penis mit kleiner vom praeputium umfasster Glans zu beschränken sei. Dagegen finden *P. australis* d'Orb. und Verwandte mit schlanker Schale und mehreren basalen Dentikeln der Mittelplatte in der Uebersicht von Grosse und Fischer überhaupt keinen Platz. Es geht nicht an, wegen der Zahl der basalen Dentikel die nahverwandten Formen aus einander zu reissen, und eben so wenig ist es nöthig, einen besonderen Namen für die ganze Gruppe zu schaffen, da ein solcher in *Littorinida* Souleyet besteht, wozu *Heleobia* als synonym eingeht. Leider fehlen uns noch genauere Angaben über *Littorinida*, zumal deren Radula; auch vermuthe ich, dass die Angabe, der Penis habe eine Rinne, nicht einen geschlossenen Canal, auf Irrthum beruht.

Hier nach scheint es, dass im Wesentlichen die ächten Hydrobiinen, Bithiniinen etc., der nördlichen Hemisphaere angehören, indess *Paludestrina* und *Littorinida* Südamerika eigen sind. Wahrscheinlich ist *Potamopyrgus* auch hierher zu ziehen. Hierüber, wie über den Penis von *Lithoglyphus* fehlen uns leider Angaben. Sehr verbunden wäre ich behufs Fortsetzung dieser Studien, für Zusendung von Material, zumal natürlich von in Alcohol conservirten Thieren in Schale. *Potamopyrgus*, *Amnicola*, *Hydrobia*, *Lithoglyphus* wären mir besonders erwünscht, so wie natürlich ganz besonders die Arten aus Südamerika, letztere auch dann, wenn nur Schalen zu haben sind.

Zum Schlusse noch einige Worte über die Verbreitung. In Rio Grande do Sul kommen vor: Pal. lapidum d'Orb., Litt. australis d'Orb., piscium d'Orb. Von Iquape an der Küste von S. Paulo erhielt ich Litt. australis und Litt. charuana d'Orb aus brackischem Wasser. Letztere Art sass zwischen den Wurzeln von Wasserfarn (Salvinia). Aus Süßwasser erhielt ich von eben da Litt. australis und Pal. lapidum. Das Vorkommen dieser Arten im Brackwasser von S. Paulo ist um so interessanter, als neben ihnen noch andre seither nur vom La Plata und Rio Grande d. S. bekannte Arten durch die Herren Loefgren und Edwall, denen ich diess Material verdanke, aufgefunden wurden: Azara labiata Mat., Chilina fluminina Mat. Ich zweifle nicht, dass dieser unter $24^{\circ} 41'$ S. Br. gelegene Fundort sich als der nördlichste erweisen wird für die Verbreitung von Azara, Chilina und Paludestrina.

Diese Beobachtungen bestätigen gut, was ich früher über die Süßwasserfauna von Südbrasilien bemerkte. Es ist die Archiplata-Fauna, die hier weit gegen Norden reicht, aber zum Theil mit Elementen der nord- und mittelbrasili-anischen Fauna durchsetzt. Die Fortsetzung der Studien über die Verbreitung der Brack- und Süßwasserfauna von Südbrasilien wird noch viele hochinteressante Resultate liefern.

Zum Schlusse die systematische Gruppierung der südamerikanischen Formen:

Paludestrina Orb. (Typus: P. peristomata Orb.)

Schale kugelig. Penis einfach mit kleiner vom Präputium umfasster Glans.

Hierher: P. lapidum Orb.

Littorinida Soul. (Typus: L. Gaudichaudii Soul.)

syn. Heleobia Stimpson.

Schale kegelförmig. Penis einfach, aber mit Saugwarzen besetzt, die nur selten (P. piscium) rudimentär sind.

Hierher: L. australis Orb., charuana Orb., piscium Orb., culminea Orb. u. A.

S. Paulo. 1. Dez. 1894.

Beitrag zur Fauna von Mexiko.

Von

H. Rolle.

Durch eine von Colima an der Westküste von Mexiko erhaltene Sendung bin ich in den Stand gesetzt, einen kleinen Beitrag zu der Molluskenfauna dieser noch wenig bekannten Gegend zu geben. Colima liegt am Fusse des gleichnamigen Vulkans, ungefähr unter gleicher Breite mit Mexiko und Vera Cruz, in geringer Entfernung von dem Hafenstädtchen Manzanillo. Die von dort erhaltenen Arten sind:

1. *Glaudina audebardi* Desh., völlig mit den Exemplaren des Berliner Museums übereinstimmend.
var. *amoena* v. Martens Biolog. Centralamer. t. 3. fig. 7. desgl.
2. *Gl. albersi* Pfr. (Martens l. c. t. 4 fig. 10). Die Exemplare sind nicht unerheblich grösser, als die Martens'che Abbildung, bis 40 mm lang, stimmen aber sonst sehr gut. Der Fundort Colima wird schon von Xantus angegeben.
3. *Gl. (albersi var.?) solidior* n. Differt a typo testa multo solidiore, graciliore, anfractu penultimo altiore. Alt. 40 mm.

Mit dem Typus zusammen in grösserer Anzahl, wahrscheinlich von einer anderen Localität.

4. *Gl. alabastrina* Albers. Diese seither etwas unsichere Art befindet sich ebenfalls in der Sendung; die Bestimmung ist von Herrn von Martens verifizirt worden.
5. *Gl. Liebmanni* Pfr. Seither von der Westküste noch nicht nachgewiesen.
6. *Salasiella elegans* von Martens n. sp.

T. elongato-turrita, vix striatula, nullo modo granulata, nitidissima, unicolor cornea. Spira obtuse convexa. Anfractus 8 convexiusculi, sutura modice impressa discreti, ultimus infra sensim attenuatus. Apertura

parum obliqua, irregulariter lanceolata; peristoma undique incrassatum, album, labrum externum supra convexe productum, infra recedens, margine basali rotundato, columellari valde incrassato, profunde emarginato (sicut in *Gland. excavata* Marts.), basi late oblique truncata. — Alt. 11,5, lat. 3,5, alt. apert. 4 mm.

Mit keiner der bekannten Arten zu verwechseln (Martens).

7. *Helix (Trichodiscus) cordorana* Pfr.
8. *Polygyra richardsoni* Marts. var. *fasciata* n., durch ein rothes Band ausgezeichnet.
9. — *bicruris* Pfr.
10. *Otostomus jodostylus* Pfr.
11. *Otostomus colimensis* n.

T. conico-elliptica, perforata, rugose striata, albida, seriebus macularum violaceo-fuscarum tribus in anfractibus spirae, quinque in ultimo ornata. Anfractus $6\frac{1}{2}$ planiusculi, sutura parum impressa discreti, supremi 3 unicolores, apice obtusulo, ultimus magis convexus. basi sensim attenuatus, in regione umbilicali fuscotinctus. Apertura elliptica, perparum obliqua; peristoma breviter expansum, tenui, album, margine basali anguste rotundato, columellari latiuscule reflexo, supra triangulatim dilatato, in speciminibus bene conservatis violaceo tinctus; callus parietalis tenuis, sed distinctus; Alt. 31, diam. 15, alt. apert. 15 mm.

Steht dem *Ot. fenestrellus* Marts. und *Ot. dunkeri* var. *forreri* Marts. am nächsten. Von ersterem unterscheidet er sich durch den umgeschlagenen Mündungsrand, von dem letzteren durch die mehr langgestreckte Gestalt und die nicht bauchigen Windungen.

12. *Orthalicus ponderosus* Streb. Eine für die Westküste charakteristische und dort weitverbreitete Form.
13. *Orth. melanochilus* Val.

14. *Orth. princeps* Brod.

15. *Orth. elegans* n.

T. ei Orth. principis simillima. differt testa graciliore.
columella vix contorta, fere verticaliter descendente.

Alt. 62, diam. 28,5, alt. apert. 28, lat. 14 mm.

Mit Orth. princeps nahe verwandt, aber doch wohl specifisch abzutrennen.

16. *Orth. nobilis* n. Differt ab Orth. zonifero, cui proxima,
anfractibus planis, sutura vix impressa, apice et labio
nigris, columella fere verticali, margine verticali infra
tantum leviter arcuato.

Alt. 59, diam. 29, alt. apert. 28, lat. 16 mm.

Verhält sich zu O. zoniferus fast genau wie O. elegans
zu O. princeps.

17. *Orth. zoniferus* Streb. Völlig typische Exemplare.

18. *Orth. (colimensis* n. sp.?). Differt ab Orth. principe testa
solidiore, columella multo magis contorta.

Alt. 58, diam. 30, alt. apert. 28, diam. 15 mm.

Eine zwischen O. princeps und O. ferussaci stehende
Form, von der leider nur tott gesammelte Exemplare vor-
liegen, sie scheint mir specifisch verschieden.

Hemitrichia guimarasensis n. sp.

Von

Dr. Joh. Thiele.

T. oblique perforata, depresso-conica, superne cuticula
gummacea induta, lutea, zonis duabus latis obscure
fusco-olivaceis cincta. Anfr. $5\frac{1}{2}$ parum convexi, sutura
parum distincta disjuncti, lineolis spiralibus rugulisque
radialibus confertissimis, in ultimo infra fasciam luteam
descendentibus. Apertura subobliqua, peristoma simplex,
acutum.

Diam. 26, alt. 15, apert. lat. 14, alt. 10 mm.

Hab. Guimaras.

Diese Art gehört zum Formenkreise der *H. luteofasciata Lea*, unterscheidet sich aber von ihr sofort durch das viel niedrigere Gewinde, die olivenbraune, oben gewöhnlich dunklere Farbe, durch die viel feinere Skulptur der Oberseite, die etwa 2 mm weit über das schmale gelbe Band an der Peripherie hinabreicht, während sie bei *luteofasciata* dieses Band frei lässt; die gelbe Umgebung des Nabels ist gegen die dunkle Zone ziemlich scharf abgesetzt. Die Unterseite zeigt wenige undeutliche Spirallinien.

Von den 5 Exemplaren dieser Art, die ich kenne und die A. B. Meyer von Guimaras mitgebracht hat, befinden sich 4 im Dresdener und eines im Berliner zoolog. Museum. Dieselben zeigen geringe Verschiedenheiten in der Höhe des Gewindes und der mehr oder weniger ausgeprägten Olivenfarbe, die auch in das Gelb hineinspielen kann; eins ist unten mit einigen unregelmäßigen gelben Flecken marmoriert.

Literaturbericht.

Pilsbry, Henry A., Manual of Conchology Structural and systematic. Second Series Vol. IX. Guide to the study of Helices.

Wir werden über diesen wichtigen Band, welcher eine vollständige Zusammenstellung der heute geltenden Ansichten über die Systematik der Helicaceen enthält, an anderer Stelle eingehend berichten.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia
1893, Pt. 3. 1894, Pt. 1.

p. 388. Sterki, V., Growth Changes in the Radula of Land Mollusca.
(pl. 11 und 12).

p. 403. Pilsbry, H. A., Thysanophora coloba n. sp. (aus Nicaragua).
1894, Pt. 1.

p. 11 Pilsbry, H. A., Critical List of Mollusks collected in the Potomac Valley (Plate 1). — *Polygyra tridentata* var *fraudulenta* n. p. 20 t. 1 fig. 6 und var *juxtidens* n. ibid. fig. 8; — *Philomyces pensylvanicus* n. p. 22.

p. 69. — —, List of Port Jackson Chitons collected by Dr. J. C. Cox, with a revision of australian Acanthochitidae. With pl. 2—4.

Martini und Chemnitz, Systematisches Conchylien-Cabinet.
Neue Ausgabe.

Lfg. 411. *Aspergillum*, von Clessin.

— 412. *Achatinidae*, von Kobelt (Schluss). Neu *Limicolaria adansoni* var. *substigata*.

— 413. *Helix*, von Kobelt. Keine neue Art.

Sitzungsbericht der Gesellschaft naturf. Freunde in Berlin 1895.

p. 33. Martens, Ed. von, Mollusken aus Paraguay. Neu *Unio paraguayanus*.

p. 35. — —, über ein zu einem Meissel verarbeitetes Conchylienstück aus Neuguinea (von *Cassis cornuta*). Mit Abbildung.

Martens, Ed. von, Molluschi terrestri e d'acqua dolce. In Bottego, Esplorazione del Giuba. Risultati zoologici. (Annali Mus. Civico Genova (2.) XV. p. 63—66.

Zehn Arten, davon neu *Streptaxis bottegoi*.

Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus. Les Mollusques marins du Roussillon II. 10. Avec 11 planches.

Enthält in gewohnter vorzüglicher Bearbeitung die Donacidae, Psammobiidae, Solenidae und Mesodesmatidae.

Babor, J. F., Doplnky k znamóstem o českých Slimacích. In Vestnik Kral ceske společnosti nauk 1894 XLV. Mit Tafel. Czechisch mit deutschem Resümee.

Enthält Beobachtungen über Nacktschnecken.

Transactions of the Wagner Free Institute of Science of Philadelphia. Vol. 3 March 1895.

part. III. Dall, W. H., Contributions to the Tertiary Fauna of Florida, with especially reference to the Miocene Silex beds of Tampa and the Pliocene Beds of the Caloosahatchie-River.

Eine äusserst wichtige eingehende Abhandlung über die Systematik der Pelecypoden. Da in den nächsten Wochen nach einer Mittheilung des (mittlerweile nach Alaska gereisten) Verfassers ein wichtiger Nachtrag zu erwarten ist, werden wir erst nach dessen Erscheinen eingehender berichten.

The Journal of Conchology. Vol. VIII. No. 1.

- p. 3. Jones, K. Hurlstone, Molluscan Albinism and the tendency to the Phenomenon in 1893.
p. 11. Chaster G. W., on the occurrence of *Pulsellum lofotense* Sars in the Irish Sea.
p. 11. Standen, R., *Vertigo substriata* Jeffr. var. *alba*.
p. 23. Standen, R., *Helix aspersa* Müll. m. *sinistrorum* Taylor.
p. 24. Marshall, J. T., Alterations in British Conchology.

Proceedings of the Linnean Society of New South Wales (2) IX.

- p. 464. Hedley, C., Remarks on *Gundlachia beddomei* und *Liotia tasmanica* Woods (woodcut).
p. 501. Hedley, C., Notes on Australian Shipworms. Neu *Teredo edax* p. 501 pl. 82.

Calderon, Don Salvador, Moluscos marinos de Andalucia existentes en el Museo de la Universidad de Sevilla. In Act. Soc. esp. Hist. nat. (2) III 1894 7 pg.

Keine neue Art.

Martens, Ed. von, Die Gattung Cylindrus Fitz. In Archiv f. Naturg. 1895. p. 103. Mit Tafel.

Cylindrus obtusus Drp. hat nichts mit Pupa zu thun, aber auch nichts mit *Bul. insularis* und *pullus*, die zu *Stenogyra* gehören, während *Cylindrus* eine Gattung für sich bilden muss, welche näher an *Helix* als an *Buliminus* steht.

The Nautilus. Vol. VIII.

- p. 97. Sterki, Dr. V., two new *Pisidia* (*cruciatum* t. 2 fig. 1—6, 13 und *P. punctatum* fig. 7—12, beide aus dem Ohiogebiet).
p. 100. Bradshaw, Mrs. M. T., *Haminea virescens* (fig. 15).
p. 102. Pilsbry H. A., New Forms of American Shells (*Pseudohyalina lateumbilicata* und *Somatogyrus sargentii* von Alabama).
p. 102. Gill, Th., *Rangia* the proper name of the mactroid genus *Gnathodon*.
p. 103. Ford, John, a new variety of *Olivella* (*gracilis* var. *gaylordi* t. 2, f. 14, Golf von Californien).
p. 104. Sargent, H. E. *Ferussacia subcylindrica* and two new species in Jackson Co., Alabama.
p. 109. Baker, Frank C., a glance at the Chicago Academy of Sciences.
p. 112. Dall, W. H., on a new Species of *Holospira* from Texas (*pasonis* n.)
p. 112. Bradshaw, Mrs. M. F., *Megatebennus bimaculatus*.

- p. 113. Sterki, Dr. V., on collecting Pisidia.
- p. 114. Pilsbry H. A., new american Fresh-Water Mollusks (Planorbis alabamensis, Amnicola olivacea, Planorbis bicarinatus var. aroostookensis, Vivipara georgiana var. limnothauma).
- p. 116. Clapp, Geo. H., Mollusks of Alleghany Co., Pennsylvania.
- p. 121. Simpson, Ch. T., Unio ochraceus and cariosus (with fig.).
- p. 123. Ford, John, Notes on the reported extinction of the Genus Achatinella and marvelous development of a Florida Fasciolaria.
- p. 125. Fulton, Hugh, Note on Helix Sauliae Pfr. nec Reeve.
- p. 125. Nylander, Olof O., Shells of Aroostook Co Maine.
- p. 126. Dall, William H., New Species of Land Shells from the Galapagos Islands. (Nesiotus reibischii und fanneri).
- p. 127. Pilsbry, H. A., Note on Tasmania Acmaea and Ischnochiton. (Acmaea parva var. tasmanica n. und Ischnochiton (Haploplax) mayi n.)
- p. 129. Dall, W. H., new species of Land Shells from Puget Sound, (Patulastra pugetensis und Pyramidula randolphii).

L'Echange, Revue Linnéenne Année X.

- p. 90. Locard, A., Notices conchyliologiques XXVII. Description de deux Succinees nouvelles (castroi n. und silvae n. aus Portugal).
- p. 131. — —, XXVIII. Description de deux Coquilles marines nouvelles. (Trivia mollerati und Patella paulinoi aus dem Mittelmeer.
—, Année XI.
- p. 4. Locard, A., Notices Cochylilogiques. XXIX. Description de deux Hyalinies nouvelles (algarvensis aus Algarve, gyrocurtopsis von Oporto) p. 16. XXX. Conchyliologie d'Allouard-les-Bains (Isère). Keine n. sp.

Le Naturaliste Année 17.

- p. 44. Ancey, G. F., Description d'une nouvelle Helix d'Algérie (Patula marthae vom Dschurdschura). —
- p. 121. Jousseaume, Dr., Description d'un Mollusque nouveau (Ovula laugieri von Suez.)

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 1894 Pt. II und III.

- p. 208. Pilsbry, H., Patella kermadecensis: Mit Pl. VII—VIII.
- p. 223. Baker, Frank C., Further Notes on the embryonic whorls of the Muricidae. Giebt die Abbildung der Apices von Murex troescheli und Eupleura caudata.

*Proceedings of the United States National Museum Vol. XVI.
1893.*

- p. 316. Stearns, Robert E. C., Preliminary Report on the Molluscan Species collected by the U S. Scientific Expedition to West Africa.
- p. 341. — —, on rare or little known Mollusks from the West Coast of North and South America, with descriptions of new species With pl. 50.
- p. 353. — —, Report on the mollusk Fauna of the Galapagos Islands with descriptions of new species. Enthält eine allgemeine Uebersicht über die Verbreitung der Fauna auf den von der amerikanischen Expedition besuchten Inseln und ein vollständiges Verzeichnis der Fauna. Zum erstenmal abgebildet sind: *Pleuropyrgus habeli* t. 51 fig. 1; — *Onchidium lestei* t. 51 fig. 2, 3; — *Onchidella steindachneri* Semper t. 51 fig. 4, 5; — *Nitidella incerta* t. 51 fig. 6; — *Tectarius galapagiensis* t. 51 fig. 7. Im Ganzen werden 288 Arten aufgeführt.
- p. 451. Peck, James L., Report on the Pteropods and Heteropods collected by the M. S. Fish Commission Steamer Albatross during the Voyage from Norfolk to San Francisco 1887—88.
- p. 470. Dall, W. H., a subtropical miocene Fauna in Arctic Siberia. (With pl. 56).
- p. 591. Simpson, Chas, T., on some fossil Unios and other Freshwater Shells from the Drift at Toronto, Canada, with a review of the distribution of the Unionidae of Northeastern North America. Die Funde liefern den Beweis von einem Vordringen der Mississippi-Fauna bis Canada in einer Intraglazialperiode.
- p. 639. Dall, W. H., Land Shells of the Genus *Bulimulus* in Lower California, with descriptions of several new species. Neu oder zum erstenmal abgebildet: *Scutalus montezuma* Dall t. 72 fig. 1; — *S. bayleyi* Dall t. 71 fig. 1; — *Mesembrinus xantusi* t. 72 fig. 4; — *Leptobrysus excelsus* Gld. t. 72 fig. 7; — *L. zeledoni* Dall t. 71 fig. 2; — *L. bryanti* Dall t. 71 fig. 3, 4; — *L. veseyianus* Dall t. 71 fig. 4, 5; — *Orthotomium sufflatum* Gould t. 72 fig. 9.
- p. 694. Dewitt Webb, M. D., the shell-heaps of the east-cost of Florida With Plates 18—84.
- p. 743. Stearns, Robert E. C., Notes on recent collections of North American Land, Fresh-Water and Marine Shells received from the U. S. Department of Agriculture.

Wohnungswechsel:

Herr C. P. Gloyne wohnt jetzt Campagne Bertrand cointrin,
Canton de Genève (Suisse.)

Eingegangene Zahlungen:

Kraetzer, F., 6 Mk.; — Schlüter, H., 6 Mk.; — Reinhardt, B., 6 Mk.; — Trübsbach, L., 18 Mk.; — Brusina, A., 12 Mk.; — Neumann, E., 6 Mk.; — Hocker, G., 6 Mk.; — Pastor, B., 6 Mk.; — Simroth, L., 6 Mk.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

No. 9 u. 10.

September-Oktober 1895.

Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft. Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn Dr. W. Kobelt in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von R. Friedländer & Sohn in Berlin zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn D. F. Heynemann in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Diagnoses

specierum novarum ex insulis Philippinis
auctoribus

J. F. Quadras et O. F. von Moellendorff.

(Schluss).

Tricula elongatula Q. et Mlldff.

T. rimata, turrita, tenuis, subtilissime striatula, lineis spiralibus maxime confertis microscopicis decussata, pallide lutescens. Anfr. 6 convexiusculi, sutura marginata subcrenulata disjuncti, ultimus antice paulisper ascendens. Apert. verticalis, oblique ovalis, peristoma parum expansum, intus sublabiatum, margine supero
XXVII.

ad insertionem paullum sinuatum, marginibus callo crassiusculo conjunctis.

Diam. 1,75, alt. 3,2 mm.

Hab. in insula Catanduanes. (Q. 2455).

Tricula hidalgoi Q. et Mlldff.

T. rimata, conoideo-globosa, solidula, laevigata, opaca, brunneo-cornea. Anfr. 4 convexi, celeriter accrescentes, sutura marginata disjuncti, ultimus tumidus, paullatim descendens. Apert. paullum retrorsum inclinata, late acuminate-ovalis, dextrorsum protracta, peristoma sat late expansum, haud reflexum, intus calloso-incrassatum. Operculum valde concavum, anfr. 3, nucleo subbasali, sublaterali.

Diam. 2, alt. 2,2.

Hab. ad lacum Mainit insulae Mindanao. (Q. 2751).

Prososthenia quadrasi Mlldff.

T. subperforata, turrita, solida, subirregulariter plicato-striata, nitidula, olivaceo-cornea. Anfr. 7 convexi, lente accrescentes, sutura profunde impressa disjuncti, ultimus pone aperturam callo annuliformi flavo cinctus. Apert. verticalis, oblique ovalis, peristoma parum expansum, continuum, superne appressum, intus calloso-incrassatum.

Diam. 3, alt. 5,1 mm.

Hab. prope oppidum Surigao insulae Mindanao. (Q. 2721).

Stenothyra quadrasi Mlldff.

T. compresse ovato-conica, solida, transverse levissime striatula, seriebus spiralibus punctorum impressorum sculpta, luteo-brunnea; spira sat elevata apice acuto. Anfr. $5\frac{1}{2}$, primi convexi, penultimus convexiusculus, ultimus valde compressus, ventre applanatus, basi

crista brevi, compressa, valida munitus. Apert. valde coarctata, late ovalis, peristoma calloso-incrassatum. Operculum terminale, paullulum concavum, anfr. 4. Diam. 4, alt. 6,5 mm.
Hab. prope Manila nec non in insula Negros (Q. 204).
var. *minor*, plerumque decollata, paullo minor.
Hab in insulis Mindoro et Busuanga. (Q. 2644).

Stenothyra hyalina Q. et Mlldff.

T. vix rimata, ovato-conica, tenuis, pellucens, hyalino-alba, laevigata, nitens. Anfr. $4\frac{1}{2}$ sutura sat impressa, submarginata discreti, convexi, penultimus turgidus, ultimus ventre paullum applanatus, breviter deflexus. Apert. sat obliqua, acuminato-ovalis, peristoma intus calloso-limbatum.

Diam. 2, alt. 3 mm.

Hab. ad suburbia Paco et San Juan de Monte prope Manila (Q. 301, 302, 530)

var. *lutescens* Mlldff. Minor, pallide lutescens, paullo gracilior. Diam. 1,5, alt. 2,5 mm.

Hab. prope vicum Montalban provinciae Manila leg. O. de Moellendorff.

Stenothyra cyclothyra Q. et Mlldff.

T. subrimata, irregulariter conico-ovata, solidula, glabra, corneo-lutescens. Anfr. 4 convexiusculi, sutura parum impressa marginata disjuncti, ultimus ventre sat appланatus, sinistrorsum gibber, antice longiuscule valde deflexus, ad aperturam maxime coarctatus. Apert. parum obliqua, subcircularis, parva.

Diam. 1,5, alt. 2,2 mm.

Hab. prope vicum Montalban provinciae Manila legerunt autores.

Stenothyra cristata Q. et Mlldff.

T. rimata, oblonge ovato-conica, solidula, laevigata, pallide lutescens, decollata. Anfr. qui supersunt 3 convexi, pone suturam bene impressam marginatam subangulati, ultimus ventre paullum applanatus, sinistrorum gibber, antice brevissime deflexus, modice coarctatus, basi compressus, circa rimam crista brevissima parum distincta, altera brevi sed validissima crassa usque ad basim aperturae producta munitus. Apert. fere verticalis, acuminato-ovalis. Operculum sat concavum.

Diam. 2, alt. 3,25 mm.

Hab. in lacu Mainit insulae Mindanao.

Stenothyra boettgeri Q. et Mlldff.

T. rimata, elongate conica, solida, levissime striatula, lineis spiralibus perindistinctis cincta, brunnea; spira decollata. Anfractus qui supersunt 3 vix convexiusculi, ultimus ventre parum applanatus, ad aperturam parum coarctatus. Apert. paullum retrorsum inclinata, oblique ovalis, peristoma continuum, superne appressum, intus calloso-incrassatum.

Diam. 2,5, alt. (decoll.) 3,5 mm.

Hab. in insula Tinago prope Mindanao (Q. 1944).

Cyathopoma (Jerdonia) microconus Q. et Mlldff.

T. anguste umbilicata, turbinata, solidula, tenuiter striatula et lineis spiralibus valde confertis decussata, luteocornea, opaca. Spira sat elevata, lateribus fere strictis, apice obtuso. Anfr. fere 5 turgidi, sutura profunde impressa disjuncti. Apert. fere verticalis, subcircularis, peristoma simplex, rectum, obtusum.

Diam. 2, alt. 2 mm.

Hab. prope vicum Buguey provinciae Gagayan leg. coll. indigena.

Cyathopoma (Jerdonia) euspirum Mlldff.

T. anguste sed pervie umbilicata, elate pyramidata, solidula, subtilissime striatula, lineis spiralibus minutis sed distinctis decussata, sericina, flavescenti-cornea; spira elongata, lateribus subconcavis, apice obtusulo, glabratu, nitente. Anfr. 6 teretes, sutura profunda discreti. Apert. parum obliqua, subcircularis, peristoma rectum, obtusum, intus sublabiatum. Operculum extus testaceum, paullum concavum, anfr. 5. intus corneum, subplanum, medio papilla munitum; sulcus mediocris.

Diam. 3, alt. 3.6 mm.

Hab. prope vicum Garamuan provinciae Camarines leg. coll. indigena.

Cyathopoma (Jerdonia) concavospirum Mlldff.

T. pro sectione sat late et pervie umbilicata, turbinata, tenuis, subpellucida, subtilissime striatula et lineis spiralibus minutis sed distinctis decussata, pallide corneo-lutescens; spira modice elevata, lateribus distincte concavis, apice acutulo. Anfr. 5 perconvexi, satura profunda disjuncti, sat celeriter accrescentes, ultimus tumidulus. Apertura verticalis, subcircularis, ampla, peristoma rectum, obtusum. Operculum ut in sp. praec.

Diam. 4, alt. 3.5 mm.

Hab. cum praec.

Ditropis adesmospira Mlldff.

T. tubulum spiraliter tortum anfr. 3 liberos sistentem formans, olivaceo-flava, nitens. Anfractus rotundato-quadrangulares, superne et ad peripheriam carinis bene exsertis acutis cincti, inter carinas planulati. Apertura sat obliqua, subcircularis, peristoma haud expansum duplex, internum incrassatum, porrectum.

Diam. 3.5, alt. 2.5 mm.

Hab. prope vicum Caramuan provinciae Camarines leg. coll. indigena.

Cyclophorus ceratodes Mlldff.

T. late et aperte umbilicata, subdiscoidea, solida, transverse striatula, microscopice decussatula, nitens, castaneo-fusca, maculis pallidis, interdum in strigas flammulatas confluentibus hic illie picta; spira parum elevata apice submucronato. Anfr. 5 rapide accrescentes, sat convexi, supremi distanter costulati, penultimus liris spiralibus 5 parum distinctis tum evanescentibus cinctus, ultimus rapide accrescens, ad aperturam valde dilatatus, campanulatus. Apertura ampla, modice obliqua, circularis, peristoma duplex, externum modice expansum, ad umbilicum dilatum, patens, internum aurantiacum, brevissime porrectum.

Diam. maj. 42, min. 31, alt. 24, apert. diam. (intus) 17,5 mm.

Hab. prope vicum Caramuan provinciae Camarines leg. coll. indigena.

Cyclophorus pterocyclus Mlldff.

T. modice umbilicata, depresso-turbinata, subtiliter striatula, superne carinulis 5—6, parum distinctis et in intersticiis lirulis spiralibus numerosis cincta, costulis membranaceis confertis, deciduis quasi pruinosa, fulva, strigis flammulatis castaneis picta; spira modice elevata apice acutulo. Anfr. 5 convexi, ad suturam planulati, ultimus carina alternatim fusco- et flavido-maculata, parum exserta cinctus. Apertura subverticalis, rotundato-ovalis, peristoma duplex, superne pone insertionem excisum, sursum et retrorsum curvatum, tum protractum, margine columellari leviter sinuata. Operculum

corneum, crassiusculum, intus annulo incrassatulo et papilla centrali parva munitum.

Diam. 21, alt. 16. mm.

Hab. prope vicum Caramuan provinciae Camarines leg. coll. indigena.

Lagochilus stephanophorum Mlldff.

T. late et aperte umbilicata, conoideo-depressa, tenuiscula, subpellucida, transverse subtiliter striatula, lineis spiralibus minutissimis decussatula, costulis membranaceis tenuissimis induta, fulvocornea, strigis fulguratis castaneis ornata; spira breviter conoidea lateribus convexiusculis, apice submucronato acutulo. Anfr. 6 sat convexi, ad suturam profunde impressam subcanaliculatam fimbriati, ultimus subcompressus, ad peripheriam angulatus, serie pilorum longiusculorum munitus, ad umbilicum declivis, subangulatus. Apertura valde obliqua, peristoma duplex, externum sat expansum, superne ad insertionem subalatum, internum incrassatum, breviter porrectum, continuum, superne appressum, profundiuscule incisum. Operculum normale.

Diam. maj. 15, min. 13, alt. 10,5, apert. lat. 7, long. 7,5 mm.

var. *minor*. Diam. 11,5, alt. 9, anfr. ult. minus compresso, apert. minus ampla.

Hab. prope vicum Caramuan leg. coll. indigena.

Leptopoma pileolus Q. et Mlldff.

T. anguste et semiobtecte perforata, turbinata, tenuis, pellucida, leviter striatula, lineis spiralibus maxime confertis decussatula, nitens, alba; spira sat elevata, sere exacte conica. Anfr. 6 sat convexi, sutura bene impressa discreti, ultimus carina valde acuta et exserta opace alba cinctus. Apert. sat obliqua subcircularis

peristoma latiuscule expansum, ad carinam lanceolatum et subcanaliculatum, columella profundiuscule sinuata, extus fere stricta, superne dilatata perforationem medio obtegens.

Diam. 15,25, alt. 14 mm.

Hab. Inter vicos Magapig et Gattaran provinciae Cagayan.

Leptopoma varians Mlldff.

T. anguste et semiobtecle umbilicata, turbinata, tenuissima, pellucida, leviter striatula, lineis spiralibus maxime confertis decussata, lirulis 4—5 parum elevatis cineta, pruinosa, sericina, aut unicolor pallide lutescens aut brunnescens aut maculis castaneis ad suturam distantibus ceterum confertis interdum strigatim confluentibus picta aut rarius taenia angusta peripherica ornata. Spira fere regulariter conica apice acutulo. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, sutura sat impressa, subcanaliculata discreti, ultimus carina parum exserta cinctus. Apert. modice obliqua, subcircularis, peristoma breviter expansum, tenue, margo columellaris extus fere strictus, modice sinuatus, superne subdilatatus.

Diam. 10—12, alt. 10—11,5 mm.

Hab. in provinciis Manila, Morong, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan ipse legi.

Alycaeus cyphogyrus Quadr. et Mlldff.

T. late et aperte umbilicata, depressa, fere discoidea, solidula, subpellucida, transverse subtiliter striatula, lineis spiralibus confertis microscopicis decussata, lutescenti-albida. Spira vix elevata, apice valde obliqua, glabrato, mucronato, prominulo. Anfr. 4 teretes, ultimus vix compressus, a medio longe gibboso-inflatus in parte inflata costulatus, vix 1 mm. pone aperturam

valde constrictus, a constrictione valde deflexus. Tubulus longiusculus, circa 1 mm. Apertura diagonalis circularis, peristoma distincte duplex, externum late expansum, superne ad insertionem levissime excisum, internum continuum, incrassatum, breviter porrectum. Diam. maj. 5,66, alt. 3 mm.

Hab. in insula Catanduanes leg. J. Quadras, prope vicum Caramuan insulae Luzon coll. indigena.

Arinia dichroa Mlldff.

T. anguste et fere obtecte perforata, ovato-oblonga, tenuiscula, pellucens, superne aurea, subtus albohyalina, nitens; spira sursum sensim attenuata apice acutulo. Anfr. 6 turgidi, sutura profunda disjuncti, primi 3 sat distanter costati, ceteri laeves, ultimus in prima quarta parte levissime constrictus, antice paullum ascendens. Apertura parum obliqua, circularis, peristoma perdistincte duplex, externum sat late expansum, superne ad insertionem subdilatatum, ad perforationem profunde sinuatum, reflexum. internum longiuscule porrectum.

Diam. 3,5, alt. 5,5 mm.

Hab. prope vicum Caramuan provinciae Camarines leg. coll. indigena.

Arinia chrysacme Mlldff.

T. rimata, subcylindrico-oblonga, solidula, subpellucida, costulis filiformibus sat distantibus undique sculpta, flava, sursum fulvescens; spira subcylindrica, apice subimmerso, obliqua, mucronato. Anfr. 6 turgidi, sutura valde profunda disjuncti, ultimus in prima quarta parte levissime constrictus, tum tumidulus, brevissime ascendens. Apertura paullum obliqua, circularis, peristoma duplex, externum modice expansum.

ad perforationem reflexum, internum paullum porrectum.

Diam. 2,5 alt. 4,25 mm.

, 2,66 , 4,6 mm.

, 2,75 , 5,25 mm.

Hab cum praec.

Arinia gibbosula Mlldff.

T. anguste et semiobtecte perforata, ovato-conoidea, tenuiscula, subpellucida, flava; spira convexo-conoidea, sursum sensim attenuata apice acutulo. Anfr. 5½ turgidi, primi 3½ costulis subtilibus sat distantibus sculpti, ultimi glabrati, ultimus in ultima tercia parte valde constrictus, tum gibboso-inflatus, ad aperturam campanulatus, vix ascendens. Apertura parum obliqua, circularis, peristoma distinete duplex, externum late expansum, ad perforationem sinuatum, reflexum, internum continuum, superne appressum, subexpansum, porectum.

Diam. 3 mm.

Arinia cylindrus Q. et Mlldff.

T. angustissime et fere obtecte perforata, oblonga, subcylindrica, tenuis, subpellucida, costulis confertis usque ad aperturam sculpta, fulva; spira primum subcylindrica, sursum conoidea, apice obliquo subimmerso, rarius prominulo. Anfr. 6 turgidi, sutura profunda impressa disjuncti, ultimus in tercia parte leviter constrictus, tum tumidulus. Apertura parum obliqua, circularis, peristoma distinete duplex, externum late expansum, ad columellam paullum dilatatum, sinuosum, internum subexpansum, incrassatulum, porrectum.

Diam. 2,5, alt. 4 mm.

Hab. in montibus Mariveles insulae Luzon legerunt autores.

Diploptychia Mlldff. n. sect. Diplommatinae.

Lamellae columellares 2, palatales 2, parietalis una.
Typ. *D. heliscus* Mlldff.

Diplommatina (*Diploptychia*) *heliscus* Mlldff.

T. rimata, subfusiformi-turrita, tenuis, subtiliter striatula, corneo-lutescens; spira valde elevata, sursum valde attenuata lateribus subconcavis. Anfr. $8\frac{1}{4}$ valde convexi, ultimus decrescens, paullum devians, antice sat ascendens. Apertura modice obliqua, subcircularis, peristoma vix expansum, valde incrassatum, quasi multiplicatum, longe porrectum. Lamellae columellares 2, infera humilis, sat recedens, intus valde elevata, supera humilior, oblique intuenti conspicua, palatales 2 profundae, supera longiuscula, infera brevior, parietalis profunda, sat elevata.

Diam. vix 1, alt. 2,5 mm.

Hab. ad Minalongao provinciae Nueva Ecija ipse legi.

Omphalotropis (*Atropis*) *crassilabris* Mlldff.

T. vix ruinata, pyramidata, solidula, transverse subtiliter striatula, liris tenuibus membranaceis cincta, corneo-brunnea; spira fere exacte conica apice obtuso. Anfr. 6 convexiusculi, sutura subcanaliculata disjuncti, ultimus, ad peripheriam carina bene exserta crassiuseula cinctus. Apertura valde obliqua, acuminato-ovalis, peristoma sat expansum, valde incrassatum, brunneo-fulvum, marginibus callo tenui sed distincto junctis.

Diam. 2,75, alt. 3,9 mm.

Hab. prope vicum Libmanan provinciae Camarines insulae Luzon leg. coll. indigena.

Obs. Similis O. trochomorphae Mlldff., quam per errorem generi Satsumae olim adscripseram.

Acmella gradata Mlldff.

T. anguste perforata, pyramidata, tenuiuscula, subpellucida, laevigata, nitens, corneo-fulva; spira gradata lateribus fere strictis, apice obtuso. Anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi, ad suturam profunde impressam subangulati, sat lente accrescentes. Apertura fere verticalis, oblique late ovalis, peristoma rectum, obtusum, margine columellari profundiuscule sinuato, carinulam tenuem in perforationem emitte.

Diam. 1,8, alt. 2,5.

Hab. in provincia Camarines insulae Luzon leg. coll. indigena.

Acmella pusilla Q. et Mlldff.

T. anguste perforata, ovato-conica, tenuiuscula, subpellucida. vix striatula, nitens, corneo-flavescens; spira valde elevata, lateribus convexiusculis, apice obtusulo. Anfr. 6 convexi, sutura sat profunda discreti. Apert. fere verticalis, acuminato-ovalis, peristoma rectum, obtusum, intus sublabiatum, margine columellari profunde sinuato.

Diam. 1,33, alt. 2 mm.

Hab. in provincia Gagayan insulae Luzon leg. collector indigena.

Helicina (Geophorus) bothropoma Mlldff.

T. subdepresso trochiformis, tenuis, oblique curvatum striatula, subopaca, laete flava; spira conoidea lateribus convexiusculis, apice mammillari, laevi, nitido. Anfr. 5 fere plani, sutura anguste marginata disjuncti,

ultimus carina acuta sat exserta carinatus, basi planiusculus, antice non descendens. Apertura maxime obliqua, lanceolata, peristoma superne vix, dextrorsum sat expansum, basi substrictum, reflexiusculum. Columella brevis, dilatata, cum margine basali angulum vix distinctum formans. Operculum ad columellam profundiuscule bifidum, lamina interna cornea, ad columellam valde reflexa, externa calcarea, valde concava, sinistrorsum profundiuscule excavata, lamella transversa nodulosa munita, trans lamellam denuo excavata, margine columellari profundiuscule sinuoso.

Diam. 18, alt. 9,5 mm.

Hab. prope vicum Caramuan provinciae Camarines leg. coll. indigena.

Obs. Differt ab *H. acutissima*, cui proxima, testa tenuiore, carina minus acuta, basi applanata, apertura magis obliqua et praesertim operculo valde peculiari.

Georissa regularis Quadr. et Mlldff.

T. angustissime perforata, turrito-conica, tenuis, subtilissime striatula, opaca, corneo-fulva; spira valde elongata lateribus strictis apice obtusulo. Anfr. 6 perconvexi, lente accrescentes, sutura profunde impressa discreti. Apert. modice obliqua, subcircularis, peristoma rectum, obtusum, in margine columellari vix dilatato.

Diam. 1, alt. 1,7 mm.

Hab. in insula Busuanga. (Q. no. 2768).

Diagnosen neuer Arten

Von

Bruno Strubell.

Helix (Sphaerospira) minnigerodei n.

T. obtekte umbilicata, depresse globosa, tenuiuscula sed solida, translucida, subtilissime striatula, in anfractibus spirae sub lente vestigiis pilorum regulariter dispositorum obsita, unicolor lutescenti-fusca apice pallidiore. Spira convexa apice planiusculo parvo haud prominulo. Anfractus $4\frac{1}{2}$ regulariter crescentes, sutura distincta albida fuscomarginata discreti, superi convexitus, ad suturam breviter planati, ultimus major, rotundatus, subinflatus, hic illie malleatus lirisque et sulcis spiralibus obsoletis praesertim ad peripheriam sculptus, antice profunde deflexus. Apertura diagonalis, fere circularis, parum lunata, intus caerulescenti-albida fusco marginata, peristoma undique latissime expansum et reflexum, coeruleo-albido labiatum, dein fusco-limbatum, limbo tenuissimo arcuato marginibus callo tenui junctis, columellari dilatato, ad umbilicum appresso eumque fere omnino tegente.

Diam. maj. 40,5, min. 30,5, alt. 30 mm.

Hab. Normanby Island Novae Guineae anglicanae.

Helix (Sphaerospira) anceps n.

T. semiobtekte umbilicata, depresse globosa, solida, in anfractibus superis sub lente granulosa, in ultimo regulariter confertimque arcuatim striata, unicolor rufo-castanea. Spira convexa apice plano parvo. Anfractus $4\frac{1}{2}$ convexi, sutura impressa discreti, ultimus dilatatus, rotundatus, circa umbilicum primum infundibuliformem dein angustatum peculiariter compressus, antice leniter sed profunde descendens. Apertura

obliqua, lunato-circularis, intus livide albo-coerulea
limbo externo fusco, marginibus vix conniventibus,
callo tenuissimo junctis, columellari oblique ascende,.
leviter dilatato, umbilici majorem partem tegente.

Diam. maj. 44, min. 34, alt. 32 mm.

Hab. Ferguson Island Novae Guineae.

Diffr. ab Hel. Gerrardi (Rehsei Mts.) Smith testa minore
magis deppressa .umbilico multo magis obtecto.

Helix (Chloritis) nephele n.

T. mediocriter sed pervie umbilicata, umbilico ad introitum infundibuliforme dilatato, deppresse globosa,
tenuiuscula, haud nitens, pilis brevissimis confertis
regulariter dispositis undique obsita, unicolor rufo-
fusca. Spira deppresse conica apice planiusculo. Anfrac-
tus $5\frac{1}{2}$ convexi, sutura impressa disereti, regulariter
crescentes, ultimus magnus subinflatus, circa umbilicum
compressus, antice valde celeriterque descendens.
Apertura obliqua, late lunato-ovalis, intus rufescens;
peristoma leviter incrassatum, expansum, concolor,
marginibus conniventibus callo tenuissimo junctis,
externo et basali reflexis, columellari dilatato, reflexius-
culo.

Diam. maj. 34, min. 27.5, alt. 26 mm.

Hab. Cloudy Mountains Novae Guineae britannicae,
alt. 2500.

Nanina (Hemiplecta) strubelli Kobelt mss.

T. anguste perforata, deppresse trochiformis, acute carinata,
tenuis, nitida, translucida, subtiliter striatula, unicolor
virescenti-cornea. Spira deppresse conica, apice parvo.
Anfractus 5 convexiusculi, leniter regulariterque cres-
centes, superi convexiusculi, inferi ad suturam deppressi,
carinae vestigium exhibentes, ultimus carina acuta
compressa cinctus, supra et infra fere aequaliter con-

vexus, antice haud descendens. Apertura obliqua ovato-triangularis, lunata, concolor, intus profunde canaliculata, extus acute angulata, peristomate tenui, recto, margine infero bene rotundato, columellari ad insertionem haud dilatato.

Diam. maj. 24, min. 21, alt. 12 mm.

Hab. Cloudy Mountains Novae Guineae.

Succinea strubelli Kobelt mss.

T. parva ovalis, succinea, tenuis, pellucida, subtiliter striata, spira parva. Anfractus $2\frac{1}{2}$ rapide crescentes, convexi, ultimus fere totam testam efformans, sub lente vestigia sulcorum spiralium exhibens. Apert. acuminato ovalis columella arcuata filosa.

Alt. 8, diam 5,5, alt. apert. 6 mm.

Hab. Cloudy Mountains Novae Guineae britannicae.

Succinea papuana n.

T. parva ovata, quam praecedens solidior, succineo-cornea, ruditer et inaegulariter striatula, translucida. Anfractus $2\frac{1}{2}$ rapide crescentes, primi $1\frac{1}{2}$ spiram minimam efformantes, ultimus oblique dilatatus, lineis spiralibus obsoletis sculptus. Apertura acuminato-ovalis, columella oblique arcuata, filosa.

Alt 7, diam 5,5, alt apert. 5,2 mm.

Hab. Lorne Range Novae Guineae britannicae.

Etwas bauchiger und mehr schief, als die vorige, auch festshaliger, sonst nahe verwandt. Es sind dies die ersten Succineen aus Neuguinea.

Helix (Solaropsis) leopoldina n.

T. obtecta perforata, depresso globosa, *subinflata* undique confertissime granulata, fuscescens, castaneo strigata fasciis alternatim castaneo et albo maculatis tribus, prima suturali latiore, maculis lunaeformibus, secunda

et tertia in anfractu ultimo tantum conspicuis maculis sagittiformibus ornata ad basin fasciolis numerosis albido articulatis cincta. Spira convexo-conica apice brevissime conico; sutura distincta albofilosa. Anfractus $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, regulariter crescentes, ultimus obscure subangulatus, *supra et infra fere aequaliter contexus*, antice haud descendens. Apertura diagonalis, semilunaris, intus coeruleo albida, pulcherrime iridescentia: peristoma tenue vix levissime incrassatum, undique expansum, coeruleoscens, marginibus distantibus callo tenuissimo junctis, basali et columellari breviter reflexis, columellari arcuatim ascende, ad insertionem breviter dilatato et super perforationem reflexo.

Diam. maj. 46, min. 39, alt. 29 mm.

Hab. San Leopoldo Brasiliae.

Pilsbry's neue Eintheilung der Heliciden.

Von

Dr. O. F. von Möllendorff.

Dr. Kobelt hat bereits (N. B. C. 1893 p. 82) auf die Wichtigkeit von Pilsbrys neuesten Studien zur Systematik der Heliciden hingewiesen und der nunmehr abgeschlossene IX. Band von Tryon's Manual, welcher die ausführliche Begründung seiner Ansichten enthält, rechtfertigt das Interesse, mit welchem dieser Publikation entgegengesehen wurde. Es ist eine sehr wichtige Arbeit, mit welcher sich alle Systematiker der Heliciden auseinanderzusetzen haben werden, aber als abschliessende Lösung der Frage wird sie schwerlich angesehen werden können. Dazu fehlen in erster Linie doch noch zu viele anatomische Untersuchungen

sowohl einzelner Arten als auch ganzer Gruppen. Aber auch im Rahmen unserer jetzigen beschränkten Kenntnisse ist schon viel Spielraum für abweichende Ansichten, und wenn ich die Kritik der auf anatomische Verhältnisse basirten Abgrenzungen berufeneren Federn überlassen muss, so ist es vielleicht nicht ohne Nutzen, wenn ich einige Einwendungen vom conchyliologischen Standpunkt aus schon jetzt veröffentliche.

Es ist in erster Linie bedauerlich, dass Pilsbry in der Einleitung die Agnathen (Testacelliden) und Zonitiden nicht oder nur flüchtig berücksichtigt. Dies tritt besonders hervor bei der Besprechung der Kiefer. Pilsbry nimmt als ältesten Typ den aus getrennten Platten bestehenden an (*Polyplacognatha, Punctum*), aus dem sich der odontognathe, goniognathe, aulacognathe und oxygnathe Kiefer entwickelt habe. Logischer Weise musste dann auch der agnathe Typus, wo der Kiefer bekanntlich nicht ganz fehlt, sondern membranartig ist und daher in Kalilauge zerstört wird, als eine Weiterentwicklung des oxygnathen Typus betrachtet werden. Alle auf den Kiefer basirten Eintheilungen erklärt er für künstlich, was entschieden zu weit geht: richtig scheint nur, dass, wir überall in der Natur, auch hier Ausnahmen vorkommen. Das ist aber mit allen andern Unterscheidungsmerkmalen der Fall und ganz sicher auch mit den morphologischen Charakteren der Reproduktivorgane, die jetzt ebenso ausschliesslich „Mode“ sind, wie früher Kiefer und Radula. Sehr richtig sagt P. (p. XXVII), dass weder Kiefer, noch Radula noch Schale einzeln genommen eine richtige Systematik ergeben, sondern die Summe aller morphologischen Kennzeichen in Betracht gezogen werden muss, da sonst die Klassifizierung leicht einseitig wird. Nur schade, dass er dieses Prinzip selbst nicht immer befolgt; die einseitige Verwendung des Geschlechtsapparats führt gelegentlich zu demselben Resultat. Mir scheint der Kiefer immer noch

ein sehr wichtiges Merkmal zu sein, welches sehr häufig ausschlaggebend sein wird, wo die sonstigen Kennzeichen im Stich lassen.

Eine von Pilsbry 1890 aufgestellte Gattung Macroon umfasste Stylodonta, Helicophanta, Acavus, Panda. Im gegenwärtigen Werk hat er diese Gattung aufgegeben, behandelt die obigen Gruppen als Gattungen seiner II. Tribus Macroogona und rechnet ausserdem dazu: Pyrochilus (= Phania), Ampelita, Pedinogyra, Anoglypta, Garyodes und Macrocyclus. Die letztere lasse ich beiseite, weil ihre Fresswerkzeuge und Weichtheile noch unbekannt sind. Bei allen übrigen Gattungen ist der Kiefer glatt (bei Anoglypta ganz schwach gestreift, aber immer noch oxygnath zu nennen). Den allermeisten ist ausserdem die Tendenz zum starken Herabbiegen der letzten Schalenwindung gemeinsam. Nun schliessen sich ohne alle Frage Obbina und Planispira durch die Schale an Pyrochilus und Acavus an, beide zeigen, namentlich Obbina, den oben hervorgehobenen Charakter der letzten Windung, und beide sind oxygnath. Durch die auf die Geschlechtsorgane gegründete Eintheilung Pilsbry's gerathen sie aber in die IV. Tribus Epiphalligona und kommen mit den odontognathen Chloritis, Camaena u. a. zusammen. Ich bin nicht Anatom, aber aus Pilsbry's eigenen Angaben ersehe ich, dass die Einrichtung des Geschlechtsapparats keineswegs so verschieden ist, um eine solche Zerreissung sonst verwandter Gruppen nothwendig zu machen:

Macroogona.

Genitalia simple, the vas deferens inserted directly on penis or enlarged into an epiphallus; no flagellum. No dart sack or mucous

Epiphalligona.

Genital system having an epiphallus and flagellum on penis (but these structures obsolete in some Pleurodontes and Planispiras). Appendix or

glands, no diverticulum or spermatheca.	penis gland small, if pre- sent; female side with no accessory appendages.
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Der ganze Unterschied scheint also der zu sein, dass die Macroogonen kein Flagellum haben, welches auch bei Epi-phallogonen manchmal obsolet wird. Und darum die durch Gebiss und Schale deutlich ausgesprochene Verwandtschaft vernachlässigen? Bei Eulota wird das Verhandensein oder Fehlen des Fagellum's kaum für wichtig genug gehalten, um Sektionen derselben Gattung aufzustellen.

Dass in der That die Beschaffenheit des Kiefers innerhalb einer aus andern Gründen zusammengehörigen Reihe schwanken kann, beweist Pilsbrys Angabe über Caprinus (Dentellaria) und Caracolus; bei ersterer Gruppe kommen glatte, schwach und stark gerippte Kiefer vor, und auch in letzterer ist wenigstens eine Art (*C. bornii* Pfr.) odontognath. Trotzdem glaube ich, dass auch diese in ihrer Majorität oxygnäthen Gruppen nebst Labyrinthus und Isomeria zu derselben Familie wie Obbina u. s. w. gehören. Speziell Caracolus hat nicht bloss grosse habituelle Ähnlichkeit mit Obbina, sondern zeigt auch den gleichen Bänderungstypus und namentlich auch die starke Herabbiegung der letzten Windung. Auch in dem rein sexuellem System Pilsbrys stehen Pleurodonte und Obba dicht neben einander. Wir werden also gut thun den Kiefer als wichtiges morphologisches Kennzeichen bei der Eintheilung nach wie vor zu berücksichtigen, ohne zu vergessen, dass gelegentliche Ausnahmen vorkommen. Für uns „Schalenmenschen“ ist es aber eine grosse Befriedigung immer mehr zu sehen, dass die neuerdings so sehr verachtete Schale doch schliesslich immer noch den besten Fingerzeig zur richtigen Gruppierung liefert, vorausgesetzt, dass ihre Kennzeichen noch sorgfältiger als früher geprüft und mit richtigem Takt angewendet werden.

Eine mir gänzlich unannehbare Familie ist Endodontidae Pilsbry, welche Punctum, Laoma, Flammulina, Phasis, Amphidoxa, Endodonta, Pyramidula (Patula) und Parahrhytida umfasst, also sowohl nach Schalen- als Weichtheilcharakteren eine sehr gemischte Gesellschaft, gegen deren Zusammenfassung ich folgende Einwände zu machen habe.

Punctum muss schon wegen seines eigenthümlichen Kiefers unbedingt eine besondere Familie oder Subfamilie bilden. Das gleiche gilt von Laoma mit Phrixgnathus.

Das Genus Flammulina mit den Gruppen Phacussa, Thalassohelix, Gerontia, Allodiscus, Pyrrha, Therasia, Phenacohelix. Flammulina s. str., Suteria, Hedleyoconcha, ? Monomphalus und ? Rhytidopsis entspricht den Charopidae Hutton's, welcher Charopa Alb. falsch aufgefasst hatte (f. Suter Phil. Inst. Canterb. 1891 p. 270), und den Phenacohelicidae Sut. Diese Formen bilden durch das Verhandensein einer Schleimdrüse am Fussende, den stegognathen Kiefer und die Radula einen ganz eigenen Typus, den Suter und Pilsbry selbst gut characterisiert haben und der ohne Zweifel die Berechtigung eine eigene Familie — Phenacohelicidae — zu bilden besitzt. Seine Vermengung mit Endodonta und Charopa (im eigentlichen Sinne) halte ich für einen Rückschritt.

Ueber die Einfügung von Phasis ist nichts weiter zu sagen, als dass es wohl ein Nothbehelf aus Mangel an einem andern passenden Platz für diese Gruppe gewesen ist. Keinenfalls glaube ich, dass die Arten capensis Pfr. und uitenhagensis Kr. mit menkeana Pfr., dem Typ von Phasis, in dieselbe Gruppe gehören. Trachycystis Pilsbry (für Pella Alb.) scheint mir ebenfalls als subgen. von Phasis einen sehr unglücklichen Platz erhalten zu haben. Eine selbständige Gattung ist sie jedenfalls und seit Suter (Ann. Mag. N. H. 1894 p. 60) eine Schleimpore am Fussende

nachgewiesen hat, kann sie wie *Flamulina* nicht bei den Patuliden (Endodontiden) bleiben.

Gänzlich verfehlt ist schliesslich die Anreihung von *Sculptaria* als subgen. an *Phasis*, die wohl lediglich aus geographischen Gründen erfolgt ist. Die Anatomie ist noch unbekannt; wenn die Schale schliesslich noch irgend etwas in der Systematik zu bedeuten hat, sollte der zusammenhängende und ausgebogene Mundsaum jede Verbindung sowohl mit *Trachycystis* als auch mit den Patuliden ausschliessen.

Amphidoxa und *Stephanoda* kenne ich noch zu wenig, um mir ein Urtheil über ihre systematische Stellung zu erlauben. Die Anatomie der typischen Arten ist noch nicht untersucht; die einzige studirte Art, *hookeri* Rve. von den Kerguelen, würde ich nach der Schale zu *Flammulina* oder allenfalls zu *Charopa*, aber nicht zu *Amphidoxa* gestellt haben.

Pararhytida passt weder nach der Schale, noch nach dem Kiefer (oxygnath), noch nach den Geschlechtsorganen (nicht haplogon, sondern mit Flagellum und Appendix am Penis, Pilsbry p. 53) zu den Patuliden, sondern wird sich eher an die Zonitiden anschliessen lassen.

Nach dieser Reinigung der Familie verbleiben ihr die Gattungen *Endodonta* und *Pyramidula* (= *Patula* auct.) und es ist dann kein Grund mehr vorhanden den Namen *Patulidae* in *Endodontidae* zu ändern, was auch sonst nicht nöthig gewesen wäre.

Das Genus *Endodonta* umfasst die subgenera *Brazieria*, *Diglyptus* (-*Pitys* Beck), *Libera*, *Endodonta* s. str., *Phenacharopa*. Subgen. *Endodonta* wird in die Sektionen *Helenoconcha*, *Endodonta* s. str., *Nesophila*, *Ptychodon* und *Thaumatodon* zerlegt, ebenso *Charopa* in eine Anzahl Sektionen.

Wie schon früher hervorgehoben, kann ich mit mit dieser Schachtelung wenig befrieden. Zugegeben, dass die ver-

schiedenen Gruppen höheren und niedrigeren generischen Rang besitzen, so ist es doch zur grösseren Uebersichtlichkeit des Nomenklatur wünschenswerther und praktischer, entweder kleinere Gattungen zu creiren und diese in Sektionen zu spalten, oder falls die Subgenera nicht genügend differenzirt sind um als Gattungen behandelt zu werden, sie ebenfalls nur als Sektionen zuzulassen. Wollen wir z. B. die systematische Stellung von *Endodonta lamellosa* genau bezeichnen, so müssen wir schreiben:

Endodonta (*Endodonta* [*Endodonta*]) *lamellosa* und das scheint mir des Guten dem doch zuviel.

Von Pilsbrys Untergattungen würden sich *Brazieria*, *Diglyptus*, *Libera* sehr gut als Gattungen auffassen lassen. Von ersterer bezweifle ich überhaupt (mit Pilsbry selbst), dass sie hierher gehört; ich glaube vielmehr an eine Verwandtschaft mit *Plectopylis*. Beiläufig sei hier bemerkt, dass meine *Plectopylis coarctata* (N. Bl. 1894 p. 113) von Bohol und Panglao nebst ihrer nachträglich von Quadras entdeckten v. *majuscula* von Masbate zweifelos auch zu *Brazieria* gehört. *Diglyptus*, deren Weichtheile noch nicht studirt sind, zeichnet sich nicht nur durch ihre hohe Gestalt vor allen andern Gruppen dieser Familie aus, sondern auch durch die abweichende Skulptur der Embryonalwindungen. *Libera* verdient Gattungsrang schon allein durch die biologische Eigenthümlichkeit, die Eier in ihrem Nabel zu tragen, den sie durch eine Membran schliesst. Auch sind die Zungenzähne verschieden und die Augenpedunkeln lang und dünn (Pilsbry p. 23), während sie bei *Endodonta* keulenshäftig sind. *Phenacharopa* (*rectius Phenacocharopa*) und *Aeschrodomus* gehören zweifellos näher an *Charopa* als an *Endodonta*, während *Paratrochus* (*dalbertisi* Braz. von N. Guinea) sicher überhaupt nicht hierher gehört, sondern wahrscheinlich zu *Aulacospira*.

Hiernach bleibt noch über *Charopa* zu entscheiden.

Charopa Alb. im eigentlichen Sinne, also nach Ausscheidung der Phenacoheliciden, hat Suter als Patulide erkannt und stellt sie als sect. zu Patula (Transact. N. Z. Inst. XXIII p. 90). Pilsbry betrachtet sie dagegen als zahnlose Endodonten und stellt sie als Subgenus zu Endodonta, der er Patula (*Pyramidula*) als eigene Gattung gegenüber stellt. Der soviel ich sehen kann, einzige anatomische Grund hierfür ist, dass die Augenstiele bei Charopa wie bei Endodonta keulenförmig, bei Patula lang und dünn sind. Aber auch dieser Unterschied ist nicht einmal als durchgehend anerkannt, abgesehen davon dass noch recht wenig Arten auf denselben geprüft sind — denn von Libera giebt Pilsbry, wie oben erwähnt, selbst an, dass die Augenstiele lang und schlank sind, und doch lässt er sie bei Endodonta. Auf die Radula legt Pilsbry selbst je nach Bedürfniss weniger oder mehr Werth, die hervorgehobenen Unterschiede sind auch nicht durchgehend. Hiernach würde es mir praktischer erscheinen Endodonta, Charopa und Patula als besondere Genera derselben Familie zu betrachten oder aber alle drei als subgenera einer Gattung, welche dann, schon aus Gründen sprachlicher Logik, nicht Endodonta, sondern Patula heissen müsste.

Zu Charopa würde ich als Sektionen stellen: *Aeschrodomus*, *Phenacocharopa*, *Tropidotropis*, *Pterodiscus*, aber nicht *Acanthoptyx* Anc. (für *acanthinula* Crosse), die wohl zu *Flammulina* gehören dürfte.

Wir kommen nun zu der Gattung *Pyramidula* Pilsbry, gegen deren Eintheilung sowohl als gegen ihre Nomenklatur sich sehr viel einwenden lässt. Sie zerfällt bei Pilsbry in:

Subgen. *Pyramidula* s. str.

Sect. *Pyramidula* s. str.

- „ *Patulastra*
- „ *Planogyra*
- „ *Gonyodiscus*
- „ *Lyrodiscus*

Subgen. *Patula* (-*Anguispira Morse*).

Subgen. *Atlantica*

Subgen. *Helicodiscus*

Subgen. ?*Pupisoma*.

Also auch hier wieder diese unsympathische Schachtelung, bei welcher derselbe generische Name drei verschiedene Anwendungen findet. Es ist nicht abzusehen, warum die als Subgenera abgetrennten Gruppen höheren Rang haben sollen, als die als Sektionen zu *Pyramidula* gestellten.

Der Haupteinwand aber, den ich, und ich glaube die meisten Forscher mit mir, gegen diese Nomenklatur zu machen haben, wendet sich gegen die Einsetzung des Namens *Pyramidula* Fitz. für den altgewohnten *Patula*, der seinerseits für *Anguispira* eintreten soll. Es ist einer der Fälle, wo die Prioritätsmanie usque ad absurdum getrieben ist, und ich würde die Annahme dieser Neuerung selbst dann bedauern, wenn wirklich zwingende Gründe dafür vorhanden wären. Diese vermisste ich aber völlig in Pilsbrys Argument. Er sagt, *Patula* Held umschliesse alle Formen, die er jetzt als *Pyramidula* zusammenfasse, und die meisten neueren Autoren haben deshalb den Held'schen Namen als Gattungsbezeichnung angenommen. Dies sei aber unannehmbar wegen der früheren Namen *Pyramidula*, *Gonyodiscus* und *Discus* Fitzingers (1833) und eine weitere Schwierigkeit sei die, dass *Patula* Held, *Euryomphala* Beck und *Delomphalus* Agassiz alle in demselben Jahre 1837 veröffentlicht worden seien. Diese letztere Schwierigkeit scheint mir aber eben dadurch gehoben zu sein, dass Albers 1850, Pfeiffer 1855, Albers -- v. Martens 1860, v. Martens 1867 und alle folgenden Autoritäten bis auf Pilsbry dem Held'schen Namen den Vorzug gegeben haben. Was nun die angebliche Priorität Fitzinger's betrifft, so ist es mir unmöglich einzusehen, wie ein Name, der nur einen kleinen Theil der zu benennenden Gattung

umfasst und dessen Autor die Gattung in drei spaltete, für die Gesamtgattung in Frage kommen kann, für welche ein Gesamtname existirt. Und warum von den drei Fitzinger'schen Namen grade *Pyramidula*, welcher Name der Idee, dass Namen überhaupt etwas bedeuten sollen — das vergessen englische und amerikanische Autoren freilich oft — völlig Hohn spricht, wenn er für die allermeist flachen *Patulas* Anwendung findet? Sind *Gonyodiscus* und *Discus* nicht auch 1833 veröffentlicht? Mit derselben Logik, mit welcher Pilsbry *Patula* verwirft, weil man nicht entscheiden könne, welcher der 3 im Jahre 1837 publicirten Namen die Priorität habe, musste er doch erst recht die 3 Fitzinger'schen verwerfen, welche in demselben Buche, also absolut gleichzeitig, veröffentlicht wurden. Wohin das Prinzip, für kleine geschlossene Gruppen gegebene Namen zu Bezeichnungen grösserer Gattungen zu verwenden und damit altbekannten Namen die Priorität zu bestreiten, führen kann, dafür hat Pilsbry neuerdings ein andres sehr drastisches Beispiel geliefert (Proc. Acad. N. Sc. Philad. 1894 p. 15). Er entdeckt, dass die Fitzinger'schen Namen *Vitrea* und *Oxychilus* Priorität vor *Hyalinia* Agassiz (1837) haben und tauft die Gattung in *Vitrea* Fitz. um. Nun weist aber v. Ihering nach, dass die kleinen milchweissen Arten, also *Vitrea* Fitz., einer andern Gattung angehören als die grünlich gelben (N. Bl. 1892 p. 138, Z. f. wiss. Zool. 1892 p. 419), so dass *Vitrea* und *Hyalinia* neben einander bestehen bleiben und von einer Anwendung von *Vitrea* für *Hyalinia* nicht die Rede sein kann. Das Gleiche könnte sehr leicht auch bei *Pyramidula* der Fall sein. Pilsbry selbst giebt schon leichte Unterschiede in der Radula an; über die Geschlechtsorgane sagt er nichts, sie sind also vielleicht noch nicht untersucht. Nach der Schale ist *Pyramidula* s. str. nicht nur durch die Höhe, sondern namentlich auch durch die Textur und Skulptur doch recht

verschieden von den übrigen Patulas und es kann leicht sein, dass eine sorgfältige Untersuchung der Weichtheile uns zu generischer Abtrennung nöthigt. Dann hätten wir nochmals das Vergnügen die ganze Nomenklatur auf den Kopf stellen zu müssen. Umgekehrt können Gattungsnamen weiteren Umfangs auch dann bestehen bleiben, wenn einzelne kleinere Gruppen ausgeschieden werden. Man lasse dagegen eng begrenzt, durch Angabe eines Typus klar bestimmten Gruppennamen ihre beschränkte Anwendung für die vom Autor gemeinte natürliche Gruppe und bei der Zusammenfassung mehrerer solcher Gruppen in eine Gattung wähle man lieber einen neuen Namen, falls in der älteren Nomenklatur kein ganz passender vorhanden ist, als dass man einem älteren, unter Umständen voreilig, wie bei *Vitrea*, einer der Ansicht des Autors widersprechende erweiterte Bedeutung giebt.

Aus diesen Gründen bestreite ich die Berechtigung von *Pyramidula* Fitz., als Gesamtnname für die in Rede stehende Gattung dienen zu können. *Patula* Held dagegen entspricht völlig, wie Pilsbry selbst zugiebt, dem Umfang der Gattung im heutigen Sinne und kann die Priorität nicht dadurch verlieren, dass *Euryomphala* Beck und *Delomphalus* Ag. in demselben Jahre publicirt sind, nachdem sich die Wissenschaft längst für den Held'schen Namen entschieden hat. Uebrigens widerspricht auch Pilsbry seiner eigenen Deduktion, wenn er *Patula* als Sektionsnamen statt *Anguispira* anwendet; denn die Argumente, die gegen den Namen als Gattung sprechen, würden ihn auch für die Sektion ausschliessen. Erste Art, also nach Pilsbrys (irriger) Auffassung typische, ist bei Beck *solitaria* Say, so dass *Patula* und *Euryomphala* auch für die Sektion der grossen amerikanischen Patulen in Konkurrenz treten würden.

Von den übrigen Sektionen bei Pilsbry bedürfen meiner Ansicht nach noch einige der Correktur. *Patulastra* ist

bei Pfeiffer (Nomencl. p. 87), wie Pilsbry richtig hervorhebt, eine sehr gemischte Gesellschaft; wir finden da Arten von Punctum, Charopa, Discus u. a. m. und da kein Typus genannt ist, scheint es mir verlorene Mühe, den Namen auf irgend einen Theil dieser Melange zu präzisiren. Ein Theil der kleinen Arten, welche Pilsbry bei Patulastra belässt, gehört wohl sicher zu Punctum, die übrigen lassen sich ungezwungen bei Discus unterbringen.

Gonyodiscus Pilsbry vereinigt die beiden Fitzinger'schen genera Gonyodiscus und Discus, was an und für sich sehr richtig ist, weil das Vorhandensein oder Fehlen des Kieles keinerlei systematischen, gelegentlich kaum einen spezifischen Werth hat. Aber warum Gonyodiscus und nicht Discus? Dass Discus nach Fitzinger von Lesson, Haldeman, Albers u. a. in anderm Sinne gebraucht worden ist, kann dem Fitzinger'schen Namen doch die Priorität nicht rauben und der Name ist jedenfalls passender als Gonyodiscus, der sich nur auf die gekielten Arten bezieht und dieselben sprachlich bezeichnet.

Atlantica Aucey rechne ich zu Janulus und mit diesem zu den Zonitiden.

Schliesslich muss ich mich noch gegen die Einreihung von Pupisoma Stol. bei den Patuliden verwahren, mit denen sie ganz sicher gar nichts zu thun hat.

Um das oben gesagt zu resumiren gebe ich hier einen Entwurf zur Eintheilung der Patuliden.

Fam. *Patulidae.*

1. Gen. Diglyptus Pilsbry.
2. Gen. Libera Garr.
3. Gen. Endodonta Alb.
 1. sect. typica (Endodonta s. str.)
 2. " Thaumatodon Pilsbry.
 3. " Nesophila Pilsbry.

4. sect. *Ptychodon* Anc. (*Maoriana* Suter).

5. " *Helenoconcha* Pilsbry.

4. Genus *Charopa* Alb.

1. sect. *typica* (*Charopa* s. str.)

2. " *Aeschrodomus* Pilsbry

3. " *Phenacocharopa* " (emend.)

4. " *Tropidotropis* Anc.

5. " *Pterodiscus* Pilsbry.

5. Gen. *Patula* Held.

1. sect. *Pyramidula* Fitz.

2. " *Microconus* Streb. Pfeff.

3. " *Discus* Fitz.

4. " *Lyrodiscus* Pilsbry (*Lyra* Mouss.)

5. " *Lyrula* Woll.

6. " *Anguispira* Morse.

7. " *Helicodiscus* Morse.

8. " *Planogyra* Morse.

(Schluss folgt).

Literaturbericht.

Martini- Chemnitz Systematisches Conchylien-Cabinet. Neue Auflage.

Lfg. 414. Glessin, *Gastrochaenacea*. Enthält die Gattung *Panopaea* und den Schluss von B. XI. 4. a.

Lfg. 415. Kobelt, *Helix*. Enthält wesentlich Europäer der Gruppe *Pomatia*. Keine n. sp.

Martens, Ed. von, neue Arten von Landschnecken aus den Gebirgen Afrikas. In Sitz. Ber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1895 p. 120.

Zählt eine Anzahl Arten auf, die theils von Stuhlmann am Runssoro, theils von Dr. Volkens am Kilimandscharo gesammelt sind. Neu *Cyclophorus volkensi* p. 121, *Ennea tudes*, *E. paradoxula* p. 122, *Helicarion stuhlmanni*, *succulentus* p. 123, *subangulatus*, *Vitrina?* *oleosa* p. 124, *Trochonanina obtusangula*, *similaris* p. 125, *Tr?*

rufofusca p. 126, *Helix Kilimae*, runssorina p. 127, *Buliminus stuhlmanni* p. 128, *Subulina castanea* p. 129.

Martens, Ed. von, Beschreibung eines neuen Buliminus aus Süd-arabien. Ibid p. 129 (B. schweinfurthi).

Smith, Edgar A., on a Collection of Land-Shells from Sarawak, British North Borneo, Palawan and other neighbouring Islands. In Pr. Zool. Soc. London 1895 p. 97 pl. 2—4.

Neu *Xesta themis* t. 2 fig. 1.2, NB., — *X. padasensis* t. 2, fig. 3, ibid: — *X. thisbe* t. 2 fig. 4, Saravak; — *Hemiplecta praeculta* t. 2 fig. 7, Saravak; — *H. egeria* t. 2 fig. 5.6, Palayan; — *H. rabongensis* t. 2 fig. 9, Saravak; — *Dyakia subdebilis* t. 2 fig. 11, Saravak; — *Trochonanina alexis* t. 2 fig. 13—14, Banguey Insel; *Tr. heraclea*, t. 2 fig. 12, Saravak; — *Tr. Kinabaluensis* t. 2 fig. 15.16, Kina Balu; — *Tr. whiteheadi* t. 2 fig. 17.18. — *Everettia subimperforata* t. 3 fig. 1, Saravak; *E. planior* t. 3 fig. 2, Saravak; *E. barameusis* t. 3 fig. 3, Baram, Saravak; — *E. bangueyensis* t. 3 fig. 4, Banguey Insel; — *E. Thalia* t. 3 fig. 5, Berg Rabong; — *E. balabacensis* t. 3 fig. 6, Balabak; *Sitala rumbangensis* t. 3 fig. 7, Saravak; — *S. demissa* t. 3 fig. 8; — *S. busauensis* t. 3 fig. 9, Saravak; — *S. cara* t. 3 fig. 10, N. E. Borneo; — *S. duleis* t. 3 fig. 11, N. E. Borneo; *S. accepta* t. 3 fig. 12, N. E. Borneo, Palayan; — *S. anissitata* t. 3 fig. 13, Saravak; — *S. inaequisculpta* t. 3 fig. 14, Rabong; — *S. infantilis* t. 3 fig. 15, Palayan; — *Chloritis euphrosyne* t. 3 fig. 17, Kina Balu; — *Doreasia incanta* t. 3 fig. 18, Saravak; *Amphidromus hosei* t. 3 fig. 20, Saravak; — *Cyathopoma everetti* t. 3 fig. 21.22, Saravak; — *Pterocyclus latelabium* t. 3 fig. 23—25, N. B.; — *Alycaeus congener* t. 3 fig. 26, Saravak; — *Al. sadongensis* t. 3 fig. 27, Saravak; — *Cyclophorus kinabaluensis* t. 4 fig. 1, Kinabalu; — *Leptopoma geotrochiforme* t. 4 fig. 3, Saravak; — *L. skertchlyi* t. 4 fig. 4, Mt. Ambun N. B.; — *Lagochilus bangueyensis* t. 4 fig. 5, Banguey Insel; — *L. rabongensis* t. 4 fig. 6, Mt. Raboug; — *L. kinabaluensis* t. 4 fig. 7, Kinabalu; *L. conicus* t. 4 fig. 8, Kinabalu; — *L. balabacensis* t. 4 fig. 12, Balabak; — *Cyclotus palawanicus* t. 4 fig. 14, Palayan; — *Georissa everetti* t. 4 fig. 15, Saravak; — *G. bangueyensis* t. 4 fig. 16, Banguey Insel; — *G. flavescentes* t. 4 fig. 17, Gananton; — *G. borneensis* t. 4 fig. 18, Gananton.

Smith, Edgar A. Natural History Notes from H. M. Indian Marine Survey Steamer „Investigator“ Commander C. F. Oldham, R. N. — Series II. No. 10. Report upon some Mollusca dredged in the Bay of Bengal and the Arabian Sea. Appendix. In Ann. Mag. (6) XIV. p. 360. Nachträgliche Angaben über Sycotypus investigatoris Wood-Mason and Alcock und Selariella infundibulum Wats.

Smith, Edgar A. Descriptions of new species of Land Shells from New Guinea. In Ann. Mag. (6) XV. p. 230.

Neu *Nanina amblytropis*, *lissorhaphis*, *Rhyssota armata*, *Hadra strophora*, *Dorcasia subplicifera*, *Chloritis ephamilla*, *Chl. perambigua*, *Cristigibba Musgravei*.

Smith, Edgar A., Report upon the Mollusca dredged in the Bay of Bengal and the Arabian Sea during the Season 1893—94. — In Nat. Hist. Investigator (2) No. 19 (Ann. Mag. (6) XVI.)

Neu *Pontiothauma mirabile* n. gen. et spec. (eine Pleurotomide mit Siphon-Habitus 136 mm. lang.) t. 1 fig. 1; — *P. abyssicola* t. 1 fig. 2. — *Pleurotoma vagata* t. 1 fig. 3; — *Pl. praesignis* t. 1 fig. 4; — *Drillia fugata* t. 1 fig. 5; — *Nassa turrifera* t. 1 fig. 6; *Mitrella pacei* t. 1 fig. 7; — *Natica albospira* t. 1 fig. 8. — *N. candidula* t. 1 fig. 9; — *Sigaretus parvus* t. 1 fig. 10; — *Bathybembix Wood-Masoni* t. 1 fig. 11; — *Calliostoma sublaeve* t. 1 fig. 12; — *Dentalium miriticum* t. 2 fig. 1; — *Venus juvenilis* t. 2 fig. 2; — *Tellina parvula* t. 2 fig. 3; — *Abra convexior* t. 2 fig. 4; — *Cuspidaria macrorhynchus* t. 2 fig. 5; — *Cryptodon acuticarinatus* t. 2 fig. 7; — *Nucula donaciformis* t. 2 fig. 8; — *N. bengalensis* t. 2 fig. 9; — *Nuculana fumosa* t. 2 fig. 10; — *N. indica* t. 2 fig. 11; — *Malletia conspicua* t. 2 fig. 12; — *Limatula subtilis* t. 2 fig. 13.

Proceedings of the Malacological Society of London. Vol. I No. 6.

p. 257. *Smith, Edgar A., on the genus Clea. Neu Cl. nigricans var. parva, var. granulata und var. natunensis alle von Nordborneo; Cl. bangueyensis (woodcut) vor den Banguey Inseln.*

- p. 254. Vanstone, J. Henry, on the sinistral character of the shell of *Planorbis*.
- p. 257. Smith, Edgar A., Notes on *Nassodonta insignis*.
- p. 259. Hedley, C., Notes on West Australian Land-Shells. *Hel. inconvicta* Smith = *oscarensis* Cox.
- p. 261. Sykes, E. R., Descriptions of new *Clausiliace* from Japan and Yunnan. (*Hemiphaedusa schmackeri* fig. 3, Japan; — *H. ignobilis* fig. 5, Japan; — *Megalophaedusa fultoni* fig. 2; Japan; — *Pseudonenia bocki* fig. 1 und *Ps. yunnanensis*, fig. 4, S. E. Yunnan.
- p. 264. Jordan, Henry K., on some new Species of British Mollusea, from the Triton Expedition with a list of other species new to the Faroe Channel (pl. XVI). *Neu Dentalium aenigmaticum* fig. 1; — *Puncturella chasteri* fig. 2; — *Margarita tetragonostoma* fig. 3; *M. coulsoni* fig. 4; — *Eulima martyn-jordani* fig. 5; — *Actaeon browni* fig. 6.
- p. 270. Woodward, M. F. on the Anatomy of *Natalina caffra*, Fer. with special reference to the structure of the buccal mass. (pl. XVII).
- p. 278. Sowerby G. B., new species of shells from Kurachi and the Mekran Coast, collected by Mr. F. W. Townsend (With pl. XVII). *Neu Mangelia townsendi* fig. 1.2; — *Drillia nitida* fig. 3.4; — *Niso venosa* fig. 10.11; — *Gibbula townsendi* fig. 7.9. — *Minolia gradata* fig. 5.6; — *Spondylus exilis* fig. 14; — *Caryatis tumida* fig. 12.13.
- p. 281. Godwin-Austen, H. H., Notes on *Trochonanina* and other genera of Land-Mollusca, with reference to the generic position of *Martensia mosambicensis* and other shells (Pl. XIX).

Kleinere Mittheilungen.

Herr Prof. Salvador Calderon, seither in Sevilla, ist zum Professor der Mineralogie in Madrid ernannt worden und wohnt Eguilaz, 10.

Eingegangene Zahlungen:

v. Lasser R., T., Mk. 6; — Hofer, M., Mk. 6; — Borcherding, V., Mk. 6.

Paetel's Conchylien-Catalog

letzte Ausgabe (von v. Maltzan), gebraucht, wird gegen seltene exotische Landconchylien einzutauschen gesucht.

Dr. O. Staudinger & A. Bang Haas,
Blasewitz-Dresden.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.,
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwaneheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn** in Berlin zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Pilsbry's neue Eintheilung der Heliciden.

Von

Dr. O. F. von Möllendorff.

(Schluss.)

Es würde hier zu weit führen Gattung für Gattung in Pilsbry's Werk nachzuprüfen und ich beschränke mich darauf nur noch einige Einzelheiten anzuführen.

p. 68. *Polygyra* Pilsbry = *Neohelix* v. Iher. — Pilsbry erklärt den neuen Namen v. Ihering's für überflüssig, weil etwa 20 ältere Gruppennamen die Priorität hätten. Nach dem oben bei *Pyramidula* aufgestellten Prinzip halte ich für eine neue zusammenfassende Gattung einen neuen Namen für nothwendig. *Polygyra* Say bezog sich ausschliesslich auf Arten der sect. *Polygyra* s. str.

p. 109. Subgenus? Oreobba Pilsbry (zu Obba) für codonodes Pfr. und camelus Pfr. Die letztere Art ist sicher eine Camaena aus der Gruppe von palavanica und sauliae und ich glaube, dass die kürzlich beschriebene *C. microglypta* Q. et Mlldff. mit ihr zusammenfällt. Auch codonodes wird sich, glaube ich, als Camaena aus der Gruppe von *C. campanula* entpuppen.

p. 114. Trachia Alb. als Subgenus von Planispira will mir ganz und gar nicht gefallen. Pilsbry's Trachia enthält a) die eigentlichen Trachia Arten (asperella, fallaciosa etc.), b) rechte Chloritis-Arten (Trachia Stol. non Alb., penangensis, delibrata, propinqua u. a. m., c) Eurystoma (vittata Müll.) Letztere möchte ich nach Schale und Weichtheilen eher an Camaena und Camaenella anreihen. Wenn die rechten Trachias ebenfalls odontognath sind, wie die Chloritis Arten, welche fälschlich als Trachia aufgeführt und von welchen allein die Anatomie und Kiefer besprochen werden, so gehört Trachia neben Chloritis als eigene Gattung, nicht neben Planispira, welche ich als oxygnath mit Obbina zu den Acaviden stelle (s. v.).

p. 125. Thersites als Gesamtnname für Hadra ist wieder einer der oben besprochenen Fälle von Erhebung eines Sektionsnamens für eine eng beschränkte Gruppe zur Bezeichnung einer grösseren zusammenfassenden Gattung, mit demselben Nachtheil, dass ein „sprechender“ Name, welcher die besondere Eigenthümlichkeit einer einzelnen Art passend bezeichnet, für die Gesamtgattung nichtssagend und unpassend wird. Pilsbry macht sehr richtig darauf aufmerksam, dass die Landschnecken-Nomenklatur sich gegenwärtig in einem Uebergangsstadium befindet; das sollte aber ein Grund mehr sein, so radikale Namensveränderungen, wie er sie beliebt, zu verschieben, bis sich die Situation mehr geklärt haben wird und die Gattungsabgrenzungen mehr gesichert sind als jetzt, wo die Anatomen selbst unter sich noch nicht

einig sind und vor allem noch so viele Untersuchungen ausstehen.

p. 155. Interessant ist der Nachweis, dass *sAmpelita oxygnath* ist und daher mit *Helicophanta*, *Acavus* u. s. w. in eine Reihe gehört. Hierzu passt auch die Schale mit dem stark herabgebogenen letzten Umgang vortrefflich.

p. 167. Chalepotaxis Ancey für *Nanina infantilis* Gredl. aus China. Ich glaube nicht, dass diese isolirte Art eine Helicide ist. Der Kiefer ist äusserst schwach angedeutet, die Radula zeigt mindestens in dem starken Winkel der Reihen Aehnlichkeit mit dem Agnathen. Streptaxide?

p. 168. *Ganesella* Blsd. = *Satsuma* = *Fruticotrochus* = *Trochomorphoides*.

Wenn es schon sicher wäre, dass der Typus von *Ganesella*, *Helix capitum* Bens., mit den Arten, die wir als *Satsuma* oder *Fruticotrochus* zu bezeichnen gewohnt sind, in eine Gattung gehört, so hätte der Blanford'sche Name allerdings die Priorität. Aber über die Anatomie von *G. capitum* weiss Pilsbry nichts anzugeben, und so haben wir die Anomalie, dass die Gattung anatomisch auf eine *Satsuma* (*japonica*) begründet wird, während ihr Typus in dieser Hinsicht noch unbekannt ist. Nach der Schale würde ich *capitum* nicht zu *Satsuma* stellen, sondern zur *Eulota-Acusta* Reihe. Auch hier wieder bemerkt Pilsbry mit vollem Recht, dass nach den Schalen allein eine befriedigende Klassifikation nicht erreicht werden kann. Um so mehr Grund wäre meiner Ansicht nach vorhanden gewesen, mit der Einreihung von *Ganesella* und damit der Umtaufung der Gattung zu warten, bis die Untersuchung der Weichtheile ihre Zugehörigkeit zu *Satsuma* erwiesen haben wird.

p. 172. *Doreasia*. Typus dieser Gruppe ist *alexandri* Gray, mit welcher ganz eigenartigen Schnecke die Gruppe der grösseren südafrikanischen *Helices* (*globulus* Müll.) nichts

gemein hat als das Vaterland. Die rechte Doreasia, auf welche allein sich die anatomischen Notizen Pilsbry's beziehen, ist oxygnath, haplogon und gehört daher ohne Frage zu den Acaviden, wo sich auch nach der Schale in Pedinogyra, Helicophanta und Ampelita Analogien finden. Die Gruppe von globulus Müll. ist aulakognath, ihre Radula ist wesentlich von der von Doreasia verschieden (dreispitzige Mittel- und Seitenzähne), Genitalien sind noch unbekannt, die Schale erinnert am meisten an Eulota.

p. 201. Eulota Hartm. mit den Sektionen Eulota, Armania, Cathaica. Pseudiberus. Platypetasus, Thysanota(!), Plectotropis, Aegista. Coccoglypta, Mastigeulota, Tricheulota, Euhadra, Mandarina. Hiergegen möchte ich auch mancherlei einwenden. Zunächst wird Acusta glatt mit Eulota vereinigt, aber für Kiangsinensis v. Mart. die neue Sektion Mastigeulota aufgestellt. Typus von Acusta ist raviga Bens. und bei derselben sind die glandulae mucosae genau so gebildet wie bei Kiangsinensis, letztere Art besitzt ein flagellum, was bei ersterer nicht erwähnt ist. Conchyliologisch sind raviga und Kiangsinensis so nahe verwandt, dass ich sie trotz des Flagellums nicht trennen möchte; in diesem Falle bliebe der Name Acusta bestehen. Touranensis würde ich jetzt zu Eulota s. str. stellen.

Cathaica einfach als Sektion von Eulota will mir nicht zu Sinne. Die Schalen differieren sehr erheblich und in den Genitalien sind ebenfalls nicht unbedeutende Unterschiede vorhanden. Jedenfalls sind Pseudiberus Anc. und Platypetasus Pilsbry nur schwache Unterabtheilungen von Cathaica, bei der ich die betreffenden Arten, die sich nur durch den Kiel unterscheiden, untergebracht hatte. Cathaica verdient mindestens subgenerischen Rang. Ich glaube dass Fruticocampylaea, welche noch nicht anatomisch untersucht ist, ebenfalls zu Cathaica gehört, in welchem Falle die Gattung Fruticocampylaea heissen müsste.

Thysanota Alb., die man bisher theils zu den Nanniden theils zu Trochomorpha gerechnet hatte, hier bei Eulota zu finden, ist eine Ueberraschung. Ich begreife nicht wie Pilsbry, der doch die Wichtigkeit der Schalencharactere sonst anerkannt, zu einem solchen Missgriff gelangen konnte. Eine solche Ausnahme, dass Arten mit scharfrandigem Mundsaum zu solchen mit gelippten oder ausgebogenen Peristom Verwandtschaft zeigen, ist mir bis jetzt nicht bekannt.

Plectotropis verdient meiner Ansicht nach schon der Schale wegen Gattungsrang, was durch die von Pilsbry hervorgehobenen anatomischen Unterschiede bestätigt wird.

Aegista kann unmöglich Sektion von Eulota sein, wenn die Schale überhaupt noch die geringste systematische Bedeutung hat. Eher könnte sie mit Plectotropis zu einer Gattung vereinigt werden.

Coccoglypta Pilsbry. Helix pinchoniana Heude halte ich für nächst verwandt mit Zonites scrobiculatus Gredl. und stelle beide nebst Nanina buccata Heude zu Bensonia Pfr. Mit Eulota haben sie ganz sicher nichts zu schaffen.

Tricheulota ist eine neue Sektion für Chloritis spinosissima Semp. und sanziana H. et J., die wegen Vorhandenseins eines Pfeilsacks nicht bei Chloritis bleiben können. Diese interessante Entdeckung wird durch die Schale vollauf bestätigt und eine sorgfältige Beachtung der Schalenkennzeichen hätte längst ergeben müssen, dass jene Arten keine Chloritis sind. Sie haben keine Punktnarben auf den Apikalwindungen, welche glatt und glänzend sind, und die Borsten sind nicht in regelmässigen Quincunx angeordnet! Gewiss eine schöne Bestätigung, dass Schalencharactere richtig erkannt und angewendet grosse systematische Wichtigkeit besitzen. Die Conehyliologen und Palaeontologen brauchen deshalb trotz der grossen Umwälzungen, welche die neueren

anatomischen Untersuchungen hervorgerufen haben, den Muth nicht sinken zu lassen.

Euhadra Pilsbry. Gewiss hat der Autor darin Recht, dass diese chinesisch-japanische Gruppe mit Eulota verwandt ist, mit welcher sie durch Acusta verknüpft ist, aber es widerstrebt mir sie lediglich als Sektion von Eulota zu betrachten. Sollte sie sich nicht auch nach der Anatomie als Gattung halten lassen? Pilsbry's eigene Angaben über die Form des Liebespfeils, die glandulae mucosae, das Flagellum scheinen mir sehr dafür zu sprechen.

p. 215. Ueber Chloraea und Cochlostyla will ich mich hier nicht weiter auslassen, da ich über die Systematik derselben deinnächst eine ausführliche Arbeit zu veröffentlichen gedenke. Hier will ich nur erwähnen, dass wir nach Pilsbry den allgemein gebräuchlichen Namen Cochlostyla in Helicostyla zu ändern haben. Seine Gründe haben mich von der Nothwendigkeit dieser recht unbequemen Aenderung noch nicht überzeugt.

Der Schluss des Werkes behandelt die paläarktischen Gruppen. Auch hier fallen eine Reihe von Namensänderungen auf: Geomitra für Ochthephila, Helicella für Xerophila, Hygromia für Fruticicola, Fruticicola für Trichia, Helicodonta für Gonostoma, Helicigona für Campylaea(!), Otala für Macularia —, von denen einige allerdings nothwendig erscheinen, andre auf übertriebener und z. Th. schiefer Anwendung der Namenklaturnormen beruhen. Die Kritik dieses Theiles wird hoffentlich bald von berufener Seite erfolgen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass bei Besprechung eines solchen Werkes zunächst die abweichenden Ansichten zu Tage treten und darüber die Anerkennung seiner guten Seiten etwas zu kurz kommt. Es ist Pilsbry's grosses Verdienst die Frage der Heliciden-Systematik auf Grund der neueren anatomischen Untersuchungen mit verständiger

Berücksichtigung der Schalencharaktere in Fluss gebracht zu haben; dass der erste Versuch in dieser Hinsicht nicht zu allseitiger Befriedigung ausgefallen ist, kann uns nicht Wunders nehmen. Der Hauptwerth des Werkes besteht vor allem in der fleissigen und anscheinend sehr vollständigen Zusammenstellung des Materials sowohl in conchyliologischer als in anatomischer Beziehung.

Manila im Mai 1895.

Neue Land- und Süßwasser-Schnecken aus Ost-Afrika.

Von
E. v. Martens.

1. *Ennea (Edentulina) latula*. Testa cylindrico-ovata, clause rimata, leviter oblique striatula striis infra suturam fortioribus recurvatis, cereo-albida, strigis incrementi raris olivaceis; anfr. 6½, priores 3 apicem perobtusum constituentes, antepenultimus convexus, penultimus subcylindricus, ultimus penultimum latitudine aequans, infra attenuatus; sutura sat distincta, ad aperturam plus minusve ascendens. Apertura paulum obliqua, subquadrata, edentula, peristomate leviter incrassato et reflexiusculo, margine columellari sursum et introrsum dilatato, extus angusto, angulatim a callo parietali distineto. Long. 13—15. Diam. 9, long. apert. 5—6, lat. apert. 4—5 Mill. Butumbi am Süd-Ufer des Albert-Edward-Sees. Dr. Stuhlmann.

2. *Ennea (Uniplicaria n.) exogonia*. Testa inflate ovata, imperforata, leviter striolata, striolis ad suturam recurvatis, nitide cereo-alba; anfr. 7, priores 5 regulariter crescentes, conulum obtusum constituentes, penultimus antepenultimo paulo latior, leviter convexus, ultimus penultimum latitudine aequans, infra leviter angustatus; sutura simplex, ad aperturam non ascendens. Apertura subverticalis, trapezia, supra oblique acutangula, peristomate recto incrassato albo. extus striga flavoviridi limbato, margine externo in angulum obtusum producto, infra recedente, basi late ro-

tundato, margine columellari brevi subperpendiculari, pariete aperturali plica una parvula tuberculiformi munito. Long. 9, diam. $5\frac{1}{2}$, aperturae long. 4, lat. 3 Mill. Runssoro in der Waldzone, 2600 Met., Dr. Stuhlmann.

3. *Ennea (Gulella) triplicina*. Testa oblongo-cylindrica, oblique rimata, leviter striatula, ad suturam crenulata, griseo-albida; anfr. 7, subplani, sutura superficiali, superiores 3 conulum convexum brevem formantes, quartus, quintus et sextus subaequales, ultimus versus basin attenuatus, pone aperturam gibboso-inflatus et scrobiculis 2 profundis ornatus. Apertura verticalis, oblonga, peristomate incrassato et reflexo, albo; dentes parietales 2, externus angulum externum aperturae attingens, internus remotus minor; margo externus dente valido subquadrato, margo basalis dente subvalido, *margo columellaris dentibus plicaeformibus tribus* inter se appropinquatis, medio majore. Long. 8, diam $3\frac{1}{2}$, aperturae long. $3\frac{2}{3}$, diam. $2\frac{1}{2}$ Mill. Bugundi, S. W. von Albert Nyansa, in $0^{\circ} 54'$ N. Br., Dr. Stuhlmann.

4. *Ennea (Gulella) linguifera*. Testa pupaeformis, transverse ovata, leviter striatula, cereo-albida, nitida; anfr. 8, subplani, sutura superficiali, priores 5 conulum obtusum depresso formantes, antepenultimus et penultimus subaequales, ultimus versus basin angustatus, antice non ascendens. Apertura subverticalis oblonga, peristomate dilatato et reflexo, albo, 8—9 dentata; *lamella linguaeformis* in angulo externo supero aperturae *antrorum et sursum exserta*, complanata, *retrorsum* in plicas 2 elevatas spiratim in saucem intrantes *furcata*; margo externus et margo columellaris plicis ternis, supera minima, margo basalis plica unica. Long. 14, diam 7, aperturae long. 5, diam. 4 Mill. Bukende und Ongenja, westlich von Ssemliki im Urwaldgebiet, Dr. Stuhlmann.

5. *Ennea (Gulella) foliifera*. Testa late pupaeformis, transverse rimata, leviter striatula, fusco-grisea nitidula; anfr. 8, subplani, sutura superficiali, priores 5 conulum obtusum depresso formantes, antepenultimus et penultimus latitudine subaequales, penultimus altior, ultimus versus basin angustatus, antice leviter descendens. Apertura paululum resupinata, oblonga, peristomate dilatato et reflexo, albo, 9-dentata; *lamella linguaeformis* in angulo externo

superiore aperturae *perralida*, antrorsum *fornicatum revoluta*, latere externo late lobato, retrorsum in *plicas* 2 *elevatas* in faucem penetrantes *producta*; margo parietalis praeterea plica una sat humili intrante munitus; margo externus plicis 2 intrantibus, superiore pone lamellam latente, margo basalis dentibus 2 parvis aequalibus, margo columellaris plicis 2 superioribus intrantibus subaequalibus et tertia inferiore dentiformi. Long. 11 $\frac{1}{2}$, diam. 6 $\frac{1}{2}$, aperturae long. 4 $\frac{1}{2}$, diam. 4 Mill. Buloa bei Tanga, G. Lieder.

6. *Ennea (Gulella) Conradti*. Testa cylindrico-ovata, clause rimata, costulata, albida, nitidula; anfr. 7, sutura mediocriter impressa, 3 superiores regulariter crescentes, conulum obtusum depresso formantes, quartus, quintus et sextus diametro subaequales, vix convexiusculi, ultimus versus basin angustatus. Apertura verticalis, subtriangularis, peristomate breviter reflexo albo, 4-dentata: dentes parietales 2, exterior major compressus; margo externus dente unico valido triangulari, margo basalis dente unico parvo, margo columellaris dente nullo, at columella intus plica parva transversa munitus. Long. 3 $\frac{2}{3}$, diam. 1 $\frac{1}{2}$, aperturae long. 1, lat. 1 Mill. Usambara, Conradti. Ähnlich der *E. microstoma* E. Smith.

7. *Ennea (Ptychotrema) geminata*. Testa turrita oblique rimata, laevigata, pallide flava vel albida, nitidula; anfr. 7, priores 2 subglobosi, celeriter crescentes, apicem obtusum papillarem constituentes, sequentes regulariter sensim crescentes, sutura simplice, ultimus penultimo vix latior, versus basin leviter angustatus, pone aperturam sulcis spiralibus 2 exaratus. Apertura paulum obliqua, oblonga, peristomate incrassato et reflexo, 5-plicata: lamella parietalis prope angulum externum solida, flexuosa, superne ultra aperturam elevata; margo externus praeter denticulum superiorem lamellae oppositum plicis 2 oblique intrantibus, superiore pone marginem profunde sinuata, munitus; margo columellaris denticulis 2 inter se appropinquatis subplicaeformibus; confinium marginis columellaris et basalis denticulo uno profundo. Long. 11—14, diam. 4—4 $\frac{1}{2}$, apert. long. 4—5 Mill. Uganda, Butumbi und am Runssoro, 2600 Met. im Bambuswald. Dr. Stuhlmann.

8. *Ennea (Ptychotrema) quadrinodata*. Testa turrita, oblique rimata, leviter costulato-striata, albida; anfr. 7 $\frac{1}{2}$

— 8. priores 2 subglobosi, celeriter crescentes, apicem obtuse papillarem constituentes, tertius et quartus subaequales, sequentes lente diametro crescentes, sutura impressa, subcrenulata, ultimus penultimo vix latior, versus basin leviter angustatus, pone aperturam sulcis spiralibus 2 exaratus. Apertura paulum obliqua, oblonga, peristomate incrassato et reflexo, albo, 7-plicata: lamella parietalis prope angulum externum valida, elevata, flexuosa; *margo externus intus nodulis* 4 rotundatis, tribus inferioribus introrsum brevi intervallo in plicas elevatas ascendentis continuatis; margo columellaris dilatatus, intus plicis horizontalibus brevibus 2—3, infera minima. Long. 19, diam 6, apert long. 6, lat. 4 Mill. Bukende zwischen Albert-Edward-See und Albert-Nyanza, auf Waldboden, Dr. Stuhlmann.

9. *Helicarion Tanganyicae*. Testa depressa, brunneofusca, superne radiatim striatula, opaca, inferne pallidior, nitida; spira brevissime convexa: anfr. 3 celeriter crescentes, ultimus rotundatus, basi sat convexus; apertura obliqua, late lunata, $\frac{2}{3}$ diametri majoris occupans, margine externo leviter arcuato, marg. columellari valde arcuato submembranaceo. Diam. maj. $16\frac{1}{2}$, min. 11, alt. 8, aperturae diam. $9\frac{1}{2}$, latitudo obliqua $7\frac{1}{2}$ Mill. Nackenlappen breit, vorn gerundet, rechtseitiger Schalenlappen breit dreieckig, Zwischenlappen weit herabreichend, Fusssohle deutlich dreigetheilt. Am Tanganyika, P. Reichard.

10. *Trochonanina mesogaea*. Testa perforata, depresso trochiformis, superne striis obliquis valde irregularibus plus minusve obsoletis sculpta, pallide corneofusca; spira conica; anfr. 6, priores 2 convexi laeves, sequentes subplani, acute albocarinati, ultimus basi modice convexus, leviter striatulus, nitidiuseulus, antice non descendens. Apertura diagonalis, late lunata, peristomate recto simplice, marginibus sat arcuatis, columellari ad perforationem breviter triangulatim reflexo. Diam. maj. $21\frac{1}{2}$, min. $19\frac{1}{2}$, alt. $12\frac{1}{2}$, aperturae diam. $11\frac{1}{2}$, altitudo obliqua 9 Mill. Waldgebiet in Westen des Albert-Nyanza, Dr. Stuhlmann.

11. *Trochonanina Liederi*. Testa anguste perforata, depresso conoidea, superne striis confertis irregularibus sat obtusis sculpta, albida; spira convexa; anfr. $6\frac{1}{2}$, modice convexi, sutura impressa, ultimus rotundatus, subtus striis magis

distantibus latioribus sculptus, antice non descendens. Apertura diagonalis, oblique lunata, peristomate recto crassiusculo, margine supero paulum, externo valde, infero modice arcuatiss, columellari ad perforationem breviter dilatato. Diam. maj. 25, min. 22, alt. 16, apert. diam. 14, alt. obliqua 11 Mill. Kitohaui auf dem Plateau zwischen Ukuledi und Umbekuru im südlichen Theil des deutschen Schutzgebiets, Lieder.

12. *Helix Conradti*. Testa perforata, conoidea, tenuiscula, leviter striatula, pilis brevibus curvatis obsita, griseofusca, unicolor; spira brevis obtusa; anfr. 5, priores 2 laeves nitidi prominuli, apicem papillarem constituentes, sequentes convexiusculi, regulariter crescentes, sutura modice impressa, ultimus subglobosus, infra minus quam supra convexus, antice valde deflexus. Apertura valde obliqua, lunato-circularis, peristomate recto tenui, marginibus omnibus bene arcuatiss, columellari latiuscule reflexo, perforationem semitegente, albido, callo parietali tenui nitido. Diam. maj. $8\frac{1}{2}$, min. 7, alt. 6— $6\frac{1}{2}$, aperturae diam. 5, alt. obliqua $4\frac{1}{2}$ Mill. Darema in Usambara, Conradt. Nächstverwandt mit *H. pilifera* Marts. aus Abyssinien.

13. *Helix Bukobae*. Testa latiuscule umbilicata, depressa, plicis inaequalibus radialibus usque ad umbilicum continuatis sculpta, castaneo-fusca, zona peripherica pallidiore; spira deppressa, paululum prominens; anfr. $4\frac{1}{2}$, convexi regulariter crescentes, ultimus rotundatus, supra et infra subaequaliter convexus, ad aperturam sensim deflexus. Diam. maj. 15?, min. 12, alt. 7 Mill. Die Mündung verletzt, so dass über sie nichts sicheres angegeben werden kann, aber die Schale scheint nach der Herabbiegung der Naht zu urtheilen erwachsen. Bukoba am Victoria Nyanza. Dr. Stuhlmann.

14. *Helix Butumbiana*. Testa perforata, globoso-conoidea, arctispira, perpendiculariter striatula, nitidiuscula, albida; spira elata; anfr. $6\frac{1}{2}$, primus sat magnus, sequentes convexit, sutura profunda distincti, ultimus ad suturam anguste convexus, dein rapide declivis, basi sat convexus, antice non deflexus. Apertura paene perpendicularis, oblique lunata, peristomate simplice, marginibus valde arcuatiss, marg. columellari oblique ascendentem, ad insertionem antrorsum flexo, perforationem semitegente. Diam. maj. $4\frac{1}{2}$, min. 4, alt. $3\frac{1}{2}$, apert. diam. $2\frac{1}{2}$, alt. obliqua $1\frac{2}{3}$ Mill. Butumbi am südlichen Ufer des Albert-Edward-Sees, Dr. Stuhlmann.

15. *Buliminus Liederi*. Testa semiobtecte perforata, fusiformi-lanceolata, conferte costulata, fuscescenti-grisea, unicolor; apex obtusus; anfr. $7\frac{1}{2}$, primus papillaeformis, secundus jam regulariter costulatus, sequentes regulariter crescentes, convexiusculi, sutura modice impressa, ultimus rotundatus ellipticus. Apertura paulum obliqua, ovato-piriformis, peristomate recto crassiusculo, margine externo et basali bene arcuatis, columellari leviter arcuato, modice dilatato et formicatim reflexo, introrsum spiratim ascendentem. Long. 28, diam. maj. 11, min. $9\frac{1}{2}$, apert. long. 11 Mill. Kitohaui, im südl. Theil des deutschen Schutzgebietes. G. Lieder.

16. *Buliminus (Conulinus n.) Uganda*. Testa umbilicata, conoidea, oblique leviter striatula, albida; anfr. 6, convexi, regulariter crescentes, sutura sat profunda, ultimus rotundatus basi angulatum in umbilicum angustum cylindricum abiens. Apertura diagonalis trapezoidea, peristomate tenui recto, margine externo et basali sat arcuatis, marg. columellari perobliquo, superne triangulatim dilatato et reflexo. Long. 14, diam. maj. 11, min. 9, apert. long $7\frac{1}{2}$, lat. $5\frac{1}{2}$ Mill. Uganda. Dr. Stuhlmann. Verwandt mit B. conulus Rv.

17. *Buliminus (Conulinus) Hildebrandti*. Testa semiobtecte perforata, elongato-conoidea, leviter striatula, corneo-fusca; apex obtusus; anfr. $6\frac{1}{2}$, subplani, sutura impressa, regulariter crescentes, ultimus rotundatus subsaccatus, basi inflatus, Apertura perobliqua subovata, peristomate simplici tenui recto, margine externo valde arcuato, marg. basali arcuato, angulatum in columellarem transeunte, marg. columellari valde obliquo, sursum reflexo et triangulatim dilatato. Long. 10, diam. maj. 6, min. 5, apert. long $6\frac{1}{2}$ diam inclusio peristomate 3, excluso 2 Mill. Kitui in Ukamba, J. M. Hildebrandt.

18. *Buliminus (Conulinus) metula*. Testa perforata, turrito-conoidea, levissime striatula, pallide griseofusca; apex obtusus; anfr. $7\frac{1}{2}$, regulariter crescentes, convexi, sutura profunda, ultimus rotundatus, inferne inflatus. Apertura modice obliqua subtrapezia, peristomate simplice tenui recto, margine externo et basali bene arcuatis, marg. columellari subverticali, modice dilatato, perforationis rotundae minorem

partem tegente. Long. 9, diam. maj. $5\frac{1}{2}$, min. $4\frac{2}{3}$ aperature long. $3\frac{3}{4}$, diam. incluso peristomate 3, excluso $2\frac{1}{4}$ Mill. Kitohau im südlichen Theil des deutschen Schutzgebiets. G. Lieder.

19. *Buliminus (Rhachis) Böhmi* n. Testa perforata, ovato-conoidea, tenuis, levissime striatula, griseo-isabellina, versus apicem rufescens, fascia fusca ad suturam alteraque basali lata; spira conica, apice acuta; anfr. 7, primus depresso, secundus globosus, sequentes regulariter crescentes, planiusculi, sutura modice impressa, ultimus subbiconicus, ad peripheriam rotundatus, regione umbilicari pallide fuscus. Apertura dimidiata longitudinem aequans diagonalis ovata, peristomate tenui, paululum expanso, margine externo superne modice arcuato, marg. basali late rotundato, marg. columellari triangulatum reflexo, griseo-isabellino. Long. 24, diam. $13\frac{1}{2}$, apert. long. obliqua 13, diam. 8 Mill. Gegend des Tanganyika. Dr. R. Böhm.

20. *Limicolaria (Burtoa) Nilotica* Pfr. var. *obliqua*. Testa crassa, ventricosa, conoidea, spira attenuata, anfr. penultimo tumido, apertura $\frac{2}{5}$ longitudinis testae occupante, margine externo *oblique excurrente*, superne subrectilineo, marg. columellari obliquo. Long. 109—114, diam. maj. 72—77, aperturae long. 68—69 Mill. Usagara und an der Ostseite des Tanganyika. Lieder und Reichard.

21. *Limicolaria (Burtoa) Nilotica* Pfr. var. *crassa*. Testa crassa, globoso-ovata, spira lata, obtusa, apertura $\frac{3}{5}$ longitudinis testae occupante, peristomate crasso, margine externo superne obliquo, inferne valde arcuato, marg. columellari subperpendiculari. Long. 86, diam. 60, apert. long. 52. Mill. Kawirondo im Nordosten des Victoria Nyanza, O. Neumann.

22. *Limicolaria (Burtoa) Nilotica* Pfr. var. *oblonga*. Testa crassa, ovato-oblonga, spira aequaliter attenuata, apertura dimidiata longitudinem testae occupante, peristomate crasso, margine externo supra et infra subaequaliter arcuato, marg. columellari brevi, paululum obliquo. Long. 96—102, diam. 56—60, apert. 50—53 Mill. Am südlichen Ufer des Victoria Nyanza. Dr. Stuhlmann.

23. *Limicolaria turriformis*. Testa turrita, tenuiscula, confertim subgranuloso-striata, lineis impressis spiralibus rarioribus indistinctis, pallide straminea, strigis sat pallide rufis

perpendicularibus vel leviter flexuosis; apex obtusulus; anfr. 10, convexiusculi, ad suturam pliculosi, ultimus leviter convexus, basi sensim attenuatus. Apertura trapezoideo-oblonga. $\frac{2}{5}$ longitudinis occupans, margine externo tenui, marg. columellari brevi, perpendiculari vel leviter obliquo, basi attenuato, angulatim terminato, pallide violascente, fauce pallide caerulecente. Long. 89—93, diam. 35—41, apert. long. 37—39, lat. incluso marg. columell. 20—22 Mill. Kawirondo und Usoga, im Nordosten und Norden des Victoria Nyanza, O. Neumann. Nahe verwandt mit *L. Adansoni* und *turris*.

24. *Limicolaria turriformis* var. *Neumanni*. Testa gracilior, pallide straminea unicolor vel strigis rarissimis variciformibus fuscescentibus, dimidia parte inferiore anfr. ultimi magis nitida, margine columellari inferiore plus minusve ad sinistram retorto. Long. 89, diam. $34\frac{1}{2}$, apert. long. 37, lat. 18 Mill. Nebbi in Uganda. O. Neumann.

25. *Limicolaria turriformis* var. *solida*. Testa minor, fusiformis, crassiuscula, distinctius granulata, unicolor albida, margine columellari subverticali. Long. 61—66, diam. 25— $29\frac{1}{2}$, apert. long. 27— $28\frac{1}{2}$, lat. 15—18 Mill. Südwest-Ufer des Victoria Nyanza, Emin Pascha 1877.

26 *Limicolaria mediomaculata*. Testa fusiformi-oblonga, leviter striatula, lineis impressis spiralibus in anfr. penultimo obsoletis, in ultimo nullis, pallide fuscescens, strigis angustis numerosis pallidis et in medio cujusvis anfractus maculis subquadratis fuscis picta; spira modice attenuata; anfr. 7—8, vix convexiusculi, sutura superficiali, ultimus sat angustus, infra sensim attenuatus. Apertura sublanceolata, margine columellari brevi, superne late reflexo, roseo-violaceo, fauce pallide caerulecente strigis et maculis pellucentibus. Long. 39—45, diam. 16—18, apert. long. 13—14, lat. 10—11 Mill. Kawirondo, im Nordosten des Victoria Nyanza, O. Neumann.

27. *Limicolaria Martensiana* E. Smith var. *pallidistriata*, testa pallide straminea, strigis pallide aurantiis, margine columellari violaceo, rima umbilicali fusa. Long. 43, diam. 19, apert. long. 19, lat. $11\frac{1}{2}$ Mill. Grassteppe südlich von Albert-Edward-See, Dr. Stuhlmann.

28. *Limicolaria Martensiana* E. Smith. var. *multifida*. Testa pallide straminea, strigis fuscis latis plus minusve

flexuosis sursum versus suturam omnibus subito in strigulas numerosas rectas perangustas aurantiofuscas exeuntibus, margine columellari violaceo. Long. $37\frac{1}{2}$ — $41\frac{1}{2}$, diam. $16\frac{1}{2}$ —17, apert. long. 17, lat. 10 Mill. Am Victoria-Nyanza, am westlichen Fuss des Runssoro, sowie zwischen Albert-Nyanza und Albert-Edward-See, Dr. Stuhlmann, G. A. Fischer und O. Neumann.

29. *Limicolaria Martensiana* var. *eximia*. Testa subovato-oblonga, subcostulato-striata, in anfr. superioribus minutim decussata, pallide stramineo-flava, strigis obscure fuscis latis, plerisque flexuosis, nonnullis perobliquis, infra suturam strigulis numerosis angustis pallidioribus picta; spira sat obesa; anfr. $8\frac{1}{2}$, regulariter crescentes, convexiusculi, ultimus sat convexus, basi sensim attenuatus. Apertura dimidium testae longitudinem non attingens, margine columellari levissime arcuato, intus albido-caerulecente, extus violaceo. Long. 59, diam 25, apert. long. 25, lat. 16 Mill. Kawirondo, O. Neumann.

30. *Limicolaria connectens*. Testa conico-elongata, subcostulato-striata et in anfractibus superioribus distinete granulosa, fuscescenti-flavida, versus apicem rubescens, strigis rectissimlicibus numerosis inaequalibus, plerisque perangustis, nonnullis latioribus picta; spira sat gracilis; anfr. $8\frac{1}{2}$, regulariter crescentes, vix convexiusculi, ultimus paululum convexus, versus basin sat attenuatus. Apertura lanceolata, angulo supero peracuto, basi anguste rotundata, margine columellari subverticali, violaceente. Long. 51, diam. $19\frac{1}{2}$, apert. long. 31, diam. 10 Mill. Zwischen L. rectistrigata und colorata E. Sm. in der Mitte. Nordostküste des Victoria-Nyanza, O. Neumann.

31. *Limicolaria acuminata*. Testa elongato-conica, subtiliter costulato-striata, striis subtilissime granulosis, ad suturam plicatula, *sat nitida*, stramineo-fusca, strigis rufofuscis in medio late fulguratis, infra suturam angustis numerosis picta; *spira sursum valde attenuata*, acuminata apice ipso obtuso; anfr. 7?, fere *plani*, regulariter crescentes, ultimus? obtuse angulatus, basi strigis confluentibus perobliquis paene unicolore fusca. Apertura ovata, margine columellari perpendiculari, latiuscule reflexo, rubro-violaceo. Long. 30, diam. maj. 15, apert. long. 14, lat. $8\frac{1}{2}$ Mill.

Galeriewald am Boa-Flüsschen in N. W. Lendu, westlich vom Albert-Nyanza, Dr. Stuhlmann. Das vorliegende Stück vielleicht nicht ganz ausgewachsen. Verhält sich zu den übrigen Limicolarien ähnlich wie *Achatina pulchella* Marts. und *Grandidieriana* Bourg. (als *Stenogyra*) zu den Achatinen.

32. *Pseudoglessula Conradti*. Testa rimata, subturrata, confertim leviter costulata, costulis in anfr. secundo validis valde distantibus, corneo-fusca; anfr. 7, convexiusculi, regulariter crescentes, ultimus ellipticus, medio obsolete subangulatus, basi rotundatus. Apertura paulum obliqua, trapezoidea, peristomate crassiusculo, margine externo leviter arcuato, basali subhorizontali, columellari subperpendiculari, modice dilatato et reflexo, rimam umbilicarem non obtegente, sursum introrsum levissime oblique truncato. Long. 14, diam. 6, apert. long. $5\frac{1}{3}$, lat. incluso peristomate 4, excluso 3 Mill. Usambara, Conradt. In der Mitte zwischen *Pseudoglessula* und *Buliminus*, aber wegen der eigenthümlichen Sculptur der zweiten Windung doch wohl zu ersterer zu stellen.

33. *Glessula Runssorina*. Testa ovato-oblonga, leviter striatula, nitida, fulvo-cornea; anfr. $5\frac{1}{2}$ – 6, primus subglobosus laevis, secundus distincte striatulus, sequentes convexiusculi, regulariter crescentes, sutura sat impressa, subcrenulata, penultimus pro ratione elongatus, ultimus brevior, ellipticus, prope aperturam valde descendens, strigis nonnullis variciformibus, basi rotundatus. Apertura modice obliqua, lanceolata, margine externo extus nigrolimbato, supra et infra modice arcuato, medio rectilineo, margine basali rotundato, marg. columellari valde arcuato, appresso, albo, inferne oblique truncato, superne in callum parietalem distinctum transeunte. Long. $23\frac{1}{2}$, diam. 9, apert. long. 10, lat. 5 Mill. Runssoro, 3100 Met., Dr. Stuhlmann.

34. *Subulina (Subulona n.) silricola*. Testa turrita, sat gracilis, nitida, corneo-flava, apice obtuso; anfr. 11, secundus tertius et quartus convexiusculi, diametro vix crescentes laeves, sequentes lente et regulariter crescentes, subplani, leviter striatuli, striis infra suturam plicaeformibus recurvatis sculpti, varicibus fuscescentibus raris picti; ultimus subangulatus, infra celeriter attenuatus. Apertura ovata, sat obliqua, $\frac{2}{3}$ longitudinis ocupans, margine externo tenui

subrecto, marg. basali rotundato, marg. columellari valde arcuato dilatato, basi distinete truncato. Long. 52, diam. 12, apert. long. $11\frac{1}{2}$, lat. 7 Mill. Urwald zwischen Albert-Edward-See und Albert-Nyanza, Dr. Stuhlmann.

Als Untergattung *Subulona* bezeichne ich die grösseren ostafrikanischen Arten mit mehr ausgesprochener Schalenhaut, welche öfters Striemen oder Wachstumsabsätze zeigt, wie *St. castanea* Mart. und *Mamboiensis* E. Smith.

35. *Subulina pinguis*. Testa subclavato-turrita, levissime striatula, nitida, pallide flava; anfr. $9\frac{1}{2}$, convexiusculi, primus parvus subglobosus, secundus et tertius subaequales, sequentes lente diametro crescentes, vix convexiusculi, sutura modice impressa, subcrenulata, ultimus basi rotundatus. Apertura acute ovata, sat obliqua, margine externo tenui recto, marg. basali breviter rotundato, marg. columellari breviter arcuato, contorto, subincrassato, albido. Long. $26\frac{1}{2}$, diam. 8, apert. long. 8, diam. 4 Mill. Urwald in Butumbi, an der Südküste des Albert-Edward-Sees, Dr. Stuhlmann.

36. *Subulina elegans*. Testa conico-turrita, costulis verticalibus sat distantibus sculpta, nitida, castaneo-fusca, apice obtuso; anfr. 9, primus parvus globosus laevis, secundus inflatus, subdepressus, jam distinete costulatus, tertius secundum diametro non superans, sequentes regulariter lente crescentes, convexiusculi, sutura sat profunda, ultimus ad peripheriam angulatus, basi subplana, leviter striatula. Apertura vix obliqua, quadrato-ovata, circa $\frac{1}{4}$ longitudinis testae occupans, margine externo tenui, paulum arcuato, marg. basali late rotundato, marg. columellari valde arcuato subincrassato albo, basi distinete truncato. Long. 10, diam. 3, apert. long. $2\frac{1}{8}$, lat. $1\frac{1}{2}$ Mill. Bundeiko, Bukende und Bugundi, zwischen Albert-Edward-See und Albert-Nyanza, Dr. Stuhlmann. Erinnert an *Pseudoglossula*.

37. *Subulina perstriata*. Testa turrita, confertim costulato-striata, albida, opaca, apice obtuso; anfr. $8\frac{1}{2}$, primus parvus subglobosus, vix prominens, jam costulato-striatus, secundus et tertius subaequales, sequentes regulariter lente crescentes, convexiusculi, sutura mediocriter impressa, ultimus basi rotundato-attenuatus. Apertura diagonalis, $\frac{1}{4}$ longitudinis testae fere occupans, rotundato-ovata, margine extenso tenui arcuato, marg. columellari sat tenui, leviter arcuato,

distincte torto, basi peroblique subtruncato, superne in callum parietalem distinctum continuato. Long. $24\frac{1}{2}$, diam. 6, apert. long. $5\frac{2}{3}$, lat. $5\frac{1}{2}$ Mill. Urwald bei Butumbi, an der Süd-küste des Albert-Eduard-See, Dr. Stuhlmann.

38. *Subulina bicolumellaris*. Testa turrita, confertim striata, costulato-striata, sordide fuscescens, opaca, apice obtuso; anfr. $7\frac{1}{2}$, primus subglobosus, paulum prominens, secundus globosus laevis, tertius aequale latus, costulatus, sequentes regulariter lente crescentes, convexiusculi, sutura medio-criter impressa, ultimus basi rotundato-attenuatus. Apertura modice obliqua, $\frac{8}{10}$ longitudinis testae occupans, oblongo-ovata, margine externo tenui, paulum arcuato, *margine columellari* subverticali *bipartito* quasi funiculos duos sulco separatos spiratim ascendentibus exhibente, basi oblique truncato. Long. 15, diam. 5, apert. long. 4, diam. 2 Mill. Karewia am westl. Fuss des Runssoro, 1175 Met., St. Dr. Stuhlmann.

39. *Subulina suberenata*. Testa turrita, levissime striatula, flavescentia, apice subobtuso; anfr. 9, primus parvus papillaeformis, secundus et tertius inflati subglobosi aequales laeves, sequentes regulariter lente diametro crescentes, vix convexiusculi. *sutura irregulariter crenulata*, ultimus basi rotundato-attenuatus. Apertura obliqua, $\frac{8}{10}$ longitudinis occupans, acute ovata, margine externo tenui, paulum arcuato, marg. basali rotundato, marg. columellari valde arcuato, basi distincte truncato, superne in callum parietalem tenuem continuato. Long. 13, diam. $5\frac{1}{2}$ apert. long. 4, diam. $2\frac{1}{2}$ Mill. Urwald in Butumbi, Dr. Stuhlmann.

40. *Succinea corticalis*. Testa ovato-oblonga, leviter striatula, nitida, pallide flava; spira brevis, obtusiuscula; anfr. 3, ventricosi. Apertura ovata, superne obtusangula, marginibus sat crassis, albis, margine externo oblique extrorsum porrecto, superne subrectilineo, inferne arcuato, marg. basali late rotundato, marg. columellari subverticali, callo parietali distincto, Long. 6, diam. maj. $3\frac{1}{2}$, min. $2\frac{1}{2}$, apert. long. 6, diam. $2\frac{1}{2}$ Mill. Wembere-Steppe unter Baumrinde, Stuhlmann.

41. *Paramelania (Edgaria) flexicosta*. Testa ovato-globosa, subimperforata, solidiuscula, plicis radialibus arcuatis nodulosis in anfractu penultimo 11, in ultimo 16 – 17, interstitis subduplo latiore separatis, versus aperturam magis confertis

et liris spiralibus sat confertis, in anfr. penultimo 6—9 conspicuis, alternis plerumque minoribus, in ultimo 9—10 plicas percurrentibus et 5 majoribus nodosis infra plicas in parte inferiore sculpta, violascenti-albida, plicis albis, liris plerumque fuscis, basalibus fuscis albinodosis; spira acuta, gradata; anfr. 7, convexi, prope suturam planati et laevigati. Apertura ovalis, basi distincte effusa, margine externo sigmoides, sat tenui et leviter crenulato, intus pallide fusco-maculato, marg. basali anguste rotundato, marg. columellari lato crasso albo, extrorsum arcuatim dilatato, perforationem punctiformem plerumque totum obtegente, crista basali a margine bene separata. Long. 19, diam. maj. 15, min. 20, apert. inclusa margine long. 11 $\frac{1}{4}$, lat. 7 $\frac{1}{4}$ Mill. Tanganyika, Reichard.

42. *Paramelania (Edgaria) tiarella*. Testa biconico-globosa, imperforata, solida, plicis radialibus plus minusve obliquis leviter bi-vel trinodosis in anfractu penultimo 8, in ultimo 9—10, interstitio duplo vel triplo latiore separatis et liris spiralibus in anfr. penultimo 2—3 conspicuis, in ultimo 4 inter plicas et 4 validioribus infra plicas in parte inferiore sculpta; flavescenti-albida, liris saepius rufofuscis; spira obtusiuscula gradata; anfr. 5 $\frac{1}{3}$, valde convexi, prope suturam subplanati. Apertura ovata, basi distincte effusa, margine externo erassiusculo, vix arcuato, marg. basali rotundato crasso, marg. columellari crasso albo, paululum extus arcuato, non crenulato, crista basali margini approximata. Long. 10—13, diam. maj. 10, min. 8, apert. inclusa marg. long. 8, lat. 6 Mill. Tanganyika.

Hugh Cuming.

In den beiden letzten Nummern des Journal of Conchology bringen J. Cosmo Melvill und E. L. Layard interessante Erinnerungen an den „König der Sammler“, denen wir die folgenden Notizen entnehmen.

Hugh Cuming wurde am 14. Februar 1891 in West Abington bei Kingsbridge in South Devon geboren. Als

Kind wenig bemittelter Eltern kam er schon früh in die Lehre bei einem Segelmacher. Der Verkehr mit Seeleuten weckte in ihm den Trieb zum Reisen, und als er 1819 Gelegenheit fand, ein Geschäft in Valparaiso zu gründen griff er mit beiden Händen zu. Hier wurde er zufällig mit Lieutenant Frembley von der Expedition der Herrn King und Fitzroy bekannt und dieser lenkte seine Aufmerksamkeit und seinen angeborenen Sammeltrieb auf die Mollusken und ganz besonders auf die grossen Chitoniden. Schon 1826 entschloss er sich, sich ganz dem naturwissenschaftlichen Sammeln zu widmen. Er rüstete auf eigne Kosten ein kleines Segelschiff aus und besuchte zuerst Juan Fernandez, dann die Gesellschaftsinseln und namentlich die Inseln Annaa und die Paumotus.

Mit reicher Ausbeute nach Valparaiso zurückgekehrt, begann er alsbald die Vorbereitungen für eine zweite Expedition, die diesmal mit Unterstützung der chilenischen Regierung die Erforschung der Westküste von Südamerika zum Zweck hatte. Im Laufe zweier Jahre untersuchte er die Küste südlich bis Chiloe, nördlich bis zu den Galapagos, überall auch mit der Drake arbeitend. Dann kehrte er mit seiner reichen Ausbeute nach England zurück und erregte durch dieselbe nicht geringes Aufsehen unter den Fachleuten. Die ersten Jahrgänge der *Proceedings of the Zoological Society* sind angefüllt mit den Beschreibungen der neuen Arten durch Broderip und Sowerby. Da er auch finanziell sehr gute Resultate erzielte, entschloss er sich zu einer neuen Reise, deren Ziel diesmal die Philippinen sein sollten. Die wunderbaren Resultate dieser Expedition sind den älteren Sammlern noch in der Erinnerung. Die Massen neuer Seeconchylien, besonders aus den von den Sammlern am höchsten geschätzten Gattungen, von Comus, Mitra, Cypraea, Pleurotoma und ganz besonders die Cochlostylen und grossen Cyclostomiden brachten eine förmliche Revolu-

lution hervor. Für die kleinen Arten, das „Spekulaziengut“, um mit dem alten Chemnitz zu reden, hatte Cuming freilich so wenig Sinn, wie die meisten Sammler. Dafür liess er aber auch die anderen Thierklassen nicht unberücksichtigt und brachte namentlich auch, was den meisten Conchologen kaum bekannt sein dürfte, ein reiches Herbarium von ca. 130 000 Nummern zusammen, das eine Masse neuer Arten enthielt.

Nach England zurückgekehrt widmete sich Cuming ausschliesslich der Vervollkommnung seiner Sammlung. Sein wunderbar reiches Material machte es ihm möglich, überall das Beste in Tausch zu erwerben, er machte dazu in einer Zeit, wo das Reisen noch erheblich schwieriger war als heute, fast alljährlich eine Rundreise durch ganz Europa und knüpfte mit allen Museen und Fachleuten persönliche Beziehungen an. In richtiger Selbsterkenntnis überliess er die Beschreibung der neuen Arten anderen, Sowerby, Reeve, Broderip, Dunker für die marinen, Pfeiffer und anderen für die Landschnecken; aber die Unterscheidung ist in weitaus den meisten Fällen sein Werk. Er hatte für die Speciesunterscheidung ein wunderbar scharfes Auge und vertrug darin auch keinen Widerspruch. Wunderbar war auch sein Gedächtnis; was er einmal gesehen, vergass er nie wieder, und sowar er bei jeder Auktion im Stande auf den ersten Blick zu sehen, was ihm noch fehlte, und das erwarb er denn auch um jeden Preis. Freilich musste er mitunter auch sehr hohe Preise zahlen, denn eine Kunst lernte er nie, die, sich zu verstehen. Wenn er in einem „lot“ eine Art sah, die ihn reizte, begannen seine Augen zu glühen und die Concurrenten gaben darauf gar wohl acht und boten eifrig mit, auch wenn sie nicht wussten, worum es sich handelte!

So brachte Cuming durch Tausch und Kauf eine Sammlung zusammen, die gegen 19 000 Arten zählte, und

dabei den unschätzbareren Vorzug hatte, dass sie mehr Original-exemplare enthielt, als irgend eine andere existirende Sammlung, denn in einem Punkte war Cuming grossartig: jedem, der ernstlich arbeiten wollte, stand sein Material zur Verfügung. Reeve sowohl wie Sowerby haben ihre Monographieen fast ganz auf sein Material gegründet, auch Philippi, Pfeiffer, Dunker, Römer haben sehr viel von ihm erhalten. Freilich hatte die Sammlung auch ihre Schattenseiten. Zunächst ging ihm als einem ächten Sammler die Schönheit des Exemplares über alles, und er bedachte sich nie ein Originalexemplar für ein schöneres Stück hinzugeben. Dann verliess er sich zu sehr auf sein Gedächtniss und dadurch waren bei nah verwandten Arten Irrthümer und Verwechslungen unvermeidlich. Layard, einer seiner intimsten Bekannten, sagt darüber: „Ich habe öfter klagen hören über Ungenauigkeiten in den Fundortsangaben Cumings, und ich denke, ich kann das erklären. Wie schon vorher erwähnt, habe ich ihr oft Sendungen zusammenstellen sehen, und habe ich allen Grund zu vermuten, dass er (ausser seinem Namen) überhaupt nicht schreiben konnte. Niemals sah ich ein Notizbuch in seiner Hand, und seine Vorräthe waren nicht besonders etikettirt. Er verliess sich vollständig auf sein Gedächtniss, nicht nur bezüglich der Localitäten, sondern auch bezüglich der Namen der Schnecken und der Autoren. Im Zimmer stand ein langer Tisch, welcher die ganze Länge des dreifenstrigen Raumes einnahm. Cuming ging vor demselben auf und ab mit einem Korb oder Kasten voll Schnecken in der Hand, aus welchem er die Exemplare nahm, die verschickt werden sollten. Er legte sie auf den Tisch und diktirte dann dem Sekretär Namen, Autor und Lokalität. Dieser schrieb sie auf die Etikette, legte diese zu der Muschel und packte sie später ein. Mich wundert nicht, dass manchmal Irrthümer vorkamen, sondern nur dass sie so selten sind“.

Cuming erreichte ein Alter von 74 Jahren. Noch im April 1865 besuchte er eine der grossen Steven'schen Auktionen, für die es damals noch ein Publikum gab. Am 10. August desselben Jahres starb er nach kurzer Krankheit. Seine Dubletten, trotz des durch 25 Jahre betriebenen ausgebreiteten Handels und Tauschverkehrs immer noch ungeheure Quantitäten, wurden versteigert, die Sammlung erwarb das britische Museum für 6000 Pfund Sterling, es wurde dadurch zu der ersten Conchyliensammlung der Welt. Melvill gibt eine Aufzählung der von verschiedenen Autoren nach Cuming benannten Arten, es sind 152 und eine Gattung, jedenfalls die grösste Zahl, die irgend ein Sammler auf seinen Namen vereinigt hat.

Ko.

Zur Molluskenfauna der Schweiz.

Von

Dr. R. F. Scharff in Dublin.

Während eines vierwöchentlichen Aufenthaltes in der Schweiz hatte ich Gelegenheit eine ansehnliche Zahl von Schnecken in der Umgebung von Mürren und von Brünig Pass zu sammeln. Ich erlaube mir hiermit einige der bemerkenswertheren Arten, deren Höheverbreitung noch nicht hinreichend bekannt ist, anzugeben und auch solche die nicht in Herrn Clessins werthvollem Werk über die Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns und der Schweiz Erwähnung finden und daher für diesen Theil Mitteleuropas neu sein möchten.

In Mürren, welches 1750 Meter über den Meeresspiegel liegt, ist *Patula ruderata* vielleicht die häufigste Schnecke, doch fanden sich nach eifrigem Suchen noch weitere 33 Arten. Ausser *Limax marginatus* (*arborum*), *L. maximus*

und *Agriolimax agrestis* sind Nacktschnecken hier nur sehr spärlich vertreten, indessen gelang es mir einige Exemplare von *Arion Bourguignati* zu entdecken, welcher bis jetzt wie es scheint noch nicht aus der Schweiz mit Bestimmtheit nachgewiesen worden war. Die beiden einzigen anderen Arten des Genus *Arion* waren *A. hortensis* u. *A. subfuscus*.

Was die kleineren *Helices* anbetrifft, so erwähnt Herr Glessin, dass *Vallonia pulchella* noch bis zu 1400 M. Höhe vorkommt und *V. costata* vielleicht bis zur halben Höhe. Ich sammelte eine Anzahl der letzteren Art in Mürren und auch auf dem Brünig, traf aber *V. pulchella* nirgends an, sodass wir also *V. costata* selbst noch zur alpinen Region angehörend rechnen müssen. *Helix personata* kommt noch etwa 50 M. oberhalb Mürren unter Alpenrosen-Gestrüpp vor, also auch in der alpinen Region, während *Helix obvoluta* die Wälder unterhalb des Dorfs nicht zu verlassen scheint. *Helix ericetorum* fand sich in einigen kleinen Stücken an der neuen Electrischen Bahnstation. *Buliminus montanus* sowie *B. obscurus* erbeutete ich beide in dem naheliegenden Tannenwald. Es mag auch von Interesse sein zu erwähnen, dass sich die folgenden Arten unter Tannenrinde vorfanden und in einem ausschliesslich aus Nadelholz bestehenden Wald:

<i>Arion hortensis</i>	<i>Helix obvoluta</i>
<i>Limax maximus</i>	, <i>sylvatica</i>
, <i>marginatus</i>	<i>Cochlicopa lubrica</i>
<i>Agriolimax agrestis</i>	<i>Clausilia laminata</i>
<i>Helix ruderata</i>	, <i>bidentata</i> .
, <i>personata</i>	

Auf dem Brünig Pass (1000 M.) ist die Molluskenfauna natürlich bedeutend reicher. Erwähnenswerth sind von hier besonders zwei Hyalinien, von denen eine meines Wissens noch nicht aus der Schweiz bekannt war — nämlich *Hyalinia alliaria*. Ich fand von dieser Art nur drei

Stück. Sie fiel mir sofort durch den starken Knoblauchsgeruch auf, doch auch ein weiterer Vergleich mit irischen Stücken liess keinen Zweifel zu an der Identität der Schweizer Form mit dem nordeuropäischen. Leider gelang es mir nur eines einzigen Exemplars von *Hyalinia depressa* hahaft zu werden, denn es hatte wochenlang nicht geregnet und war das Wetter für Hyalinien ungemein ungünstig. Von Nacktschnecken fanden sich indessen die folgenden:

<i>Arion hortensis</i>
„ <i>bourgignati</i>
„ <i>ater (empiricorum)</i>
„ <i>subfuscus</i>
<i>Agriolimax agrestis</i>
„ <i>laevis</i>
<i>Limax tenellus</i>
„ <i>maximus</i>
„ <i>marginatus (arborum)</i>

Wie schon erwähnt, tauchte hier wieder *Vallonia costata* auf und ist auch *Helix hortensis* stellenweise ziemlich häufig, geht also bedeutend höher wie von Herrn Clessin angenommen wurde.

Literaturbericht.

Manual of Conchology, structural and systematic. By George W. Tryon Continuation by Henry A. Pilsbry. Pts. 59—61.

Enthält die Opistobranchiata tectibranchia mit den Familien Actaeoniidae, Tornatinidae, Scaphandridae, Bullidae, Aplustridae, Ringiculidae, Gastropteridae, und Philinidae. Für *Buccinulus* wird der Name *Solidula* Fischer eingeführt. Als neu wird beschrieben *Bulla roperiana* von den Balearen, der westindischen *B. solida* näher stehend, als der mittelmeerischen *B. striata*. — *B. gouldiana* nom. nov. für *B. nebulosa* von Californien, die von der (verschollenen) *B. nebulosa* Schröter verschieden ist. Für *Doridium* wird der ältere Name *Aglaja* Renier eingeführt.

Brusina, S., Frammenti di Malacologia terziaria serba. In Annales Geologiques de la Peninsule balcanique, dirigée par J. M. Zujovic. Tome IV. Belgrad 1893. Con una tavola.

Als neu beschrieben werden: *Neritodonta stanae* p. 28. t. 2 fig. 3; — *Gaspia vujici* p. 30 t. 2 fig. 4; — *Melanopsis zujovici* p. 33 t. 2 fig. 5; — *Melanopsis lozanici* p. 34 t. 2 fig. 6; — *Oryoceras fistula* p. 38 t. 2 fig. 7; — *Planorbis lazici* p. 40 t. 2 fig. 1; — *Pl. marinkovici* p. 41; — *Limnaea pancici* p. 43; — *Limnocardium stanae* p. 49; — *Melanopsis serbica* p. 50; — *Mel. klerici* p. 53; — *Prososthenia serbica* p. 66; — *Planorbis pavlovici* p. 68; — *Ancylus serbicus* p. 71; — *Neritodonta radovanovi* p. 72. t. 2 fig. 2; — *Planorbis microcephalus* Sdbgr. nec Fuchs = *nitidus* A. Brann nec Müll. wird in Pl. Sandbergeri umgetauft.

Journal de Conchyliologie Vol. XLII. No. 3.

p. 161. Crosse, H., Faune malacologique terrestre et fluviatile de la Nouvelle — Caledonie et de ses dependances. Eine sehr dankenswerthe Zusammenstellung der Fauna dieses interessanten Archipels, für welchen der Verfasser wohl das reichste Material besitzt. Die Gattungen *Helix*, *Amphidromus*, *Partula*, *Ampullaria*, *Amphibola*, *Pirena*, *Batissa* werden aus der Fauna gestrichen, ebenso *Helix cespitoides*, die auf ein verschlepptes Exemplar von *Hel. cespitum* gegründet ist. Für *Helix raynali* Gass. wird eine neue Gattung *Ougapia* gegründet. *Pythia leopardus* Gassies nec Reeve erhält den Namen *gassiesi* Crosse. Mit den Auri culaceen bricht die Arbeit ab.

Annales de la Société Royale Malacologique de Belgique Tome XXVII. 1892.

- p. 3. Nobre, Augusto, Etude géologique sur le Bassin du Douro. Enthält auch Verzeichnisse der an der Küste lebenden marinischen Mollusken.
- p. 31. Pelseneer, Paul, Introduction à l'Etude des Mollusques. Mit zahlreichen Zinkographien. Das angenommene System ist folgendes:

- A. Amphineura.
 - 1. Polyplacophora.
 - 2. Aplacophora.

B. Gastropoda.

1. Streptoneura.

3. Aspidobranchia.

a. Dokoglossa.

b. Rhipidoglossa

4. Pectinibranchia.

a. Platypoda.

b. Heteropoda.

II. Euthyneura.

5. Opisthobranchia.

6. Pulmonata.

C. Scaphopoda.

D. Lamellibranchia.

1. Photibranchia.

2. Filibranchia.

3. Pseudolamellibranchia.

4. Eulamellibranchia.

Procés-Verbaux des Séances de la Société Royale Malacologique de Belgique Tome XXII. 1893.

- p. VII. Pelseneer, Paul, Sur le Genre *Actaeon*.
p. XV. Coutourieux, J., Note sur deux coupes observées dans la Banlieue de Bruxelles.
p. XXVII. — —, Fossiles nouveaux pour la Faune de l'Eocène supérieur.
p. XXX. Vincent, E., Observations sur les *Glycimeris Landeniens* et sur la Nomenclature de *Glycimeris intermedia* Sow.
p. LXI. Pelseneer, Paul, la Formation de Variétés chez la Moule comestible.
p. LXVI. — —, sur la fonction de l'Osphradium des Mollusques.
p. LXXIV. Vincent, E., sur un specimen de *Eastonia rugosa* recueilli à Knocke.
p. LXXVIII. Pelseneer, Paul, les organes génitaux de *Auricula*.
p. LXXIX. Vincent, E., Note préliminaire sur les *Avicula*.

— —, *Tome XXIII. 1894*

- p. XXVII. Vincent, E., Description d'un bivalve nouveau trouvé dans le Landenien inférieur (*Glycimeris fallax*).
p. XXX. Coutourieux, J., Note sur une gîte fossifère de l'Etage Weimelien.

- p. XXXIX. Vincent, G., et J. Coutourieux, Note relative à la Géologie des environs d'Asche.
- p. LXII. Vincent, G., Note relative à la Paléontologie des Sables Landeniens de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Neu *Chlamys briarti* und *Chl. bayeti*.
- p. LXX. — —, Documents relatifs à la Faune Landenienne.
- p. LXXII. — —, une nouvelle espèce du Genre *Chlamys*. (*Chl. flandrica*).
- p. LXXIV. Pelseneer, Paul, Numismatique malacologique. Eine alte Münze von Eretria trägt einen Cephalopoden, wahrscheinlich eine Eledone.
- p. LXXV. Raeymaekers, Dr., Liste de quelques Mollusques du Midi, recueillies dans l'estomac du canard sauvage (*Anas boschas* L.).
- p. LXXXIII. Pelseneer, Paul, Pulmonés à branchie. — *Physa lamellata* Smith von Madagaskar besitzt eine Kieme und wird deshalb zu einer eigenen Gattung *Pulmobranchia* erhoben. Der Autor hat übrigens rudimentäre Kiemen auch bei *Ancylus* und *Planorbis* nachgewiesen.
- p. LXXXIV. Vincent E., Description d'un Bivalve nouveau (*Periploma rugosa*) de l'Etage paniselien. Mit Figur.
- p. XCIII. — —, Note préliminaire sur les Pinna. — Neu *P. consobrina* p. 95 mit Figur: — *P. propinqua* p. 97, Figur.
- —, Tome, XXIV. 1895.
- p. V. Raeymaekers, D., Epoque à laquelle *Mya arenaria* a disparu de la région du Bas-Escaut belge.
- p. XXX. Vincent, E., Mollusques marins d'Huelva et d'Aquila.
- p. L. — —, Note préliminaire de Niso. Neu *N. pyramidata*, *micans*, *obesula*, mit Figuren, aus dem Tertiär.

Cook A. H., *Shipley and Reed, Molluses and Brachiopods (recent and fossil)*. In the Cambridge Natural History. Vol. III. London, Macmillan and Co., 1895. 8°.

Ein stattlicher Band von 535 Seiten, mit reicher Ausstattung, welcher den Autoren, wie dem Verleger Ehre macht. Er bildet ein vollständiges Handbuch der Conchylienkunde, welches völlig dem heutigen Stande unserer Kenntnisse entspricht und Anatomie, geographische Verbreitung und Systematik gleichmässig berücksichtigt. Die Illustrationen sind vorzüglich ausgeführt und zum grösseren Theile neu. Das Buch füllt entschieden eine Lücke

in der englischen Literatur aus und wird auch von deutschen Malakozoologen mit Nutzen gebraucht werden.

Martens, E. von. Neue Arten von Landschnecken aus den Gebirgen Ost-Afrikas. In Sitz.-Ber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1895. p. 120.

Neu *Cyclophorus volkensi* p. 121 vom Kilimandscharo; — *Eumea tudes* p. 122 von ebenda; — *E. paradoxula* p. 122 vom Runssoro; — *Helicarion stuhlmanni* p. 123 von ebenda; — *H. succulentus* p. 123 desgleichen; — *H. subangulatus* p. 124, Bukende; — *Vitrina oleosa* p. 124, Runssoro; — *Trochonanina obtusangula* p. 125, Marungu; — *Tr. simulans* p. 125, Kilimandscharo; — *Th.?* *rufofusca* p. 126, Kilimandscharo; — *Helix kilimae* p. 127, Kilimandscharo; — *H. runssorina* p. 127, Runssoro; — *Buliminus retirugis* p. 128, Runssoro; — *B. stuhlmanni* p. 128, Karema; — *Subulina castanea* p. 129, Runssoro.

Martens, Ed. von, Ein neuer Buliminus aus Süd-Arabien. (Bul. Schweinfurthi). Ibid. p. 129.

Smith, Edgar A., Report upon some Mollusca, dredged in the Arabian Sea during the Season 1894—95. In Nat. Hist. Notes Investigator Series II. No. 20. (Ann. Mag. N. H. (6) XVI 1895. p. 262.)

Neu *Nassa pseudoconcinna* vor Gudscherat p. 263; — *Capulus irregularis* p. 264; — *Crassatella indica* p. 265.

The Journal of Conchology Vol. VIII. No. 2—4.

- p. 33. Marshall, J. T., Alterations in British Conchology (Cont.)
p. 42. Collier, Edw., Notes on a Conchological Excursion to the West of Ireland.
p. 55. Standen, R., Note on *Cypraea tessellata*.
p. 59. Melvill, J. C., an Epitome of the Life of the late Hugh Cuming.
p. 70. Adams, Lionel E., *Segmentina nitida* in Northamptonshire.
p. 71. Layard, E. L., some personal Reminiscences of the late Hugh Cuming.
p. 83. Adams, Lionel E., *Helix hortensis* var. *luteolabiata* var. nov. and large *Hel. itala* in Northamptonshire.
p. 84. Melvill, J. Cosmo, and Robert Standen, Notes on a Collection of Shells from Lifu and Uva, Loyalty Islands, formed by the Rev. James and Mrs. Hadfield, with List of Species. (pl. II, III). Neu *Haminea cairnsiana* p. 89 t. 2 fig. 1; *Myurella nectarea*

p. 91 t. 2 fig. 2; — *Drillia hadfieldi* p. 94 t. 2 fig. 3; — *Glyptostoma aliciae* p. 95 t. 3 fig. 15; — *Gl. calcicincta* p. 95 t. 3 fig. 21; — *Gl. cremonilla* p. 96 t. 3 fig. 31; — *Gl. emmae* p. 96 t. 3 fig. 24; — *Gl. theskela* p. 97 t. 3 fig. 26; — *Daphnella dulcinea* p. 98 t. 3 fig. 25; — *Mitra honesta* p. 101 t. 3 fig. 17; — *Costellaria nitidissima* p. 102 t. 3 fig. 19; — *Engina mundula* p. 105 t. 2 fig. 6; — *E. spica* p. 105 t. 2 fig. 12; — *Ocinebra benedictus* p. 108 t. 2 fig. 12. — *Cerithium dichroum* p. 115 t. 2 fig. 5; — *Diala hardyi* p. 118 t. 2 fig. 10; — *D. lutens* p. 118 t. 2 fig. 9; — *Barleeia chasteri* p. 120 t. 3 fig. 22; — *Syrnola mossiana* p. 122 t. 2 fig. 16; — *Minolia glaphyrella* p. 125 t. 3 fig. 18; — *Kellia fidelium* p. 128 t. 3 fig. 30.

Dautzenberg, P., Campagne de la Melita 1892. Mollusques recueillis sur les cotes de la Tunisie et de l'Algerie. In Memoires Soc. Zool. France 1895. — 11. pg.

— —, *Description d'une nouvelle espèce de Modiola provenant du Littoral occidental de la France.* In Feuille jeunes natur. 1895. Avec planche.

The Nautilus Vol. IX.

- p. 49. Sage, Ino. H., a Sora (*Porzana carolina*) caught by a mussel (Woodcut).
- p. 50. Dall, W. H., Synopsis of the subdivisions of *Holospira* and some related Genera. — Bei *Holospira* wird eine neue Untergattung *Coelostemma* errichtet, bei *Coelocentrum* desgleichen die Untergattung *Spartocentrum*, ferner bei *Holospira* s. str. die Sektionen *Haplostemma*, *Eudistemma*, *Distomospira*. — *Columna ramentosa* Cooper ist nach der Anatomie ganz eng verwandt mit *Leptobyrsus*, also *Bulimulus*; für die Sektion wird der Name *Pseudorhodea* vorgeschlagen.
- p. 52. Pilsbry Henry A., a new *Teinostoma* (*Hidalgoana* von Singapore).
- p. 52. Vanatta E. G., Notes on the smaller american Planorbines. Neu Pl. *callioglyptus* und Pl. *opercularis* var. *oregonensis*.
- p. 57. Index to Conchologist Exchange.
- p. 61. Hedley, C., on the Australasian Gundlachia.
- p. 68. Pilsbry, Henry A., a new mexican *Bythinella* (*palomasensis* aus dem See Palomes in Nordwest Mexiko).
- p. 69. Soper, Mrs. E. C., Notes on Shells.
- p. 71. Shepard, Mrs. Ida M., With a Dredge.
- p. 72. Pilsbry, H. M., *Epiphragmophora californiensis* var *contracostae* n.

L' Echange. Revue Linnéenne XI année.

p. 85. Locard, A., Notices Conchyliologiques. XXXII. Une Coquille française méconnue. Der Autor hat in der Draparnaud'schen Sammlung in Wien das Original von *Helix fasciola* aufgefunden; es ist eine Campylaeæ aus der nächsten Verwandschaft der *Helix cornea* aber anscheinend noch nicht wiedergefunden.

Oliveira, Paulino d', Opistobranches du Portugal. In Instituto vol. XLII. No. 9. Coimbra 1895.

Es werden 45 Arten ageführt, davon 13—14 neu für den atlantischen Ocean; für die Wissenschaft neu sind *Doriopsilla pelseneeri*, *Facelina variegata* und *Phyllaplysia paulinii Mazzarelli* mss.

Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft auf der fünften Jahresversammlung zu Strassburg, den 4—6 Juni 1895. Leipzig 1895.

p. 125. Simroth, H., über den Einfluss des Lichtes auf die Färbung pelagischer Schnecken. Je länger die pelagischen Larven sich auf dem Meer herumtreiben, um so mehr neigt ihre Färbung zum Violett.

The Journal of Malacology Vol. IV No. 3. Septbr. 1895.

p. 53. Hedley, Charles, Mollusca of the Oriental Region. Der Autor verficht die Zugehörigkeit von Neuguinea zur orientalischen Region und ihre Trennung von Australien gegenüber Cooke.

p. 56. Chasler, George W., Notes on a few of the less known British Marine Mollusca. Behandelt *Adeorbis imperspicuus* Mtrs., *Lepton sykesii* Chasler, *Crenella pellucida* Jeffr., *Cerithiopsis clarkii* Fbs. et Hanl.

Proceedings of the Malacological Society of London Vol. I. No. 7.

p. 292. Bendall, W., List of the Land Mollusca of the island of New Providence, Bahamas, with an enumeration of the species recorded from the other islands.

p. 296. Leighton, T., Notes on two cases of transport and survival of Terrestrial Mollusca in the New Forest.

p. 297. Woodward, Martin F., Note on the Anatomy of the larva of the European Oyster, *Ostrea edulis* L. With. pl. 20.

p. 300. Smith, Edgar A., Report on the Land and Freshwater Shells collected by Mr. Herbert H. Smith at St. Vincent, Grenada and other neighbouring islands. With pl. 21. Von St. Vincent werden

38 Arten aufgeführt, davon neu *Stenopus insidiosus*, *Vitrea sublimpida* und *Simpulopsis vincentina*, von Grenada 33, keine neu. *Bulimulus indistinctus* wird in binominis umgetauft. Von den Grenadines werden 9 Arten aufgezählt.

- p. 323. Smith, Edgar A., on a small collection of Land-Shells from Central Africa. — *Limicolaria saturata*, *ventricosa* und *Achatina Ellioti*, alle wahrscheinlich von Abhang des Ruwenzori. Sie sind zinkographisch abgebildet.
- p. 326. Newton, R. Bullen, on some new species of British eocene Gastropoda, with Remarks on two forms already described. With pl. 22.
- p. 333. Hedley, Charles, Pterosoma Lesson claimed as a Heteropod.
- p. 336. Collinge, Walter E., Notes on some Slugs from Algiers. With pl. 23. — Neu *Amalia ater* (!) und *A. maculata*. — Das Vorkommen eines *Elisolimax*, der mit *Elisa bella* Heyn identisch sein soll, wäre sehr merkwürdig.

Kleine Mittheilungen.

Das Vaterland der seltenen Cypraea tessellata ist nach einer Mittheilung von R. Standen sicher der Archipel von Hawaii. Herr Worthington hat 1891 zwei Exemplare auf dem Strand von Katruka auf Oahu gefunden, das eine davon 40 mm. lang. (Journ. of Conch. VIII. p. 55).

Mittheilungen und Anfragen.

Die von den Herrn Dr. Gustav Freytag-Wiesbaden und Burmeister Hamburg hinterlassenen Conchyliensammlungen sind in meinen Besitz übergegangen und bin ich dadurch in der Lage eine bedeutende Auswahl in allen Molluskengattungen zu bieten.

Berlin N. W. Emdenerstrasse 4.

Hermann Rolle.

Neue Mitglieder:

Herr Paul Ehrmann, Lehrer am Taubstummen-Institut in Leipzig.
Herr Leo Siegert, stud. rer. nat., am Zoolog. Institut in Leipzig.

Eingegangene Zahlungen:

v. Möllendorf, M., Mk. 18.—; Westerlund, R., Mk. 6.—.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma **R. Hachfeld** in Potsdam bei, welcher gefl. Beachtung empfohlen wird.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M., Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Nachrichtsblatt

der Deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Achtundzwanziger Jahrgang.

Redigirt

von

Dr. W. Kobelt
in Schwanheim (Main).



FRANKFURT AM MAIN.

Verlag von MORITZ DIESTERWEG.

1896.

Druck von Peter Hartmann, Schwanheim a. M.

Inhalt.

	Seite
<i>Quindas, J. F. et O. F. von Möllendorff, Diagnoses specierum novarum ex insulis Philippinis</i>	1. 81
<i>Böttger, Dr. O., neue Fundorte tertärer Landschnecken bei Offenbach a. M.</i>	16
<i>Kobelt, Dr. W., die geographische Verbreitung der Untergattung Pomatia Leach</i>	25
<i>Kobelt, Dr. W. et H. Rolle, Diagnosen neuer Pomatiens</i>	34
<i>Böttger, Dr. O., die marinen Mollusken der Philippinen. V. Die Pyramidelliden</i>	40
<i>Brockmeyer, Dr. H., Beiträge zur Biologie unserer Süßwassermollusken</i>	57
<i>Ihering, Dr. H. von, Zur Kenntniss der südamerikanischen Voluta und ihrer Geschichte</i>	93
<i>Weiss, Dr. A., die Conchylienfauna der altpleistocänen Travertine des Weimarisch-Taubacher Kalktuffbeckens. I Nachtrag .</i>	99
<i>Kobelt, Dr. W., eine Najadee aus Turkestan</i>	103
<i>Rolle, H., ein neues Cardium von der Nordjapanischen Küste .</i>	113
<i>Kobelt, Dr. W., die Fauna der Galapagos</i>	115
<i>Böttger, Dr. O., Diagnosen neuer Clausiliens</i>	124
<i>Rolle, H., Diagnose eines neuen Buccinum</i>	128
<i>Sterki, Dr. H., zur systematischen Stellung von Sphyradium (Pupa) edentulum Drp.</i>	128
<i>Möllendorff, Dr. O. von, Landschnecken von Celebes</i>	133
<i>Baer, W., neuer Fundort für Trigonostoma holosericea Stud. .</i>	156
 Kleinere Mittheilungen	37.
<i>Necrologie</i>	37. 74.
<i>Literaturbericht</i>	19. 38. 75. 105. 129. 157.



Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft.

Achtundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Diagnoses

specierum novarum ex insulis Philippinis
auctoribus

J. F. Quadras et O. F. von Moellendorff.

Ennea (Diaphora) cristatella Mlldf.

T. perforata, subcylindrica, tenuiscula, pellucida, albo-hyalina, consertim costulata, sericina; spira sensim attenuata, apice obtuso. Anfr. 9½ convexiusculi, ad suturam sat impressam angulati, ultimus paullum distortus, antice paullum ascendens, basi compressus. crista sat distincta cinctus. Apertura verticalis, rotundato-tetragona, peristoma modice expansum, intus valde labiatum. Lamella parietalis valde elevata, longe intrans, columellaris remota, valida, dentibus 2 in formam crucis oppositis. Sinulus recedens subcircularis.

Diam. 1,6, alt. 5.75 mm.

Hab. ad vicum Odiongan insulae Tablas leg. coll. indigena.

Ennea (Diaphora) strophostoma Q. et Mlldff.

T. anguste perforata, subcylindrica, pellucida, hyalina. laevis, nitens; spira sensim attenuata apice obliquo, obtuso. Anfr. 8 fere plani, ad suturam sat impressam crenulati, ultimus breviter solutus, valde deflexus, lateraliter valde compressus, superne et inferne crenato-cristatus. Apertura subverticalis, arcta, elongate-piriformis, peristoma parum expansum, reflexiusculum. Lamella parietalis valida, valde elevata, columellaris sat valida profunda, dente longiusculo in palato opposito.

Diam. 1,25, alt. 5 mm.

Hab. prope vicum Magapig provinciae Gagayan.

Ennea (Diaphora) solenidium Mlldff.

T. anguste sed pervie perforata, subcylindrica, tenuis, pellucida, hyalino-alba, levissime striatula, nitens; spira cylindracea, superne vix attenuata, apice eroso aperta. Anfr. qui supersunt 8 convexiusculi, lente accrescentes, ultimus a quarta parte solutus, porrectus, subdeflexus, distinctius striatus, basi compressus, obtuse cristatus. Apertura fere verticalis, oblique piriformis, peristoma modice expansum, vix labiatum. Lamellae nullae.

Diam. 2,5–2,75, alt. 7–8 mm.

Ennea cumingiana Hidalgo J. de Couch. 1887 p. 41 (non Pfeiffer).

Hab. in insula Tablas leg. cl. J. Quadras et coll. indigena.

Ennea (Diaphora) telescopium Mlldff.

T. cylindrice et pervie umbilicata, fere exacte cylindrica, tenuis, pellucida, hyalino-alba, oblique costulata, sericina; spira cylindracea, sursum vix attenuata, apice decollata, aperta. Anfr. qui supersunt 13 planulati, lentissime accres-

centes, ultimus a tertia parte solutus, porrectus et deflexus. basi subcompressus, obtuse cristatus. Apertura verticalis, oblique piriformis, peristoma latiuscule expansum, albolabiatum. Lamellae nullae.

Diam. 3—3.25, alt. 11—11.5 mm.

Hab. in insula Tablas leg. coll. indigena.

Vitrinoconus omphalotropis Mlldff.

T. modice sed pervie et subcylindrice umbilicata, umbilico $\frac{2}{3}$ diametri adaequante, sat elate trochiformis, tenuis, subpellucida, consertim areuatim costulata, sericina, corneoconoidea apice obtuso. Anfr. 9 $\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura per carinam exsertam distinete marginata subcanaliculata disjuncti, lentissime accrescentes, ultimus carina acuta exserta carinatus, basi planiusculus, fere laevigatus, nitens, circa umbilicum carinula filiformi cinctus. Apertura parum obliqua, trapezoidea, peristoma rectum, obtusum.

Diam. maj. 9, min. 8, 6, alt. 6 mm.

Hab. prope vicum Libmanan provinciae Camarines insulae Luzon leg. coll. indigena.

Vitrinoconus arctissimus Q. et Mlldff.

T. latissime umbilicata, umbilico late infundibuliformi $\frac{1}{2}$ diiectri superante, conoideo-depressa, sublentiformis, superne dense plicato-striata, nitidula, brunneo-cornea; spira parum elevata, lateribus subconvexiusculis. Anfr. 9 lentissime accrescentes, convexiusculi, sutura per carinam exsertam filomarginata discreti, ultimus carina peracuta, utrinque bene exserta carinatus, basi paullo convexior, laevigatus, circa umbilicum angulatus, tum declivis. Apertura valde obliqua, securiformis, peristoma superne rectum, obtusum, medio protractum, basi et ad umbilicum subexpansum, incrassatulum.

Diam. maj. 11, min. 10.5, alt. 4.5 mm.

Hab. ad vicum San José districtus Princeps insulae Luzon.

Helicarion mollis Mlldff.

T. deppressa, tenuissima, sat distincte plicato-striatula, nitida, pellucida, virescens; spira plana. Anfr. 3½, rapide accrescentes, sutura appressa, distincte marginata disjuncti, ultimus valde dilatatus, subtus membranaceus.

Diam. maj. 18, min. 12.5, alt. 8 mm.

Animal unicolor, pallens, pes valde compressus, altus, superne acute carinatus, supra glandem caudalem bene arcuatns, cornu breve vix prominulum efficiens; chlamydis loba sinistra papillis 2, dextra 1 munita.

Hab. in insula Tablas leg. coll. indigena.

Obs. Similis *H. resilienti* Beck ex insula Cebu, sed testa majore, sutura, sculptura magis distincta, anfractu ultimo magis dilatato, animali unicolore devians.

Euplecta (Coneuplecta) pacifica Q. et Mlldff.

T. rimata, turbinata, tenuis, pellucida, superne levissime plicato-striatula, nitens, luteo-cornea: spira valde elevata, fere exacte conica. Anfr. 6½ lente accrescentes, modice convexi, ultimus ad peripheriam indistincte angulatus, basi pallidior, fere glabratus. Apertura sat excisa, peristoma simplex, acutum, margine columellari superne brevissime reflexo.

Diam. maj. 6, alt. 5.75.

Hab. prope vicum Gasiguran districtus Principe insulae Luzon.

Kaliella opaca Q. et Mlldff.

T. anguste perforata, elate trochoidea, confertim et tenuiter striatula, subopaca, fulvo-brunnea, sursum pallescens: spira valde elevata, lateribus convexiusculis, Anfr. 6²/₄ convexiusculi, sutura filiformi disjuncti, ultimus carina acuta exserta carinatus, basi lineis spiralibus microscopicis cinctus, nitidulus. Apert. fere verticalis, late elliptica, modice exisa, peristoma rectum, acutum, margine columellari subcalloso, superne breviter reflexo,

Diam. 4.25, alt. 4.5 mm.

Hab. Circum vicum Palanan provinciae Isabela de Luzon.

Kaliella chondrium Q. et Mlldff.

T. vix rimata, globosa, tenuis, subpellucida, undique confertim costulata, sericina, brunnea; spira convexo-conoidea. Anfr. 5¹/₂ convexi, pone suturam subangulati, lente accrescentes, sutura profunde impressa, filomarginata disjuncti, ultimus ad peripheriam linea elevata tenui cinctus. Apert. verticalis, subcircularis, valde excisa, peristoma rectum, acutum, margine columellari paullum dilatato, reflexo.

Diam. maj. 1.9, alt. 1.6 mm

Hab. ad vicum Palanan provinciae Isabela de Luzon.

Lamprocystis leucochondrium Mlldff.

T. vix rufata, depresso-globosa, tenuis, pellucida, hyalina, subtiliter striatula, valde nitens; spira sat elevata lateribus convexiusculis. Anfr. 5¹/₂ planiusculi, lente accrescentes, sutura submarginata disjuncti, ultimus lateraliter subcompressus, basi bene convexus. Apertura fere verticalis, late elliptica, valde excisa, peristoma rectum obtusum, margine basali et columellari callosis, columellari superne reflexiusculo.

Diam. 2.8, alt. 2 mm.

Hab. in insula Tablas leg. coll. indigena.

Hemitrichia platyzona Q. et Mlldff.

T. subconvexo-depressa, solidula, flavescentia, ad peripheriam zona lata castanea plus minusve diluta cincta; spira parum elevata apice obtuso. Anfr. 6 sat convexit, lente accrescentes, sutura sat impressa disjuncti, lineis spiralibus et radialibus confertis minute granulati — granulis fere 60 in 1 □ mm. —, pilis brevibus flavidis velutini, ultimus lateraliter applanatus, basi laevigatus, nitens. Apertura modice obliqua, compresse elliptica, valde excisa, peristoma simplex, acutum, basi et ad columellam albo-callosum, columella superne reflexiuscula.

Diam. maj. 25, alt. 14,5 apert. lat. 14, long. 10 alt. 9 mm.

, , 24. , 15 , , 14,5 , 10 , 9 mm.

Hab. in insula Tablas primus leg. J. Quadras.

Hemitrichia setosula Middff.

T. convexo-depressa, solidula, castanea, zona suturali flavescente ornata; spira modice convexa, superne plana, apice haud aut vix prominulo. Anfractus 5½ convexit, sutura modice impressa disjuncti, punctis impressis seriatim dispositis — 25 in 4 □ mm. — sculpti, in punctis setis rigidis longiusculis aureis hirsuti, ultimus ad peripheriam vix angulatus, haud applanatus, basi medio flavescens. Apertura modice obliqua elliptica, valde excisa, peristoma rectum, acutum, basi et ad columellam albo callosum, superne reflexiusculum.

Diam. maj. 22, alt. 13, apert. lat. 12, long. 9,5, alt. 8,5 mm.

Hab. in insula Tablas leg. coll. indigena.

Hemiglypta franciscanorum Q. et Middff.

T. omnino aut fere obtecte perforata, valde depressa, solida, superne per lineas spirales profunde impressas et strias transversas minute sed valde distincte et subregulariter granulata — granulis ea. 100 in 4 □ mm. —, superne subolivaceo-castanea; spira breviter conoidea, apice plano. Anfr. 6 fere plani, lente accrescentes, sutura vix impressa discreti, ultimus acutissime carinatus, supra carinam distincte impressus, basi striatulus, valde nitens, ad carinam taenia angusta fusca, tum zona lata fulvo-brunnea cinctus, circa columellam virescenti-flavidus. Apertura modice obliqua, lanceolata, sat excisa, peristoma rectum, obtusum, intus calloso-incrassatum, ad perforationem superne breviter dilatatum.

Diam. maj. 51, min. 46, alt. 22, apert. lat. 29, long. 16 alt. 13,5 mm.

Hab. ad vicum Baaō provinciae Camarines leg. R. P. Ord. Franc., ad vicum Libmanan ejusdem provinciae coll. indigena.

Inozonites stenomphalus Q. et Mlldff.

T. anguste perforata, depresso-conoidea, superne confertim costulata, nitidula, corneo-flavescens; spira pro genere sat elevata apice obtuso. Anfr. 5' convexusculi, sutura profunde impressa, per carinam exsertam distincte marginata, fere canaliculata disjuncti, lentissime accrescentes, ultimus supra peripheriam carina filiformi cinctus, infra carinam glabratus, bene convexus, nitens. Apertura fere verticalis, late elliptica, valde excisa, peristoma rectum, obtusum, margine columellari paullum sinuato.

Diam. maj. 6, min. 5.5, alt. 3.5 mm.

Hab. prope vicum Palauan provinciae Isabela de Luzon.

Satsuma palawanica Q. et Mlldff.

T. anguste sed aperte et subcylindrica umbilicata, depresso-conoidea, tenuiscula, subpellucida, curvatum plicato-striatula, corneo-brunnea; spira sat elevata, lateribus vix convexiusculis, apice obtuso. Anfr. 5' convexusculi, lente accrescentes, ultimus ad peripheriam subacute angulatus. Apertura valde obliqua, cordiformis, peristoma superne vix extus et basi magis expansum, intus albolabiatum.

Diam. maj. 7.75, min. 7, alt. 4.75 mm.

Hab. prope vicum Palauan provinciae Isabela de Luzon.

Obs. Proxima *Helici gouldi* Pfr. et cum illa haud generi Trochomorphae, sed potius *Satsumae* inserenda.

Satsuma apex Q. et Mlldff.

T. anguste et fere obtecte umbilicata, trochiformis, tenuiscula, pellucida, oblique striatula, lineis spiralibus sat distinctis et plicis rugulosis subtilibus oblique antrorsum decurrentibus sculpta, nitens, pallide flavescens; spira valde

elevata lateribus sat concavis, apice obtusulo, glabratō, fuscō. Anfr. 6 $\frac{1}{2}$, plani, sutura per carinam subexsertam filomarginata disjuncti, ultimus carina subacuta, utrinque bene exserta carinatus, antice breviter sed valde deflexus, basi paullum convexus. Apertura maxime obliqua, lanceolata, peristoma superne vix extus et basi magis expansum, basi reflexiusculum, margine columellari superne valde dilatato, umbilicū fere obtegente.

Diam. 18, alt. 14.5 mm.

var. apiculata Mlldff.:

Minor, paullo altior, anfr. 6, ultimus basi paullo magis convexus. Diam. 16, alt. 13.25 mm.

Hab. in insulis Galamianes leg. coll. indigena.

Plectotropis quadrasi Mlldff.

T. sat aperle umbilicata, subconoideo-depressa, acute carinata, tenuis, subpellucida, transverse leviter plicato-striata, lineis spiralibus maxime confertis minutissime granulosa, fulvo-cornea; spira breviter elevata, lateribus fere strictis. Anfr. 5 $\frac{1}{2}$ fere plani, sat lente accrescentes, sutura per carinam subexsertam marginata disjuncti, ultimus ad carinam bene exsertam subduplicatam setis brevibus indutus, basi convexior, ad umbilicum declivis. Apertura sat obliqua, rotundato-securiformis, peristoma? (def.).

Diam. maj. 18, min. 16, alt. 8 mm.

Hab. in cæcumine montis inter oppidum Hagan et vicum Palanan provinciae Isabela de Luzon.

Aulacospira rhombostoma Mlldff.

T. modice, sed aperle umbilicata, conoideo-depressa, tenuis, subtiliter striatula, opaca, corneo-lutea; spira modice elevata, subgradata, apice obliqua, submucronata. Anfr. 4 fere plani, obtuse angulati, ultimus superne pone angulum leviter sulcatus, antice breviter descendens, brevissime solitus. Apertura valde obliqua, rotundato-rhombea, peristoma

continuum, tenui, undique leviter expansum. Lamella parietalis valida, valde elevata, dentibus 3 in columella, basi et margine externo in formam crucis oppositis.

Diam. 3,25, alt. 1,5 mm.

Hab. in insula Tablas leg. coll. indigena.

Chloraea quadrasii Mlldff.

T. globoso-depressa, solidula, levissime plicato-striatula, lineis spiralibus microscopicis decussatula, opaca, sursum nitidula, caeruleo-smaragdina; spira semiglobosa, apice piano. Anfr. 4 convexiuseuli, ultimus tumidulus, ad peripheriam acute angulatus angulo aperturam versus evanescente, basi inflatus, subgibber, pone aperturam suberistatus, tum coarcatus et brevissime sed valde deflexus, in parte deflexa laete flavus. Apertura diagonalis, truncato-elliptica, peristoma modice expansum, reflexiusculum, superne et usque ad medium basin laete flavum, tum album. Columella oblique curvatim descendens, medio distincte dentata, superne interdum macula castanea induta.

Diam. maj. 20, alt. 12, apert. lat. 12, long. 10, alt. 6,5 mm.

Hab. ad vicum Magapig provinciae Cagayan insulae Luzon.

Cochlostyla (Callycochlias) chionodes Mlldff.

T. depresso-globosa, solida sed subpellucida, leviter striatula, lineis spiralibus confertis microscopicis decussata, pallide virescenti-flavida, rarius brunnescens, cuticula hydrophana nivea aut omnino obducta aut taeniatim ornata; spira subsemiglobosa apice purpureo. Anfr. 4½ convexi, ultimus bene rotundatus, antice parum dilatatus, circa columellanam castaneo-zonatus. Apertura sat obliqua, fere circularis, valde excisa, peristoma modice expansum, reflexiusculum, extus fuscomarginatum, margo externus medio sat protractus. Columella oblique substricte descendens, valde dilatata, superne sat excavata.

Hab. in insula Cobrador prope Romblon leg. coll. indigena.

Obs. species quasi intermedia inter. *C. valenciennesi* et *coccottomon*.

Cochlostyla (Axina) garibaldiana Dohrn et Semper,
var. *holoserica* Mldff.

Differt a typo anfractu ultimo multo magis deflexo, testa cuticula sericea, callo parietali crassiore.

Diam. maj. 75, min. 65, alt. 33, apert. lat. 48, long. 31, alt. 22 mm.

Hab. prope vicum San José districtus Principe insulae Luzon.

Cochlostyla (Orustia) melanorhapha Q. et Mldff.

T. conoideo-globosa, solidula, levissime striatula, opaca, olivacea, sursum pallescens, taeniis cuticulae hydrophanae albidis 2, ad suturam et ad peripheriam ornata; spira sat elevata, apice plano. Anfr. 5 convexiusculi, sutura appressa nigromarginata disjuncti, ultimus bene convexus, antice sat descendens, circa columellam taenia angusta atrofusca circumdatus. Apert. fere diagonalis, ovalis, sat excisa, peristoma latiuscule expansum, reflexiusculum, albolabiatum, nigromarginatum. Columella sat excavata, sat lata, oblique substriete descendens.

Diam. maj. 28, alt. 26,5 mm.

Hab. ad flumen Digollorin provinciae Isabela insulae Luzon.

Cochlostyla (Helicostyla) gilberti Q. et Mldff.

T. globosa, solida, leviter striata, lineis spiralibus impressis, sat et irregulariter distantibus sculpta, leviter oblique malleata, olivacea, sursum pallescens, taeniis cuticulae hydrophanae numerosis laceratis picta; spira semiglobosa apice fere plano. Anfr. 5 convexi, sutura subappressa marginata disjuncti, ultimus tumidus, antice longe paullatim descendens.

Apertura valde obliqua, ovalis, sat excisa, peristoma late expansum, reflexiusculum, albolabiatum, extus rubello-marginatum. Columella valde excavata, oblique striete descendens.

Diam. maj. 51,5, alt. 46, apert. lat. 32, long. 35, alt. 27 mm.

Hab. prope oppidum Baler districtus Principe insulae Luzon.

Cochlostyla (Helicobulimus) intermedia Q. et Mlldff.

T. oblongo-ovata, solida, tenuiter plicato-striatula, fusca, sursum castanea, cuticula hydrophana tenuissima subunicolore olivaceo-brunnea obducta, opaca; spira valde elevata, sensim attenuata, apice obtuso. Anfr. 6—6½ sat convexi, sutura profunduscule impressa disjuncti, lente accrescentes, ultimus ⅔ altitudinis aequans. Apertura valde obliqua, ovalis, parum excisa, peristoma parum expansum, intus late nigrolimbatum. Columella parum torta, substicta, fere recta, cum margine basali angulum parum distinctum formans.

Diam. 42, alt. 65 mm

Hab. prope vicum San José districtus Principe insulae Luzon.

var. *subcylindrica* Mlldff.

T. ovato-elongata, anfr. 6½—7, lentius accrescentes, ultimus ⅔ altitudinis aequans, apertura minor, columella paullo magis torta. Diam 40, alt. 65 mm.

Hab. prope oppidum Baler.

Hypselostoma sibuyanicum Mlldff.

T. rimata, tenuis, irregulariter turrito-conica, subtilissime striatula, opaca, pallide corneo-brunnea; spira turrito-conica apice obliqua, nitidulo. Anfr. 5 convexi, sutura valde impressa disjuncti, ultimus subplanus, infra medium obtuse carinatus, supra carinam leviter sulcatus, antice valde ascendens, brevissime solitus et porrectus. Apertura retrorsum

inclinata, rotundato-rhomboidea, peristoma simplex, tenue, valde expansum. Lamella parietalis valida, valde elevata, dentibus 3 longiusculis, subaequalibus in formam crucis oppositis.

Diam. 2,3, alt. 2 mm.

Hab. in monte altiore insulae Sibuyan leg. C. Roebelen.

Hypselostoma polyodon Middff.

T. anguste perforata, turbinata, tenuis, pellucida, subtiliter striatula, opaca, luteocornea; spira sat elevata lateribus subconcaavis, apice obliquo, obtuso. Anfr. 5 convexi, sutura profunde impressa fere canaliculata disjuncti, ultimus ad peripheriam obtuse carinatus, supra carinam impressus. subsulcatus, basi planus, antice breviter solutus, porrectus, sat ascendens, carina initio partis ascendentis subito evanescente. Apertura valde retrorsum inclinata, rotundato-rhomboidea, peristoma tenue, undique breviter expansum. Lamella parietalis validissima, fere $\frac{2}{3}$ altitudinis aperturae aequans, flexuosa, margine dextro lamella illi approximata longiuscula opposita, columellaris brevis sat valida, dentes basales 3 validiusculi.

Diam. 2,66, alt. 2 mm.

Hab. in insula Tablas leg. coll. indigena.

Prosopeas romblonicum Middff.

T. imperforata, subcylindraceo-turrita, tenuis, pellucida, subtiliter curvatim striatula, sat nitens, straminea; spira sensim attenuata apice semigloboso. Anfr. 7 planulati, ultimus infra peripheriam confuse subangulatus. Apertura modice obliqua, anguste acuminato-ovalis, peristoma simplex, aequum, margo dexter supra medium protractus, columella vix torta, calloso-incrassata.

Diam. 4,6, alt. 15.

Hab. in insula Romblon leg. coll. indigena.

Cyclotus (Platyrhaphes) lateplicatus Mlldff.

T. latissime umbilicata, discina, solidula, transverse sat distanter plicato-striata, lineis spiralibus subtilibus valde confertis decussata, luteo-cornea; spira plana apice mucronato, brevissime prominulo. Anfr. $4\frac{1}{2}$ teretes, sutura perprofunda plieulosa disjuncti, ultimus antice sat descendens. Apertura modice obliqua, circularis, peristoma rectum, obtusum. Operculum terminale, extus valde concavum, anfr. 6 gradati, oblique ruditer plicati.

Diam. maj. 14, alt. 6,5, apert. diam. 5 mm.

var. stenostoma Mlldff. Minor, apertura minore, anfr. ultimo plerumque magis descendente, spira paullo magis prominula.

Cyclotus latecostatus Hidalgo J. de Conch. 1888 p. 58 (ex parte, non Kobelt).

Hab. in insula Tablas primus leg. J. Quadras.

Arinia oculum Mlldff.

T. rimata, ovata, tenuis, pellucida, pallide-flavescens, sursum aurea; spira ventricosulo-subcylindracea, sursum conoidea, apice obliquo, glabrato. Anfr. 5 turgidi, primi 3 valde distanter costulati, costulis 25 in anfractu tertio, penultimus usque ad tertiam partem costulis paullatim evanescientibus sculptus, tum laevigatus, ultimus laevis, in quarta parte ab initio leviter constrictus, tum tumidulus. Apertura fere verticalis, circularis, peristoma valde distincte duplex, externum modice expansum, internum sat expansum, breviter porrectum, sulco ab illo separatum.

Diam. 2,4, alt. 3,5 mm.

Hab. in monte altiore insulae Sibuyan leg. C. Roebelen.

Palaina chalarostoma Mlldff.

T. sinistrorsa, anguste umbilicata, irregulariter ovato-conica, costulis tenuibus acutis, foliaceis, valde distantibus

sculpta, tenuis, pellucida, alba. Anfr. 6 convexi, primi 4 spiram late conoideam apice obliquo glabratu formantes, penultimus paullum distortus, ultimus initio constrictus, a media parte solutus, deflexus et porrectus, circa umbilicum valde compressus, suberistatus. Apertura vix obliqua, circularis, peristoma simplex, undique modice expansum.

Diam. 1,5, alt. 2,8 mm.

Hab. prope vicum Atimonan provinciae Tayabas insulae Luzon leg. coll. indigena.

Diplommatina (Sinica) balerica Q. et Mlldff.

T. vix rimata, acuminato-oblonga, costulis filiformibus sat distantibus subsflexuosis sculpta, fulvo-cornea; spira sat elongata, fere regulariter conica. Anfr. $7\frac{1}{2}$ convexi, ultimus initio modice constrictus, parum distortus, antice paullum ascendens. Apertura valde obliqua, subcircularis, peristoma duplex, externum sat late expansum, internum subporrectum, superne callo lato appressum. Lamella columellaris validiuscula, subhorizontalis, spiraliter recendens, palatalis brevis, supra columellam conspicua.

Alt. 2,5, diam. 1,25 mm.

Hab. prope oppidum Baler districtus Principe insulae Luzon.

Omphalotropis filocincta Q. et Mlldff.

T. angustissime perforata, ovato-conica, tenuis, pellucida, vix striatula, sericina, luteo-fulva; spira fere regulariter conica apice obtusulo. Anfr. 6 modice convexi, sutura valde impressa disjuncti, ultimus tumidulus, ad perforationem declivis, carina filiformi cinctus. Apertura parum obliqua, acuminato-ovalis, peristoma rectum, obtusum, columella profunde sinuata, carinulam in perforationem emittens.

Diam. 2,4, alt. 3,2 mm.

Hab. circa vicum Palanan et ad flumen Digollor in provinciae Isabela de Luzon.

Helicina (Ceratopoma) quadrasi Middff.

T. conoideo-subglobosa, tenuis, subpellucida, oblique striatula, lineis spiralibus sub lente fortiore vix conspicuis decussatula, flava; spira convexo-conoidea, apice acutulo. Anfr. $4\frac{1}{2}$ planulati, ultimus convexior, ad peripheriam carina obtusa, sed bene exserta cinctus, pone aperturam rufulus. Apertura modice obliqua, rotundato-triangularis, peristoma modice expansum, sublabiatum, intus rubellomarginatum; columella brevis, subexcavata, cum margine basali angulum parum distinctum formans. Operculum tenue, cornuum.

Diam. maj. 6, alt. 4.5 mm.

Hab. prope vienm Casiguran districtus Princeps insulae Luzon.

Helicina (Pleuropoma) sphaericum Middff.

T. conoideo-globosa, solidula, leviter striatula, lineis spiralibus elevatis deciduis distantibus cineta, opaca, pallide lutescens, sursum fulvescens aut rubella; spira convexo-conoidea. Anfr. $4\frac{1}{2}$ planulati, ultimus convexior, ad peripheriam perindistincte subangulatus. Apertura parum obliqua, rotundato-triangularis, peristoma brevissime expansum, vix labiatum.

Diam. 4.2, alt. 3.5 mm.

Hab. in insula Tablas leg. coll. indigena.

Georissa carinulata Q. et Middff.

T. ovato-conica, solidula, transverse subtiliter striatula, carinulis 4 bene exsertis cincta, rubella. Anfractus 4 bene convexi, sutura profunda subcanaliculata disjuncti, ultimus basi 2 carinulis cinctus. Apertura acuminato-ovalis, peristoma rectum, obtusum, columella lata, callosa.

Diam. 1.66, alt. 2 mm.

Hab. in montibus inter Ambabuk et Palanan provinciae Isabela de Luzon.

Neue Funde tertiärer Landschnecken bei Offenbach a. M.

Von

Dr. O. Boettger, Frankfurt a. M.

Bei seinen seit mehreren Jahren fortgesetzten Aufsammlungen der Versteinerungen in den Steinbrüchen der untermiocänen Corbiculaschichten des Bieberer Berges bei Offenbach, die durch das häufige Vorkommen von sogen. Schlangeneiern seit altersher berühmt sind, fand Herr Posteleve C. H. Bickhardt in Frankfurt a. M. als Seltenheit Steinkerne von zwei fossilen Landschnecken, die früher von dorthin noch nicht bekannt waren. Die eine Art ist:

Buliminus (Medea) turgidulus Sandberger.

1870-75 *Bulimus (Petraeus) turgidulus* Sandb., Land- u. Süssw.-Conch. der Vorwelt p. 488, Taf. 25, Fig. 21.

Diese Art, die bis jetzt nur aus den gleichaltrigen Schichten von Ober-Ingelheim in Rheinhessen bekannt war, von wo auch ich ein Jugendexemplar von fast 4 Windungen besitze, kommt wie alle bei Bieber angetroffenen Landschnecken hier nur als Steinkern vor, aber Form und Grösse lassen keinen Zweifel über die richtige Bestimmung der Art. Während das Original Sandberger's 22 mm Länge und 10 mm Breite besitzt, zeigt das mir von Bieber vorliegende Stück, dem Spitze und ein kleiner Theil der letzten Windung fehlen, $16\frac{1}{2}$ mm Länge bei $8\frac{1}{2}$ mm grösster Breite.

Dass diese Species in die engere Gruppe des im nordböhmischen Oberoligocän vorkommenden *B. complanatus* Rss. und des bis jetzt als Varietät dazu gestellten *B. complanatus* var. *major* Sbgr. von Thalfingen bei Uhn gehört, ist zweifellos; schwieriger ist nur die Frage, in welche der lebenden Untergattungen von *Buliminus* diese verschiedenen Formen zu stellen sind. Ich neige mich jetzt zu der Ansicht, dass sie nicht in die Untergattung *Petraeus* einzurordnen sind.

die niemals die spitze Kegelform der Oberschale dieser fossilen Formen besitzt, sondern der transkaukasischen Untergattung *Medea* Bttgr. mit dem Typus *B. raddei* Kobelt, die in allen Einzelheiten namentlich mit *B. complanatus* übereinstimmt und selbst in Glanz und Stärke der Schale mit ihm wetteifert. Dieser Nachweis der Verwandtschaft einer weitern untermiocänen Landschnecke mit einem jetzt ausschliesslich kaukasischen Typus, der früher schon für gewisse *Helices*, *Clausilien* und *Pupiden* erbracht werden konnte, ist von besonderem Werthe für die Frage nach der Abstammung unserer heutigen paläarktischen Molluskenfauna.

Die zweite Schnecke, die ich hier behandeln will und die leider ebenfalls nur als Steinkern vorliegt, hat das Gepräge einer bauchigen *Oleacina* mit etwas mukronat aufgesetzter Spitze, unterscheidet sich aber von allen bis jetzt aus dem Mainzer Becken bekannt gewordenen Landschneckenformen durch eine ganz eigenthümliche Spindelbildung. Sie ist neu und ich will sie dem eifrigen Finder zu Ehren nennen

Spiraxis ? *bickhardti* n. sp.

Char. Nur im Steinkern ohne Skulptur erhalten. — Das Gehäuse ist verlängert eisförmig, nach oben mit etwas mukronat aufgesetzter Spitze, nach unten mit ziemlich parallelen Seiten. Das Gewinde ist kegelförmig mit ganz leicht konkaven Seiten, das Gehäuseende stark zugespitzt. Von den 7 ziemlich flachen Umgängen, die durch angedrückte Nähte geschieden werden, ist der zweite etwas höher als der dritte; sie nehmen anfangs langsam an Höhe zu, aber die vorletzte, namentlich nach links hin stärker gewölbte Windung ist doppelt so hoch wie die drittletzte, und auch die letzte ist nur wenig höher als der vorletzte Umgang, indem sie etwa den dritten Theil der Gesamtschalenhöhe erreicht. Die Naht der letzten Windung senkt sich vor der Mündung allmählich, aber sehr stark nach abwärts; die

Schlusswindung selbst ist auf der Mitte stark abgeflacht, unten etwas sackartig ausgebaucht und vor der stark komprimierten und eingezogenen Mündung mit einem unregelmässigen, deutlich etwas erhobenen Ringwulst umgeben. Die Mündung ist sehr schmal birnförmig, oben lang und spitz ausgezogen und an den vorletzten Umgang angedrückt, unten etwas zurücktretend und winkelig-abgerundet. In der Nabelgegend ist eine mässig weite, nicht allzu tief eindringende Perforation zu erkennen, von der eine sehr scharf eingeschnittene spirale, nach innen tauförmige, aber nach aussen nicht leistensförmig überhöhte Furche ausgeht, die bis an die Basis der Mündung in S-förmiger Krümmung nach abwärts zieht. Das Nabelfeld ist gleichmässig und stark von oben nach unten gewölbt. Die Mündungsräder waren einfach und scharf. — Länge der Schale etwa 19, grösste Breite $7\frac{1}{2}$ mm; Mündungshöhe 7, Mündungsbreite 3 mm.

Nach eingehender Vergleichung ist es mir nicht möglich, diese eigenthümliche Form etwa zu den Gattungen *Oleacina* oder *Glandina* zu stellen, mit denen der äussere Habitus sie recht gut vergleichen liesse; ich vermuthe vielmehr in der Schnecke, die diese Steinkerne hinterlassen hat, eine Gattung, die ähnlich wie die heutigen *Spiraxis*-Arten eine scharfe, S-förmig gekrümmte Spindel besass, muss aber dahingestellt sein lassen, ob die Schale in Wirklichkeit perforiert war, wie es der Steinkern zeigt, oder ob diese Durchbohrung nur davon herröhrt, dass eine massive Spindel aus der im übrigen glatten und glänzenden Nabelgegend des Kernes herausgewittert ist. So ähnlich die Krümmung der Spindel und die ganze untere Mundpartie auch der einer *Oleacina* etwa aus der Gruppe *Boltenia* ist, so leicht unterscheiden sich die vorliegenden Steinkerne doch von dieser Gattung durch das Auftreten eines Nabelfeldes, das das Vorhandensein eines distinkten linken Mündungsbeleges

zur Voraussetzung zu haben scheint. Mit *Streptostyla* existiert sicher keine nähere Verwandtschaft.

Von dieser Art sind bis jetzt mehrere übereinstimmende Stücke in den untermiocänen Corbiculakalken des Bieberer Berges bei Offenbach a. M. gesammelt worden, von denen mir Herr C. H. Bickhardt zwei der besten für meine Privatsammlung überlassen hat.

Literaturbericht.

Dall, W. H., Report on Mollusca and Brachiopoda dredged in deep water, chiefly near the Hawaiian Islands with illustrations of hitherto unfigured species from Nordwest-America. — Scientific Results of the Explorations by the U.S. Fish Commission Steamer Albatross, No. XXXIV. In Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. XVII. p. 675—733, with pl. 23—32.

Der Albatross hat Ende 1891 eine Reihe von Drakezügen zwischen Californien und Hawaii ausgeführt, welche eine ganz neue und reiche Molluskenfauna ans Licht gebracht haben. Die neuen Arten sind *Scaphander* (*Bucconia*) *alatus* p. 676 t. 27 fig. 2; — *Sabatia pustulosa* p. 677 t. 26 fig. 10; — *Drillia microscelida* p. 677; — *Pleurotomella gypsina* p. 678 t. 30 fig. 10; — *Pl. hawaiiensis* p. 679 t. — *Pl. ? climacella* p. 679 t. 31 fig. 14; — *Spergo* (n. subg. *Mangiliae*) *glandiniformis* p. 680 t. 24 fig. 1—2; — *Sp. daphnelloides* p. 683 t. 31 fig. 11; — *Lunatia sandwichensis* p. 684 t. 26 fig. 8; — *Solariella reticulina* p. 684 t. 26 fig. 9; — *Emarginula hawaiiensis* p. 685 t. 26 fig. 7; — *Dentalium phaneum* p. 686 t. 26 fig. 1; — *Dent. complexum* p. 686 t. 26 fig. 3; — *Eucoria pacifica* p. 688 t. 23 fig. 2.4 t. 24 fig. 4.5.7.8, die Gattung nicht mit *Verticordia* verwandt, sondern eine eigene gut verschiedene Familie bildend; — *Halicardia* n. gen. für *Mytilimeria flexuosa* Verr. et Smith, abg. t. 23 fig. 1.3.5.6, t. 24 fig. 3; — *Lyonsiella alaskensis* p. 703 t. 25 fig. 2. Sitka, bei 3200 m. Tiefe; — *Pectunculus arcudentiens* p. 705 t. 26 fig. 6. Ferner werden von Alaska als neu beschrieben

oder zum erstemmal abgebildet: *Buccinum strigillatum* t. 27 fig. 9; — *B. aleuticum* n. p. 706 t. 27 fig. 7; — *B. ovulum* n. p. 707 t. 30 fig. 6; — *B. (Sulcosimus n.) taphrium* t. 29 fig. 6; — *Chrysodomus insularis* p. 707 t. 29 fig. 3; — *Chr. periscelidus* t. 27 fig. 6; — *Chr. phoeniceus* p. 708 t. 29 fig. 1; — *Chr. ithrius* p. 708 t. 39 fig. 4; — *Sipho hypolispus* t. 27 fig. 1; — *S. acosmius* t. 27 fig. 3; — *S. halibreetus* t. 29 fig. 9; — *Ancistrolepis (n. subg. Chrysodomus) eucosmius* t. 29 fig. 7; — *Anc. magnus* n. p. 709 t. 29 fig. 5; — *Strombella melonis* t. 28 fig. 2-3; — *Str. fragilis* t. 28 fig. 4; — *Str. middendorfii* t. 28 fig. 1; — *Beringius frielei* n. p. 711 t. 27 fig. 8; — *B. aleuticus* n. p. 711 t. 29 fig. 2; — *Molinia frielei* t. 29 fig. 8; — *Boreotrophon disparilis* t. 27 fig. 4; — *B. scitulus* t. 27 fig. 5; — *Puncturella major* t. 26 fig. 4; — *Solemya johnsoni* t. 25 fig. 1; — *Cryptodon bisectus* t. 26 fig. 2.5. — *Calyptogena pacifica* t. 25 fig. 4.5; — *Limopsis vaginatus* t. 25 fig. 3.6.7. Unter den Brachiopoden ist die neue Gattung *Frieleia*, Typus *Fr. halli* n. p. 714 t. 24 fig. 6.9.13. zunächst mit *Hemithyris* verwandt: — *Hemithyris beecheri* n. p. 717 t. 31 fig. 1-4; — *H. craneana* n. p. 717 t. 31 fig. 5-6; — *Liothyrida clarkeana* n. p. 718 t. 31 fig. 9-10; — *Eudesia (Macandrevia) americana* p. 721 t. 32 fig. 1.4.7. (= *Eud. fontaineana* Dall olim, nec d'Orb.); — (*M.*) *craniella* n. p. 722 t. 30 fig. 1; — (*M.*) *diamantinae* n. p. 723 t. 30 fig. 5 t. 32 fig. 3-6; — *Terebratalia obsoleta* t. 30 fig. 7.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1895. Pt. I.

- p. 45. Harris, Gilbert D., New and otherwise interesting Tertiary Mollusca. (With. pl. 1-9).
- p. 206. Pilsbry H. A., and E. G. Vanatta, new Species of the Genus *Cerion* (Bolt.) == *Strophia* autor. — Meistens auf Grund der Untersuchung der inneren Zähne und Falten werden neu aufgestellt: *G. (Paracerion) tridentatum*, *basistriatum*, (*Magnardia*) *felis*, *johsoni*, *columna*, *reginae*, mit subsp. *percostatum*, *comes swiftii*, *eucosmum*, *brevispira*; — *maritimum* var. *sublaevigatum*; — *abacoensis*, *ineanoides*, *magnardi*, *yumaensis*.

Report of the New York State Museum 1894. Vol. 47.

- p. 51. Merrill, Frederick J. H., Exhibit of New York Land- and Fresh-water Shells (exhibited at the Worlds Columbian Exposition).
- p. 77. Catalogue of the Marginellidae, Olividae, Columbellidae, Conidae, Terebridae, Cancellariidae, Strombidae, Cypraeidae, Ovulidae.

Cassididae, and Dolidae, contained in the collections of the New York State Museum. — Exclusive of the Mazatlan Collection.
Journal de Conchyliologie 1894. No. 4 (ausgegeben 15. Dezember, 1895).

- p. 333. Grosse, H., Faune malacologique terrestre et fluviatile de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances (suite et fin).
p. 474. Brot, Dr. A. Description de deux Melanies nouvelles. (*Mel. crawfordi* t. 9 fig. 5, Transvaal; — *Mel. leefei* t. 9 fig. 6, Tonga).
p. 476. Suter, Henri Corrections et additions à la Liste synonymique et bibliographique des Mollusques terrestres et fluviatiles de la Nouvelle-Zélande.

The Journal of Malacology. Vol. IV. No. 4.

- p. 69. Cooke, A. H., *Purpura coronata* Lam in the West-Indies. (Continued).
p. 71. Sykes, E. Ruthven, Notes on the terrestrial Molluscan Fauna of New Caledonia.
p. 74. Webb, W. M., the British Species of *Testacella*.

Babor, J. F., über das Centralnervensystem von Dreissensia polymorpha Pallas. In *Sitz. Ber. kgl. Gesellschaften* 1895. XLVIII.

Der Autor hat bei *Dreissensia* ein fünftes Ganglienpaar gefunden, welches er für das Parietalganglion anspricht; demnach sind das Zentralnervensystem der Lamellibranchiaten und das der Gastropoden nach demselben Plane gebaut.

- The Journal of Conchology*. Vol. VIII. No. 5. January 1896.
p. 129. Melvill, J. G. and Robert Standen, Notes on a collection of Shells from Lifu and Uvea (Schluss).

- p. 136. Newton, R. Bullen, on the occurrence of *Alectryonia angulata* in S. E. Africa: with a Notice of previous researches of the cretaceous conchology of South Africa.

- p. 152. Farrer, Capt. J. W., Notes on the Land- and Freshwater Mollusca of the English Lake District.

- p. 162. Byne, L. St. George, the Marine Mollusca of Teignmouth Bay. Additions.

- p. 176. Chaster, George W., on the variation of *Stylifer turtoni* Brod.
Cull, R. Elsworth, a study of the Unionidae of Arkansas, with incidental reference to their distribution in the Mississippi Valley. In *Transact. Acad. St. Louis*. Vol. VI. No. 18. Vol. VII. No. 1--3.

Es werden 59 Arten besprochen und 22 davon abgebildet: keine n. sp.

Taylor, Geo. W., Preliminary Catalogue of the Marine Mollusks of the Pacific Coast of Canada, with notes on their distribution. In Transact. Roy. Soc. Canada (2) vol. I. p. 17—100.

Es werden 284 Arten aufgeführt und ihre Verbreitung erörtert. keine n. sp. Ausserdem werden die Binnenconchylien von Britisch Columbia aufgeführt, 67 sp.

- Bulletins of American Paleontology. By G. W. Harris, Ithaca.*
No. 1. G. D. Synonymy of Leas and Conrads Claiborne Fossils, and descriptions of new species. 52 pp. 4 pl.
No. 2. Aldrich, T. H., New or little known Tertiary Mollusca from Alabama and Texas. 30 pp., 5 pl.
No. 3. Harris, G. D., Neocene Mollusca of Texas, or Fossils from the Deep Well at Galveston. 32 pp., 4 pl.

Fulton, Hugh, a List of the species of Amphidromus Albers, with Critical Notes and Descriptions of some hitherto undescribed Species and Varieties. In Ann. Mag. N. H. (6) XVII. January 1896.

Der Autor erkannt 64 Arten an. Als neu werden beschrieben und abgebildet: alticola Bttg. mss. von Java p. 70 t. 6 fig. 5; — enganoensis p. 71 t. 6 fig. 1, Engano Insel, West Sumatra; — robustus p. 73 = Winteri var. Martens Ostasien t. 20 fig. 4, Java; = Winteri var. inauris Böttger p. 74 t. 6 fig. 12, Java; — poecilochroa Bttg. mss. p. 77 t. 6 fig. 7, Sumbawa; — hamatus p. 84 t. 5 fig. 13, Labuan; — placidus p. 84 t. 5 fig. 11, Ostborneo; — angulatus p. 84 t. 6 fig. 3, Saravak; — pictus p. 85 t. 5 fig. 8, Kina Balu; — versicolor p. 86, Balabac; — dubius p. 86 t. 6 fig. 1.; Balabac; — Everetti p. 87 = quadrasi var. Smith Ann. Mag. XL. 1893 t. 18 fig. 12; Palawan; — smithi p. 88 t. 7 fig. 12, Annam; — roseolabiatus p. 89 t. 6 fig. 8, Siam.

Hedley, Charles, Considerations on the surviving refugees in Austral-Lands of Ancient Antarctic Life. In Proc. Roy. Soc. N. S. Wales 1895.

Der Autor diskutiert die Frage der alten Landverbindung zwischen Australien und Südamerika und erörtert namentlich die Verbreitung mancher mariner Gattungen; er nimmt an, dass die Landverbindung sich Neuseeland näherte, ohne es zu berühren.

Hedley, Charles, Dendrotrochus Pilsbry assigned to Trochomorpha.

In Records Australian Museum, Vol. II. No. 6.

Die Untersuchung von *Helix helicinoides* Hombr. ergibt dass diese Gruppe nichts mit Papuina zu thun hat, sondern eine baumbewohnende Sektion von Trochomorpha bildet.

Protz, Albert, Bericht über meine vom 11. Juni bis zum 5. Juli 1894 ausgeführte zoologische Forschungsreise im Kreise Schwetz. In Schriften naturf. Gesellsch. Danzig. N. F. IX. I. 1895.

Neu für Westpreussen sind zehn Arten, darunter *Conulus pratensis* und *Vertigo mouliniana, alpestris* und *ronnebyensis*.

Godwin-Austen, H. H., List and Distribution of the Land Mollusca of the Andaman and Nicobar Islands, with description of supposed new species. In Proc. Zool. Soc. London 1895. p. 438.

Es werden zusammen 88 Arten aufgeführt, davon sind nur 8 beiden Gruppen gemeinsam: 7 gehen bis Sumatra und Java, nur 5 bis Burma. Als neu beschrieben werden *Sitala homfreyi*, Süd-andaman, p. 448 fig. A; — *Planospira wimberleyi*, Nicobaren, p. 449; — *Pupisoma constricta*, Andamanen, p. 450 fig. B; — *Vaginulus giganteus*, Andamanen, p. 451; — *Acmella mellita* Andamanen, p. 453 fig. C; — *Cyathopoma natalicum* p. 453 fig. D, Camorta; — *Diplomatina nicobarica* var. *batticalvensis* fig. 454; — *Omphalotropis brevis*, Camorta, p. 455.

The Nautilus. Vol. IX.

- p. 85. Henderson John B., Notes of a Conchologist in Japan.
- p. 87. Sargent, H. E., Annotated List of the Mollusca found in the vicinity of Clearwater, Wright Cty., Minnesota.
- p. 90. Pilsbry, H. A., Description of a new australian Chiton (*Ch. bednali*).
- p. 91. Sterki, Dr. V., some notes on the genital organs of Unionidae, with reference to systematics.
- p. 97. Roper, Edward W., Notes on the Washington Sphaeria and Pisidia, with Descriptions of new Species. (*Pis. randolphi* n.).
- p. 100. Henderson, John B., Notes on collecting shells in China.
- p. 101. Randolph, P. B., Shells of Seattle, King O., Washinton.
- p. 102. White, Mrs. G. W., Collecting in Southern California.
- p. 108. Pilsbry, H. E., on the Names of certain subgenera of *Helicostyla*. *Prochilus* und *Eudoxus* sind bei anderen Thierklassen lange

vorher angewandt worden, es werden dafür Dolichostyla und Opallistyla vorgeschlagen.

Martini Chemnitz, Systematisches Conchylien-Cabinet. Neue Auflage.

Lfg. 416. Kobelt, Columbella. Neu *Columbella marquesana* var. *taeniolata* t. 26 fig. 14.

Lfg. 417. Kobelt, Helix. Zum erstenmal abgebildet: *Helix anceps* Str. mss. t. 223 fig. 1. 2; — *minigerodi* Str. t. 223 fig. 3. 4; — *nephela* Strub. t. 223 fig. 5. 6; — *ephamilla* Smith t. 223 fig. 7. 8; — *rollsiana* Smith t. 224 fig. 1—4; — *trobriandensis* Hedl. t. 224 fig. 5—8; — *musgravei* Smith t. 224 fig. 13. 14; — *Nanina strubelli* t. 224 fig. 11. 12.

Lfg. 418. Kobelt, Cerithium: — Neu *Cerithidea mindorensis* t. 33 fig. 9; — *quadrasi* t. 33 fig. 3. 4; — *möllendorfii* t. 34 fig. 1. 2.

Lfg. 419. Kobelt, Bullidae. Keine n. sp.

Neues Mitglied:

Herr C. H. Bickhardt, in Frankfurt a. M.

Eingegangene Zahlungen:

Seibert, E., Mk. 6.—; Goldfuss, H., Mk. 6.—; Fürst Salm, A., Mk. 6.—; Riemenschneider, N., Mk. 6.—; Clessin, O., Mk. 6.—; Schmidt, W., Mk. 6.—; v. Rosen, A., Mk. 6.—; Arndt, B., Mk. 6.—; Tschapeck, W., Mk. 6.—; Löbbecke, D., Mk. 6.—; Pässler, B., Mk. 6.—; Martens, B., Mk. 6.—; v. Dalla-Torre, J., Mk. 6.—; Strubell, F., Mk. 6.—; Borcherding, V., Mk. 6.—; Bickhardt, F., Mk. 6.—; Naturforschende Gesellschaft in Görlitz, Mk. 6.—; Wehner, W., Mk. 6.—; Krause, L., Mk. 6.—.

Paetel's Conchylien-Catalog

letzte Ausgabe (von v. Maltzan), gebraucht, wird gegen seltene exotische Landconchylien einzutauschen gesucht.

Dr. O. Staudinger & A. Bang Haas,
Blasewitz-Dresden.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma **R. Hachfeld** in Potsdam bei, welcher gefl. Beachtung empfohlen wird.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M., Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft.

Achtundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn** in Berlin zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Die geographische Verbreitung der Untergattung *Pomatia* Leach.

Von
Dr. W. Kobelt.*)

Die Sippschaft der Weinbergschnecken ist eine von denen, welche ganz ausschliesslich auf das paläaretische Gebiet beschränkt sind. *Pfeiffer* rechnet zwar noch im Nomenclator zwei australische Arten (*Helix coriaria* Pfr. von Neusüdwales und *Helix monacha* Pfr.) zu *Pomatia* im engeren Sinne und eine ganze Anzahl ähnlicher Arten (*subgranosa* le *Gouillou*, *jervensis* Quoy, *Gilberti* Pfr., *grayi* Pfr.,

*) Abgedruckt aus Kobelt und Rolle, Beiträge zur Molluskenfauna des Orients, (Iconogr. N. F. Suppl. I.)

mulgoae Cox, *subtilis* Pfr., *bednalli* Braz., *scotti* Cox, *greenhilli* Cox, sämmtlich aus Australien), zu *Cryptomphalus*, aber alle diese haben mit *Pomatia* im engeren, wie im weiteren Sinne nichts zu thun, sondern gehören zu der für Ostasien und Australien characteristischen Gruppe *Hadra*. Weiter zieht er hierher noch *Helix subplicata* Sow. von der kleinen öden Insel Baxo bei Porto Santo und hierin folgt ihm auch Tryon (*Manual, Second Series vol. IV.* p. 236). In der That steht diese Art auch vollkommen isolirt in der Fauna der makaronesischen Inseln und kann, wenn man sie irgendwo anschliessen will, nur mit *Helix aspersa* in Beziehung gebracht werden; aber Form und Sculptur des Apex weichen doch sehr erheblich auch von dieser ab, und solange nicht der anatomische Beweis für die Zusammengehörigkeit erbracht worden ist, bleibt die Vereinigung mit *Pomatia* immerhin fraglich. Es kommt dazu, dass *Helix subplicata* eine im Aussterben begriffene Art, ihr Areal auf eine kleine, öde Felseninsel beschränkt ist, die lebenden Exemplare sind im Vergleich zu den viel häufigeren fossilen verkümmert, dünnchalig, und haben nie den starken Verbindungswulst auf der Mündungswand wie diese; es handelt sich möglicher Weise nur um den letzten Ueberrest eines Formenkreises, welcher auf Madeira beschränkt war, wobei ja durchaus nicht ausgeschlossen ist, dass er Beziehungen zu den Vorfahren von *Helix aspersa* gehabt hat.

Endlich wird noch eine centralamerikanische Art nicht nur von Pfeiffer, sondern auch noch neuerdings von Crosse und Fischer zu *Cryptomphalus* gerechnet, *Helix humboldtiana* Val. aus Mexiko. Dieselbe gleicht allerdings in der Gestalt einerseits der vorgenannten *Hel. subplicata*, andererseits der *Helix Mazzullii* Jan und ähnlichen Varietäten der *aspersa*, aber ihre Sculptur ist genau so gekörnelt, wie bei *Helix (Odontura) eximia* Pfr., und sie kann unbedenklich dieser Gruppe zugerechnet werden.

Die Untergattung *Pomatia* ist also eine specifisch paläoarctische, auch wenn wir die beiden etwas abweichenden Gruppen *Cantareus Risso* und *Cryptomphalus Moq. Tand.* dazu rechnen, die sowohl in der Gehäuseform, als in der geographischen Verbreitungsweise sehr erheblich abweichen. Besonders der letzteren Verschiedenheit möchte ich ein erheblicheres Gewicht beilegen, als gewöhnlich geschieht. Sowohl *Helix aperta* wie *Helix aspersa* gehen erheblich weiter nach Westen, als die echten *Pomatia*. Die erstere ist allerdings meines Wissens auf die Olivenregion des Mittelmeeres beschränkt und geht meistens noch nicht einmal bis an deren äusserste Grenze, sondern hält sich mehr in der Nähe des Meeres; selbst in Algerien findet sie sich nur in den angebauten Gebieten, dem Tell, und steigt nicht auf die Hochplateaux hinauf; sie fehlt aber im äussersten Westen jenseits der alten Küstenlinie Oran-Cartagena*) und anscheinend in ganz Spanien, und tritt auch im Orient, in Syrien und Palästina zurück; doch kommt sie auf Cypern noch vor. Ihre Verbreitung stammt also wohl aus der Zeit, wo das Mittelmeer noch erheblich kleiner war und Land sowohl das syrisch-egyptische wie das andalusische Meer erfüllte. Ob *Helix tristis Shattl.* von Corsica wirklich zu *Cantareus* zu stellen, wäre genauer zu prüfen; dass der Schein gerade bei den corsicanischen Arten arg trügen kann, hat die anatomische Untersuchung der sogen. Campyläen von dort (*raspailii* und Genossen) erwiesen.

Eine erheblich weitere Verbreitung hat die Untergattung *Cryptomphalus*, und zwar aus zwei Gründen. Einmal ist *Helix aspersa* viel weniger an die Küstenebenen gebunden, wie *Helix aperta*, und dann ist sie von allen bekannten

*) Der äusserste westliche Punkt an der algerischen Küste, von welchem ich *Helix aperta* besitze, ist Mostaganem, einige Stunden östlich von Oran. Aus Spanien kennt sie *Hidalgo* nicht, auch ich habe sie nicht dort gefunden.

Helices neben der tropischen *Helix similaris* Fer. diejenige Art, welche am leichtesten verschleppt und in fremden Ländern angesiedelt werden kann. Sie geht bis in die Städte und Häfen hinein und wird gar häufig an der Unterseite von Fässern festsitzend gefunden; daneben ist sie als ein bei Franzosen und Spaniern gleich beliebtes Nahrungsmittel von diesen in alle von ihnen angelegten Kolonien mitgenommen worden und gedeiht in den meisten derselben ausgezeichnet. So finden wir sie nicht nur auf den Azoren, Canaren und Madeira, sondern auch in Nord- und Südamerika, auf Haiti und in Cayenne, in Neuseeland und Australien, am Cap, auf den Maskarenen und im nencaledonischen Archipel*), wo ihre Ansiedelung erst in der neuesten Zeit erfolgt ist. So scheint aber auch ohne Menschenhilfe in der Ausbreitung begriffen und rückt überall der Grenze des Weinstocks nach, ohne sie am Rhein bis jetzt erreicht zu haben. Zwar in der Umgebung von Bremen und Hamburg werden lebende Exemplare immer wieder gefunden, aber fortzupflanzen scheint sie sich dort so wenig wie sonstwo in Deutschland; die Schweiz berührt sie bei Genf, wo ich sie im vorigen Jahre zahlreich sah, wohin sie aber nach einer Mittheilung von *Brot* erst neuerdings vorgedrungen ist. Dagegen bewohnt sie jetzt fast ganz Frankreich, wo sie fossil meines Wissens noch nicht gefunden worden ist, und dringt immer weiter gegen die belgische Grenze vor; sie ist längs der Meeresküste bis zur Normandie und auf die normannischen Inseln gelangt und findet sich in England nicht nur an der Südküste, sondern nördlich bis zum Firth

*) Man vergleiche die Erzählungen von *Layard* (in *Kew, Dispersal of Shells p. 104*), welcher mehrfach Gelegenheit hatte, die Einführung zu beobachten oder doch bis auf die Quelle zurückzuverfolgen. Französische Kriegsschiffe nehmen lebende Escargots häufig als Proviant mit.

of Murray und auch in Irland, überall, wo noch Seeklima herrscht. In Spanien und Nordafrika findet sie sich überall, am ganzen Mittelmeer scheint sie in der Olivenregion und noch ein Stück darüber hinaus nirgends zu fehlen; ob sie tiefer nach Kleinasien hineingeht, weiss ich nicht, die Krim, Südrussland, Transkaukasien und Mesopotamien erreicht sie nicht. Bei Trapezunt aber kommt sie mit dem Oelbaum zusammen vor; auch bei Sinope hat sie *Retowski* gefunden, sie wird also an der Nordküste Kleinasiens so wenig fehlen, wie an der Südküste. In Italien geht sie anscheinend kaum über den Kamm des Apennin hinaus, vom Südabhang der Alpen kennen sie weder *de Betta*, noch *Gredler* noch *Adami* wohl aber folgt sie der Küstenlinie der Adria durch Venetien, charakteristischer Weise bis Padua an die älteste Pomündung landein gehend, bis nach Triest. Auch in Dalmatien findet sie sich überall; wie weit sie aber landein geht und wo auf der Balkanhalbinsel ihre Nordgrenze liegt, lässt sich heute noch nicht feststellen. In Sicilien findet sie sich auch in Tertiärschichten. Eigenthümlich ist, dass diese Art, welche sonst überall unter den verschiedenartigsten Verhältnissen streng an Form und Zeichnung festhält und kaum zur Abtrennung von Varietäten Anlass gegeben hat, im östlichen Algerien, etwa von Isser oriental ab, in der tollsten Weise variiert und eine ganze Reihe merkwürdiger Localformen ausprägt, eine Erscheinung, die schon bei Palermo mit *Helix Mazzullii Jan* beginnt.

Die ächten *Pomatia* haben ihr Entwicklungszentrum unzweifelhaft in Kleinasien und auf der südlichen Balkanhalbinsel; auch Syrien und die Mesopotamien umgebenden Bergketten können zu ihrer eigentlichen Heimath gerechnet werden. Wo die Ostgrenze des Gebietes liegt, lässt sich im Norden und im Süden genau bestimmen, nicht aber in den persischen Gebirgen. Jedenfalls haben Turkestan und Afghanistan keine Vertreter von *Pomatia* mehr.

Nach Westen hin verhält sich die Verbreitung der Untergattung sehr eigenthümlich. Wie die Finger einer Hand — ich weiss keinen besseren Vergleich — strecken sich aus der gemeinsamen Heimath die Verbreitungsgebiete einzelner Arten in dieser Richtung aus und das Merkwürdigste dabei ist, dass diese Fortsätze weder auf den Archipel, noch auf die Bergketten Rücksicht nehmen, und dass es von jedem Formenkreise nur eine Art ist, die sich weiter nach Westen erstreckt.

Nördlich der Alpen haben wir nur *Helix pomatia* L., die gemeine Weinbergschnecke, welche sich durch das Alpengebiet und an beiden Seiten desselben bis zur gascognischen Senke, dem ehemaligen Meerbusen von Narbonne erstreckt. Dort bricht sie plötzlich ab. Spanien hat sie nie erreicht; um Bordeaux ist sie seit einigen Decennien angesiedelt, jetzt aber sehr häufig; aber sie scheint auch freiwillig immer weiter vorzudringen und von den nordöstlichen Randbergen in das Garonnethal hinabzusteigen. Im Löss der Plateaux um Lyon fehlt sie. Ihr Vorkommen in Norditalien deutet darauf hin, dass sie älter als die Erhebung der Alpen ist, dass sie wahrscheinlich in dem Gebiet lebte, das die Alpen heute einnehmen, dann durch die Eiszeit verdrängt wurde und nach deren Beendigung von Süden, Westen? und Südosten her wieder in das Gebirge einwanderte. Nach Norden scheint sie vor der Eiszeit noch wenig verbreitet gewesen zu sein; sie findet sich fossil noch nicht im Löss, auch nicht in den Mombacher Sanden, sondern erst in den Tuffen von Cannstadt und Burgtonna, sowie in den Thüringischen Tuffen. In Süddeutschland und Mittelfrankreich ist sie also seit dem Diluvium einheimisch, nach Norddeutschland und weiter ist sie erst im Mittelalter als gesuchte Fastenspeise gekommen und findet sich nur in der Umgebung von Klöstern und alten Edelsitzen. In England*) ist sie jetzt so weit

*) Cfr. Kew, *dispersal of Shells* p. 235 ff., wo diese Frage sehr eingehend erörtert wird.

verbreitet, dass die meisten englischen Conchologen ihre Einwanderung auch schon in die Diluvialperiode setzen; Irland hat sie indess nicht erreicht. Nach Osten hin reicht sie bis an die russischen Steppen, bei Kiew kommt sie noch vor; aus der Moldau führt sie *Clessin* nicht mehr an, noch weniger aus der Dobrudscha; in der Krim fehlt sie sicher. In Siebenbürgen und dem Banat ist sie noch häufig; über die Verbreitung südlich der Donau wissen wir nichts, in Südserbien kommt sie noch vor; südlich der Balkankette finde ich nur das isolirte Vorkommen bei Volo in Thessalien, das *Westerlund* und *Blanc* anführen. Aus Kleinasien sind mir Verwandte von *Helix pomatia* nicht bekannt geworden; eine direkte Verbindung mit dem Gebiete der eng verwandten *Helix buchii* in Transkaukasien scheint nicht zu existiren. Auch nördlich vom schwarzen Meer schieben sich die Gebiete von *Helix obtusalis Zgl.*, welche das schwarze Meer von der Dobrudscha bis zum Kaukasus umsäumt, und der siebenbürgisch-moldauischen *Helix lutescens Zgl.* dazwischen, letztere schon in Siebenbürgen sie local ausschliesend.

Südlich an das Verbreitungsgebiet der *Helix pomatia* schliessen sich die zweier anderer Arten, *Helix lucorum Müll.* und *Helix cincta Müll.*, welche aber nicht einander parallel laufen, sondern sich in eigenthümlicher Weise kreuzen. *Helix cincta* findet sich schon am Südabhang der Alpen, mit *Helix pomatia* gemischt, aber nur auf eine schmale Zone beschränkt; aus Toskana kennt sie *Gentiluomo* nur von einem einzigen Fundort Tredozio, und dort ist sie vermutlich zu Speisezwecken angesiedelt. Dagegen haben wir sie im östereichischen Litorale und am Südabhang des Karstes, in Dalamatien, auf der Balkanhalbinsel bis nach Griechenland hinunter, im Archipel, im vorderen und südlischen Kleinasien bis nach Nordsyrien und auf Cypern. Die grosse Achse des Verbreitungsgebietes ist also von Südost nach Nordwest gerichtet. *Helix lucorum* dagegen

tritt in Mesopotamien und Transkaukasien auf und erfüllt das nördliche Kleinasien, ohne die Südküste zu erreichen; *Rolle* fand sie in einer sehr hübschen Form bei Elmaly auf dem Hochplateau im inneren Lycien. Dann findet sie sich namentlich im Gebiet des bythinischen Olimp und von da bis Constantinopel, in Rumelien und dem mittlerem Albanien, ohne Epirus, Griechenland und die Inseln der Archipels zu berühren. Auch in Dalmatien und auf den ionischen Inseln fehlt sie, aber in Italien weist sie wieder zahlreiche Fundorte auf: an der Ostküste von Ancona und Bologna bis zum Mte. Gargano und den Hügeln um Bari, aber westlich vom Kamni des Apennin nur local, vielleicht angesiedelt. So auf Elba und am Südrand der Alpen. Aus Syrien sind mir sichere Fundorte nicht bekannt: ein Stück der *Bourguignat'schen* Sammlung, in mancher Hinsicht abweichend und von *Mabille* *Helix salisi* genannt, soll von Tarablus in Syrien stammen: ein flaches, weitgenabeltes Exemplar, als *Helix jubae Bgt.* bezeichnet, hat *Juba de l'Hotellerie* auf dem Markt von Alexandrien, wohin die verschiedenartigsten Schnecken aus Syrien und Kleinasien gebracht werden, gekauft.

Die grosse Achse des Verbreitungsgebietes von *Helix lucorum* ist somit fast rein westlich gerichtet und kreuzt sich in Albanien mit der des Gebietes von *Helix cincta*. Sehr eigenthümlich schiebt sich dazwischen der Verbreitungsbezirk von *Helix ligata Müll.*, des äussersten Ausläufers der weiss oder doch ganz hell gelippten Pomatiens, die in Cilicien und Syrien ihre stärkste Entwicklung erreichen. Er nimmt mit zahlreichen mehr oder minder selbständigen gewordenen Rassen ganz Mittelitalien ein, besonders die Gebiete westlich von Apennin, und reicht bis zum mittleren Calabrien hinunter, ohne nach Sicilien überzugreifen. Dann tritt er mit *Helix secerunda Rossm.* und *praestans Blanc* wieder in Dalmatien, auf den nördlichen ionischen Inseln und in Akarnanien auf, geht aber nicht über den Welebit hinüber. Weiterhin scheint

eine Lücke zu folgen. erst von Kalymnos kenne ich mit *Helix valentini m.* wieder einen Vertreter dieser Gruppe; was weiter östlich vorkommt, *Helix solida* und Verwandte und die scharf spiral gefurchten Formen aus der Sippschaft von *Helix pachya*, steht nicht unerheblich von der ächten *ligata* ab.

Den südlichsten Ausläufer der Pomatiens bilden die ganz dunkelmäuligen Arten aus der Verwandtschaft der *Helix melanostoma Drp.*, vielleicht ein selbständiger gewordener Zweig der *cincta*-Gruppe, der in Nordafrika eine neue Heimat gefunden hat: *Helix melanostoma* findet sich dort hauptsächlich im Osten und greift nur in der Provinz Constantine bei Lambessa auf das Hochplateau hinauf; weiter westlich findet sie sich nur im bebauten Küstengebiete und reicht dort bis nach St. Denis-au-Sig und Mostaganem kurz vor Oran. Nach Malta ist sie möglicherweise von Tunis aus übergeschleppt; allerdings stellt Caruana das Vorkommen von *Helix Giuliae* überhaupt in Abrede, aber ich erinnere mich, in Syrakus Exemplare gesehen zu haben, die von Malta stammen sollten. Eingeschleppt, wenn auch vielleicht schon in sehr früher Zeit, ist sie jedenfalls in der Provence, wo sie in einer kleinen, etwas verkümmerten Form vorkommt. Den Zusammenhang mit *cincta* hält die Formengruppe der *Helix ambigua* aufrecht, welche für Corfu und die übrigen ionischen Inseln und das südliche Litoral der Adria charakteristisch ist, aber nicht tiefer in die Balkanhalbinsel eindringt; auf Creta wird sie durch die reizende *Helix pronuba* vertreten, in Egypten durch *Helix nucula Parreyss*, aber weder aus dem Archipel noch aus den Küstenländern des vorderen Asiens ist mir bisher eine Form bekannt geworden, welche zur Gruppe der *Helix melanostoma* zu rechnen wäre. Ehe man aber aus dieser sehr eigenthümlichen lückenhaften Verbreitung Schlüsse zieht, muss man bedenken, dass *Helix melanostoma* hauptsächlich in den Getreideebenen vorkommt und darum sehr leicht verschleppt werden kann.

Für die eigentlichen Stammländer der Gruppe lässt sich, so lange wir die Gebirge Kleinasiens noch kaum kennen, eine Uebersicht der Verbreitung noch nicht geben. Wir haben im Norden den Formenkreis der *Helix obtusalis Zgl.* am schwarzen Meer und am Fuss des Kaukasus, dann in Cilicien und Nordsyrien die weisslippige *Helix solida* und die scharf spiralsculptirte Sippschaft der *Helix pachya*, am Bosporus und auf der südlichen Balkanhalbinsel zahlreiche kleinere Formen, welche sich um die griechische *Helix figulina* gruppiren, dann wieder im südlichen Palästina die zu *aperta* hinüberführende Formenreihe der *Helix cavata, prasinata, engaddensis*, endlich noch zahlreiche mehr oder minder isolirt stehende Arten, über die sich erst entscheiden lassen wird, wenn mehr Material vorliegt und die Gruppe auch einmal anatomisch untersucht ist. Rolle's Ausbeute gibt eine Ahnung von den Schätzen, welche dort noch der Entdeckung harren. Ich habe ausserdem noch die Pomatién der Bourguinat'schen Sammlung in Genf studiren können, aber zu einer erschöpfenden Behandlung reicht das Material bei weitem noch nicht aus.

Diagnosen neuer Pomatién.

Von

Dr. W. Kobelt und H. Rolle.

1. *Pomatia bituminis* n.

T. quoad genus parva, ovato-conica, exumbilicata, solida et ponderosa, ruditer striata, striisque spiralibus parum conspicuis sculpta, griseo-alba, supra fasciis tribus confluentibus livido-fuscis ornata, fasciis 4 et 5 vix conspicuis. Spira conoidea apice parvo, laevi, vix obtusato; sutura impressa, infra irregularis. Anfractus $5\frac{1}{2}$ convexi, ultimus vix inflatus, antice profunde descendens vel deflexus. Aertura obliqua, parva, ovato-circularis, lunata, intus alba;

peristoma incrassatum, saturate castaneum, marginibus callo castaneo junctis; externo recto; basali patulo, castaneo labiato; columella callosa, oblique ascendentem subtuberculata, longitudinaliter oblique plicata, supra leviter dilatata, appressa.

Alt. 29, diam. 30–30,5 mm.

Tschangankiö in Cilicien, in der Umgebung der Bohrlöcher der deutschen Petroleumbohrgesellschaft.

2. *Pomatia issica* n.

T. medioris, exumbilicata, globosa, solida, ponderosa, ruditer striato-costulata, alba, castaneo-fusco fasciata, fasciis 3 superis in anfractu ultimo confluentibus, quarta lata, dilata, quinta infima vix conspicua. Spira convexo-conoidea, apice parvo, laevi; sutura subirregulariter impressa, distinete albomarginata. Anfractus $5\frac{1}{2}$ convexit, ultimus inflatus, antice profunde descendens. Apertura obliqua, irregulariter suborbicularis, valde lunata, faucibus coeruleo-albidis, fasciis vix translucentibus; peristoma incrassatum, saturate atrocastaneum, marginibus callo atro junctis, externo et basali exacte rotundatis, basali subpatulo, atrolabiato, columella subverticali, callosa, indistincte subdentata, medio longitudinaliter plicata, dein impressa, supra dilatata, appressa.

Alt. 35, diam. 37 mm.

Alexandrette.

3. *Pomatia pericalla* Bourguignat miss.

T. magna omnino exumbilicata, subglobosa, solida, ruditer striato-costellata, in parte supera anfractum irregulariter spiraliter sulcata, griseo-albida, fusco quinquefasciata, fasciis tribus superis confluentibus, omnibus plus minusve interruptis. Spira conoidea, apice laevi, lutescente vel albido; sutura distincta, aperturam versus irregulariter crenulata. Anfractus 5 convexit, regulariter sed celeriter accrescentes, ultimus inflatus, antice profunde deflexo-descendens. Apertura magna obliqua, lunato-circularis, faucibus fuscescentibus,

fasciis vix translucentibus; peristoma album, vel pallide lutescenti-album, marginibus vix callo tenuissimo junctis, externo simpli, tenui, basali expanso, vix tenuissime labiato, columellari arcuato, tenuiter calloso, supra dilatato, appreso, interdum obsolete plicato.

Alt. et diam. 58—60 mm.

Giosna in Cilicien.

4. *Pomatia antiochiensis* n.

T. magna omnino exumbilicata, globoso-conoidea vel subglobosa, solida, ruditer striata, sculptura spirali fere nulla, hic illie malleato-cicatricosa, albida vel lutescens, fusco interrupte quinquefasciata, fasciis superis tribus confluentibus, in anfractu ultimo interdum castaneo fasciata, fasciis zonulam angustam periphericam et subsuturalem tantum relinquentibus. Spira convexo-conoidea, apice medioeri vix obtusato; sutura profunda, subimpressa, inter anfractus inferos subirregularis. Anfractus 5 convexit, regulariter crescentes, ultimus antice leniter sed sat profunde descendens. Apertura obliqua, lunato-subcircularis, intus albida, fasciis translucentibus in speciminibus vividius coloratis livido-coeruleis, latis; peristoma rufofuscum, vel castaneum, leviter incrassatum, rectum, marginibus callo distincto rufo-fusco vel castaneo junctis, externo recto, basali patulo, distincte labiato, columellari strictiusculo, oblique ascende, subcylindrico, superne dilatato et adnato.

Alt. 54, d. 52 mm. — Spec. alt. altit. et lat. 55 mm.

Um Antiochia.

5. *Pomatia epidaphne* n.

T. mediocris, exumbilicata, globosa vel globoso-conica, solida, ponderosa, undique ruditer costellato-striata, inter costellas praesertim in parte supera anfractuum spiraliter lineata, hic illie malleata et cicatricosa; albida, fusco quinquefasciata, fasciis 3 superis confluentibus, inferis interruptis.

parum distinctis. Spira convexo-conoidea, apice laevi, mediocri, vix obtusato. Anfractus 5 convexiusculi, regulariter crescentes, ultimus vix inflatus, antice sat celeriter descendens. Aertura obliqua, ovato-rotundata, lunata, intus albida, fasciis coeruleo-translucentibus; peristoma fuscescens, marginibus callo fuso junctis, externo et basali pone limbum fuscum distinete albolabiatis patulis, columella callosa, stricta, plus minusve distinete longitudinaliter plicata, supra parum dilatata, appressa.

Alt. 42, diam. 44 mm. Spec. alt. alt. 37, diam. 39 mm.

Antiochia.

— 1 —

Necrologie.

Am 28. Decbr. starb in Udine (Friaul) der Professor G. A. Pirona, geboren am 20. Novbr. 1822. Er erlag einem Schlaganfall, als er sich gerade zur Samstagsitzung des R. Istituto Veneto nach Venedig begeben wollte.

— 2 —

Kleinere Mittheilungen.

Im Nautilus Nr. 8 führt E. J. Post einen weiteren Fall an, in welchem ein Strandläufer durch eine Muschel gefangen wurde. Es handelt sich um eine vom Sturm ans Ufer geworfene *Pinna muricata* in Florida, welche den Schnabel des Vogels so fest gefasst hatte, dass die Muschelränder in demselben einschnitten.

Fürst Albert von Monaco hat in den Sommermonaten 1895 eine vierte Erforschungsfahrt nach den Azoren gemacht, welche nach einer vorläufigen Mittheilung in den Comptes rendus noch bedeutend bessere Resultate ergeben hat, als eine der früheren. Namentlich die Fischerei mit den in tiefes Wasser gelegten und erst nach mehreren Tagen gehobenen, geköderten Reussen hat reiche Beute an neuen Krebsen u. dgl. geliefert. Ein neues Oberflächennetz, das auch bei rascherer Fahrt gebraucht werden kann und im Mittelmeer gute Resultate erzielte, versagte im atlantischen Oceān völlig, da mit sinkender Sonne die Meeresthätle sich mit so unendlichen Massen von *Pelagia noctiluca* bedeckte, dass das Netz sofort abriss. Es wurden auch mehrere neue Mollusken erbeutet und namentlich auch Cephalopoden, über die demnächst berichtet werden wird. Mit Hilfe biseayischer Walfischfänger

wurde auch ein Kaschelot (?) erbeutet, wobei allerdings die „Princesse Alice“ beinahe zu Schaden gekommen wäre. In dem Mageninhalt, welchen das Thier im Todeskampfe auswürgte, fanden sich mehrere gut erhaltene Cephalopoden, dabei ein neuer Histiotethis und eine völlig neue, mit weichen Schuppen bedeckte Form, welche vorläufig als *Lepidotethis grimaldii* Joub. bezeichnet wird, und demnächst beschrieben werden soll.

Das Pester Museum hat nach einer Mittheilung unseres Mitgliedes Brancsik (Jahresh. Trencsin 1895—96 p. 224) von seinem leider dem Fieber erlegenen Sammler Fennichel aus der Umgebung der Astrolabe — Bai eine ganze Anzahl typischer *Helix profuga* A. Schm. erhalten, welche auf irgend eine Weise dorthin eingeschleppt worden sein müssen.

Mit Beziehung auf die von Herrn Strubell im vorigen Jahrgang beschriebenen beiden *Succinea* von Neuguinea und besonders auf die Bemerkung, dass diess die ersten Vertreter der Familie aus Neu-Guinea seien, macht Herr Charles Hedley die Redaktion darauf aufmerksam, dass er bereits 1891 in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI p. 691, 100, pl. 12 f. 32 und pl. 42 f. 34, 37 eine *Succinea* aus Neuguinea beschrieben hat, die wahrscheinlich mit einer der Strubell'schen Arten zusammenfällt und dann selbstverständlich die Priorität hat.

Die Société royale belge de Geographie plant eine Forschungsreise nach dem Südpolargebiet, deren Leitung dem belgischen Marineoffizier Ad. de Gerlache anvertraut werden soll. Sie ist auf zwei Jahre berechnet, der zwischenliegende Winter ist zu Forschungen im Stillen Ozean bestimmt. Wir erinnern bei dieser Gelegenheit daran, dass bis jetzt noch keine innerhalb des südlichen Polarkreises gesammelte Molluskenart bekannt ist; auch die südlichsten Fundorte des Challenger liegen nördlich davon.

Literaturbericht.

Journal de Conchyliologie vol. 43. 1895 No. 1. (ersch. 15 Februar 1896).

- p. 5. Vayssiére, A., Etude zoologique de l'*Ovula* (*Neosimnia*) *spelta* L., et du *Conus mediterraneus*, Brug.
- p. 19. Dautzenberg, P., Revision des espèces actuellement connues du Genre *Geotrochotella*.
- p. 26. Drouët, H., Unionidae nouveaux ou peu connus.

- p. 40. Mayer-Eymar, C., Description de Coquilles fossiles des terrains tertiaires inférieurs (suite).

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia
1895 II.

- p. 214. Baldwin D. D., Descriptions of new species of Achatinellidae from the Hawaiian Islands. — Die Untersuchung der Zungenbewaffnung hat merkwürdiger Weise zwei ganz verschiedene Typen ergeben. Die erdbewohnenden Gruppen Amastra und Laminella, haben einen Kiefer: die Radula ist länglich, nicht breit, Zähne viereckig in fast geraden Reihen, die mittleren klein, schmal, mitunter schwach dreispitzig, die seitlichen grösser, zweispitzig, die randständigen zwei- oder vielspitzig. Die baumbewohnenden Sektionen Achatinellastrum, Bulimella, Apex, Partulina, Newcombia, Eburnella, Perdicella haben keinen Kiefer, eine breite, langrunde Radula, zahlreiche in gebrochene Reihen geordnete Zähne, die mittleren lang, schlank, oft verkümmert, die seitlichen und Randzähne nach demselben Typus gebaut, mit schmäler Basis und breiter Platte mit 5—7, die am Rande mit 2—4 Zähnchen. — Die beiden erdbewohnenden Sektionen sind also als Gattungen anzuerkennen. — Als neu beschrieben werden: Ach. multizonata p. 215 t. 10 fig. 1, 2, Oahu; Ach. ernestiana p. 217 t. 10 fig. 5, 6, Oahu; Bul. luteostoma p. 217 t. 10 fig. 7, 8, Oahu; Bul. lyonsiana p. 218 t. 10 fig. 9—11, Oahu; Bul. lymaniana p. 219 t. 10 fig. 12, 13, Oahu; Apex vespertina p. 219 t. 10 fig. 15, Oahu; Ap. cookei p. 220 t. 10 fig. 15, Oahu; Partulina dolei p. 221 t. 10 fig. 17, 18, Maui; Part. nivea p. 222 t. 10 fig. 19, Maui; Part. mucida p. 222 t. 10 fig. 23; Part. anceyana p. 223 t. 10 fig. 16; Part. horneri p. 224 t. 10 fig. 20—22; Part. hawaiiensis p. 225 t. 10 fig. 24—26; Part. theodorei p. 226 t. 10 fig. 27; Newcombia canaliculata p. 226 t. 10 fig. 28, 29; Laminella helvina p. 227 t. 11 fig. 30; Lam. depicta p. 228 t. 11 fig. 33—35; Amastra pullata p. 228 t. 11 fig. 31, 32; Am. umbrosa p. 229 t. 11 fig. 36, 37, alle von Molokai; Am. rubicunda p. 229 t. 11 fig. 38; Am. undata p. 230 t. 11 fig. 39; Am. badia p. 230 t. 11 fig. 40; Am. pellucida p. 231 t. 11 fig. 41, 42; Am. breviata p. 231 t. 11 fig. 45, 46; Am. tenuispira p. 232 t. 11 fig. 51; — Am. nana p. 232 t. 11 fig. 48, 49; Am. antiqua p. 233 t. 11 fig. 47; Am. vetusta p. 233 t. 11 fig. 50; sämmtlich von Oahu; Am.

im älteren Tertiär ganz unmerkliche Uebergänge — folge ich hier noch den landläufigen systematischen Anschauungen, da ich es trotz guter Kenntniss des Materials und der einschlägigen Litteratur nicht wage, in diesen schwierigen Fragen schon jetzt radikal vorzugehen.

Die bis jetzt von den Philippinen bekannten Pyramidelliden lassen sich in 10 Gattungen unterbringen:

Gen. I. *Pyramidella* Lmk.

Subgen. 1. *Pyramidella* s. str.

1. *Pyramidella ventricosa* Guér.

= *Obeliscus scitulus* A. Ad. sequ. Tryon.

Inseln Masbate (A. Adams, coll. Quadras No. 577) und Cebú (coll. Quadras, O. Koch No. 99). — Fidji-Inseln, Vanikoro (Cuming), Singapore (Tryon).

2. *Pyramidella cincta* Rve.

Philippinen (Reeve, A. Adams), Cebú (coll. Quadras No. 582).

3. *Pyramidella fastigium* (A. Ad.)

Loay auf Bohol (A. Adams). — Mir unbekannt.

4. *Pyramidella balteata* (A. Ad.)

Manila auf Luzon (coll. Quadras No. 25); Cagayan, Prov. Misamis auf Mindanao (A. Adams).

Bei Manila ist diese Art häufig in Stücken von alt. $5\frac{1}{2}$, diam. max. $2\frac{3}{8}$ mm. Der Gaumen trägt 3 Zahnfalten.

5. *Pyramidella pusilla* (A. Ad.)

Manila auf Luzon (coll. Quadras No. 25a) und Insel Lugbon bei Romblon (No. 31); Catanuan auf Luzon (A. Adams). — O-shima und Takano-shima (A. Adams und Dunker), Rothes Meer (Jickeli).

Häufig in Stücken von alt. $4\frac{3}{4}$, diam. max. $1\frac{3}{4}$ mm. Der Gaumen trägt 4 Zahnfalten.

Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft.

Achtundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwambheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Die marinen Mollusken der Philippinen (V)

nach den Sammlungen des Herrn José Florencio Quadras
in Manila.

Von

Prof. Dr. O. Boettger in Frankfurt (Main).

(Fortsetzung zu Nachr.-Blatt d. d. Mal. Ges. 1893 p. 97—115, 153—167
und 185—193 und 1895 pag. 1—20 und 41—63).

V. Die Pyramidelliden.

Trotzdem dass mir die Trennung der Pyramidelliden von den Turbonilliden künstlich erscheint — die Gattung *Mumiola* A. Ad. z. B. könnte mit dem nämlichen Rechte zu den Turbonilliden gestellt werden, und zwischen den Gattungen *Syrnola* A. Ad. und *Turbonilla* Riso finden sich

Gen. II. *Otopiclura* P. Fischer.

1. *Otopiclura auris cati* (Chemn.)

Moron, Prov. Bataan, und Ternate, Prov. Cavite, Luzon (coll. Quadras), Bohol (O. Koch No. 32). Cebú (v. Moellendorff 1890 und coll. Quadras 1893). — Vanikoro (A. Adams). Mauritius (Tryon).

Die Stücke von Cebú zeigen alt. 21, diam. max. $10\frac{1}{2}$ mm.

2. *Otopiclura nodicincta* (A. Ad.)

Philippinen (A. Adams). — Retillan auf Guajan, Marianen (coll. Quadras No. 2963).

3. *Otopiclura mitralis* (A. Ad.)

St. Estevan in Nord-Ilocos auf Luzon (A. Adams), Insel Rita bei Paragua und Salay, Prov. Cagayan de Misamis, Mindanao (coll. Quadras). — Tahiti, Mauritius, Seychellen (Möbius) und Rothes Meer (Jickeli).

Der vorletzte Umgang besitzt 17—18 Vertikalfalten.

var. *variegata* A. Ad.

Insel Masbate (A. Adams). — Okinawa auf den mittleren Liukiu-Inseln (coll. Boettger), Réunion (Deshayes).

Stücke von den Liukiu-Inseln zeigen auf dem vorletzten Umgang 27 Vertikalfalten.

4. *Otopiclura glans* (Rve.)

Cebú (coll. Quadras No. 621), in Stücken von alt. 9—13 mm. — Ternate (coll. Br. Strubell), Okinawa auf den mittleren Liukiu-Inseln (coll. Boettger).

5. *Otopiclura nitida* (A. Ad.)

Philippinen (A. Adams). — Retillan auf Guajan, Marianen (coll. Quadras No. 2964), Upolu (Graeffe), Tahiti (Schmeltz), Fidji-Inseln (Tryon), Rothes Meer (Jickeli).

Gen. III. *Syrnola* A. Adams.

Für die 8 mir von den Philippinen vorliegenden Arten

dieser Gattung mag folgendes Schema gelten:

- I. Schale nadelförmig oder cylindrisch.
 - a. Gelbbraun, 10 Umgänge, Spindelfalte sehr schwach, 4-5 mm 6. *S. manilensis* Bttgr.
 - b. Gelblich, Spindelfalte deutlich,
8-9 mm 1. *S. attenuata* (A. Ad.)
 - c. Weiss, 13-14 Umgänge,
5-6 mm 7. *S. quadras* Bttgr.
- II. Schale thurmförmig oder kegelförmig; Gewinde mit geraden Seiten.
 - a. Ganz glatt, rothbraun, Umgänge mehr als doppelt so breit wie hoch, Aussenlippe innen mit zahlreichen erhöhten Spiralfalten, 9-12 mm . 2. *S. acalis* (A. Ad.)
 - b. Obertheil der Windungen mit Spirallinien, letzter Umgang mit Kante, 5-6 mm . . 4. *S. striatula* (A. Ad.)
 - c. Ganz glatt, letzter Umgang ohne Kante, von $\frac{1}{3}$ Gesamthöhe, 3 mm 5. *S. heptagyra* Bttgr.
- III. Schale thurmförmig oder verlängert-spindelförmig; Gewinde mit mehr oder weniger konvexen Seiten.
 - a. Falte obsolet, letzter Umgang fast $\frac{2}{3}$ der Gesamthöhe, 3 mm 8. *S. incerta* Bttgr.
 - b. Falte kräftig, schief, letzter Umgang mit Nabelkiel, von $\frac{2}{7}$ Gesamthöhe, 3 $\frac{3}{4}$ mm 9. *S. suberistata* Bttgr.
 1. *Syrnola attenuata* (A. Ad.)

Bacjauan bei Badajoz auf Tablas (coll. Quadras No. 27),
Backayon auf Bohol (A. Adams), Insel Cayuanan bei Mindanao (coll. Quadras No. 102).

Das Stück von Tablas misst alt. $8\frac{1}{2}$, diam. max. $1\frac{7}{8}$ mm. Die Spindellamelle steht gerade in der Mitte der Spindel, zieht ziemlich wagrecht ins Innere und ist bei schiefem Einblick in die Mündung sehr deutlich bemerkbar.

2. *Syrnola acalis* (A. Ad.)

= *Obeliscus acalis* A. Ad., = *Pyramidella (Syrnola) adamsi* Tryon.

Loay auf Bohol (A. Adams) und Gebú (O. Koch No. 549). — Rothes Meer (M'Andrew).

3. *Syrnola aciculata* (A. Ad.)

Cagayan, Prov. Misamis, Mindanao (A. Adams). — Tanabe (A. Adams), Upolu (Graeffe), Fidji-Inseln (Garrett), Rothes Meer (M'Andrew). — Mir unbekannt.

4. *Syrnola striatula* (A. Ad.)

Manila auf Luzon (v. Moellendorff 1890). — Fidji-Inseln (A. Adams).

Das einzelne von Manila vorliegende Stück hat perforierte, mässig feste Schale; die Umgänge würde ich abgeflacht nennen; die Basis ist ohne deutliche Spiralstreifung, die Mündung unten zugespitzt. — Alt. $5\frac{1}{2}$, diam. max. $2\frac{1}{8}$ mm.

5. *Syrnola heptagrya* n. sp.

Ghar. T. perforato-rimata, turrita, tenera, albida, pellicula, nitens; spira elata lateribus strictis; apex appressus, perversus, obtusus. Anfr. 7 leviter convexiusculi, sutura parum impressa, late marginata disjuncti, sat lente accrescentes, fere laeves, ultimus peripheria rotundatus, aequo longus ac latus, $\frac{1}{3}$ altitudinis testae aequans. Apert. verticalis, basi recedens, anguste ovalis, superne magis quam inferne angulata; perist. simplex acutum, marginibus callo distincto junctis, dextro superne strictiusculi descendente, media parte leviter arcuatim protracto, columnellari concavo, extorsum

reflexiusculo, superne lamella valida transversa instructo, faucibus ut videtur non liratis.

Alt. $2\frac{3}{4}$, diam. max. 1 mm; alt. apert. $\frac{7}{8}$, lat. apert. $\frac{5}{8}$ mm.

Manila auf Luzon (coll. Quadras No. 1), nur ein Stück.

Die Art gehört zur engeren Gruppe der *S. striatula* (A. Ad.), sie ist aber weit kleiner und es fehlen ihr die Spirallinien und die Kielung des letzten Umganges. Auch die japanischen Arten *S. solidula* und *hyalina* Dkr. haben in der Gehäuseform Aehnlichkeit.

6. *Syrnola manilensis* n. sp.

Char. T. fere subrimata, cylindrato-subulata, solidula, aut lutea aut sucinacia unicolor, nitida: spira elongata lateribus convexiusculis; apex obtusulus perversus. Anfr. 10 planati, sutura distincta, late marginata disjuncti, vix striatuli et sub lente forti temuissime spiraliter lineati, ultimus $\frac{1}{5}$ peripheria rotundatus, basi distinctius spiraliter lineatus, altitudinis testae aequans. Apert. verticalis anguste ovata, superne acuta, intus non lirata: perist. simplex acutum, marginibus callo levi junctis, dextro strictiusculo, basali valde curvato, columellari sigmoideo, extus incrassatulo et reflexiusculo, intus lamellam spiralem perobliquam obsoletissimam ferente.

Alt. $4\frac{3}{4}$, diam. max. 1 mm; alt. apert. 1, lat. apert. $\frac{5}{8}$ mm.

Manila auf Luzon (v. Möll. 1890, coll. Quadras No. 363) und Mariveles auf Luzon (coll. Quadras No. 363), an beiden Orten zahlreich.

Erinnert in der Form an die japanische *S. modica* (A. Ad.), entfernt sich aber von den typischen Arten der Gattung durch die nur schwach entwickelte Spindellamelle.

7. *Syrnola quadrasi* n. sp.

Char. T. fere subrimata, cylindrato-subulata, solidula, albida, pellucida, nitida; spira gracillima lateribus ad apicem

planati, deorsum ad suturam subimbricati, sutura distincte impressa, late marginata disjuncti, lentissime accrescentes, levissime convexiusculi; apex acutus perversus. Anfr. 13—14 vix striatuli, ultimus brevis, basi rotundato-subangulatus, $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{6}$ altitudinis testae aequans. Apert. parum obliqua late ovata, intus non lirata; perist. simplex acutum, marginibus callo levi junctis, dextro superne compresso, basali late curvato, columellari signoideo, incrassato, extrorsum reflexiusculo, cum basi testae angulum formante distinctum, media parte lamella perobliqua, distincta, hebeti instrueto.

Alt. $5\frac{1}{4}$ — $5\frac{1}{2}$, diam. max. $1 - 1\frac{1}{4}$ mm; alt. apert. 1, lat. apert. $\frac{3}{4}$ mm.

Manila auf Luzon (coll. Quadras No. 364), von Herrn J. F. Quadras zahlreich gefunden.

Sehr ähnlich der mitteleocaenen *S. spira* (Desh.) von Grignon, aber noch schlanker, ähnlich auch gewissen subimbricaten und subscalaren mitteloligocaenen Arten des Mainzer Beckens aus der Verwandtschaft der *S. nysti* (d'Orb.), aber mit keiner derselben ganz übereinstimmend. Von lebenden Arten möchte ich *S. smithi* Tryon aus Westafrika als besonders ähnlich bezeichnen, doch besitzt unsere Art 2—3 Umgänge mehr.

8. *Syrnola incerta* n. sp.

Char. T. subrimata, oblongo-turrita, solida, alba, sat pellucida, nitens; spira modice elata lateribus convexiusculis; apex perversus appressus, obtusulus. Anfr. 7 leviter convexiusculi, sutura distincte impressa, late marginata disjuncti, sat rapide accrescentes, laeves vel potius perparum distincte spiraliter lineati, ultimus peripheria rotundatus, fere longior quam latus, fere $\frac{2}{5}$ altitudinis testae aequans. Apert. verticalis anguste ovalis, superne magis quam inferne angulata; perist. simplex acutum, marginibus callo distincto junctis, dextro superne strictiuscule descendente, media parte vix

protracto, basali subeffuso et columellari longo subverticali incrassatis et leviter reflexis, lamella columellari spiraliter oblique ascende, obsoletissima, faucibus ut videtur non liratis.

Alt. $3\frac{1}{4}$, diam. max. $1\frac{1}{4}$ mm; alt. apert. 1, lat. apert. $\frac{5}{8}$ mm.

Manila auf Luzon (coll. Quadras No. 1a), zwei etwas abgerollte Stücke.

In der Gestalt ähnlich der *S. heptagyra* Bttgr., aber mit fast obsoleter Falte und deutlich konvexen Gewinde-seiten. Die Art passt wegen der obsoleten Falte nicht besonders gut zu *Syrnola* und hat mehr das Aussehen einer *Liostomia* Sars, doch hat sie immer noch erheblich mehr Umgänge als die Arten dieser nordischen Gruppe.

9. *Syrnola subcristata* n. sp.

Char. T. rimata, elongato-fusiformis, tenuiseula, pellucida, nitida, vitrea; spira turrita lateribus convexiusculis; apex perversus acutus, compressus. Anfr. $8\frac{1}{2}$ planati, sutura distincte impressa, submarginata disjuncti, sat rapide accrescentes, striatuli, ultimus attenuatus, circa rimam cristula funiformi cinctus, basin versus microscopice spiraliter lineatus et striis profundioribus, praecipue in crista distinctis ornatus, $\frac{2}{5}$ altitudinis testae aequans. Apert. subverticalis, anguste ovalis, biangulata, basi subeffusa, intus non lirata; perist. simplex, acutum, marginibus disjunctis, dextro leviter curvato, cum columellari stricto, incrassato, reflexiusculo anguloni aculum formante; columella superne lamella valida, obliqua, spiraliter intrante munita.

Alt. $3\frac{3}{4}$, diam. max. 1 mm; alt. apert. $1\frac{1}{8}$, lat. apert. $\frac{1}{2}$ mm.

Insel Bisucay, Galanianes (coll. Quadras No. 105), von Herrn J. F. Quadras nur in einem Stück erbeutet.

In der äusseren Form erinnert diese Art an *Odostomia*

exilis Pse.; der tauförmige, um den Nabelritz geschlungene Basalkiel aber entfernt sie von dieser und von allen bekannten Arten der Gattung *Syrnola*.

Gen. IV. *Oscilla* A. Adams.

1. *Oscilla annulata* (A. Ad.)

Gagayan, Prov. Misamis auf Mindanao (A. Adams). Manila auf Luzon (coll. Quadras No. 13), zwei abgerollte Stücke. — Japan, Singapore (Tryon).

Die Stücke von Manila messen alt. 4, diam. max. $1\frac{1}{4}$ mm. Die Spindellamelle ist sehr dick und kräftig; der Gaumen trägt 4 scharfe, gleichweit von einander abstehende Spiralfalten.

2 *Oscilla ligata* Angas.

Angas, Proc. Zool. Soc. London 1877 pag. 173.

Insel Catanduanes (coll. Quadras No. 67), ein Stück. — Botany Bay, Australien (Angas).

Das vorliegende Stück misst alt. $2\frac{1}{4}$, diam. max. 1 mm und hat je drei gerundete Spiralreifen auf dem drittletzten und vorletzten, acht auf dem letzten Umgang, der nach unten hin sich etwas verschmälernt und der leicht ausgesogenen Mündung unten eine ähnliche Zuspitzung verleiht wie oben. Die tiefliegende Spindellamelle ist quer und etwas nach aufwärts gerichtet; die Zahl der Gaumenfalten entspricht der Anzahl der äusseren Spiralreifen.

—
In die nämliche Gattung gehört nach Originalstücken trotz der undeutlichen oder fehlenden Spiralreifen auf der Schalenbasis *Oscilla tasmanica* (Ten.-Woods) aus Tasmanien (Tryon, Man. Conch. Bd. 8, Taf. 79, Fig. 78), die bisher unter *Odostomia* aufgeführt worden ist, aber sowohl die kräftige Spindellamelle, als auch die charakteristischen Gaumenfalten besitzt.

Gen. V. *Elusa* A. Adams.

1. *Elusa subulata* (A. Ad.)

Sorsogon, Prov. Albay auf Luzon (A. Adams). — Japan (A. Adams), Rothes Meer (M'Andrew). — Mir unbekannt.

2. *Elusa gracilis* (A. Ad.)

Loay auf Bohol (A. Adams), Manila auf Luzon (coll. Quadras No. 362), mehrere Stücke. — Japan (A. Adams), Rothes Meer (Jickeli).

Die Stücke von Manila messen alt. $6\frac{1}{2}$, diam. max. $1\frac{1}{4}$ mm. Die Radialskulptur ist nicht ganz gleichmässig ausgebildet; sie wechselt sowohl nach den Umgängen wie nach den Individuen. Gewöhnlich sind die ersten 6—7 Windungen und meist auch der letzte glatt, ungefaltet: manchmal fehlen die Falten aber auch den mittleren Umgängen oder sie sind daselbst nur schwach angedeutet. Die eigen-thümliche Färbung der Art ist immer deutlich; dagegen vermisste ich die Gaumenfaltung („outer lip lirate within“), die für die Gattung *Elusa* charakteristisch sein soll. Vielleicht stellt sie sich erst bei ganz vollständig erwachsenen oder überbildeten Stücken ein?

3. *Elusa metula* (A. Ad.)

Gindulman auf Bohol und Cagayan, Prov. Misamis auf Mindanao (A. Adams). — Mir unbekannt.

Gen. VI. *Chrysallida* Carpenter.

1. *Chrysallida crebristriata* Carp.

Sual auf Luzon (Carpenter). — Mir unbekannt.

Gen. VII. *Mormula* (A. Ad.)

1. *Mormula acris* (A. Ad.)

Philippinen (A. Adams). — Mir unbekannt.

2. *Mormula egregia* (A. Ad.)

A. Adams, Journ. Linn. Soc. (Zool.) Bd. 7, 1864,
pag. 2.

Dalaguete auf Cébu, Philippinen (A. Adams). — Mir unbekannt.

Gen. VIII. *Styloptygma* A. Adams.

1. *Styloptygma typica* Tryon.

= *Obeliscus stylinus* A. Ad. sequ. Tryon.

Gindulman auf Bohol (A. Adams). — Mir unbekannt.

Gen. IX. *Actaeopyramis* P. Fischer.

Die sämmtlichen Arten dieser wenig bekannten Gattung sind auch mir unbekannt geblieben.

1. *Actaeopyramis striata* (Gray).

2. *Actaeopyramis fulva* (A. Ad.),

3. *Actaeopyramis granulata* (A. Ad.).

4. *Actaeopyramis suturalis* (A. Ad.) und

5. *Actaeopyramis tenella* (A. Ad.)

A. Adams, Proc. Zool. Soc. London 1851 pag. 224.

Diese 5 Arten stammen von den Philippinen (A. Adams) ohne näheren Fundort.

6. *Actaeopyramis lauta* (A. Ad.) und

7. *Actaeopyramis amoena* (A. Ad.)

Diese beiden stammen von Bolinao, Philippinen (A. Adams).

8. *Actaeopyramis speciosa* (A. Ad.)

Backayon, Prov. Misamis, Mindanao (A. Adams).

9. *Actaeopyramis stylina* (A. Ad.)

Catanuan, Philippinen (A. Adams).

Gen. X. *Mumiola* A. Adams.

1. *Mumiola spirata* (A. Ad.)

= *Odostomia interstriata* Souverbie.

Gamaguin (A. Adams), Insel Culion, Calamianes (coll.

Quadras No. 103), ein Stück von $4\frac{1}{2}$ mm. Länge, Manila (No. 45) und Bagac, Prov. Bataan (No. 51) auf Luzon, Cajidiocean auf Sibuyan (No. 1745a) und Inseln Lugbon bei Romblon (No. 1560) und Tinago bei Mindanao (No. 56). — Samoa- und Fidji-Inseln und Neukaledonien (Tryon).

2. *Mumiola pupiformis* (Souv.)

= *Odostomia pupaeformis* Souverbie.

Badajoz auf Tablas (coll. Quadras No. 1758). — Neu-südwales und Neukaledonien (Tryon).

Das einzige von Tablas vorliegende Stück hat bei 9 Umgängen $6\frac{1}{2}$ mm Länge und $2\frac{1}{5}$ mm grössten Durchmesser.

VI. Die Turbonilliden.

Die wenigen bis jetzt von den Philippinen bekannt gewordenen Vertreter aus dieser Familie lassen sich in 2 Gattungen unterbringen:

Gen. I. *Turbanilla* Riss.

1. *Turbanilla acicularis* (A. Ad.)

A. Adams, Proc. Zool. Soc. 1853 pag. 182 (*Chemnitzia*).

Loay auf Bohol (A. Adams). — Mir unbekannt.

2. *Turbanilla concinna* (A. Ad.) und

3. *Turbanilla boholensis* (A. Ad.)

A. Adams, l. c. pag. 181 und 180 (*Chemnitzia*).

Beide ebenfalls von Bohol und mir unbekannt.

4. *Turbanilla quadrasi* n. sp.

Char. T. non rimata, cylindrato-subulata, solidiuscula, alba, pellucida, nitida; spira elata lateribus strictis, prope apicem convexiusculis; apex perversus, subacuteus. Anfr. 12 planati, ad suturam profunde impressam, marginatam levis-

sime gradati, lente accrescentes, verticaliter costati, costis strictis, parum validis, obtusis, 16—18 in anfr. penultimo, superne ad suturam validioribus, ultimus infra suturam levissime constrictus, peripheria rotundatus, costis subtus evanidis, ad suturam solum distinctioribus, basi laevi, $\frac{1}{5}$ altitudinis testae aequans. Apert. obliqua, basi recedens, irregulariter piriformis; perist. simplex acutum, marginibus disjunctis, dextro subpresso, striete descendente, basali et columellari longo, concavo incrassatis et reflexiusculis; columella superne valide spiraliter torta.

Alt. 6—6 $\frac{1}{4}$, diam. max. 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. 1 $\frac{1}{2}$, lat. apert. $\frac{3}{4}$ mm.

Manila auf Luzon (coll. Quadras No. 364a), von Herrn J. Fl. Quadras in Anzahl aufgefunden.

Erinnert in Form und Skulptur an die atlantische *T. semicostata* Jeffr., ist aber fast um das Doppelte grösser.

5. *Turbanilla dactylus* n. sp.

Char. T. subrimata, cylindrato-subulata, solidiuscula, alba, pellucida, nitida; spira pro genere parum elata, lateribus prope apicem convexiusculis, deorsum parallelis; apex perversus obtusulus. Anfr. 10—11 convexiusculi, sutura profunde impressa, marginata disjuncti, lentissime accrescentes, suboblique costati, costis validis, 19—20 in anfr. penultimo, interstitiis costarum indistincte spiraliter lineatis, ultimus angustius costatus, costis 23—28, subtus ad peripheriam rotundato-subangulatam subito terminatis, basi parum convexa laevi, vix $\frac{1}{5}$ altitudinis testae aequans. Apert. obliqua basi recedens, truncato-ovalis; perist. simplex acutum, marginibus disjunctis, dextro areuato, basali subangulari, columellari substricto verticali, incrassatulo; columella superne aut levissime aut non spiraliter torta.

Alt. 3 $\frac{1}{2}$ —4 $\frac{1}{4}$, diam. max. $\frac{7}{8}$ —1 $\frac{1}{8}$ mm; alt. apert. $\frac{3}{4}$, lat. apert. $\frac{1}{2}$ mm.

Manila auf Luzon (von Moellendorff 1890), ein Stück, und Cebú (O. Koch 1895, No. 545), 2 Stücke.

Von der vorigen Art durch konvexe Umgänge, mehr zusammengeschobenes Gewinde und viel schwächere Drehung der Spindel unterschieden. Im ganzen recht wohl mit der mittelmeerischen *T. acuticostata* Jeffr. vergleichbar.

6. *Turbanilla bicarinata* (Carp.).

Carpenter, Proc. Zool. Soc. 1856 pag. 171 (*Chemnitzia*).

7. *Turbanilla polyzonata* (Carp.).

Carpenter l. c. pag. 170 (*Chemnitzia*) und

8. *Turbanilla bittiiformis* (Carp.).

Carpenter. l. c. pag. 171 (*Chemnitzia*).

Alle drei von Cagayan, Prov. Misamis, Mindanao (Carpenter) und mir unbekannt.

9. *Turbanilla truncatula* n. sp.

Char. T. subrimata, subcylindrata, tenera, griseo-albida, nitidula; spira parum elata, sursum parum attenuata lateribus strictiusculis; apex oblique involutus, perobtusus. Anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura profunda, impressa, anguste marginata disjuncti, lentissime accrescentes, verticaliter costulati, costulis leviter arcuatis parum validis, densis, 23 in anfr. penultimo ornati et sulcis spiralibus parum numerosis, deorsum profundius impressis reticulati, ultimus peripheria rotundatus, basi spiraliter haud sulcatus, $\frac{2}{7}$ altitudinis testae aequans. Apert. subverticalis anguste ovalis, superne parum acutata; perist. simplex acutum, marginibus disjunctis, dextro curvato, columellari longiusculo, concavo, parum incrassato; columella sursum levissime spiraliter torta.

Alt. $2\frac{1}{4}$, diam. max. $\frac{5}{8}$ mm; alt. apert. $\frac{5}{8}$, lat. apert. $\frac{3}{8}$ mm. -

Manila auf Luzon (v. Moellendorff 1890), nur ein Stück.

Sehr kleine Art, die in der Skulptur an gewisse *Pyrgulina*-Arten erinnert, aber durch die fast rein cylindrische Totalgestalt von dieser Gattung doch stark abweicht. Nähere Verwandte aus tropischen Meeren scheinen nicht bekannt zu sein.

Gen. II. *Eulimella* Forbes.

1. *Eulimella quadrasi* n. sp.

Char. T. subrimata, subulato-turrita, tenera, fragilis, albida, pellucida, vix nitens; spira gracilis lateribus prope apicem leviter convexiusculis; apex acutissimus, minimus, peculiariter compressus et distortus. Anfr. 9 perconvexi, lentissime accrescentes, sutura profunda disjuncti, striis subtilibus decussati, radiantibus sat regularibus, sigmoideis, distinctioribus quam spiralibus, ultimus globulosus, penultimo parum major, latior quam altus, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ altitudinis testae aequans. Apert. verticalis ovalis, utrinque rotundata; perist. simplex acutum, marginibus callo subsoluto junctis, regulariter curvatis, dextro leviter protracto, sigmoideo, columellari concavo, parum dilatato, leviter appresso, nec dentato nee lamiellifero.

Alt. 4, diam. max. 1 mm; alt. apert. $\frac{3}{4}$, lat. apert. $\frac{5}{8}$ mm.

Manila auf Luzon (coll. Quadras No. 296), von Herrn J. F. Quadras in mässiger Anzahl gesammelt.

Diese an *Aclis* erinnernde, auffallende Art besitzt den verdrehten Wirbel einer echten Turbonillide und hat meines Wissens in tropischen Meeren keine näheren Verwandten. In der Form erinnert sie an *Eu. ventricosa* Forb. des Mittelmeeres; es fehlt ihr aber die Glätte der Schale und der lebhafte Glanz dieser Art.

Beiträge zur Biologie unserer Süßwassermollusken.

Von

Dr. Heinr. Brockmeier (M.-Gladbach).*)

1. Ueber Mollusken abgeschlossener Wasserbecken.

Im 3. Jahresberichte der Biologischen Station zu Plön habe ich in meiner Arbeit über Süßwassermollusken der Gegend von Plön auf die Ausnahmstellung des Kleinen Ukelei-Sees aufmerksam gemacht, welche in dem fast vollständigen Fehlen der genannten Thiere in diesem abgeschlossenen Wasserbecken ihren Ausdruck findet. Während meines diesjährigen Aufenthaltes in Plön habe ich, aus leicht zu erkennendem Grunde, meine besondere Aufmerksamkeit den abgeschlossenen, nur wenige qm grossen Tümpeln gewidmet, welche sich nicht selten an den tiefsten Stellen der höher gelegenen Mulden des ostholsteinischen Hügellandes finden. Trotzdem diese Muldentümpel manchmal recht versteckt liegen, da dort mehrere „Knicke“ zusammenzustossen und Erlen und Weiden die Einschliessung zu vervollständigen pflegen, habe ich doch niemals dort eine Molluskenarmuth beobachtet, wie sie mir beim Kleinen Ukelei-See aufgefallen ist. Ich untersuchte 17 solcher Tümpel, von denen die meisten in der Umgebung des Schöh-Sees sich vorfinden und beobachtete darin, wenn ich von den kleinen Pisidiern absehe, 18 Arten, die aber auf den einzelnen Tümpel verschieden vertheilt sind. Das Verzeichniss der gesammelten Formen mag hier folgen, da es auch einige, durch ein vorgedrucktes Sternchen kenntlich gemachte Arten enthält, welche ich im vorigen Jahre nicht gefunden habe. Bei jeder Art ist die Anzahl der Fundorte angegeben. Es sind:

Planorbis nitidus,	12.
" marginatus.	4.
* " erista.	3.

*) Abgedruckt aus Forschungsber. Biol. Stat. Plön IV. 1896.

<i>Planorbis contortus.</i>	2.
* " <i>complanatus.</i>	1.
* " <i>rotundatus.</i>	1.
" <i>albus,</i>	1.
" <i>vortex.</i>	1.
* <i>Limnaea elongata,</i>	6.
" <i>palustris.</i>	4.
" <i>stagnalis.</i>	3.
* " <i>peregra,</i>	1.
" <i>ovata,</i>	1.
* <i>Physa hypnorum.</i>	3.
<i>Aeroloxus lacustris.</i>	2.
<i>Valvata cristata,</i>	1.
<i>Cyclas cornea,</i>	6.
" <i>lacustris.</i>	4.

Diese, selbst für kürzere Landreisen wenig geeigneten Thiere müssen, wie ja auch wohl allgemein angenommen wird, von anderen Thieren eingeschleppt worden sein. In welchem Zustande wurden sie aber übertragen, und welches sind die Ueberträger? Ohne Zweifel werden Wasservögel ganz geeignet sein das Wohngebiet vieler Thiere zu erweitern. Nicht selten wird man aber Wasserschnecken in Tümpeln finden können, welche in der unmittelbaren Nähe menschlicher Wohnungen sich befinden, und für dieses Vorkommen dürften die scheuen Wasservögel nicht so leicht verantwortlich zu machen sein, während es mir weniger bedenklich erscheint, gewissen Wasserinsekten den Schleppdienst zuzuweisen.

In den von mir untersuchten Muldentümpeln habe ich stets Wasserwanzen und Käfer aus der Familie der Dyticiden in gröserer Menge angeltroffen, und wenn dieselben in der Uferzone an den daselbst befindlichen Pflanzen emporkriechen, um das Wasser zeitweise zu verlassen, so können leicht Schnecken mit herausgehoben werden, denn diese pflegen sich gerade dort nicht selten aufzuhalten.

Es ist leicht einzusehen, dass diejenigen Arten am meisten fortgeführt werden, welche sich häufig an der Wasseroberfläche aufhalten. Dies trifft in besonders hohem Grade für die Lungenschnecken kleiner und darum im Sommer sehr warmer Wasserbecken zu. Hier müssen die Thiere häufig zum Athmen nach oben kommen und halten sich auch wohl noch längere Zeit daselbst auf, um die Verunreinigungen der obersten Wasserschicht wegzulecken. Sind sie aber nicht oben, so genügt bei manchen Arten schon eine Beunruhigung des Wassers, wie sie z. B. schon durch einen emporkriechenden Wasserkäfer verursacht werden kann, um ein schnelles Aufsteigen derselben zu bewirken. Besonders schön kann man das plötzliche Aufsteigen an der *Physa hypnorum* beobachten. (Clessin.) Es wird, wider Erwarten, durch ein Zusammendrücken der Lungenhöhle eingeleitet, was man deutlich daran erkennen kann, dass sofort nach der Erschütterung eine mehr oder weniger grosse Luftblase hervorgedrückt wird, welche aussen meistens haften bleibt. Gleich darauf findet höchst wahrscheinlich eine Ausdehnung der Lungenhöhle statt, welche dann verdünnte Luft enthält, die mit der aussen haftenden Luftblase einen kräftigen Auftrieb bewirkt. Für die in zweiter Linie erfolgende Volumenvergrösserung der Lunge spricht der folgende Versuch. Erschreckt man eine *Physa* nicht sehr stark, so beobachtet man auch sofort das Hervortreten einer silberglänzenden Luftblase, die aber nicht vollständig herausgedrückt wird, und bald wieder in die Lungenhöhle zurücktritt. Die aufgestiegene *Physa* sinkt unter, sobald die anhaftende Luftblase sich mit der Luft über dem Wasser vereinigt hat, was sowohl unmittelbar nach der Ankunft oben als auch einige Zeit später erfolgen kann. Der letzte Fall ist hier besonders wichtig, weil das längere Verweilen an der Oberfläche die Verschleppung begünstigt.

Im Gegensatze zu den Lungenschnecken halten sich

die Kiemenschnecken seltener an der Wasseroberfläche auf und lassen sich bei Beunruhigung zu Boden fallen, wo ihnen nicht so leicht die Gelegenheit geboten wird, eine Reise durch die Luft zu machen.

Hierauf ist in der oben angeführten Liste das Vorherrschen der Lungenschnecken zurückzuführen, und wenn auch die mit Kiemen ausgestatteten Cyclasarten einen nicht unwesentlichen Bestandtheil der Tümpelfauna ausmachen, so findet auch diese Erscheinung ihre befriedigende Erklärung, wenn man sich der Thatsache erinnert, dass die Thiere gerne an Pflanzen einporkriechen und auch an der Wasseroberfläche entlang gleiten.

Unter den an der Oberfläche des Wassers sich häufiger aufhaltenden Mollusken werden besonders die kleinen Arten und unter diesen wieder diejenigen am meisten Aussicht haben, ihr Verbreitungsgebiet auszudehnen, welche ein flaches Gehäuse besitzen und darum mit einem ziemlich grossen Theile ihrer Schale dem Träger anhaften. (*Planorbis nitidus*.) Hierbei ist zuerst das Wasser das Bindemittel und nach dem Verdunsten desselben vermögen die von ihm zurückgelassenen Bestandtheile eine wirksame Befestigung zu bewerkstelligen. Eine *Amphipeplea glutinosa*, welche ich in einem Glasgefasse züchtete, kroch, um das Wasser zu verlassen, an der Glaswand empor und hob bei der Gelegenheit einen *Planorbis cristata* mit heraus, der nach dem Verdunsten des Wassers so fest an der Schale haftete, dass schon eine gewisse Kraft erforderlich war, um das Gehäuse abzulösen. Wiederholt habe ich Gelegenheit gehabt, kleine Planorben von meiner Hand abzulesen, wenn ich mit derselben Pflanzenproben einem Tümpel entnommen hatte.

Bei der Untersuchung der 17 Muldentümpel habe ich auch auf die darin vorkommenden höheren Pflanzen geachtet und gefunden, dass diejenigen am häufigsten sich vorfinden, welche frei an der Wasseroberfläche schwimmen (Wasserlinsen).

und dann die Gewächse, deren Samen ein geringes Gewicht haben und längere Zeit auf dem Wasser schwimmen. Ich fand Wasserlinsen (*Lemna minor*, *polyrrhiza* und *trisulea*) in 11 Tümpeln,

<i>Hottonia palustris</i>	„	10	“
<i>Alisma plantago</i>	„	8	“
<i>Potamogeton natans</i>	„	5	“
<i>Riccia fluitans</i>	„	3	“
<i>Sparganium ramosum</i>	„	3	“
<i>Iris Pseudo-Acorus</i>	„	2	“
<i>Hydrocharis morsus ranae</i>	„	1	Tümpel.
<i>Fontinalis antipyretica</i>	„	1	“
<i>Rohrkolben</i>	„	1	“

Im Laufe dieses Jahres habe ich wiederholt einige Maare der Eifel besucht. 2 Tage widmete ich der Untersuchung des vollständig abgeschlossenen Pulvermaares bei Gillenfeld. Es fanden sich darin:

Limnaea stagnalis,
 „ *auricularia,*
Plan. albus,
 „ *crista,*
Valvata piscinalis.
Bythinia tentaculata,
Ancylus fluviatilis und
Pisidien.

Im Schalkenmehrener Maar waren mit Ausnahme von *Valv. piscinalis*, *Bythinia tentaculata* und *Ancylus fluviatilis* dieselben Arten vertreten, es kamen aber noch hinzu:

Limnaea elongata,
Planorbis carinatus und
Valvata cristata.

Auffallend ist hier das Vorkommen von *Valvata piscinalis*, *Bythinia tentaculata* und *Ancylus fluviatilis* im Pulvermaar. Der ziemlich fest auf seiner Unterlage sitzende *Ancylus* dürfte

wohl mit derselben verschleppt worden sein, wenn sie hierzu geeignet war.

Bei Grevenbrück im Sauerlande habe ich schon früher einmal (Ostern 1887) eine noch ziemlich gut erhaltene Schale von *Ancylus fluviatilis* an einer Stelle gefunden, wo ich sie am allerwenigsten erwartet hätte, und zwar oben auf einem bewaldeten Berggrücken, am Fusse eines dort hervorragenden Kalkfelsens mit Clausilien zusammen. Der Berg wird von der Lenne und einem Nebenflusse derselben umflossen, hat aber oben und an den Seiten nicht die Spur einer Wasseransammlung.

Valvata piscinalis und *Bythinia tentaculata* habe ich nur in je 2 halbwüchsigen Exemplaren im Pulvermaare gefunden. Die ausgewachsenen Thiere werden nicht leicht aufgenommen, weil das gewölbte Gehäuse eine zu kleine Haftfläche darbietet; die Jugendformen könnten wohl leichter übertragen werden, weil bei ihnen das Verhältniss zwischen Gewicht und Haftfläche wesentlich günstiger ist, sie sind aber zu selten an der Oberfläche des Wassers. Vielleicht hat eine andere Erklärung eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich.

Bei Gillenfeld findet sich *Ranunculus aquatilis* im Pulvermaar, und in noch grösserer Menge in der Alf. Da diese Pflanze in dichten Gruppen lebt und dadurch zahlreichen Thieren, z. B. Flohkrebsen und Wasserasseln, geeignete Schlupfwinkel darbietet, so wird dieser gedeckte Tisch ganz gewiss von Wasservögeln ein eingehenden Prüfung unterzogen werden, und zwar mit einer solchen Gründlichkeit, dass dabei grössere oder kleinere Theile der Pflanze abgelöst werden. Giebt man nun die Möglichkeit der Verschleppung solcher Stücke durch Wasservögeln zu, so wäre in diesem besonderen Falle nicht nur für Valv. *piscinalis* und Byth. *tentaculata*, sondern überhaupt für nicht zu grosse Kiemenschnecken etc. eine besonders interessante Art der Ver-

breitung gegeben. Die untergetauchten Blätter von *Ranunculus aquatilis* sind nämlich vieltheilig, mit borstenförmigen, nach allen Seiten abstehenden Zipfeln, welche aber ausserhalb des Wassers zusammenfallen und dann für eine daraufsitzende Schnecke oder kleinere Muschel Fangarme darstellen, die erst im Wasser ihr Opfer wieder freigeben. Es ist klar, dass dann mit den Pflanzenstücken auch anhaftender Laich fortgeführt werden kann.

Sobald ich die zahlreichen künstlichen Wassertümpel der hiesigen Gegend (M.-Gladbach) genauer untersucht habe, gedenke ich auf dieses Thema zurückzukommen. Hier mag nur kurz erwähnt sein, dass ich bis jetzt wohl *Cyclas*, *Pisidien* und Lungenschnecken, darunter *Limnaea elongata* und *Planorbis crista*, aber noch keine Kiemenschnecken darin gefunden habe.

2. Das Verhalten der Wasserschnecken beim Austrocknen der Gewässer und im Winter.

Hierzu möchte ich bemerken, dass ich ein Einbohren derselben in den Schlamm, wie es vielfach angegeben wird, nicht habe beobachten können. Selbstverständlich würde ich daraus noch keine Berechtigung herleiten, diese Angaben irgendwie in Zweifel zu ziehen, wenn ich nicht ein anderes Verhalten der Thiere zu beobachten Gelegenheit gehabt hätte. In der Gegend von M.-Gladbach giebt es eine ganze Reihe von Gräben, die während der wärmeren Jahreszeit längere Zeit kein Wasser enthalten. Es leben darin: *Limnaea elongata*, *L. palustris* mit der var *L. truncatula*, *Physa hypnorum*, *Planorbis rotundatus*, *Pl. carinatus*, *Pl. marginatus* *Pl. nitidus*, *Pl. complanatus*, *Pl. cornutus*, *Bythinia tentaculata*, *Paludina vivipara* und *Valvata cristata*.

Sinkt der Wasserspiegel in diesen Gräben, so ist es zunächst auffallend, dass die Schnecken der Uferzone dem Wasser nicht zu folgen pflegen, und ist das letzte Wasser

verschwunden, so folgen auch die darin gewesenen Schnecken dem Beispiele ihrer Artgenossen, indem sie sich einfach in ihre Gemächer zurückziehen und bessere Zeiten abwarten. Untersucht man dann solche Gräben genauer, so findet man neben den freiliegenden Exemplaren ein gauze Anzahl anderer, die unter und zwischen verwesenden Blättern ein Ruheplatzchen gefunden haben. Sehr voreilig würde es nun sein, dieses Vorkommen als die Folge einer besonderen Muskelthätigkeit aufzufassen. Die dicht zusammengepackten Blätter liegen in dem mit Wasser gefüllten Graben sehr lose oder schwimmen darin, so dass Thiere bequem darunter gelangen können. Verschwindet dann das Wasser, so rücken diese Pflanzenreste zusammen und schliessen ein, was dazwischen ist. In einem Graben fand ich einmal viele Conferven; als dieser später ausgetrocknet war bildeten die Algen eine papierartige Decke auf dem Grunde und unter derselben sassen *Limnaea elongata*, *L. palustris* etc., die Mündungen der Gehäuse dem Boden zugekehrt und warteten nur auf Wasser um die unterbrochene Reise fortzusetzen.

In austrocknenden Gewässern bei Plön habe ich ebenfalls die Schnecken frei auf dem Grunde vorgefunden. Es waren:

Limnaea elongata.

„ *truncatula*. (Chausseegraben bei Ascheberg).

Physa hypnorum.

Planorbis rotundatus und

„ *nitidus*.

Es ist leicht einzusehen, dass die gedeckelten und die engmündigen Formen am besten geeignet sein werden, eine längere Trockenzeit zu überstehen. Am 17. Aug. 95 sammelte ich in Uetersen bei Hamburg *Planorbis marginatus*, *Pl. corneus*, *Limnaea stagnalis*, *L. palustris* u. *L. ovata*. Bis zum 2. Sept. 95 wurden die Thiere trocken in einer Schachtel aufbewahrt und dann ins Wasser gebracht; nach einiger

Zeit krochen umher: 1 *Planorbis marginatus* u. 1 *Planorbis corneus*, der Rest aber war eingegangen.

Während meiner Eifeltour hatte ich mehrere Exemplare von *Limnaea elongata* und *L. peregra* 8 Tage lang in einer Schachtel aufbewahrt und brachte die Thiere dann ins Wasser. Von *Limnaea elongata* krochen die meisten bald umher, während keine *Limnaea peregra* die Trockenperiode überstanden hatte. In der Natur gestalten sich die Verhältnisse wesentlich günstiger, weil Bodenfeuchtigkeit und Gewitterregen das Leben der Thiere länger erhalten, während die schädliche Wirkung der Sonnenstrahlen durch Schatten spendende Pflanzen gemildert zu werden pflegt. Mehrere Jahre bereits beobachte ich hier einen von Buschwerk umgebenen Graben, worin *Limnaea elongata*, *L. palustris*, *Planorbis marginatus* und *Physa hypnorum* vorkommen und habe gefunden, dass derselbe während der warmen Jahreszeit über 4 Monate trocken sein kann, ohne das Leben der Thiere zu gefährden.

Auch Kiemenschnecken erweisen sich auf feuchtem Grunde längere Zeit widerstandsfähig. Am 8. April 95 waren bei Düsseldorf durch den Rhein *Paludina fasciata* Müll. und *Lithoglyphus naticoides* angeschwemmt worden. Die Paludinen lagen bereits auf dem trockenen Sande, während *Lithoglyphus* in den zurückgelassenen Tümpeln umherkroch. Die Sumpfschnecken brachte ich nicht gleich ins Wasser, sondern legte sie lose auf die Erde eines grösseren Blumentopfes, der regelmässig, soweit es das Interesse der Pflanze erforderte, begossen wurde. Am 9. Mai 95 beendet ich den Versuch. Im Aquarium kamen die Thiere bald aus ihren Gehäusen hervor, lebten noch längere Zeit, und einige Weibchen setzten auch noch Brut ab (am 12. Mai).

Ueber das Verhalten der Wasserschnecken im Winter drückt sich Glessin (21. Jahresbericht des Naturhist. Vereins in Augsburg, S. 135) folgendermassen aus: „Die Limnaeen

halten eine strengere Winterruhe als andere Wasserschnecken. Viel weniger verstecken sich die Planorben, Bythinien und Valvaten, welche den ganzen Winter über unter dem Eise hervorgeholt werden können. Noch weniger werden Physa fontinalis und Aneylus fluviatilis von der Kälte beeinflusst.*

Diesen Bemerkungen gegenüber dürften einige Beobachtungen von Interesse sein, welche ich gelegentlich machen konnte. Ende December 1888 war das Eis auf dem Teiche des botanischen Gartens in Marburg an einer Stelle entfernt worden, und hier sah ich eine grosse Limnaea stagnalis an einer Wasserpflanze emporkriechen. Noch mehr überraschte mich eine 1,5 cm hohe Limnaea ovata der hiesigen Gegend, welche am 12. December 1894 ganz munter an einer etwa 2 cm. dicken Eisdecke entlang kroch, während zahlreiche Artgenossen auf dem Schlammgrunde in Thätigkeit zu sehen waren. Nicht selten habe ich auch lebende Limnaeen in der Eisdecke beobachten können.

Da das Eis sich auf stehendem Wasser gebildet hatte, musste das Wasser unter demselben eine Temperatur von + 4° haben, und wenn nun eine Limnaea es nicht verschmäht, von dort auf eine viel kältere Eisdecke überzugehen, so spricht das eben nicht für eine besondere Empfindlichkeit gegen Kälte, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass ein schlechter Wärmeleiter, der Schneckenschleim, das Unangenehme dieses Temperaturwechsels wesentlich mildert. Durch einen einfachen Versuch habe ich die eben erwähnte Eigenschaft des Schneckenschleims feststellen können. Ich umfasste die Kugel eines Thermometers mit 3 Fingern meiner Hand und bewirkte dadurch in 20 Sekunden ein schnelles Steigen des Quecksilbers von $17\frac{1}{2}^{\circ}$ R auf $24\frac{3}{4}^{\circ}$. Damit belegte ich die Kugel mit Schleim, indem ich sie über den Rücken einer Nacktschnecke hin und her rollte, und nun bewirkten meine Finger in derselben Zeit ein Steigen von $17\frac{1}{2}^{\circ}$ auf 22° . Hierauf ersetzte ich den Schleim durch

einen Lederlappen von einem Militärhandschuh und erzielte damit dieselbe Wirkung. Weitere Versuche zeigten, dass Papier ein besserer, Wolle ein noch schlechterer Wärmeleiter ist.

3. Bemerkungen über Wachsthum und Hammerschlägigkeit.

Ueber den Gehäusebau berichtet Glessin, wie folgt: „Schon im Hochsommer wächst das Gehäuse, dessen Weiterbau im Frühjahr sofort nach dem Erwachen aus dem Winterschlaf, meist im Monat April beginnt, nicht mehr weiter: die Zeit bis zum Eintritt der Winterruhe wird dazu benutzt, die Mündung des Gehäuses durch Ablage einer Schmelzschicht zu verstärken, damit dieselbe beim Einbohren in den Schlamm nicht beschädigt wird.“

Meine Beobachtungen passen nicht so ganz zu diesen Ausführungen. Mitte Sept. 95 habe ich in Plön wiederholt Gelegenheit gehabt, verschiedene Limnaeen (*L. stag.*, *ovata* und *palustris*) mit ganz frischen Anwachsstreifen zu untersuchen. Im vorhergehenden Jahre fand ich um dieselbe Zeit in dem Gr. Plöner See eine grosse *Linn. auricularia*, welche eine frisch gebildete, und darum so dünne rechte Mundlippe hatte, dass mir die Mitnahme nicht ratsam erschien. Auch im Winter kann unter günstigen Umständen ein Weiterwachsen erfolgen. Eine 3 mm lange *Linn. stagnalis*, welche ich im Sept. 94 zwischen Wasserlinsen aus Plön mitgebracht hatte, setzte ich in einem Becherglase an das Fenster meines Arbeitszimmers. Mitte Dezember 94 war sie schon 2 cm lang und bis zum 8. März hatte die Länge noch um 5 mm zugenommen. Das starke Wachsen im Frühjahr ist wohl auf den anregenden und belebenden Einfluss der steigenden Temperatur zurückzuführen, aber auch im November können die Temperaturverhältnisse noch so günstig sein, dass den Thieren bei reichlichem Futter das Gehäuse zu klein wird. Hiervon konnte ich mich am 6. Nov. 95

überzeugen. An diesen Tagen besuchte ich einen Wasserschmecken enthaltenden Graben, der seit dem 15. Aug. 95 (1894 war er schon am 6. Juni trocken) kein Wasser enthielt, trotzdem in der Zeit vom 2.—12. Oktober, ferner am 16. 25. und 29. Oct. sowie am 5. und 6. November Niederschläge erfolgt waren, welche aber nur ein Aufweichen der im Graben befindlichen abgestorbenen Blätter bewirkt hatten. Auf dieser vorzüglichen Schneckenweide waren *Limn. elongata*, *L. palustris*, *Helix incarnata*, *Limax tenellus* und *Arion subfuscus* friedlich nebeneinander, und die halbwüchsigen Exemplare der *Limn. palustris* zeigten bereits frisch gebildete Anwachsstreifen. Seit dem 10. Nov. enthält der Graben wieder Wasser, und gegenwärtig (17. Nov.) sind die Temperaturverhältnisse noch so günstig, dass ein weiteres Wachsen mit Sicherheit angenommen werden kann.

Niedrige Temperaturen setzen die Fressgeschwindigkeit, welche bei den einzelnen Arten sehr verschieden ist, bedeutend herab, was hier durch einige Zahlen erläutert werden mag. Eine *Limnaea ovata* leckte in 1 Minute

bei 18,5° C 35 mal,

,	15°	"	25	"
,	12,5°	"	23	"
,	10°	"	16	"
,	8,5°	"	8	"

Während der kühleren Jahreszeit wird also nur wenig Nahrung aufgenommen, welche vielleicht gerade ausreicht, um die vorhandenen Organe zu erhalten. Ist Futter reichlich vorhanden, so wird sich während der wärmeren Jahreszeit ein Ueberschuss ergeben, der zu Neubildungen Verwendung findet. Ist dieser bedeutend, so wird das Gehäuse bauchig, ist er nur gering, so wird es schlank. Werden die Lebensbedingungen für längere Zeit günstiger oder ungünstiger, so muss sich dies bei noch wachsenden Thieren an den Neubildungen der Gehäuse erkennen lassen.

Jul. Hazay hat beobachtet, dass ein kleiner Blutegel, welcher sich am Mantel einer Limnaea festgesetzt hatte, bewirkte, dass sich der Zubau plötzlich bogenförmig nach innen umbog und eine stark verengte Mündung ergab. Eine Limn. stagnalis, welche ich aus einem pflanzenreichen Graben in ein Aquarium brachte, welches weniger günstige Ernährungsbedingungen darbot, bildete darin einen nach innen umgebogenen Anwachsstreifen. Im Trümmer See bei Plön sah ich eine 36 mm lange Limn. stagnalis, welche einen 8 mm breiten, nach innen umgebogenen Zuwachsstreifen hatte. Aus demselben See erhielt ich eine 41 mm lange Limn. stagnalis, welche eine so weit nach aussen umgeschlagene Mundlippe hatte, dass dadurch eine 2 mm tiefe und 4 mm weite Rinne gebildet wurde. In der hiesigen Gegend habe ich mehrere Limn. ovata mit nach aussen umgeschlagener Mundlippe beobachtet; sie fanden sich im fliessenden Wasser. Ich bin der Ansicht, dass diese Varietäten dann zur Ausbildung kommen, wenn nahezu ausgewachsene Thiere unter wesentlich günstigeren Umständen das Gehäuse vollenden können. Im fliessenden Wasser beispielsweise kann dies leicht dadurch geschehen, dass ein Tier durch die Strömung von einer mageren auf eine fette Weide geführt wird.

Ueber die Ursache der an vielen Gehäusen zu beobachtenden Hammerschlägigkeit äussert sich Jul. Hazay folgendermassen: „Der abnormale rasche Bau ist es, welcher die Unebenheiten in der Hammerschlägigkeit oder Gitterung ermöglicht; der weiche, zarte Bogen des frischen Anbaues, durch Kalkablagerung verhältnissmässig noch nicht verdickt und erhärtet, darum auch sehr nachgiebig, nimmt alle äusseren Einwirkungen an.“

Ich bin auch der Ansicht, dass breite und noch nicht genügend verdickte Anwachsstreifen die Bildung der in Rede stehenden Schaleneigenthümlichkeit begünstigen. Unzweifel-

haft richtig ist es auch, dass solche Schalenstücke leicht Eindrücke von aussen empfangen, die Hammerschlägigkeit möchte ich aber nicht darauf zurückführen, weil die Anordnung der Vertiefungen eine gewisse Gesetzmässigkeit erkennen lässt, die bei dieser Annahme eine befriedigende Erklärung nicht findet. Im Leben vieler Schnecken wird es vorkommen, dass die Aufnahme von Nahrung aus dem einen oder anderen Grunde mehr oder weniger erschwert ist. Die verschiedenen Organe bleiben aber in Thätigkeit und müssen ernährt werden; reicht nun das aufgenommene Futter hierzu nicht aus, so geschieht es auf Kosten des Körpers. Dauert dieser Zustand längere Zeit, so wird das Thier ein geringeres Volumen einnehmen müssen, und der an der Schale haftende Mantel wird dann auf frisch gebildete und noch nicht genügend verdickte Schalenteile einen derartigen Zug nach innen ausüben, dass es die eigenthümlichen Einsenkungen erhält, welche das Wesen der Hammerschlägigkeit ausmachen. Im Aug. u. Sept. habe ich nicht selten Limnaeen in den grösseren Seen bei Plön beobachten können, welche durch das bewegte Wasser fortwährend hin und her geschaukelt wurden. Nach der Beruhigung des Wassers stand den Thieren als Weide ein Sandgrund zur Verfügung, und Sand habe ich auch im Verdauungskanal gefunden. Gelingt es solchen Schnecken nicht, bis zur nächsten Beunruhigung des Wassers geschütztere Stellen zu erreichen, so wiederholt sich das Spiel, weil ein Festsaugen auf dem Grunde erfolglos ist. Es ist klar, dass unter solchen Umständen die Limnaeen eine Volumenverringerung erfahren müssen, die nur genügend verdickte Gehäuse nicht beeinflussen wird. Von einer Aufzählung weiterer Fälle sehe ich ab und möchte nur noch auf die Möglichkeit hinweisen, dass halbwüchsige Exemplare mit breiten, aber noch dünnen Anwachsstreifen den Winter zu überstehen haben.

4. Das Zusammenleben von Schnecken und Algen.

Ueber diesen Gegenstand hat E. Lemmermann im 3. Jahresbericht der Biolog. Stat. in Plön bemerkenswerthe Mittheilungen gemacht. Er hat es sich besonders angelegen sein lassen, auf die Vortheile hinzuweisen, welche die Algenbüschel den sie tragenden Mollusken gewähren. Wo Licht ist, pflegt aber auch Schatten zu sein. Ich habe zuweilen gefunden, dass solche Algen den Schnecken nicht nur nachtheilig sind, sondern auch den Tod derselben zur Folge haben. Es wird dies leicht erklärlich, wenn man sich vergewissert, dass die Oberfläche der Schnecke durch aufsitzende Pflanzenbüschel eine nicht unbeträchtliche Vergrösserung erfährt und dadurch dem fliessenden oder durch den Wind bewegten Wasser eine so grosse Angriffsfläche darbietet, dass das Thier leicht von der Unterlage losgerissen und fortgetrieben wird. Im Trammer See habe ich wiederholt Planorben und Limnaeen in dieser hilflosen Lage gesehen und am Grossen Binnen-See bei Howacht fand ich Limnaeen, welche mit ihren Algenbüscheln aufs Land geworfen waren. Bei Cuxhaven bereitete mir vor einigen Jahren eine ziemlich grosse Litorina litorea dadurch eine angenehme Ueberraschung, dass sie, von einem etwa 20 cm langen Algenbüschel getragen, im Wasser dahinschwebte. Unter günstigen Umständen kann also dieses Zusammenleben auch für die geogr. Verbreitung der Arten von Bedeutung sein.

Die Froschlaichalge, welche Lemmermann bei Bremen häufig auf Schnecken angetroffen hat, habe ich in dem südlichen See bei Ruthleben auf *Limnaea stagnalis* vorgefunden. Bei M. Gladbach und in der Eifel habe ich sie auf *Limnaea peregra* in kleinen abgeschlossenen Wasserbecken beobachtet, die weit von jedem fliessenden Wasser entfernt waren.

Schliesslich sei noch hervorgehoben, dass das mehr oder weniger dicke Kalkinkrustat mancher Mollusken auf die Lebens-

thätigkeit der Algen zurückzuführen ist. Behandelt man eine kleine Stelle der Kalkkruste mit Salzsäure und bringt den Rückstand auf einen Objectträger, so wird man neben kleinen Fadenalgen eine grosse Anzahl von Diatomeen vorfinden. Derselbe See liefert Mollusken mit und ohne Kalkablagerungen. In gewissen Tümpeln hatten alle Limnaeen Kalkkrusten, während in anderen alle Limnaeen ein vollständig glattes Gehäuse aufzuweisen hatten; im letzteren Falle gleich das Wasser durch die darauf schwimmenden Wasserlinsen einer grünen Wiese. Der Trammer See, der Gr. Plöner See und der Gr. Madebröken-See lieferten mir aus grösserer Tiefe Muscheln, welche keine Spur von Kalkauflagerung erkennen liessen. Die Form der Kalkkrusten lässt Unterschiede hervortreten, die ohne Zweifel auf die Algen zurückzuführen sind, welche die Abscheidung bewirkten. Eine genaue Untersuchung der Lebensbedingungen dieser Algen wäre daher wünschenswerth, weil sie voraussichtlich zur Bestimmung der Herkunft angeschwemmter Gehäuse wichtige Anhaltspunkte ergeben würde.

5. Bemerkungen über die Atmung bei *Limnaea stagnalis*.

Im 3. Jahresberichte der Biolog. Station in Plön habe ich auf Seite 119 über *Limn. stagnalis* aus dem Gr. Plöner See berichtet, dass sie längere Zeit im tiefen Wasser zu bleiben vermöge. Durch einen Versuch hatte ich dies für 12 Tage bewiesen. Es schien mir nun wünschenswerth, das Verhalten der Limnaea für einen längeren Zeitraum festzustellen. Herr Dr. Zacharias hatte die Freundlichkeit, einen daraufbezüglichen Versuch einzuleiten, und ich benutze hier die Gelegenheit, ihn für sein mir bewiesenes Entgegenkommen meinen Dank auszusprechen.

Am 27. Juli 1895 wurden einige ausgewachsene Limnaeen aus einem Tümpel am Schöh-See in einen Drahtkasten gebracht, dieser auf den Boden des Springbrunnenbassins

der Biolog. Station gestellt. Das Wasser enthält einige Wasserpflanzen (*Lemna trisulca*, *Typha* und *Stratiotes*), welche es ohne Zweifel in einer für die Schnecken günstigen Weise beeinflussen. Während der Dauer des Versuches ist der Springbrunnen nicht in Thätigkeit gewesen. Ungünstig für die Schnecken war die Ruhe, günstig aber die niedrige Temperatur des Wassers, welche sogar unter die Oberflächentemperatur des Gr. Plöner Sees herabging. Am 22. August betrug die Temperatur 16° R. (5 Uhr N.), am 31. Aug. $12\frac{2}{3}^{\circ}$ R. (4 Uhr N.) und am 16. September $11\frac{1}{2}^{\circ}$ R. (11 $\frac{1}{2}$ Uhr V.). Als bemerkenswerthes Resultat dieses Versuches wäre hervorzuheben, dass auch die in Tümpeln vorkommende *Limnaea stagnalis* in einem kleinen und ruhigen, aber kühlen Wasser längere Zeit (vom 27. Juli bis zum 16. Sept. 1895) unter der Wasseroberfläche auszuhalten vermag. Ein 50 mm langes Exemplar mit 7 Umgängen, welches am 16. Sept. dem Drahtkasten entnommen und in ein Cylinderglas gesetzt wurde, kroch alsbalb zur Wasseroberfläche empor und öffnete die Lungenhöhle, bei welcher Gelegenheit deutlich zu erkennen war, dass dieselbe Luft enthielt. Auf dem Wege zur Oberfläche wurde wiederholt die Umgebung der Athemöffnung vorgestülpt.

Es ist klar, dass in diesem Falle das kühle, sauerstoffreiche Wasser eine sehr ergiebige Hautathmung möglich gemacht hat; gleichwohl dürfte aber auch der Lungenhöhle noch eine wirksame zuzuweisen sein. Ich habe nämlich bei anderen, in einem Glasgefasse gezüchteten *Limnaeen* beobachtet, dass sie zuweilen, ohne durch eine Erschütterung dazu gereizt zu sein, Gasblasen aus der Lunge aufsteigen lassen. Sobald nun die Athemhöhle die frühere Ausdehnung wieder gewonnen hat, stellt sie einen luftverdünnten Raum dar, der auf den Gasaustausch zwischen Blut und Wasser ungemein fördernd einwirken wird.

M.-Gladbach, November 1895.

Necrologie.

Am 26. März 1896 starb zu Jokohama in Japan, wo er gegen ein hartnäckiges Leberleiden, das er sich in den Tropen zugezogen hatte, Heilung suchte, Herr Bernhard Schmacker aus Bremen in seinem 44. Lebensjahr. Schon in jungen Jahren war er als Kaufmann nach Ostasien gegangen, aber auch schon frühe entwickelte sich in ihm ein reger Sinn für die ihn umgebende Natur und namentlich fesselte ihn die Liebe für die Molluskenwelt. Freilich konnte er bei der zeitraubenden und verantwortlichen Arbeit, die ihm als einem der Chefs des grossen und in den chinesischen Handelsstädten weitverzweigten Hauses Carlowitz & Co. zufiel, sich nicht so intensiv dem Schneckenstudium hingeben, wie er es wohl wünschte, aber eigene Sammler, die er bezahlte, und Erholungsreisen, die er selbst in China, Japan und nach den Philippinen machte, vereinigten doch so ansehnliches Material aus allen Gebieten der Zoologie in seiner Hand, dass er nicht blos eine der reichsten Privatsammlungen ostasiatischer Schnecken und Muscheln zusammenbrachte, sondern auch europäische Forscher und wissenschaftliche Anstalten mit einem kostbaren Material an Vogelbälgen, Reptilien, Schmetterlingen u. s. w. unterstützen konnte. Namentlich die Museen von Frankfurt a. M. und Bremen rühmen die Liberalität des Verstorbenen. Viele neue ostasiatische Tiere tragen infolgedessen auch seinen Namen. Litterarisch hat er sich verdient gemacht durch mehrere Arbeiten über chinesische und japanische Schnecken in dem Nachr.-Blatt d. Deutsch. Malak. Gesellschaft und im Proc. of the Malac-Soc., die er mit O. Boettger zusammen verfasst hat, und die schon deshalb Werth behalten werden, weil sie sich auf ein meist sehr grosses Beobachtungsmaterial stützen. Der Verstorbene in dem auch wir einen treuen Freund verloren, war das Muster eines gewissenhaften Forschers, der keine Zeile drucken liess, ehe er die Originale der von ihm behandelten Tiere verglichen und die gesammte Litteratur über den Gegenstand geprüft habe. Er war aber auch das Muster eines Sammlers: er sammelte stets im grossen Stil, er freute sich seines Besitzes, aber er gab auch, wo er der Wissenschaft nützen konnte, uneigennützig und mit vollen Händen.

Btg.

Literaturbericht.

Brancik, Dr. C., Contributiones ad faunam Molluscorum insulae Papua. In Jahresh. Ver. Trenesin 1894—95 p. 209-228 t. 5, 6.

Als neu beschrieben werden Triton (Lagena) confinis p. 211 t. 5 f. 1; — Vertagus implicatus p. 217 t. 5 f. 2; — Melania lauterbachi p. 218 t. 5 f. 3; — Heinialecta divergens p. 222 t. 5 f. 4; — Hemiglypta semilucida p. 222 t. 5 f. 5; — Trochonanina sturanyi p. 223 t. 5 f. 6; — Pupinella luteola p. 225 t. 5 f. 7; — Donax haesitans p. 226 t. 6 f. 2; — Batissa discors p. 227 t. 6 f. 1.

Sinroth, Dr. H., über bekannte und neue Urocycliden. Mit 2 Tafeln und 8 Abbildungen im Text. Frankfurt 1896 Sep. Abdr. aus Abhandl. Senckenb. Gesellsch. vol. XIX.

Als neu beschrieben werden Trichotoxon robustum p. 283 t. 1 f. 23, t. 2 f. 5—6 vom Kilimandseharo (mit bis zu 14 Liebespfeilen); — Tr. neumannii p. 290 t. 2 f. 6—8 Kva Kitoto (mit 18 Pfeilen); — Tr. athrix p. 292 t. 2 f. 9 von Pori Mangati Ufirmi; — Tr. volkensi p. 293 t. 1 f. 21, t. 2 f. 19. Deutsch Ostafrika ohne Spezialfundort; — *Leptichnus* (n. gen.) fischeri t. 1 f. 7—11. statura parva, solea angustissima, intestinum non in pedem immersum, duae taeniae principales in pallio et dorso; porus pallialis apertus; epiphallus duobus flagellis instructus. Deutsch-Ostafrika ohne sicherer Fundort; — Dendrolimax continentalis t. 1 f. 1 f. 1—6, Westafrika, Togoland; — *Microcylus* (n. gen.) baumannii p. 303 t. 1 f. 12—20, Togoland: statura parva; pallium duobus taeniis principalibus notatum, non dorsum; porus pallialis apertus; dorsum tota extensione carinatum; genitalia coecum amatorio instructa. — Zunächst mit *Urocyclus* verwandt, vielleicht nur Untergattung davon.

Smith, Edgar A., Notes on some Land-Shells from Vanbu, Tonkin, with Descriptions of two new Species. In Ann. Mag. N. H. (6) XVII. p. 128.

Neu *Camaena vanbuensis* p. 129 und *Pterocyclos vanbuensis* p. 130.

The Journal of Conchology Vol. VIII. No. 6. April 1896.
p. 177. Collier, Edw. and Robert Standen, Further Conchological Notes from the West of Ireland.

p. 190. Adham, Charles. Note on the habits of *Vertigo edentula* Drp.
p. 191. Tregelles, G. F., the Marine Mollusca of Cornwall.

Sitzungs Bericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1896. No. 1.

- p. 11. Martens, Ed. von, über die Endungen — *oiae*, — *iae*, — *iae* in naturgeschichtlichen Benennungen.
p. 16. — —, *Planorbis scalaris* Jay. Ein völlig ausgebildetes Exemplar von *Paludina scalaris* Jay aus Florida erscheint nicht als *Physa* sondern vollständig als *Planorbis*, der erhebliche Ähnlichkeit mit *Pl. trivolis* Jay zeigt.

Ihering, Dr. H. von, os Unionidos da Florida. In Rev. Mus. Paulista I, 1895 p. 206.

Die Unionenfauna von Florida erscheint nach sorgfältiger Untersuchung nicht als eine selbstständige, sondern als eine verarmte Abzweigung der Mississippi-Fauna, in welcher *Margaritana* ganz fehlt, *Anodontia* nur durch eine Art vertreten ist und auch einige Unionengruppen, die noch in Georgia auftreten, nicht mehr repräsentiert sind. Die Alleghanies bilden durchaus nicht eine so wichtige Faunenscheide, wie man gewöhnlich annimmt, weder für die Fische noch für die Najadeen.

The Journal of Malacology. Vol. V. No. 1. March 25 1896.

- p. 1. Chaster George W., Some new marine Mollusks from Tangier. Mit Taf. 1. (*Neu Caecum cuspidatum* t. 1 fig. 4; — *Retrotortina fuscata* n. gen. et spec. t. 1 fig. 5, 6; — *Pherusa carinata* t. 1 fig. 3; — *Cyclostrema pruinatum* t. 1 fig. 2; — *Cyclostrema fenestratum* t. 1 fig. 1. —

Lahille, F., Contribucion al estudio de las Volutas Argentinas. In Rev. Mus. de la Plata Vol. VI. 295—332. Mit 12 Taf. Neu neben zahlreichen Varietäten: *Vol. oviformis*, *ambigua* und *paradoxa*.

Journal de Conchyliologie vol. 43 No. 2, 1 Avril 1895 (erschienen 1896).

- p. 77. Monterosato, T. de, Note sur le genre *Barleeia* Clark. Die Gattung wird auf *B. rubra* und *Rissoa gougeti* Mich beschränkt.
p. 79. Grosse, H., Additions à la Faune Malacologique terrestre et fluviatile de la Nouvelle-Caledonie et de ses dépendances. — *Helicima Aldrichi* abgebildet; — *Placostylus leucoleucus* p. 80 t. 5 fig. 6 von der Fichteninsel.
p. 82. Bayay, A., Coquilles nouvelles provenant des récoltes de M. L. Levay dans les rapides du Haut-Mekong, pendant la campagne du Massie, 1893-95. — *Neu Lacunopsis sphaerica* p. 82 t. 6 fig. 1; —

L. coronata p. 83 t. 6 fig. 2; — *L. levayi* p. 84 t. 6 fig. 3; — *L. massici* p. 86 t. 6 fig. 4; — *Pachydrobia brevis* p. 87 t. 5 fig. 2 — *P. pellucida* p. 88 t. 5 fig. 3; — *P. elongata* p. 89 t. 5 fig. 4; — *P. sulcata* p. 89 t. 5 fig. 5; — *Hydrorissa* (n. gen.) *elegans* p. 91 t. 6 fig. 5; — *H. levayi* p. 92 t. 6 fig. 6; — *Stenothyra hypocystoides* p. 93 t. 6 f. 7.

Proceedings of the Malacological Society of London. Vol. II
No. 1. April.

- p. 1. Melvill, J. Cosmo and J. Ponsonby, Descriptions of seven new species of terrestrial and fluviatile Mollusca from the Hadramaut, South Arabia. — Neu *Stenogyra bentiae* p. 1 t. 1 fig. 4; — *Arnouldia eremias* p. 1 t. 1 fig. 12—14; — *Otopoma dhofarensis* p. 2 t. 1 fig. 9—11; — *Ot. consimile* p. 2 t. 1 fig. 5—7; — *Ot. hadramanticum* p. 2 t. 1 fig. 1—3; — *Planorbis arabicus* p. 3 t. 1 fig. 15—17; — *Paludestrina glaucovirens* p. 3 t. 1 fig. 8. Alle von Dhofar, ca. 800 Miles östlich von Aden.
- p. 4. Burne, R. H., Notes on the Anatomy of *Hanleya abyssorum* M. Sars.
- p. 14. Sowerby, G. B., Description of *Cassis adeocki*, a new species. Mit Holzschnitt.
- p. 15. Gude, G. K., Description of a new species of *Vitrina*, and new forms of *Helicidae*, with a list of the helicoid shells hitherto found in the Canary Islands. Neu *Vitrina Parryi*, *Helicella tumulorum* var. *pulchra* und var. *arucasensis*, *Hemicycela bituminosa* var. *unicolor*, *Hem. pouchet* var. *geminata*. Die neuen Mabille'schen Arten hat auch Col. G. S. Parry nicht gefunden.
- p. 23. Gude, G. K., Description of *Streptaxis paulus*, a new Species. Mit Figur.
- p. 24. Sowerby, G. B., List of the Pleurotomidae of South Australia, with description of some new species. — 37 Arten, davon neu *Drillia dimidiata* p. 24 t. 3 fig. 2; — *Dr. bednalli* p. 25 fig. 3; — *Dr. gratiosa* p. 25 fig. 1; — *Dr. saxea* p. 25 fig. 4; — *Daphnella dulcis* p. 26 fig. 5; — *D. diluta* p. 26 fig. 6; — *D. fallaciosa* p. 26 fig. 7; — *D. bitorquata* p. 27 fig. 9; — *D. (Teres) mimica* p. 27 fig. 10; — *D. vercoi* p. 27 fig. 8; — *Clathurella lamellosa* p. 28 fig. 11; — *Mangilia adeocki* p. 29 t. = *bella* Ad. et Ang. nec Hds.; — *Mangilia alucinans* p. 29 fig. 12; — *M. connectens* p. 30 fig. 14; — *M. inornata* p. 30 fig. 15; — *M. alticostata* p. 31 fig. 16; — *M. cuspis* p. 31 fig. 17.
- p. 33. Suter, Henry, Descriptions of some new Land Mollusca from New

- Zealand and Macquarie Island. — Neu *Lagochilus Chiltoni* p. 33 t. 4 fig. 1; — *L. (?) studeri* p. 33 t. 4 fig. 2; — *Athoraeophorus simrothi* p. 34 t. 4 fig. 3—4; — *Charopa roseveari* p. 34 t. 4 fig. 5—7; — *Ch. titirangiensis* p. 35 t. 4 fig. 8—10; — *Laoma elegans* p. 35 t. 4 fig. 11—12; — *Phrixgnathus lucidus* p. 36 t. 4 fig. 13—15; — *Phr. spiralis* p. 36 t. 4 fig. 16—18; — *Phr. moellendorffii* p. 37 t. 4 fig. 19—21; — *Phr. hamiltoni* p. 37 t. 4 fig. 22—24; — *Phr. sublucida* p. 37.
- p. 39. Simroth, Dr. H., on *Neohyolimax brasiliensis* n. gen et spec. from Brazil. (Mit Taf. 5).
- p. 41. Collinge, Walter E., on a collection of Slugs from the Sandwich-Islands. — *Neu Agriolimax globosus, perkinsi.*

Jacobi, A., Anatomische Untersuchungen an Malayischen Land-schnecken. In Archiv f. Naturg. 1895. Mit Tafel (Anatomie von *Amphidromus chloris* und *interruptus*).

Linden, M. von, die Entwicklung der Skulptur und der Zeichnung bei den Gehäuseschnecken des Meeres. In Zeitschr. f. wissensch. Zoolog. 1896.

Thurston, E., Pearl and Chank (Turbinella) Fisheries of the Gulf of Manaar and Ceylon. Madras. Buil Gov. Mus. 1894. Non vidi.

Tate, Ralph, Mollusca. In Report on the Horn Expedition to Central Australia Part. II Zoology. Febr. 1896 With an Appendix on Anatomical Characters, by G. Hedley. 40 p. 181—226, with pl. 17—19.

Von den 25 durch die Expedition gesammelten Arten sind 5 weiter verbreitet, fünf andere haben nahe Verwandte, die übrigen 15 sind streng auf das Gebiet beschränkt, welches Tate auf Grund der Pflanzenverbreitung als Larapintine Region zusammenfasst. Die Fauna steht am nächsten der des subtropischen und gemäßigten Westaustralien, dagegen ist sie von der von Queensland scharf geschieden. Vertreten sind die Gruppen Microphyura, Endodonta, Flammulina, Angasella, Chloritis, Thersites (= Hadra), Liparus, Stenogyra, Pupa und Succinea. Besonders charakteristisch ist Angasella mit 5 Arten. Das sog. Larapintine-Gebiet ist Land mindestens seit der Kreidezeit, aber es hat nur in der späteren Kreideperiode und in der Pliocaenperiode Verbindung mit anderen Regionen gehabt und ist sonst immer eine nicht durch Meer

sondern durch die Wüste abgeschlossene Insel gewesen. Die Schnecken leben am Südabhang des Hochlandes oder in den tiefen Schluchten, in einzelnen weit getrennten Kolonien, genau wie die acht endemischen Pflanzen. *Hadra fodinalis* und *Pupa contraria* finden sich in grossen Mengen subfossil. Die neuen Arten sind schon in *Transact. Roy. Soc. S. Australia XVIII.* 1894 mit kurzen Diagnosen veröffentlicht, aber damals hier nicht aufgeführt worden. Es sind *Microphyura hemiclausa* p. 185 t. 17 fig. 1; — *Charopa aemula* p. 186 t. 17 fig. 2; — *Ch. planorbulina* p. 187 t. 17 fig. 3; — *Flammulina retinodes* p. 187 t. 17 fig. 4; — *Angasella setigera* p. 189 t. 17 fig. 6; — *Ang. euzyga* p. 190 t. 17 fig. 7; — *Ang. winekeana* p. 191 t. 18 fig. 8; — *Ang. papillosa* p. 191 t. 18 fig. 9; — *Ang. arcigerens* p. 192 t. 18 fig. 27; — *Chloritis squamulosa* (od. *ophioderma*, falls *Helix* im alten Sinne genommen wird) p. 193 t. 18 fig. 10; — *Hadra* (*Glyptorhagada*) *clydonigra* p. 195 t. 19 fig. 24; — *H. sublevata* p. 196 t. 17 fig. 5; — *H. adecockiana* p. 196 t. 19 fig. 26; — *H. fodinalis* p. 199 (cfr. *Trans. Roy. Soc. S. Aust. XVI.* 1892 p. 63 t. 1 fig. 1); — *H. grandituberculata* p. 200 t. 18 fig. 11; — *H. watlii* p. 201 t. 18 fig. 12; — *Liparus spenceri* p. 202 t. 18 fig. 13; — *Stenogyra interioris* p. 203 t. 18 fig. 14; — *Pupa ischma* p. 204 t. 19 fig. 16; — *P. fuscinea* p. 205 t. 19 fig. 18; — *P. larapinta* p. 205 t. 19 fig. 19; — *Succinea interioris* p. 206 t. 19 fig. 21; — Unter den 13 Süßwasserarten ist charakteristischer Weise kein neue oder eigenthümlich. Für *Physa Newcombi* und Verwandte wird die neue Gattung *Jsidorlla* errichtet.

In dem anatomischen Anhang gibt Hedley die Mundbewaffnung und theilweise auch den Genitalapparat von *Bithynia australis*, *Microphyura hemiclausa*, *Hadra setigera*, *Xanthomelon fodinalis*, *adcockiana*, *arcigerens* und *Liparus Spenceri*. — (*Helix fodinalis* wird in dieser einen Arbeit aufgeführt als *Thersites*, *Badistes* und *Xanthomelon*!)

Hedley, Ch. Notes on Mollusks from the Alpine Zone of Mount Kosciusko. In *Rec. Austral. Mus.* II. 7. —

Die Mollusken der höchsten Erhebung Australiens zeigen nach Hedley generisch einen antarktischen, specifisch eine tasmanischen Charakter, genau wie manche andere Thierklassen und Pflanzen. Die Schnecken sind: *Endodonta nivea* t. 23 fig. 5—7; — *Flammulina excelsior* t. 23 fig. 2—4; — sechs weitere schon bekannte *Endodonta*, *Chloritis brevipila* und *Rhenea splendidula*.

Hedley, Ch., Description of *Pugnus*, a new genus of Ringiculidae from Sydney Harbour. — Ibid. p. 5. (*Pugnus parvus* n. gen. et spec. t. 23 fig. 1). —

Brockmeier, Dr. Heinr., Beiträge zur Biologie unserer Süßwassermollusken. In Forschungsber. Biol. Station Plön IV. 1896.

Wir bringen, da der Forschungsbericht wohl nur einem geringen Theil unserer Mitglieder zugänglich wird, diese interessante Arbeit vorstehend im Wortlaut zum Abdruck.

The Nautilus Vol. IX.

- p. 109. Pilsbry, Henry A., the Aulacopoda, a primary division of the Monotremate Land Pulmonate. Die Familien mit Sohlenfurchen werden als Aulacopoda den Familien ohne solche (Holopoda) entgegengestellt.
- p. 111. Dall, W. H., on some species of *Scala*. — *S. (Stenorhytis) mazyki* aus dem Miocän von Südcarolina; — *Sc. ranellina* aus dem Jacksonian von Alabama; — *Sc. mitchelli* von Texas, lebend.
- p. 112. Pilsbry, H. A., Sculpture of the apical whorls, a new character for distinguishing Groups of Bulimuli.
- p. 115. Strode, W. S., the size of mussels.
- p. 116. Sterki, Dr. V., small land shells from New Mexico.
- p. 117. Vanatta, E. G., the geographical distribution of *Planorbis umbilicatus*.
- p. 119. Gardner, A. H., Dredging in Long Island Sound.
- p. 121. Wright, B. H., New Florida Unios. — Neu *U. hartwrightii* t. 2 fig. 4—6; zum erstenmal abgebildet *U. oscari* fig. 1—3.
- p. 123. Streng, L. H., a new variety of *Limnaea (desidiosa* v. *de Campi*, mit fig.).
- p. 123. Pilsbry, H. A., Description of a new Gastrodonta (*collisella* n. aus Tennessee).

Eingegangene Zahlungen:

Pousonby, L., Mk. 6.—; Weiss, W., Mk. 6.—; Schmacker, Sch., Mk. 6.—; Schedel, J., Mk. 6.—; Arnold, N., Mk. 6.—; Nägele, W., Mk. 6.—; Roos, K., Mk. 6.—; Pfeiffer, K., Mk. 6.—; Fruhstorfer, B., Mk. 6.—; Schacko, B., Mk. 6.—; Hocker, G., Mk. 6.—; Kraetzer, F., Mk. 6.—;

Wohnungsveränderung.

Herr Oberlehrer a. D. C. Arndt wohnt jetzt in Neubrandenburg, Mönchen-Strasse 4.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M., Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Achtundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Diagnoses

specierum novarum ex insulis Philippinis auctoribus

J. F. Quadras et O. F. von Moellendorff.

1. *Ennea (Diaphora) samarica* Mlldff.

T. rimata, subcylindrica, tenuis, pellucida, costulato-striata, nitens, albo-hyalina. Spira subcylindrica, sensim attenuata, apice glabro, obtuso. Anfr. $9\frac{1}{2}$ planulati, sutura profunda disjuncti, ultimus paullum distortus et ascendens. Apertura verticalis, subcordiformis, peristoma parum expansum, albolabiatum, continuum, superne adnatum. Sinulus sat recedens, sursum protractus. Lamella parietalis valida, longe intrans, extus marginem attingens, columellaris profunda, validiuscula, dentibus 2 in formam crucis oppositis.

Diam. 1,75, alt. 7,5 mm.

Hab. prope vicum Loquilocon insulae Samar leg. coll. indigena.

2. *Ennea (Diaphora) truncatella* Mlldff.

T. imperforata, gracillima, elongate subcylindrica, costis rectis sat acutis sculpta, hyalina, pellucida. Spira subcylindrica, sursum attenuata, apicem obtusulum versus denuo accrescens. Anfr. 20 plani, sutura profunda discreti, primi 6 laeves, plerumque decollati, ultimus sat solitus, valde tortus, deflexus et porrectus, superne compressus. Apertura verticalis, rotundato-piriformis, peristoma sat expansum, superne ad sinulum valde recedens. Lamella parietalis humilis, longe intrans.

Alt. (speciminis restituti) 15, diam. 1 mm.

Hab. in monte Putian prope vicum Dingle insulae Panay leg. coll. indigena.

3. *Ennea (Diaphora) canaliculata* Q. et Mlldff.

T. anguste sed pervie perforata, irregulariter ovatula, tenuis, pellucida, laevigata, nitens, albo-hyalina; spira superne conoidea apice obtuso, tum subcylindrica, subtus attenuata. Anfr. 7 planulati, ad suturam angustissime crenulati, ultimus penultimo angustior, basi valde compressus, circa umbilicum crista bene exserta crenata cinctus, ab ultima quarta parte solitus, deflexus et porrectus, costulatus, superne compressus et cristatus. Apertura verticalis, rhomboidea, peristoma continuum, sat expansum, ad conjunctionem marginis superi et externi valde recedens et excisum, quasi canalem formans. Lamella parietalis humilis, longe intrans.

Diam. 4, alt. 8,5, apert. lat. 1,5, long. 2,5 mm.

3,8 „ 8,75

3,5 „ 6,5

3,3 „ 8

Hab. in insulis Calamianes leg. coll. indigena.

4. *Vitrinoconus infracostatus* Mlldff.

T. late et aperte umbilicata, umbilico $\frac{2}{5}$ diametri adaequante, convexo-depressa, solidula, sericina, superne sat ruditer costulata, inferne costulato-striata, brunnea; spira convexo-conoidea. Anfr. $7\frac{1}{2}$ parum convexiusculi, lentissime accrescentes, sutura per carinam exsertam filiformi disjuncti, ultimus penultimo vix latior, ad peripheriam acute carinatus, basi convexior, ad umbilicum obtuse angulatus, antice breviter descendens. Apertura sat obliqua, trapezoidalis, modice excisa, peristoma rectum, obtusum, a latere sigmoideo curvatum, basi bene arcuatum.

Diam. 10, alt. 5 mm.

Hab. in districtu Benguet insulae Luzon leg. cl. W. Micholitz.

5. *Macrochlamys (Macroceras) platytaenia* Q. et Mlldff.

T. vix rimata, conoideo-depressa, solidula, vix striatula, valde nitens, hyalino-alba, taenia fulvo-brunnea, latiuscula ornata. Spira fere regulariter conica, modice elevata. Anfr. $4\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus bene convexus. Apertura modice obliqua, late elliptica, sat excisa, peristoma rectum, acutum, margine columellari superne breviter reflexo.

Diam. 8,5, alt. 6 mm.

Hab. in insula Marinduque leg. coll. indigena.

6. *Euplecta canalifera* Mlldff.

T. imperforata, depresso-conoidea, tenuis, pellucida, superne sat distanter plicata, basi striatula; nitens, lutescenti-hyalina. Spira modice elevata, fere exacte conica. Anfr. $6\frac{1}{2}$ planulati, lente accrescentes, sutura per carinam exsertam canaliculata disjuncti, ultimus carina acuta bene exserta, crenata carinatus, basi convexus. Apertura vix obliqua, securiformis, peristoma rectum, acutum, columella sursum incrassatula, calloso-appressa.

Diam. 11,5, alt. 6,7 mm.

Hab. in parte septentrionali et meridionali insulae Samar
leg. coll. indigena.

7. *Euplecta subterranea* Q. et Mlldff.

T. imperforata, subdepresso-conoidea, tenuis, pellucida,
subsericina, alba; spira sat elevata, convexo-conoidea. Anfr.
 $7 - 7\frac{1}{2}$ convexiusculi, angusti, lentissime accrescentes, trans-
verse costulato-striatuli, carinati, pone carinam linea elevata
cincti, ultimus non descendens. Apertura verticalis, perangusta,
peristoma rectum, acutum, margine basali et columellari
subcallosis, columella superne appressa, callo circumdata.

Diam. 11,25 – 13,5. alt. 6,7 – 7,5 mm.

Hab. in caverna Buho prope vicum Sierra Bullones
insulae Bohol.

8. *Coneuplecta boholica* Q. et Mlldff.

T. rimata, turbinata, tenuis, pellucida, superne sub-
tiliter striata, sericina, pallide intescenti-cornea. Spira valde
elevata, lateribus convexiusculis. Anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi,
sutura per carinam exsertam filomarginata disjuncti, ultimus
ad peripheriam carina filiformi cinctus, subtus glabratus,
nitens. Apertura modice obliqua, late elliptica, valde excisa,
peristoma rectum, acutum, margine columellari superne
dilatato, reflexo.

Diam. 5,5. alt. 5,5 mm.

Hab. prope vicum Vilar insulae Bohol.

9. *Kaliella leucotropis* Q. et Mlldff.

T. rimata, depresso-trochiformis, tenuiuscula, subtiliter
et consertim costulato-striata, subsericina, fere opaca, brun-
nea. Spira fere regulariter conica apice acutulo. Anfr. 5
convexiusculi, ultimus carina bene exserta albida carinatus,
basi subglabratus, nitidulus. Apertura parum obliqua, late
securiformis, peristoma rectum, acutum, margine columellari
superne dilatato, breviter reflexo.

Diam. 2,5, alt. 2,25 mm.

Hab. in montibus Sierra Bullones dictis insulae Bohol.

10. *Bensonia igorrotica* Mlldfl.

T. anguste umbilicata, depressa, solidula, pellucens, superne dense costulata, lineis spiralibus minutissimis decussata, sericina, subtus striata, magis nitens, brunneo-cornea; spira breviter conoidea, apice plano. Anfr. $5\frac{1}{2}$ lente accrescentes, sutura sat impressa discreti, convexiusculi, ultimus bene convexus. Apertura parum obliqua, elliptica, valde excisa, peristoma rectum, obtusum, intus calloso-limbatum, columella calloso-incrassatula, sinuata, vix reflexa.

Diam. 17,5, min. 15,5, alt. 9,5, apert. lat. 9, long. 7, alt. 6,5 mm.

Hab. in districtu Benguet insulae Luzon leg. cl. M. Micholitz.

11. *Bensonia holotrachia* Mlldfl.

T. anguste umbilicata, convexo-depressa, striis transversis et lineis elevatis undique exasperata, opaca, corneo-fulva; spira modice elevata, gradata apice plano. Anfr. $5\frac{1}{2}$ sat convexi, lente accrescentes, carinulis 5--6 elevatis cincti, ultimus ad peripheriam carina acuta filiformi circumdatus. Apertura modice obliqua, elliptica, sat excisa, peristoma rectum, obtusum, columella subcallosa, superne dilatata, haud reflexa.

Diam. 13, alt. 7 mm.

Hab. in districtu Benguet insulae Luzon leg. cl. W. Micholitz.

12. *Inozonites quadrasi* Mlldfl.

T. anguste et cylindrice umbilicata, discoidea, tenuiuscula, pellucida, superne subcostulato-striata, subtus glabra, nitens, pallide corneo-flavescens; spira breviter conoidea. Anfr. $5\frac{1}{2}$ lente accrescentes, sutura sat profunda disjuncti, convexiusculi, ultimus supra peripheriam subangulatus, basi

bene convexus. Apertura parum obliqua, late elliptica, valde excisa, peristoma rectum, obtusum, margine columellari subcalloso sinuato.

Diam. 7,25, alt. 3,3.

Hab. in parte centrali insulae Bohol.

13. *Trochomorpha subtaeniata* Q. et Mlldff.

T. late et aperte umbilicata, discoidea, tenuis, pellucens, tenuiter plicato-striatula, lineis spiralibus impressis sat distantibus cincta, sericina, luteo-cornea. Spira vix elevata, lateribus strictis. Anfr. 6 convexiusculi, lente accrescentes, ad suturam submarginatam subgranulosi, ultimus carina acuta exserta carinatus, ad carinam brunneosens, basi paullo convexior. Apertura diagonalis, securiformis, peristoma rectum, acutum, margine supero sat protracto.

Diam. 12,5, alt. 4 mm.

Hab. in insula Bohol.

14. *Trochomorpha (Sirella) platysma* Q. et Mlldff.

T. latissime et aperte umbilicata, maxime compressa, discina, sat tenuis, subpellucens, tenuiter striatula, luteo-cornea; spira plana, vix prominula. Anfr. 7 plani, lentissime accrescentes, sutura late marginata disjuncti, ultimus carina acutissima carinatus. Apertura maxime obliqua, rhomboidea, peristoma rectum, acutum.

Diam. 15 - 16, alt. 3,5 mm.

Hab. in montibus Sierra Bullones dictis, nec non prope vicum Vilar insulae Bohol.

15. *Satsuma stenodesma* Q. et Mlldff.

T. semiobtecta perforata, elate trochiformis, tenuis, pellucida, subtiliter oblique plicato-striatula, subnitens, pallide straminea; spira valde elevata, lateribus paullum concavis, apice acutulo fusco. Anfr. 6 plani, sutura per carinam exsertam submarginata fuscolineata disjuncti, ultimus carina peracuta fusa carinatus, basi paullo convexior, lineis spirali-

libus minutissimis decussatus, antice breviter deflexus. Apertura maxime obliqua, lanceolata, peristoma initio rectum, tum breviter, basi magis, ad columellam valde expansum, supra perforationem reflexum.

Diam. 16, alt. 16, apert. lat. 10, long. 7,5, alt. 5,5 mm.

Hab. in insulis Calamianes leg. coll. indigena.

16. *Cochlostyla (Orustia) elerae Möll.*

T. globoso-conoidea, solida, tenuiter striatula, suturate viridis, sursum pallidior, taenia angusta fusca ad suturam, altera paullo latiore stramineo-lutea pone illam, tertia ejusdem coloris sub peripheriam et inter eas variis taeniolis cuticulae hydrophanae pallide stramineis picta: spira valde elevata apice plano lutescente. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus sub peripheriam paullulum subangulatus, basi planulatus, aut concolor viridis aut taeniolis nonnullis angustis cuticulae pictus. circa columellam taenia fusca intrante ornatus, antice breviter descendens. Apertura valde obliqua, ovalis, sat excisa, peristoma latiuscule expansum, reflexiusculum, nigromarginatum, intus albolabiatum. Columella lata subexcavata, oblique substricte descendens.

Diam. 29, alt 30, apert. lat. 19, long. 19, alt. 15 mm.

, 30, , 33,5 , , 20, , 20, , 16 ,

Hab. prope oppidum Gasiguran districtus Principe insulae Luzon leg. coll. indigena.

Obs. Dedicamus hanc speciem valde formosam doctissimo zoologo *Rev. P. Casto de Elera* de fauna Philippinarum bene merito.

17. *Hapalus brevis* Q. et Möldff.

T. imperforata, ovato-oblonga, subtiliter arcuatim striatula, subnitens, hyalina. Spira modice elevata lateribus convexiusculis apice obtuso. Anfr. 6 vix convexiusculi. Apertura parum obliqua, rotundato-rhomboidea, peristoma

rectum, acutum, columella valde torta, callosa, superne appressa.

Diam. 4,5, alt. 8,6 mm.

Hab. in insula Bohol.

18. *Hypselostoma quadrasi* Mlldff.

T. angustissime perforata, irregulariter pyramidalis, tenuis, subpellucida, minute striatula, opaca, brunnea. Spira elate conica apice obtuso. Anfr. 5 angulate convexi, sutura sat profunda discreti, ultimus breviter solutus et porrectus, paullum ascendens. Apertura verticalis, rotundato-tetragona, peristoma breviter expansum, tenue. Lamellae parietalis et columellaris modicae, dentibus 2 in fauce in formam crucis oppositis.

Diam. 2,5 alt. 2,5 mm.

Hab. in montibus Sierra Bullones dictis insulae Bohol.

19. *Cyclotus (Eucyclotus) mindoricus* Q. et Mlldff.

T. latissime umbilicata, discoidea, solidula, subpellucida, striatula, fulva; spira plana apice vix prominulo. Anfr. 4 $\frac{1}{2}$ teretes, ultimus paullum descendens. Apertura sat obliqua, circularis, peristoma duplex, internum rectum, externum parum expansum, ad insertionem breviter alatum. Operculum extus paullum concavum, anfr. 8 oblique plicato-striatis.

Diam. 14, alt. 6 mm.

Hab. prope vicum Bongabong insulae Mindoro. (Q. no. 3292).

20. *Cyclophorus ectopoma* Mlldff.

T. modice sed pervie umbilicata, depresso, tenuiscula, sericina, luteo fulva, maculis fuscis interdum in flammulas confluentibus ad suturam majoribus picta. Spira parum elevata apice obtuso albido. Anfr. 5 convexi, primi 3 costulis distantibus sculpti, ultimi transverse striati, lineis spiralibus elevatis et carinulis 3 cincti, pilis brevissimis deciduis hirsuti, ultimus compressus, ad peripheriam carina

sat exserta, alternatim fuso et luteo-maculata cinctus. Apert. parum obliqua, circularis, peristoma duplex, internum continuum, superne appressum, brevissime porrectum, externum interruptum, latissime expansum, subrevolutum. Operculum terminale, apertura latius, peristoma externum partim obtegens.

Diam. inaj. 28, alt. 19, apert. diam. intern. 10,5, c. perist. 16 mm. Diam. operculi 13,5 mm.

Hab. in insula Samar leg. coll. indigena.

21. *Ditropis gradata* Q. et Mlldff.

T. late, pervie et fere cylindrice umbilicata, turbinata, solidula, semipellucida, minute striatula, nitidula, flavescens. Spira gradata, sat elevata apice eroso. Anfr. qui supersunt 4 convexi, supra medium angulati, carinulis 2 superis et 1 infera cincti, sutura canaliculata disjuncti, ultimus ad peripheriam carina bene exserta acuta, altera crassiuscula circa umbilicum carinatus. Apertura modice obliqua, rotundato-rhomboida, peristoma vix expansum, obtusum, multiplicato-porrectum.

Diam. 2,66, alt. 2,5 mm.

Hab. prope vicum Vilar insulae Bohol.

22. *Leptopoma aureum* Q. et Mlldff.

T. anguste et semiobtecte umbilicata, turbinata, pro genere solida, subpellucida, subtiliter striatula, carinis 4 albis crassulis valde exsertis cincta, in interstitiis minute decussatula, opaca, aurantiaca. Spira sat elevata, fere exacte conica, apice acuto, glabro, nitente. Anfr. 6 convexiscoli, ultimus convexior, basi lineis spiralibus numerosis cinctus. Apertura obliqua, acuminato rotundata, intus laete aurea, peristoma duplex, externum sat expansum, album, internum callo crassiusculo continuum, breviter expansum, aureum.

Diam. 19,5 alt. 17,5 mm.

Hab. prope oppidum Casiguran districtus Principe insulae Luzon leg. coll. indigena.

23. *Helicomorpha pilula* Q. et Mlldff.

T. sat aperte umbilicata, subglobosa, tenuis, pellucida, costulis tenuibus valde confertis — ca. 50 in anfractu ultimo — sculpta, alba. Spira convexo-conoidea apice obtuso. Anfr. 4 teretes, sutura profunde impressa disjuncti, ultimus breviter descendens. Apertura modice obliqua, circularis, peristoma duplex, externum sat expansum, internum valde porrectum, tum breviter expansum. Operculum ut illud *H. depressae* Mlldff.

Diam. 1,5, alt. 1 mm.

Hab. in montibus Sierra Bullones dictis insulae Bohol.

24. *Helicomorpha linguifera* Q. et Mlldff.

T. modice et semiobtecte umbilicata, globoso-conoidea, tenuiscula, valde confertim costulato-striata, sericina, alba; spira sat elevata, convexo-conoidea, apice acutulo. Anfr. 4 teretes, ultimus vix descendens. Apertura parum obliqua, circularis, peristoma vix expansum, multiplicatum, porrectum, ad umbilicum dilatatum, processu linguaeformi patens.

Diam. 1,4, alt. 1,4 mm.

Hab. prope vicum Vilar insulae Bohol.

25. *Arinia pallida* Mlldff.

T. rima'a, subcylindrico-ovata, tenuis, pellucida, pallide flavescens aut albida; spira obtuse conoidea apice mucronato, obliqua. Anfr. 5 turgidi, costulis sat distantibus tenuissimis filiformibus, in anfractu penultimo evanescentibus sculpti, ultimus initio confertim striatus, striis pone aperturam paullo magis distantibus. Apertura fere verticalis, circularis, peristoma duplex, externum paullum expansum, internum porrectum.

Alt. 3,2 diam. 2,1 mm.

Hab. in districtu Benguet insulae Luzon leg. cl. W. Micholitz.

26. *Arinia manopleuris* Q. et Mlldff.

T. angustissime perforata, cylindrica, tenuis, pellucida, fulvescens. Spira cylindrica, superne breviter attenuata apice plano. Anfr. 5 perconvexi, sutura profunda disjuncti, primi 3 costulis filiformibus valde distantibus sculpti, penultimus magis distanter costatus, costulis finem versus evanescitibus, ultimus glabratus, in prima tercia parte modice constrictus. Apertura fere verticalis, circularis, peristoma duplex, externum sat late expansum, internum breviter porrectum, subexpansum.

Diam. 2, alt. 3,75.

Hab. prope vicum Gasan insulae Marinduque leg. coll. indigena.

27. *Palaina hidalgoi* Q. et Mlldff.

T. sinistrorsa, vix rimata, ovata, solidula, sat distanter costulata, albida. Spira ovato-acuminata apice submuertonato, acutulo, glabro. Anfr. 7 conyexi, ultimus initio sat constrictus, tum distortus, deflexus et denuo ascendens, haud solitus. Apertura aliquantulum retrorsum inclinata, subcircularis, peristoma incrassatum, multiplicatum valde expansum, superne appressum, ad columellum sinuatum, reflexum, rimam obtegens.

Diam. 1,75, alt. 3 mm.

Hab. in montibus Sierra Bullones dictis insulae Bohol.

28. *Diplommatina (Sinica) boholensis* Q. et Mlldff.

T. rimata, ovato-acuminata, tenuis, pellucida, costulis filiformibus flexuosis sat distantibus sculpta, fulva. Anfr. 8 convexi, primi 6 spiram subregulariter conicam apice acuto efficienes, penultimus magnus, ultimus decrescens, paullum

distortus, antice ascendens. Apertura paullum obliqua, subauriformis, peristoma duplex, utrumque valde expansum, tenue, sulco profundiusculo ab altero separatum. Lamella columellaris humilis, spiraliter recedens, palatalis brevissima, supra columellam conspicua.

Diam. 2,5, alt. 3,5 mm.

Hab. prope vicos Loboc, Vilar et Sierra Bullones insulae Bohol.

29. *Diplommatina (Sinica) crystallodes* Q. et Mlldff.

T. rimata, ovato-oblonga, tenuis, pellucida, costulis tenuissimis distantibus sculpta, nitidula, hyalino-flavescens. Spira sat elongata apice acutulo. Anfr. 6½ modice convexi, ultimus paullum distortus antice ascendens. Apertura parum obliqua, subcircularis, peristoma crassum, duplex, externum sat expansum, ad columellam descrescens, angulum distinctum formans, internum valde porrectum, subexpansum. Lamella columellaris humilis, palatalis valida, brevis.

Diam. 1, alt. 2,5 mm.

Hab. prope vicos Vilar et Sierra Bullones insulae Bohol.

30. *Tricula expansilabris* Q. et Mlldff.

T. rimata, pyramidata, solidula, subpellucida, vix striatula, opaca, albida; spira subregulariter conica apice acutulo. Anfr. 6 planulati, sat celeriter accrescentes, sutura appressa sat late marginata disjuncti, ultimus spiram aequans, confuse subangulatus. Apertura paullulum retrorsum inclinata, ampla, oblique ovalis, peristoma latiuscula expansum, haud reflexum, labiatum, callo forti continuum.

Diam. 3, alt. 5 mm.

Hab. in diversis flaviis insulae Bohol.

31. *Bythinia quadrasi* Mlldff.

T. anguste umbilicata, depressa, solidula, glabra, virescenti-alba; spira parum elevata, late conoidea. Anfr. 3 con-

vexiusculi, ultimus bene convexus, non descendens. Aper-tura modice obliqua, acuminato-ovalis, peristoma rectum, obtusum. Operculum normale.

Diam. 2.75, alt. 2 mm.

Hab. prope vicum Inabanga insulae Bohol.

Zur Kenntniss der südamerikanischen Voluta und ihrer Geschichte.

Von

Dr. H. von Ihering.

Von den Küsten des mittleren und nördlichen Brasilien kennt man bis jetzt drei Arten von Voluta: *V. musica* L., *V. hebraea* L. und *V. americana* Reeve. Erstere ist auch von den Antillen bekannt, daher ihr Vorkommen nicht überrascht. *Vol. americana*, wozu Cleryana Petit, nur von Brasilien bekannt, wird von Crosse zur Section Alcithoë gezogen. *Vol. hebraea* L. ist eine westafrikanische Art, die Kobelt von Alagras und von Rio erhielt.

Die Eintheilung der diversen Voluta-Arten in Sectionen wie sie von Grosse in seinem Cataloge (Journ. Conch. 1871 p. 263 ff.) und entsprechend von Kobelt (Jahrb. Deutsch. Mal. Ges. IV. 1877 p. 301.) vertreten wird, ist neuerdings von Dall¹⁾ durch eine völlig abweichende ersetzt worden, welche auf die Beschaffenheit des Nucleus gegründet ist. Dieser ist entweder kalkig und dauernd, oder hornig und hinfällig. In letzterem Falle überwuchert eine unregelmässige Kalkablagerung die Narbe. Ersteren Fall repräsentirt Dalls volutoide, letzteren Dall scaphelloide Serie. Zu ersterer gehören Volutilithes, Lyria, Voluta Melo, zu letzterer

¹⁾ Transact. Wagner Free Institut Philadelphia Vol. III. 1890 pag. 57 ff.

ein anderer Theil von Voluta und Cymba. Da bei vielen Arten die Spitze des Nucleus sich nicht gut erhält, so ist eine Durchführung von Dalls Eintheilung zur Zeit noch nicht möglich. Ich kann mich meinerseits der Empfindung nicht erwehren, dass diese neue Eintheilung fast ganz auf biologische Momente gestützt ist, je nachdem der Embryo sich in kleinen oder in grossen Eikapseln oder im Uterus entwickelt, und dass durch diese einseitige Behandlung zusammengehörige Formenkreise auseinander gerissen werden. Das Fehlen des Apex ist ein negativer Charakter, der möglicher Weise auf verschiedene Weise zu Stande kommen kann — ein Gedanke zu dem mich die Untersuchung von *Voluta muricina* Lam. führt. Auch finde ich, dass Dall viel zu viele selbstständige Gattungen schafft. Es handelt sich doch schliesslich um eine sehr natürliche Gruppe mit Übergangsformen. Hier werden wir erst dann genaues sagen können, wenn die Anatomie und Entwicklung der Hauptgruppen überall bekannt ist. Die anatomischen Unterschiede zwischen *Voluta* und *Volutolyria* (*V. musica*) auf Radula und Deckel basirt, sind massgebend um diese zwei Gattungen anzuerkennen, wozu conchyliologisch es stimmt, dass *Volutolyria* nur Arten mit kleinen „trochiformem“ Apex enthält.

Nach der Dall'schen Auffassung kommen an der brasilianischen Küste nur Arten von *Voluta*, an jener von Argentinien nur solche von *Scaphella* vor, und diess würde gut den Thatsachen entsprechen, wenn nicht zu *Scaphella* auch die mexikanische *Vol. junonia* gehörte. Es zeigt sich nämlich, dass die Voluten von Südbrasilien und Argentinien alle zu einer einheitlichen Gruppe gehören, die man seither *Cymbiola* Sws. nannte, während sie nach Dall *Scaphella* heist. Dabei lässt Dall die nur auf eine Species (*V. angulata*) gegründete Section *Volutella* nicht gelten, wie ich denke mit Recht, da sie eben nur etwas aberrantes Glied dieser Gruppe ist.

Ueber diese Gruppe Cymbiola haben wir neuerdings eine wichtige Arbeit von Lahille¹⁾ erhalten, die auf 12 Tafeln eine grosse Reihe von Formen abbildet. Lassen wir die von Lahille erwähnte, aber nicht in Argentinien vorkommende *Vol. festiva* Lam., eine afrikanische Art, bei Seite, so haben wir es im Wesentlichen mit folgenden Arten zu thun: *Vol. colocynthis* Ch. (*brasiliiana* Sol), *Vol. angulata* Sws., *Vol. ancilla* Sol., *Vol. magellanica* Ch. und *Vol. Becki* Brod. Letztere Art ist von mir auch in Rio Grande d. S. angetroffen. Lahille nennt sie *V. fusiformis* Kien.; das stimmt, doch ich kann nicht beurtheilen, ob letzterer Name bleibt, da *V. fusiformis* Swains eine andre Art von Tasmanien ist. *Vol. tuberculata* Wood und *subnodososa* Leach stelle ich mit Kobelt als Varietäten zu *magellanica*, ebenso einige neue von Lahille beschriebene Varietäten. *Vol. magellanica* die, glaube ich, an der Küste an Rio Grande d. S. nicht vorkommt, ist offenbar ebenso wie *Vol. brasiliiana* eine extrem variabile Art. *Vol. angulata* und *brasiliiana* sind an der Küste von Rio Grande sehr gemein, fehlen aber schon in *St. Catharina* bei Desterro und weiter nördlich.

Noch möchte ich hier die Aufmerksamkeit meines Collegen Lahille auf eine ihm nicht bekannte Art *Vol. Ferussaci Donovan* lenken, als deren Fundort Kobelt die Magellanstrasse angibt, was dem Aussehen der Art nach richtig sein dürfte. Diese Art scheint mir aber eine Varietät zu sein von *Vol. brasiliiana* und zwar jene die Lahille *Vol. oviformis* nennt.

So haben wir allgemein gesprochen an der brasilianischen Küste ächte Voluten, mit westindischen oder westafrikanischen Arten übereinstimend, in Chile und Peru und weiter nörd-

¹⁾ E. Lahille Contribucion al estudio de las Volutas argentinas I. Revista del Museo de La Plata Tom. VI. 1895 pag. 293 ff.

lich gar keine Voluten und von Rio Grande d. S. zur Magellansstrasse Vertreter der Gruppe *Cymbiola* (oder *Scaphella*).

Es ist nun interessant die Entwicklung dieses Verhältnisses zu studiren, wozu die Materialien nur zumal in Anbetracht der hier mitgetheilten Thatsachen ausreichen. In der Kreide von Brasilien existiren Arten von *Volutilithes*, die von White beschrieben wurden. In Chile finden sich im Tertiär zahlreiche *Voluta*-Arten, die in Philippi's ausgezeichnetem Werke gut beschrieben sind. Dall stellt sie alle zu *Volutilithes* und hält ihr Alter für pliocän. In beiden Punkten muss ich ihm widersprechen. Die Nucleuspartie der Schale ist an den von Philippi abgebildeten Exemplaren schlecht erhalten. Ich habe aber eine Art dieser Gruppe aus dem argentinischen Tertiär, bei welcher wenigstens ein Theil des Apex erhalten ist, dessen relativ bedeutende Breite den Gedanken an *Volutilithes* ausschliesst. Alle diese Arten gleichen, auch in dieser Hinsicht, sehr den *Aleithoë*-Arten, so dass ich sie zu dieser Gruppe stelle, in der sie nur durch die etwas geringere Zahl der Spindelfalten (2—3) eine Sonderstellung einnehmen.

Von den sechs chilenischen Arten die Philippi bespricht, ist eine, *Vol. obesa* Phil., etwas abweichend, und vielleicht zu *Cymbiola* zu ziehen. Die anderen sind alle schlanke Formen mit Spirallinien, bald mit, bald ohne Längsrippen. Eine der Arten, *V. gracilis* Phil., hat einen schon im Genus *Voluta* vergebenen Namen und mag daher *V. gracilior* heißen. Von den anderen ist *Vol. triplicata* Sow. vielleicht die Stammform der brasilianischen *Leucozonia brasiliiana* Orb. und dürfte dann auch im argentinischen Tertiär noch zu erwarten sein. Seither kannte man aus letzterem keine Volutaarten ausser *V. alta* Sow. von Santa Cruz, die auch in Chile, in Navidad, gefunden wurde. Neuerdings hat mir *Florentino Ameghino* die von seinem Bruder gesammelten Tertiär-Conchylien von Patagonien zur Bearbeitung übergeben

und unter diesen finden sich zwei Volutaarten der eocänen St. Cruz Formation, deren Diagnosen ich hier mittheile.

Voluta quemadensis sp. n.

Vol. testa fusiformi, spira exserta elongata, anfractibus duobus primis papillam sculptam formantibus, anfractibus caeteris quatuor transversim striatis, longitudinaliter cestatis, costis subobsoletis, aequidistantibus, suturam et basin versus evanidis, columella biplicata, apertura oblonga parviuscula.

Long. 60 mm., diam. 20 mm.

Jegua Quemada, format. Santacruzensis, Patagonia.

Voluta ameghinoi sp. n.

Vol. testa subgloboso-ovato ventricosa, spira brevissima, apice papillari; anfractibus lineis incrementi rude notatis, margine nodis squamiformibus magnis ornatis; apertura patula, columella biplicata.

Long. 156 mm.

La Cueva, format. Santacruzensis, Patagonia. Diese Art steht der *Vol. brasiliiana* Sol. sehr nahe, unterscheidet sich von ihr durch die Form der Knoten und die weit-heraufgezogene Mündung.

Voluta ameghinoi steht der *V. brasiliiana* sehr nahe und ist sicher deren Vorläufer. Die anderen Arten des Tertiären sind wie Philippi mit Recht hervorhob, die Vorläufer von *Vol. ancilla* und den anderen Arten von Patagonien. Der Entwicklungsgang ist dabei: Größenzunahme, Übergang der sehr schlanken Gestalt in eine gedrungenere, Verschwinden der Spiralskulptur, die indessen an den ersten Windungen bei *Vol. ancilla* und Becki noch deutlich erkennbar ist. Die Cymbiola-Arten der Südspitze sind daher eine ebenda entstandene Gruppe. Dall hält zwar die betreffenden chilenischen Ar'ten für pliocaen, aber ohne zwingenden Grund. Eine klare Eintheilung des chilenischen Tertiären ist zur Zeit noch nicht möglich, es ist daher nötig, soweit identische

und höchst naheverwandte Arten in Patagonien vorkommen, auf die dortigen besser studirten geologischen Verhältnisse Rücksicht zu nehmen, und die weisen uns nach Ameghino auf Eocän, jedenfalls aber auf das ältere Tertiär hin.

So können wir für die *Cymbiola*-Arten der amerikanischen Südspitze ihre Entstehung aus *Alcithoë*-artigen Urformen nachweisen. Ob diese Formen der volutoiden oder der *scaphelloiden* Serie Dalls angehören wissen wir nicht, und wenn mir es an Material fehlt um zu Dalls bahnbrechender Studie Stellung zu nehmen und ich einige bezügliche Zweifel nicht unterdrücken wollte, so bin ich auch fern davon die Bedeutung dieser Eintheilung zu unterschätzen. Kommt sie doch von unserer ersten Autorität auf dem Gebiete der Erforschung amerikanischer recenter wie tertiärer mariner Conchylien.

Diese Ergebnisse, denen bald weitere sich anschliessen werden, geben uns die Hoffnung, dass wir in Bezug auf die Ableitung der marinen Fauna Südamerikas bald in ähnlicher Weise festen Boden gewinnen können, wie diess durch Ameghino geschehen ist für die Herkunft der neotropischen Säugetiere. Diess wird um so wichtiger sein, als man gegenwärtig sehr geneigt ist aktiven oder passiven Wanderungen der Mollusken im Zustande des Larvenlebens eine viel zu hohe Bedeutung beizumessen. Für Wallace bildet der Ocean nicht einmal für Binnenconchylien eine trennende Schranke. Freilich giebt es heute wohl kaum irgend einen Conchyliologen der z. B. bezüglich Madeiras den Wallace'schen Standpunkt einnimmt. Und nun kommen erst die Plankton-Studien mit vermeinten Reisen der Larven von Ost- nach Westindien!

So volle Beachtung man solchen Hypothesen auch zollen kann, so ist doch andererseits gewiss nicht zu bestreiten, dass Thiergattungen, welche schon zur Kreidezeit oder im Beginn des Tertiärs existirt haben, sich auch an

Ort und Stelle weiter entwickelt und einschneidende geographische Veränderungen überdauert haben können. Diesen Standpunkt habe ich, veranlasst durch Studien über Süßwasserfauna, seit Jahren vertreten und seine Berechtigung erweist sich auch auf diesem neuen Gebiete. Zahlreiche *Struthiolaria*-Arten im chilenischen und argentinischen Tertiär weisen uns in gleicher Weise auf einstigen Küsten-Zusammenhang mit Neu Seeland und Australien hin wie R. Tate's. Nachweis der Gattung *Concholepas* im ausstralischen Eocän während die betreffenden Arten jetzt auf Chile beschränkt sind.

Im Allgemeinen herrschen im argentinischen Tertiär dieselben Gattungen, die wir auch heute noch da antreffen und was erloschen ist weist auf antarktische Beziehungen hin. Dagegen fehlen Strombidae, Harpidae, Cypraeidae, Conidae etc. soweit wir seither wissen, auch unter Berücksichtigung des neuen in meinen Händen befindlichen Material, ganz. Die Geschichte der argentinischen marinen Fauna ist daher eine recht eigenartige gewesen, recht im Gegensatz zu Europa wo indische Typen das ältere Tertiär beherrschen.

S. Paulo, 21. Juni 1896.

**Die Conchylienfauna der altpleistocaenen Travertine
des Weimarisch-Taubacher Kalktuffbeckens**
(I. Nachtrag).

Von

Dr. phil. Arthur Weiss (Weimar).

In der im vorjährigen Bände dieser Zeitschrift veröffentlichten Abhandlung habe ich jetzt nach neuen Aufsammlungen noch folgendes nachzutragen.

s*

(W = Weimar, T = Taubach, E = Ehringsdorf (zwischen W. u. T. gelegen.)

Genus *Limax*, Müller.

Limax (Heynemannia) maximus L. s. s.

Neu für W.

Genus *Vitrina*, Draparnaud.

Vitrina (Semilimax) diaphana Drp. s. s.

Neu für W.

Genus *Hyalinia*, Féussac.

Hyalinia (Polita) cellaria Müll.

Neu für T.

Hyalinia (Polita) nitens Mich.

Neu für T.

113. *Hyalinia (Polita) nitidula* Drp.

Von Sandberger für W. nachgewiesen (war in der vorigen Abhandlung vergessen worden.)

Hyalinia (Comulus) fulra Müll.

var. *Mortoni* Jeffr. Neu für W. und T.

var. *praticola* Reinh. Neu für W. und T.

Genus *Helix*, Linné.

Helix (Eulota) fruticum Müll.

var. *turcica* Slavie. Neu für T.

Helix (Xerophila) striata Müll. Neu für E.

var. *Nilssoniana* Beck Neu für E.

Helix (Helicogena) pomatia L. Neu für E.

Helix (Tachea) nemoralis L. Neu für E.

Genus *Buliminus*, Ehrenberg.

Buliminus (Chondrula) tridens Müll. h. Neu für E.

Buliminus (Napaenus) obseurus Müll. s. Neu für T.

Genus *Cochlicopa*, Risso.

Cochlicopa (Zua) lubrica Müll.

var. *columna* Gless. Neu für W.

var. *minima* Siem. Neu für T.

var. *major* Kregl. Neu für T.

Genus *Pupa*. Draparnand.

Pupa (*Oreula*) *doliolum* Brug. s. s. Neu für T.

var. *biplicata* a. s. s. Neu für W. und T.

Pupa (*Spyradium*) *edentula* Drp. s. s. Neu für T.

Pupa (*Vertigo*) *alpestris* Alder Neu für T.

Bei *Pupa antivertigo* Drp. ist „von Pohlig angegeben“ zu streichen.

Genus *Carychium*. Müll.

Carychium minimum Müll.

var. *inflata* Andreæ z. h. Neu für W. und T.

Genus *Limnaea* Lamarck.

Limnaea (*Gulnaria*) *peregra* Müll. Neu für Weimar.

„Von Pohlig angegeben“ ist zu streichen, da der selbe in seiner Abhandlung diese Art nur von Mühlhausen angiebt.

Limnaea (*Limnophysa*) *palustris* Müll.

var. *corvus* Gm. (schon von Sandberger für W. nachgewiesen.)

var. *turricula* Held Neu für W.

var. *fusca* Pfr. Neu für W.

Limnaea (*Limnophysa*) *truncatula* Müll.

var. *oblonga* Puton Neu für W. und T.

var. *ventricosa* M. T. Neu für W. und T.

Genus *Planorbis*. Guettard.

114. *Planorbis* (*Gyrorbis*) *vorticulus* Troschel s. Neu für W.

Bis jetzt nur noch von mir in Burgtonna fossil nachgewiesen.

Diese Art ist für das Pleistocaen neu.

115. *Planorbis* (*Gyranlus*) *albus* Müll. s. Neu für T.

Genus *Physa*, Drp.

Physa fontinalis L. s. Neu für T.

Genus *Bithynia*, Gray.

Bithynia leachi Shep. Neu für T.

Genus *Pisidium*, C. Pfeiffer.

116. *Pisidium (Flumininea) annicum* Müll.

Neu für W.

Ferner sind noch folgende Beifügungen zu machen:

Bei *Helix laticida* L. *Helix striata* M. var. *Nilssoniana* Beck und *Helix Canthensis* Beyr. ist zu setzen: durch Sandberger nachgewiesen.

Eine Najadee aus Turkestan.

Von

Dr. W. Kobelt.

Anodonta sogdiana n. sp.

Concha elongato-ovata, antice compressa, postice hians, sat tenuis seu solidula, nitida, medio griseo-viridis, umbones versus aurantiaca, postice late castaneo triradiata, medio et antice obsolete radiatim lineata, prope umbones laeviuscula, dein profunde concentrice sulcata, sulcis intus translucentibus, versus oras irregulariter sulcato-striata, fere polita, striis in area subfilose elevatis. Margo superior rectilineus, valde ascendens, cum antico depresso rotundato angulum formans, ventralis bene arcuatus cum postico primum exciso rostrum rectiusculum truncatum formans. Umbones ad $\frac{1}{3}$ longitudinis positi, depressi, acuti, prope apices obsolete plicati; area alatim compressa; ligamentum crassum, semiobtectum. Latus internum album, umbones versus iridescens; impressiones

musculares anteriores 2 magnae distinctae, sed parum profundae; callus marginalis distinctus, $\frac{2}{3}$ longitudinis occupans.

Long. 72, alt. max. 47, crass. 25 mm.

Im Serafschan, drei Meilen von Buchara, mir von Rolle zur Veröffentlichung mitgetheilt.

Mit der Entdeckung einer Anodonta in den turkestanischen Gewässern wird wieder ein geographisches Rätsel aus der Welt geschafft; es werden Najadeen im Jaxartes und Oxus wohl auch nicht fehlen. Die Species gehört übrigens nicht in den Formenkreis der europäischen Arten.

To the Editor of the Nachrichtsblatt der deutschen malako-zoologischen Gesellschaft.

British Association, Burlington House, London, W.

Juli. 1896.

DEAR SIR,

I am desired by the Committee of the British Association on Zoological Bibliography and Publication to draw your attention to the following statement:—

It is the general opinion of scientific workers, with which the Committee cordially agrees:

(1) That each part of a serial publication should have the date of actual publication, as near as may be, printed on the wrapper, and when possible, on the last sheet sent to press.

(2) That authors' separate copies should be issued with the original pagination and plate-numbers clearly indicated on each page and plate, and with a reference to the original place of publication.

(3) That authors' separate copies should not be distributed privately before the paper has been published in the regular manner.

The Committee, however, observes that these customs are by no means universal, and constant complaints are made that one or other of them is not put into force. In case the Publication or Society with which you are connected does not comply with these desiderata, the Committee ventures to ask whether it would not be possible for it so to comply in future. Should you, however, have any good reasons against the adoption of these suggestions, the Committee would be much obliged if you would kindly inform them of your reasons, in order that they may be guided in their future action.

The Committee further begs to ask for your co-operation in the following matter. There are certain rules of conduct upon which the best workers are agreed, but which it is impossible to enforce, and to which it is difficult to convert the mass of writers. These are:

4. That it is desirable to express the subject of one's paper in its title, while keeping the title as concise as possible.
5. That new species should be properly diagnosed and figured when possible.
6. That new names should not be proposed in irrelevant footnotes, or anonymous paragraphs.
7. That references to previous publications should be made fully and correctly, if possible in accordance with one of the recognized sets of rules for quotation, such as that recently adopted by the French Zoological Society.

The Committee ventures to point out that these and similar matters are wholly within the control of editors (*rédaction*) and publishing committees, and any assistance which you can lend in putting them into effect will be valued, not merely by the Committee, but, we feel sure, by zoologists in general.

Any remarks on the above matters with which you may favour the Committee may be addressed to me at the Natural History Museum, Cromwell Road, London, S.W.

I have the honour to be,

Yours obediently,

(Signed)

F. A. BATHER,

Secretary of the British Association Committee on
Zoological Bibliography and Publication

Literaturbericht.

The Nautilus Vol. IX.

- p. 124. Sterki, Dr. V., New North American Pisidia (trapezoideum n.)
p. 125. Sargent, H. E., Annotated List of the Mollusca found in the vicinity of Clear Water, Wright Co., Minnesota. Pt. II.
p. 129. Keep, Josiah, West Coast Species of *Haliotis*.

L'Echange, Revue Linnéenne. Lyon; Année XI.

- No. 129 p. 98. Locard, Arnoul, Notices conchyliologiques. XXIII. A propos de l'*Helix variabilis*. — No. 130 p. 109. XXXIV. Une Physe portugaise nouvelle (Ph. paulinoi), wahrscheinlich dieselbe Form, welche Morelet als *contorta* beschrieben hat.

Le Naturaliste, Année 18.

- p. 43. Jousseaume, Dr., Description de Coquille nouvelle (*Pusionella testabilis* von Aden, auf ein unausgewachsenes Ex gegründet).

Monterosato, March. di, Note intorno alle Najadi Siciliane.

In *Naturalista Siciliano* (Nuova Serie) Gennaio 1896.

Von den beschriebenen Arten wird *Unio benoiti* Bgt. als exotisch ausgeschieden. Anerkannt und im Holzschnitt abgebildet werden: *U. Gargottae* Phil., aus dem Belice. — *U. bitortus* n. aus dem Fiume Torto: — *U. biformis* aus dem Belice: — *U. bivonianus* Bgt. = *Turtonii* Phil. nee Payr., Anapo: — *U. siculus* Swains. = *aradae* Phil. = ? *lobata* Jan, Lentini: — *U. bipartitus* n., Marcellino bei Augusta: — *caficianus*, Bgt., Anapo, nebst var. *Boccardi*: — *monterosati* Bgt., Lentini.

Schmetz, J. D. E., Schnecken und Muscheln im Leben der Völker Indonesiens und Oceaniens. Ein Beitrag zur

Ethnoconchologie. Vorget. in der anthropol. Section der Versammlung der Brit. Assoc. for the Adv. of Science in Oxford, 14 Aug. 1894.

Eine sorgfältig gearbeitete Uebersicht aller bis jetzt bekannt gewordenen Arten der Verwendung von Molluskenschalen zu Geräthen, Waffen, Schmuck, Geld etc. zunächst auf Grund des Museum Godeffroy und des Leidener Museums, sowie der einschlägigen Literatur. Die systematische Aufzählung der verwendeten Arten beläuft sich auf 100.

Baker, Frank Collins, Preliminary Outline of a new classification of the Familia Muricidae. In Bullet. Chicago Acad. N. Sc. II No. II.

Der Autor vereinigt unter Muricidae die Muricinae, Purpurinae und Coralliophilinae. Bei den Muricinae werden als Gattungen anerkannt *Murex* L., *Eupleura* Ad., *Xanthochorus* Fisch., *Forreria* Jouss., *Trophon* Montf., *Ocinebra* Leach, *Vitularia* Swains., *Muricidea* Swains., *Urosalpinx* Stimp., *Typhis* Montf.; — bei den Purpurinae: *Purpura* Brug., *Rapana* Schum., *Cymia* Mösch (= *Cuma* Humphs.) Jopas Ad., *Vexilla* Swains., *Pinaxia* Ad., *Acanthina* Fischer, *Pentadactylus* Klein, *Concholepas* Lam., — bei den Coralliophilinae: *Rhizochilus* Steenstr., *Latiaxis* Swains. (einschliesslich *Coralliophila* und *Pseudomurex*), *Leptoconchus* Rüpp., *Magilus* Montf., *Rapa* Klein. — Zu den Bucciniden verwiesen werden *Pseudoliva* und *Melapium*.

Proceedings of the United States National Museum. Vol. XVIII.

- p. 1. Dall, W. H., Diagnoses of new Mollusks from the Survey of the Mexican Boundary. — *Xen Patula strigosa* var. *concentrata* p. 1; *Epiphagmophora arizonensis* p. 1; — *Ep. hachitana* p. 2; — *Polygyra chiricahuana* p. 2; — *P. mearnsii* p. 2; — *Holospira* (*Metastoma*) *crossei* p. 4; — *H. (Met.) pilsbryi* p. 4; — *H. (Distomospira) bilamellata* p. 4; — *H. (Haplostenna) mearnsii* p. 4; — *H. (Bostrichocentrum) veracruziana* p. 4; — *Unio Mitchellii* Stimpson p. 5, Texas, Neu Mexiko; — *Epiphagmophora arnheimi* = *Arionta californiensis* var. *ramentosa*, small variety in Binney, Bull U. S. Nat. Mus. XXVIII, 1885 p. 133 fig. 8; — *Cerion* (*Mainardia*) *pineria*, Fichteuinsel, p. 6.
- p. 7. Dall, W. H., Diagnoses of new Species of Mollusks from the West Coast of America. — *Xen Gallistoma iridium*, California bis Panama p. 7; — *Anaplocamus borealis* n. gen. et spec. wie

eine Anculosa aussehend aber wahrscheinlich zu den Trichotropiden gehörend, p. 8; — *Solariella nuda* p. 9; — *Sol. ceratophora* p. 9; — *Rimula (?) expansa* p. 10; — *Emarginula flabellum* p. 10; — *Choristes carpenteri* p. 10; — *Benthodolium pacificum* p. 11; — *Phos cocosensis* p. 11, Panama; — *Cominella brunneotincta*; Panama, p. 11; — *Fusus (?) rufocaudatus* p. 12; — *Tractolira sparta* n. gen. et spec., wahrscheinlich eine degenerierte Abyssalform der Volutiden, in 4500 m. Tiefe gedrakt; — *Scaphella benthalis*, in 3600 m. bei Panama, p. 13; — *Cancellaria centrota*, Panama, p. 13; — *Cone. jo.* Panama, p. 14; — *Pleurotoma (Steiraxis n.) aulaca* p. 14; — *Pleurotomella castanea* p. 15; — *Nucula iphigenia* p. 15; — *Limopsis compressus* p. 16; — *Philobrya atlantica*, von Spring Bay Argentinien, p. 16; — *Callocardia lepta* p. 17; — *C. ovalis* p. 18; — *C. gigas* p. 18; — *Callogonia angulata* p. 19; — *Periploma stearnsi* p. 19; — *Per. carpenteri* p. 20.

- p. 21. Dall, W. H., Diagnoses of new tertiary Fossils from the Southern United States. — *NeuCarolia (Wakullina n. subg.) floridina*, Miocän; — *Ostrea podagrina*, falco, Eocän; — *Turritella alcida*, Unter-Miocän; — *Actaeon chipolanus*; — *Act. (Rict.) fusulus*; — *Act. mayakkanus*; — *Ringicula semilimata*, chipolana; — *Tornatina incisula*, myrmecoon, persimilis, Fischeri, gabbi; — *Retusa chipolana*; — *Scaphander langdoni*; — *Atys oedemata*; — *At (Acrost.) gracilis*, salina, obscurata; — *Cyllichnina decapitata*, quer-cinensis, duplinensis, microtrema; — *Bullina (Alderospira n.) chipolana*; — *Hainaea pompholyx*; — *Terebra (Hastula) houstonia* Harris mss.; — *T. gabbi*, hartensis, inornata, (*Acus*) curvilineata, sincera, anutra, langdoni, chipolana; — *Conus chipolanus*, isomitratus, demiurgus; — *Pteropurpurea postii*; — *Gyrodes (Gyrodisca n.) duplinensis*; — *Umbonium (Solariorbis) floridanum*, undula, duplinense.

- p. 295. Simpson, Charles T., the Classification and Geographical distribution of the Pearly Fresh-Water Mussels. With Plate IX. Wir empfehlen diese vorzügliche Arbeit, welche eines Auszugs nicht wohl fähig ist, unseren Lesern aufs Dringendste.

- p. 381. Simpson, Charles T., Description of four new triassic Unios from the Staked Plains of Texas. *NeuUnio subplanatus*, dumblei, graciliratus und dockumensis. Sie gehören zu eben so viel verschiedenen Gruppen und beweisen, dass die Gattung *Unio*, der sie ganz unzweifelhaft zuzurechnen sind, zweifellos im Trias schon eine lange Vergangenheit hinter sich hatte.

Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, les Mollusques Marins du Roussillon. Tome II Fasc. XI.

Enthält in gewohnter sorgfältiger Behandlung die Gattungen Mactra, Lutraria, Corbula, Saxicava, Gastrochaena und Polas. Einige neue Varietäten, keine neuen Arten.

The Journal of Malacology. Vol. V. No. 2.

p. 17. Smith, Edg. A., on some Land Shells from New Guinea and other neighbouring Islands, with descriptions of new species. With pl. 2. — Neu Charopa nigrofusca p. 18 t. 2 f. 10—12, Deutsch N. G.; — Macrochlamys papuana p. 18 t. 2 f. 8—9; — Omphalotropis papuensis p. 19 t. 2 f. 19, Orangerie Bay, — Pupinella strubelli p. 21 t. 2 fig. 13, Djamna Isl.; — Helicina pachystoma p. 21 t. 2 f. 14, Neu Pommern. Ferner sind zum erstenmal abgebildet Nanina infelix fig. 6—7; — Pap. aerope fig. 1—2; — Pap. hero fig. 3—4; — Pap. janthe fig. 5.

Garstang, W., on Doris maculata a new species of Nudibranchiate Mollusca found at Plymouth. In Journ. Mar. Biol. Ass. n. s. vol. 4 p. 167.

Brusina, Sp., Bemerkungen über macedonische Süßwasser-Mollusken. In Compte-Rendu Congrès intern. Zoologie Leyde 1895 p. 365.

Planorbis macedonicus Stur. steht dem tertiären Pl. radmanesti Fuchs sehr nahe, Pl. paradoxus dem Choanomphalus maackii; Emmericia munda Stur. wird zur Gattung Ginaia erhoben, seine Pyrgula annulata bildet eine besondere Gattung und Art Chilopyrgula sturanyi Brus.; seine P. thiesseae wird als gute Art P. macedonica getauft und ist keine Diana.

Brusina, Sp., Faunistisches von der Adria-Excursion der Yacht Margita. Ibid. p. 371.

Die der kroatischen nautischen Schule in Buccari angehörende Yacht Margita hat im Quarnero, im See von Prokljan und in der Boeche di Cattaro zoologische Untersuchungen angestellt. In dem Quarnero wurden Pecten maximus und Mytilus galloprorincialis croatiens gefunden, die als nordische Einwanderer zu betrachten sind; noch mehr eine Anzahl Polychaeten, die sonst weder in der Adria, noch überhaupt im Mittelmeer vorkommen. Die Untersuchung des sog. Prokljan-Sees, einer Meeresbucht zwischen Seardona und Sebenico, ergab 21 für die Adria neue Arten, obwohl nur in ganz geringen Tiefen gearbeitet wurde.

Sturany, Dr. R., Mollusken I. (Prosobranchier, und Opisthobranchier, Scaphopoden; Lamellibranchier) gesammelt von S. M. Schiff Pola 1890—94. Sep. Abzg. aus Bd. XIII. der Denkschr. Math. phys. Classe Akad. Wissensch. Mit 2 Tafeln.

Die Untersuchungen der Pola bestätigen im Grossen und Ganzen das Fehlen einer eigenen Abyssalfauna im Mittelmeer. Nur fünf Arten von den gesammelten sind der Tiefe unter 1000 m. eigen, alle neu und an einer Stelle nördlich von Alexandrin in 2420 m. Tiefe gedrakt. Die Tiefenregionen sind im allgemeinen sehr arm an Molluskenleben; meist ergeben die Drakezüge gar keine Mollusken, auch die in 600 m. zeigten eine relativ arme Fauna. Ein Dutzend Arten wurden zum erstenmal in der östlichen Hälfte des Mittelmeers nachgewiesen, doch kann *Natica fusca* nicht zu diesen gerechnet werden, wie St. thut, da sie von der Ostküste Siziliens längst bekannt ist. Im Ganzen wurden erbeutet im östlichen Mittelmeere 76, in der Adria und der Strasse von Otranto 63 zusammen 120 Arten. Davon werden als neu beschrieben und vorzüglich abgebildet: *Fusus bengasiensis* p. 8. t. 1, f. 1, 2, ein subfossiles Exemplar aus 680 m, nach meiner Ansicht noch zu *rostratus* zu rechnen: — *Scalaria cerigottana* p. 9, t. 1, f. 3, 4, ebenfalls nur ein todes Exemplar aus 160 m.: — *Taranis alexandrina* p. 11, t. 1, f. 8, 9, ein unfertiges Stück aus 2420 m.; — *Defrancia implicisculpta* p. 12, t. 1, f. 10—20, ein Stück von derselben Stelle: — *Lyonsia aegeensis* p. 15, t. 1, f. 14—16, der *formosa* Jeffr. zunächst stehend: — *Pecchiolia berenicensis* p. 15, t. 1, f. 17—21, ein lebendes Stück aus 700 m: — *Lucina amorpha* p. 16, t. 1, f. 22, eine rechte Klappe aus 2420 m.; — *Isorropodon perplexum* n. gen et spec., mehrere einzelne Klappen von derselben Stelle, wahrscheinlich in die Nähe von *Cypocardia* zu stellen: — *Myrina modioliformis* p. 20, t. 2, fig. 34—38, aus 2420 m. (generische Stellung noch unsicher): — Ferner aus der Adria: *Fusus craticulatus* var. *pianosana* n. p. 25, t. 2, 40, 41 mit coralliophilaartiger Skulptur: — *Trochus (Jujubinus) igneus* Mtrs. mss p. 28, t. 2, f. 45, aus 128 m.; — Die ganze Arbeit ist sehr sorgfältig gemacht und eine entschiedene Bereicherung der Mittelmeerliteratur.

Sturany, Dr. R., Brachiopoden, gesammelt von S. M. Schiff Pola 1890—94. In Akadem. Anzeiger 1896 No. XV.
Sieben Arten, keine neu; am häufigsten ist *Terebratula vitrea*, auch in der Adria.

Weiss, Dr. A., über die Conchylien-Fauna der interglacialen Travertine des Weimarisch-Taubacher Kalktuffbeckens. Eine revidirte Liste der bis jetzt gefundenen Conchylien. — Abdr. aus Zeitschr. geolog. Gesellsch. 1895.

Wir verweisen auf den in dieser Nummer des Nachrichtsblattes befindlichen Aufsatz des Verfassers.

Proceedings of the Malacological Society of London. Vol. II No. 2 July.

- p. 57. Howes, Prof. G. B., Address of the President.
p. 77. Crick, G. C., on the aperture of a Baculite from the Lower Chalk of Chardstock.
p. 81. Gilson, Prof. G., the female Organs of *Neritina fluvialis*.
p. 84. Sykes E. R., Report on a Collection of Polyplacophora from Port Philipp, Victoria.
p. 94. Smith, Edg. A., on a collection of Land-Shells from South Celebes. — *Neu Helicarion wallacei* p. 95 t. 7 f. 7—9; — *Macrochlamys indifferens* p. 95 t. 7 fig. 10—12; — *Microcystina consimilis* p. 95 t. 7 fig. 13—15; — *M. consors* p. 95 t. 7 fig. 16—18; — *Xesta dimidiata* p. 96 t. 7 fig. 19; — *Chloritis plena* var. *celebensis* p. 97; — *Hemiplecta bonthainensis* p. 97 t. 7 fig. 20; — *Chloritis howesii* p. 98 t. 7 fig. 21—22; — *Calycia everetti* p. 98 t. 7 fig. 23; — *Clausilia celebensis* p. 99 t. 7 fig. 24; — *Cl. simillima* p. 99 t. 7 fig. 25; — *Cl. subpolita* p. 99 t. 7 fig. 26; — *Cl. usitata* p. 100 t. 7 fig. 27; — *Cyclotus pyrostoma* p. 100 t. 7 fig. 1—3; *Cycl. celebensis* p. 101 t. 7 fig. 4—6.
p. 104. Smith Edgar A., on some Fresh-Water Shells from the Island of Kolguew. — Von dieser kleinen Inseln in der Barents-See hat Feilden drei Arten mit gebracht, *Limnaea palustris*, eine neue Varietät von *L. ovata*, und *Planorbis borealis*.

Blazka, Franz de P., die Mollusken-Fauna der Elbe-Tümpel. In Zoolog. Anzeiger 1896. No. 507.

In Elbetümpeln bei Neratovic, 40 km. nordöstlich von Prag, wurden 52 sp. gesammelt, davon bemerkenswerth *Amphipeplea glutinosa*, *Planorbis charteus*, *Valvata naticina*, *macrostoma*.

Kobelt, Dr. W., Schnecken von N. O. Celebes und Banggai. In Abhandl. Museum Dresden 1896—97 No. 5.

18 Arten von der Halbinsel Balante gegenüber Peling und der Insel Banggai zwischen Celebes und Sula. Neu: *Xesta balantensis*,

X. banggaiensis, Chloritis balantensis, Chl. talabensis, Clausilia celebensis Bttg., Cyclotus dimidiatus. (Die Clausilia wird vor der gleichnamigen Smithschen Art wohl einige Tage Priorität haben).

Casto di Elera, F., Catalogo sistematico de toda la Fauna de Filipinas conocida hasta al presente y a la vez et de la Coleccion zoologica del Museo de P. P. Dominicanos del Colegio-Universidad de Santo-Tomas de Manila escrito con motivo de la Exposicion regional Filipina. Vol. III. Moluscos y Radiatos. — Manila 1896.

Non vidi.

Gude, G. K., a new Shell and Illustrations of some hitherto unfigured Helicidae. In Science Gossip III. 1896. No. 27.

Neu Corasia laurae von Nordluzon (p. 57 fig. 1). — Zum erstennal abgebildet Ganesella catocyrta Quadr. et Mlldff. fig. 2; — G. apex und var. apiculata Q. et M. fig. 3, 4; — Endodonta quadrasi Mlldff. fig. 5; — Endodonta fusca Q. et M. fig. 6; — Trochomorpha boettgeri Mlldff. fig. 7; — Pyramidula omalisma Fagot fig. 8: —

Martini Chemnitz Conchylien Cabinet, neue Ausgabe.

Lfg. 426. Bullacea von Kobelt (Schluss). —

The Journal of Conchology. Vol. VIII No. 7. Juli 1869.
p. 209. Tregelles, G. F., the Marine Mollusks of Cornwall.

p. 231. Smith, Edg. A., a List of the Land and Freshwater Mollusca of Trinidad. — Neu Subulina (Nothus) wichi p. 235 t. 8 fig. 2 — (To be cont.)

Westerlund Dr. C. Ag., Neue centralasiatische Mollusken. In Ann. Mus. Zoologique Acad. Imper. St. Petersbourg 1896 p. 181.

Als neu beschrieben werden, besonders aus den Sammlungen von Dr. Korschinsky: Trigonochlamys? problema, Nordpersien, p. 182; — Parmacella aethiops, Turkestan, p. 183; — Vitrina alexandri, Turkestan, p. 183; — Macrochlamys, korschinskyi p. 184, Turkestan; — Hyalina cellaria var. concinna, Nordpersien, p. 185; — Trichia rhysota und var. altaica, Altai, p. 185; — Eulota rubens var. caryodes, var. limitata, var. angulata, Turkestan, p. 186; — Helicella diaphora, Turkestan, p. 187; — Jacosta aspasta, Taschkent, p. 187; — Napaeus goebeli, Transkaspien, p. 189; — Ps. trigonochilus var. teres, expansilabris, planicollis

pachyehila, alle aus Turkestan, p. 190: — *Ps. albiplicatus* var. *narynensis*, Turkestan p. 191: — *Ps. diplus*, Turkestan p. 191: — *Ps. biformis*, Turkestan, p. 191: — *Mastoides albocostatus* und var. *distortus*, Turkestan, p. 192; — *M. liostra* aus Turkestan, p. 192; — *M. torquatus*, errans, *leptoceras*, Turkestan p. 193: *Chondrulopsis drymaeus*, *miser* var. *misellus*, Turkestan, p. 194: — *Oreula dololum* var. *tereticollis*, Nordpersien, p. 195: — *Limnaea stagnalis* var. *lacustris* forma *humerosa*, Dsungarei, p. 195: — *L. lagotis* var. *lacustris* forma *porcellanea*, Taschkent, p. 195: var. *similaris* Turkestan, p. 196: — *L. peregra* var. *lagotidea*, Turkestan, p. 196: — *L. truncatula* var. *constricta*, Taschkent, p. 197: — *Bythinia caerulans*, Dsungarei, p. 197: — *Pisidium impar*, Transkaspien; p. 198.

Gude, G. K., Armature of Helicoid Land-Shells and a new species of Corilla. — In Science Gossip N. S. III Sept. 1896. p. 88.

Neu *Corilla fryae* (T. late umbilicata, ovato-rotundata, discoidea, solidula, rufo-castanea, planulata, oblique costulata, subtus valde concava, striata, pernitida; spira plana sutura vix impressa. Anfr. 5 vix convexiusculi, inter suturam et peripheriam valde angulati, ultimus subtus ornatur striis spiralibus quae secundum latus lineis vel rugis impressis obliquis decussantur; antice convexior, valde dilatatus, profunde descendens. Apert. obliqua, obtuse subcordata, lamellis 3 parietalibus (media elongata validaque, laterales minores profundaeque), 4 palatales flexuosae, longulae, perlucentes, 3 ab apertura visibles. Peristoma ex albido purpuraceens vel rufo-castaneum, callosum, valde reflexum, margo superior subdentate crassior, inferior dente valido atque quadrato armatur. Diam. maj. 26. mm. 20. alt. 8 mm. — Albion Estate, Lindula District, Ceylon.) Die neue Art sowie *Corilla Charpentieri*, *arconea*, *rivolii*, *odontophora* und *humberti* sind in Holzschnitt abgebildet.

Eingegangene Zahlungen:

22 von Gallenstein, G., Mk. 6.—; Ehrmann, L., Mk. 12.—; Kinkel, F., Mk. 6.—; Müller, St., Mk. 6.—; Blum, F., Mk. 24.—; Fulton, L., Mk. 6.—; von Lasser, T., Mk. 6.—;

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben 20. September.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Achtundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. geben an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Ein neues Cardium von der Nord-Japanischen Küste.

• Von

Hermann Rolle.

(Mit Tafel.)

Von den Cardium der nordpacifischen Küsten sind beschrieben:

1. *Cardium Nuttalli* Conrad.

(Conrad Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. VII 1837 p. 229.
Taf. 17 Fig. 3 — Reeve Card. Fig. 66).

= *Cardium californianum* Conrad.

Die grösste Art dieser Gruppe mit 34 Rippen.

2. *Cardium corbis* Martyn.

(The Universal Conchologist Taf. 80).

Durch die sehr schiefe Form auffallend.

3. *Cardium pseudo-fossile* Reeve.

(Reeve Card. sp. 52).

Durch die grosse Anzahl der Rippen — 45 —, von den beiden vorigen Arten unterschieden.

4. *Cardium californiense* Desh.

(Guerin-Menneville, Magasin de Zoologie 1841 Taf. 47. — v. Middendorff Malacozool. Rossica Bd. III Taf. 15 Fig. 23—25).

Der vorigen Art sehr nahestehend.

Ich erhielt kürzlich von Yokohama eine Sendung Conchylien, darunter ein Cardium in grösserer Anzahl, mit dem ausgeprägten Character der nordpacifischen Heimat, welcher den obigen 4 Arten eigen ist. Dies Cardium ist aber durchaus verschieden von diesen beschriebenen; ich gebe ihm den nachfolgenden Namen:

Cardium bülowi n.

Schale ziemlich rund, nach hinten abgeflacht, solide, der Wirbel ein wenig nach vorn gekrümmmt. 28—30 starke, schwach gefurchte halbrunde Rippen, durch glatte Furchen getrennt, und 7 undeutliche nur durch vertiefte Linien getrennte Rippen der abgeflachten Hinterseite laufen vom Wirbel in schwacher Krümmung zum Bauchrand. Alle Exemplare haben 3—5 treppenartige Anwachsstreifen, die nach unten hin näher zusammen stehen. Aussen gelblich-grau, innen weiss. Eine grosse durch tiefe Einkerbung markirte Area mit grösserem Ligament. Innenseite der Schalen glatt, am Bauchrand den Rippen entsprechende nicht sehr vertiefe Zähne.

Die nächste Verwandte dieser Art ist Card. pseudo-fossile Reeve, jedoch unterscheidet sie sich von dieser durch die geringere Zahl der Rippen und auch durch die Maassverhältnisse.

Card. pseudo-fossile Länge 70 mm. Höhe 60 Dicke 40 mm.
Card. bülowi " 62 , , 58 , 42 ,

Cardium Californiense Desh. und pseudo-fossile Rve. scheinen sehr nahe zusammenzustehen und sind in der Form kaum verschieden, auch ist es mir noch zweifelhaft ob C. Californiense, wie Desh. angiebt, wirklich von Californien stammt.

Cardium Bülowi hat aber mit diesen vorerwähnten beiden Species absolut nichts zu thun. Dasselbe ist viel bauchiger, schwerer, und ist durch die breiten, groben Rippen, sowie auch durch die mehr dreieckige Form gut verschieden.

Die Fauna der Galapagos.*)

Von
Dr. W. Kobelt.

Der isoliert aus tiefem Meer aufragende Archipel der Galapagos hat schon seit Cuming und noch mehr seit Darwin die Aufmerksamkeit die Zoo- und Phytogeographen auf sich gezogen, aber eine genaue Durchforschung ist ihm erst in der neuesten Zeit zu Theil geworden und wir können auch heute noch nicht behaupten, dass wir seine Flora und Fauna wirklich gründlich kennen. Bis jetzt wenigstens hat jeder Naturforscher, welcher die Inselgruppe besuchte, auch neue interessante Formen gebracht, und ganz besonders ist die Molluskenfauna sicher noch nicht in allen ihren Details bekannt. Ueber die Verbreitung der Landmollusken im Speciellen und über ihre Vertheilung auf die verschiedenen klimatischen Zonen der Inseln hat eigentlich erst der letzte Forscher, Dr. G. Baur, der dieselben in 1890 besuchte, genauere Angaben gebracht. Die Bearbei-

*) Cfr. Dall, Insular Landshell Faunas, especially as illustrated by the data obtained by Dr. G. Baur in the Galapagos Islands. In Pr. U. St. National Museum 1896 p. 395.

tung seiner Ausbeute durch Dall klärt manche Fragen auf und verdient eine eingehendere Behandlung als ihr im Literaturbericht zu Theil werden kann.

Die Galapagos liegen gerade unter dem Aequator auf einer Bodenschwelle, welche sich über die Tausendfadenlinie erhebt und rings um von tieferem Wasser umgeben wird. Sie sind rein vulkanischer Natur; der Streit ob sie als die Gipfel eines versunkenen Landes anzusehen sind oder als gehobene Aufschüttungen untermeerischen Vulkane, ist noch immer nicht definitiv entschieden. Abgesehen von den beiden Inseln Culpepper und Wenman, welche mit einigen kleinen Felsen auf einer durch 1200 Faden Wasser von der Hauptgruppe getrennten Bodenschwelle liegen und noch völlig unerforscht scheinen, zerfallen die Galapagos in drei Gruppen: eine südöstliche mit den Inseln Charles, Chatham, Hood und Barrington, eine centrale mit der Hauptinsel Albemarle, die durch die Verschmelzung verschiedener kleinerer Piks erst in neuerer Zeit entstanden zu sein scheint, und den Inseln Narborough, die noch 1836 einen Ausbruch zu verzeichnen hatte, James, Indefatigable und der kleine Duncan Insel. Die nördliche Gruppe endlich besteht nur aus drei kleinen Inselchen: Abingdon, Bindloë und Tower.

Die Vegetation bildet drei scharf geschiedene Höhenzonen. Die unterste ist besonders in der trockenen Jahreszeit fast kahl, die spärlichen Büsche zwischen den Lavablöcken, eine Verbena und eine Acacie, sehen starr und todt aus. Am Ufer finden sich an günstigen Stellen einige Halophyten und auf den Lavablöcken eine Anzahl Cactus (*Opuntia* und *Cereus*). In dieser Zone regnet es auch in der Regenzeit kaum. Erst in 5—600 Fuss und auf der Leeseite in 800—1000 fallen regelmässige Regengüsse im Februar und Juli. Die Vegetationsgrenze ist meist scharf, an manchen Stellen aber auch allmälig: die Verbena verschwindet,

die Acacia wird höher und häufiger, der Palosanto wird zu einem tüchtigen Baum, und der Boden bedeckt sich überall mit einer Decke von Gebüsch, hier und da durch Grasflächen unterbrochen, stellenweise ein undurchdringliches Dickicht. Auch der Boden ist hier ein anderer; die Lava zersetzt sich unter dem Einfluss der Feuchtigkeit und wird eine zarte, rothe Erde. Nach oben schneidet die Buschvegetation scharf ab gegen die oberste Zone, die nur mit grobem, dichtem Gras bewachsen ist. Auch sie ist immer feucht, da selbst in der trockenen Jahreszeit Nebel um die Höhe schweben. Manche Inseln haben übrigens auch an der Küste Mangrovendickichte.

Die Meereströmungen zwischen den Galapagos scheinen ziemlich kompliziert. Im Allgemeinen lassen sich zwei Hauptströmungen unterscheiden, die sich etwas östlich der Inselgruppe treffen und dann vereinigt zwischen den Inseln hindurchgehen. Die eine kommt von Nordosten aus dem Golf von Panama, die andere von Südosten, von Peru. Beide sind gleich stark, aber die Panama-Strömung hat in ganz anderer Weise auf Fauna und Flora eingewirkt, weil sie von einem Gebiet mit üppiger Fauna und Flora kommt, wo die tropischen Regen Massen von Vegetation und Thierleben ins Meer führen. Bäume mit noch frischen Blättern können durch sie recht wohl an die Galapagos geführt werden und mit ihnen natürlich auch Schnecken und Insekten. Von Peru dagegen gelangen auch bei den seltenen Regengüssen nur Kies und Sand in das Meer.

Es ist nun von Interesse, dass fast alle Landmollusken der Galapagos mehr oder minder ausgesprochen Baumbewohner sind und einen Theil des Jahres fest an Blätter und Zweige angekittet schlafend zubringen. Der Kitt mit welchem sie sich befestigen, ist so zäh, dass man eher die Schale zerbricht oder die Rinde abreißt, als die Schnecke ablöst und er wird in solcher Menge produziert, dass er

nicht nur alle Unebenheiten der Unterlage ausfüllt, sondern sich auch noch einen Millimeter hoch am Gehäuse erhebt. Kein Epiphragma bilden nur die *Helicina*, die durch ihren hermetisch schliessenden Deckel geschützt ist, einige kleine Heliciden, die sich in Baumritzen und Bodenspalten verkriechen und die *Leptinaria*, welche unter den immer grünen Farn Schutz findet. Sie kann, wie die Heliciden leicht durch heftige Stürme vom Festland herübergeweht worden sein, wo ähnliche Arten vorkommen, ebenso die *Pupa*, welche mit der festländigen *Pupa wolfii* Miller und wahrscheinlich auch mit *P. eyriesii* Drouët von Guyana identisch ist.

Die Ableitung der Fauna von der südamerikanischen bietet auch in der That gar keine Schwierigkeiten und Dall ist der Ansicht, dass die Vertheilung der Arten auf den einzelnen Inseln ebensowenig Schwierigkeiten bietet. Allerdings ist das relativ feuchte und fruchtbare Narborough noch nie von einem Sammler betreten worden, und von dem grossen Albemarle kennen wir nur 6 Arten von der Südinsel. Die bekannten Arten vertheilen sich nach Baur wie folgt:

1. *Chatham Island*:

<i>Bulimulus nux incrassatus,</i>	alle bei 1600' unter Blättern.
" <i>jacobi typicus,</i>	
" <i>achatellinus,</i>	
" <i>unifasciatus,</i>	
" <i>bauri n.</i>	
" <i>curtus,</i>	
" <i>nucula,</i>	
" <i>chemnitzioides,</i>	
" <i>eschariferus,</i>	
" <i>habeli.</i>	
<i>Cornulus galapaganus</i>	am Ufer unter Steinen.
<i>Vitreola chathameensis</i>	
<i>Succinea producta typea</i>	
<i>Leptinaria chathamensis</i>	
<i>Helicina nesiotica</i>	

2. *Charles Island.*

<i>Bulimulus rugulosus</i>	}	<i>Bulimulus galapaganus</i>
, <i>planospira</i>		<i>Succinea brevior.</i>

3. *Süd-Albemarle.*

<i>Bulimulus jacobi</i>	<i>Trochomorpha?</i> <i>bauri</i>
.. <i>simrothi</i>	<i>Succinea bettii</i>
<i>Pupa wolffi</i>	.. <i>corbis</i>
<i>Leptinaria chathamensis.</i>	

4. *Duncan Island.*

<i>Bulimulus olla.</i>	<i>B. duncanus.</i>
------------------------	---------------------

5. *Barrington Island.*

<i>Bul. eschariferus ventrosus.</i>	<i>B. olla.</i>
-------------------------------------	-----------------

6. *James Island.*

<i>Bul. jacobi cinereus.</i>	<i>Succinea bettii.</i>
------------------------------	-------------------------

7. *Indefatigable Island.*

<i>Bul. olla.</i>

Von Bindloë sind noch bekannt *Bulimulus darwini*, *Auricula stagnalis* und *Pedipes angulatus*.

Vertheilen wir die Mollusken auf die obenerwähnten drei Gruppen, so hat die Zentralgruppe 21 Formen, von denen 14 eigenthümlich, keine mit der nordöstlichen Gruppe gemeinsam sind, sechs auch im Südosten vorkommen. Die südöstliche Gruppe hat 33 Formen, davon 21 eigenthümlich; die Nordostgruppe hat nur eine eigenthümliche Art. Das stimmt ganz damit überein, dass die südöstliche Gruppe in erster Linie den Meeresströmungen und Stürmen ausgesetzt ist. Doch dürfen wir auch nicht vergessen, dass gerade diese Gruppe und besonders Chatham am genauesten erforscht ist und dass auf Albemarle gewiss noch manches zu entdecken ist. Nur auf eine Insel beschränkt sind:

<i>Bulimulus darwini</i>	...	Bindloë
" <i>wolfi</i>	...	Indefatigable
" <i>duncanus</i>	...	Duncan

<i>Bulimulus planospira</i>	Charles
„ <i>ustulatus</i>	"
„ <i>galapaganus</i>	"
„ <i>perspectivus</i>	Chatham
„ <i>tanneri</i>	Indefatigable
„ <i>anastroides</i>	Chatham
„ <i>simrothi</i>	Albemarle
„ <i>bauri</i>	Chatham
„ <i>canaliferus</i>	Chatham
„ <i>sculpturatus</i>	James Insel
„ <i>nesioticus</i>	"
„ <i>reibischii</i>	Indefatigable
„ <i>chemnitzioides</i>	Chatham
„ <i>habeli</i>	"
<i>Vitreola chathamensis</i>	"
<i>Conulus galapaganus</i>	"
<i>Pupa wolffii</i>	Duncan
„ <i>clausa</i>	Indefatigable
<i>Succinea brevior</i>	Charles
„ <i>producta</i>	Chatham
„ <i>corbis</i>	Albemarle.

Ein Hauptgewicht legt Dall auf die Vertheilung der Arten auf die drei klimatischen Zonen. Der unteren trockenen Zone gehören 10 Arten an, nämlich:

<i>Bul. wolffii</i>		<i>Bul. eschariferus</i>	
„ <i>rugulosus</i>		„ <i>galapaganus</i>	
„ <i>planospira</i>		„ <i>perspectivus</i>	
„ <i>ustulatus</i>		<i>Pupa clausa</i>	
„ <i>calvus</i>		„ <i>munita-wolffi</i> .	

Der bewaldeten Zone gehören dagegen 19 Arten an:

<i>Bul. nux</i>		<i>Bul. chemnitzioides</i>	
„ <i>achatellinus</i>		„ <i>habeli</i>	
„ <i>jacobi</i>		<i>Vitreola chathamensis</i>	
„ <i>acutus</i>		<i>Conulus galapaganus</i>	

und nicht unter die Pupidae gehöre, nach den Charakteren der Schale sowohl als der Radula. Die Zähne der letztern sind sehr klein, etwa 0.005×0.0035 mill., r.+20 in der Querreihe, deren 127 gezählt wurden. Die Spitzen aller Zähne sind sehr kurz und klein; der Mittelzahn ist dreispitzig, die übrigen alle tragen zwei ziemlich gleiche Spitzen und es besteht kein Unterschied von Seiten- und Randzähnen, als dass nach dem Rande zu die Platten kürzer und in den 2—3 äussersten Zähnen unsichtbar werden. So ist die Radula nach demselben Typus gebaut wie die von *Punctum pygmaeum* Drap., und auch der Kiefer entspricht ziemlich demjenigen dieser Art. Die Schale betreffend wird darauf hingewiesen, dass bei allen Pupiden die Mündung lateral, oder tangential ist, bei der in Rede stehenden Art dagegen radial.

Die Schnecke ist in Nordamerika weitverbreitet, im ganzen nördlichen Theile von Ocean zu Ocean; wie weit sie nach Süden vordringt, ist noch nicht festgestellt. Sie ist auch ebenso veränderlich wie in der palaearktischen Region.

Ein interessantes Analogon hiezu ist „Pupa“ neozelania Pfr. von welcher bekanntlich H. Suter nachgewiesen hat, dass sie keine Pupa, sondern eine Charopa ist.*)

Literaturbericht.

L' Echange. Revue Linnéenne. Lyon Année XII.

- p. 25. Locard, A., Notices Conchyliologiques. XXXVII. A propos de l' *Helix terveri* Mich. Die algerische Hel Terveri wird als *H. Gaspardi* unterschieden, *Hel apista* Flor. ist = *terveri typica*.
p. 36. — —, XXXVIII. A propos de l' *Helix glabella* Drp. — Gibt die genaue Beschreibung nach einem Typus der Michaud'schen Sammlung.

*) Dagegen ist *Acanthinula* nach einer brieflichen Mittheilung von Herrn Fritz Wiegmann — Jena aus *Helix* zu entfernen und zu *Pupa* zu stellen. Red.

p. 51. — —, XXXIX Les Cypraeidae observés sur les cotes de France
Die Angaben über das Vorkommen verschiedener Arten von
Monetaria (moneta, annulus, mercatorium und barmandiana) werden
wiederholt, doch hat auch Locard nie ein lebendes Stück erhalten.

*Lang, Arnold, Kleine biologische Beobachtungen über die
Weinbergschnecke (*Helix pomatia L.*)* In Vierteljahrsschr.
naturf. Ges. Zürich. Vol. 41 p. 488 (1896).

Der Autor hat Zuchtversuche mit linksgewundenen *Helix pomatia*
gemacht und einmal von sieben Exemplaren 241, das andernmal
von neun 606 junge Schnecken erhalten, die sämmtlich
rechts gewunden waren. Er hat ausserdem Wachstums-
beobachtungen angestellt: viele waren im zweiten Jahre aus-
gewachsen, andere blieben von Anfang an zurück und erreichten
ihre volle Grösse erst im dritten und selbst im vierten Jahre:
sie leben im Durchschnitt nur drei Sommer.

Simroth, Dr. H., über verschiedene Nacktschnecken. In Bericht
Naturf. Gesellsch. Leipzig 1895—96, Sitzung von 4 Febr.

Behandelt Agriolimax laevis von Nicaragua und von St. Catharina
in Brasilien: — Agr. altaicus var. von Sendschioli in Nord-
syrien: — kaukasische Nacktschnecken: Gigantolimax kollyi Ret.:
Paralimax brandti Btg.: Par. intermittens Btg.: Par. varius
Btg.: Limax primitivus Sth.; — Urocycliden: Drei Unter-
gattungen: Polytoxon mit vielen Pfeilen, die in zwei Bündel
geordnet sind, Diplotoxon, mit 4—6 Pfeilen, die paarweise in Pfeil-
säcken stecken; und Spirotoxon mit einem schraubigen Liebes-
pfeil. Neu Polytoxon aurantiacum von Magila bei Pangani,
Spirotoxon elegans von Dunde am Kingani; Von Vaginula
wird für pfeilsacklose Formen von Westafrika die neue Gattung
Vaginina errichtet.


*Brusina, Spir., la collection néogène de Hongrie, de Croatie, de
Slaronie et de Dalmatie à l'exposition de Budapest.* In
Societ. historico-naturalis croatica. IX Godina. Agram 1896.

Das Museum von Agram hat bei der ungarischen Millenniums-Aus-
stellung die beiden Sammlungen ausgestellt, in denen es einzig
dasteht, die marinen Mollusken der Adria und die Fossilien der
südslavischen Neogenschichten. Von der letzteren gibt der Autor
hier eine Aufzählung, die 223 Arten mit genauer Synonymie
enthält. Die neuen Arten werden demnächst in photolitho-
graphischen Abbildungen veröffentlicht werden.



b

orniense Desh.



c

Journal de Conchyliologie Vol. 43. 1895 No. 3.

- p. 137. Fischer, H., Note sur l'animal du *Bulimulus pallidior* Sow.
p. 141. Hervier, J., Descriptions d'espèces nouvelles de l'Archipel Néo-Calédonien. — Neu *Drillia carnicolor*, Dr. *suavis* p. 141; — *Clavus rugizonatus*, Cl. *potentus* p. 142; — Cl. *gibberulus*, Cl. *leforestieri* p. 143; — *Surcula gatschensis*, *Glyphostoma lamproideum* p. 144; — Gl. *jouseaumei*, *leucostigmatum* p. 145; — Gl. *aubryanum* p. 146; — Gl. *globulosum* p. 147; Cl. *marchei* var. *tuberculifera* p. 147; — Gl. *disconicum*, Gl. *subspurcum* p. 148; — Gl. *goubini*, Gl. *crosseanum* p. 149; — Gl. *melanoseytum*, Gl. *tigroidellum* p. 150; — Gl. *fastigiatum*, Gl. *strombillum* p. 151.
p. 152. Mayer-Eymar, C., Descriptions de Coquilles fossiles des terrains tertiaires supérieures (suite). — Neu *Pectunculus variicostatus* t. 8. fig. 6; — *Cardita guillemettae* t. 8. fig. 7; — *Nerita dujardini* t. 8. fig. 3; — N. *oxystoma* t. 8. fig. 4; — N. *proserpinae* t. 8. fig. 4; — *Natica defrancei* t. 8. fig. 1; — Nat. *epigonina* t. 8. fig. 1; — N. *johannae* t. 7. fig. 2; — N. *lunata* t. 7. fig. 3; — N. *turonensis* t. 7. fig. 4; — N. *originalis* t. 7. fig. 5; — N. *fischeri* t. 8. fig. 2; —
p. 165. Mayer-Eymar, C., Liste systematique des Natices des Faluns de la Touraine et de Pont-Levoy, du Musée de Zürich.

Journal de Conchyliologie vol. 43. No. 4 1895 (erschienen 1. Sept. 1896).

- p. 207. Fischer, H., Note préliminaire sur le *Pterygioteuthis Giardi*, Géphalopode nouveau recueilli dans le cours de l'Expedition scientifique du Talisman (1883). Avec pl. IX.
p. 211. Ihering, H. von, sur les Area des cotes du Brésil et sur la classification du genre Area. 9 Arten, keine neu.
p. 220. Drouët, H., Unionidae nouveaux ou peu connus. (Dixième art.) Neu *Anodonta frigida* aus Jemtland, *orbicularis* aus Schoneu, *fennica* aus Finland; *Unio sardicensis* aus dem Isker bei Sofia; *Unio polychrestus* aus dem Wald von Bellegarde bei Konstantinopel; U. *hermicus* aus dem Sarabat bei Smyrna; U. *ephesus* aus dem Kaister bei Ephesus; U. *lydicus* aus dem Mäander; U. *aequibratus* von Erzerum;
p. 235. Fischer, H., Note sur la distribution géographique du genre Corambe.
p. 236. Hervier, R. P. J., description d'espèces nouvelles de l'Archipel Néo-Calédonien (suite). Neu *Glyphostoma alphonsianum* p. 237: —

Gl. callistum p. 237; — Gl. parthenicum p. 230; — Gl. gardei p. 239; — Gl. trigonostomum p. 239.

Mitonkuri, K., and Ikeda, S., Notes on a gigantic Cephalopod.
Tokio (Zool. Mag.) 1895. with pl. Non vidi.

Bernard, F., Scioberetia australis, type nouveau de Lamellibranche. In Bull. Scient. Franc. Belg. 1896. Non vidi.

Huxley T. H. et Pelsener P., Observations sur Spirula. Ibid.
1895, gr. 8° 550. Mit 6 Tafeln. Non vidi.

Gregorio, A. de, Apunti su talune Conchylie estramarine de Sicilia viventi e fossile con la spiegazione delle tavole del opera di Benoit. In Naturaliste Siciliano 1896.

Studer, T., Amstein G, und Brot A., Bibliographie der Schweizerischen Landeskunde. Fauna Helvetica. Mollusca.
Bern. 1896.

Vincent, E., Note préliminaire sur Limopsis. In Procés-verbal Soc. Roy. Mal Belgique. 9. Mai 1896.

Die sechs Arten aus dem belgischen Eocän werden besprochen und abgebildet. Neu L. lucida aus dem Landenien.

Smith, Edgar, A., on a Collection of Land-Shells from the Islands of Selayar, Jampea and Kalao. — In Ann. Mag. N. H. (6) XVIII. p. 143.

Von Saleyer hat Martens bei Weber 9 sp. Die beiden etwas südlich davon gelegenen kleineren Inseln waren unbekannt. Neu sind: Microcystina consueta p. 144. t. 10. fig. 1; — Xesta selayarensis p. 145. t. 10. fig. 3; — X. kalaoënsis p. 146. t. 10. fig. 4; — Trochomorpha jampeana p. 146. t. 10. fig. 5; — Plectotrophis crassiuscula p. 147. t. 10. fig. 7; — Planispira admirabilis p. 147. t. 10. fig. 7; — Corasia subtenuis p. 148. t. 10. fig. 8; — Hypselostoma everetti p. 148. t. 10. fig. 9; — Buliminus selayarensis p. 149. t. 10 fig. 12; — Cyclotus vicinus p. 150. t. 10. fig. 14; — Helicina kalaoënsis p. 151. t. 10 fig. 14; —

Eingegangene Zahlungen:

Metzger, M., Mk. 6.—.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben 20. November.

Bul. nucula	Succinea bettii
„ amastroides	„ brevior
„ curtus	„ producta
„ unifasciatus	Leptinaria chathamensis
„ bauri	Helicina nesiotica.
„ canaliferus	

Der oberen Graszone eigenthümlich sind nur zwei Arten, *Bulimulus olla* und *Bul. simrothi*.

Die *Bulimulus* vereinigt Dall sämmtlich unter *Naesiotes*; die Anatomie ergiebt eine enge Verwandtschaft mit *Scutalus* und den anderen südamerikanischen *Bulimulus*; von irgend welchen Beziehungen zu den hawaiischen Formen ist keine Rede; sie gehören unzweifelhaft zu acht südamerikanischen Typen. Nach Pilsbry's System gehören sie nach der Sculptur des Embryonalandes nicht zu *Bulimulus* s. str., sondern zu *Orthotomium*, und das würde auf Einwanderung aus mehr nördlichen Breiten deuten. Einen weiteren Anhalt für die Heimath der Galapagos-Fauna gibt uns Dall nicht und auf die Frage nach der Zeit der ersten Einschleppung geht er auch nicht ein. Wir bleiben dafür also immer noch auf die Resultate verwiesen, die Dr. Baur (Globus 1892 v. 61 p. 157) aus der Riesenschildkröte der Insel zieht, die ihre nächsten Verwandten im Miocän von Nebraska hat.*). Für Baur's weiteren Schluss dass die Galapagos zur Miocänzeit ein zusammenhängendes Land gewesen seien, das sich erst durch Senkung resp. durch eine positive Niveauveränderung in einen Archipel verwandelt habe, lassen sich die Mollusken nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse doch nicht recht verwenden; dafür ist die Zahl der auf einzelne Inseln beschränkten Arten dann doch zu gross, die Artenzahl und besonders die Zahl der Gattungen zu gering, die recentere Einschleppung zu naheliegend.

*) Eine noch nähere Verwandte scheint sich freilich im Diluvium von Malta zu finden und auch die fossilen Riesenschildkröten von Rodriguez und Mauritius sollen der *T. elephantopus* näher stehen, als den lebenden Formen von den Aldabras.

Von grossem biologischen Interesse sind Dalls Untersuchungen über den Einfluss des Inselklimas und der eigenthümlichen Bodenbeschaffenheit auf die Gestalt und namentlich die Skulptur des Gehäuses, aber sie sind eines Auszuges nicht wohl fähig und oft nur an der Hand der Abbildungen verständlich. Dagegen haben wir noch einige dabei gelegentlich gemachte Bemerkungen zu erwähnen über die Fauna von Fernan do Noronha und ganz besonders von St. Helena. Die Fauna der ersten Insel ist ächt südamerikanisch; *Polygyratia quinquelirata* hat ihre nächste Verwandte in *P. pollodonta* d'Orb.; den *Tomigerus ramagei* hält Dall für nicht verschiedener von *Bulimulus ridleyi* als es auf den Galapagos *Bul. darwini* von *Bul. jacobi* ist: — *Pupa solitaria* dürfte von *P. wolfii* von Guayaquil und den Galapagosformen kaum verschieden sein.

Von St. Helena hat das Washingtoner Museum eine vollständige Suite von Capt. Turton erhalten. Auf Grund genauen Studiums derselben bestreitet Dall jede Verwandtschaft mit Südamerika. *Bulimulus auris vulpina* Dillw. hat mit den südamerikanischen diekippigen Arten nichts zu thun, aber eben so wenig mit *Placostylus biraricosus*, sondern bildet mit *Bul. melanioides*, *subplicatus* und wahrscheinlich auch *B. turtoni* eine eigene Gruppe, für die Dall den Namen *Pachytotus* Beck (gestützt auf Gray 1847) annimmt, (*Chionopsis* Fisch. datirt erst von 1848). Die anatomische Untersuchung von *Bul. melanioides* durch Pilsbry verweist diese Gruppe zu den Achatiniden, neben *Perideris* und *Limicolaria*. Zwei andere sog. *Bulimulus* (*exultatus* Bens. und *subtruncatus* Smith) gehören jedenfalls auch zu den Achatiniden: sie haben eine gedrehte undurchbohrte Spindel, einen kleinen Nucleus, die oberen Windungen nehmen langsam, die unteren rasch zu; sie sind dünnshalig und lassen den Einfluss der Dürre nur wenig erkennen. Dall errichtet

für sie die neue Gattung *Cleostyla*. — Es bleiben dann noch die Formen, die sich um *Bul. helena* Quoy gruppieren. Pfeiffer hat sie mit den Galapagosarten zusammen unter *Naesiotes* gestellt, nach Dall sind sie aber mit den maskarenischen *Pachnodus* zu vereinigen, die ebenfalls zu *Bulimulus* zu stellen sind. Den Smith'schen *Tomigerus* hält Pilsbry für eine locale Umformung von *Pupa*, analog wie *Hypselostoma* und *Boysidia*; er bildet für ihn die neue Unter-gattung *Campolaemus*.

Auf die Frage nach der Heimath der *Endodontata* und der sogenannten *Patula*, die wahrscheinlich nur zahnlose Endodonten sind, geht Dall leider nicht ein; er bemerkt nur, dass alle Endodonten mit Basallamellen insular sind; das grösste Land, auf dem sie gefunden werden, ist Tasmanien. Die Arten mit Parietallamellen finden sich alle auf den tropisch-polynesischen Inseln von Neu Caledonien bis Hawaii; auch alle Arten mit Parietal- und Basallamellen sind insular und gehören meistens hohen tropischen Inseln vulkanischer Natur an.

Noch zwei interessante Bemerkungen glauben wir unseren Lesern mittheilen zu müssen. Die eine bezieht sich auf die Sicherheit der Schlüsse, welche wir aus den physikalischen Eigenschaften der Schneckengehäuse auf die Bedingungen ziehen können, unter denen das Thier gelebt. In Südkalifornien finden sich einige *Bulimulus*, an denen man nicht das Geringste von dem Einfluss des trockenen Klimas merkt, weil die Thiere den grössten Theil ihres Lebens in das saftige Fleisch von Cacteen eingebohrt zubringen. Die zweite bezieht sich auf das Vorkommen unserer *Helix hortensis* in den Vereinigten Staaten. Dass sie neuerdings dort eingeführt worden ist und sich jetzt rasch ausbreitet, ist zweifellos; die Abkömmlinge der neu eingeführten Exemplare sind von den europäischen nicht zu unterscheiden, meistens gebändert, auch in der Lebensweise nicht ver-

schieden. Aber ausserdem findet sich in *Helix subglobosa* Binney eine ungebänderte Form, welche an der ganzen, fast tausend Miles langen Küstenstrecke von Massachusetts bis Cap Breton überall vorkommt, sich nirgends weit von der Küste entfernt und namentlich auch die unbewohnten kleinen Küsteninseln bevölkert; sie ist in den Küchenabfällen im Staat Maine und auch in den Thonen der Champlain Periode gefunden worden, also ganz bestimmt älter als der Verkehr zwischen Europa und Amerika; ja das Vorkommen auf den Inseln macht es wahrscheinlich, dass sie älter ist, als die letzte Senkung der Küste. In der amerikanischen Landmolluskenfauna steht die Gruppe Tachea völlig fremd; ihr Vorkommen müsste ein Relikt aus derselben Zeit sein, aus welcher die circumpolaren Süßwassermollusken, die Hyalinen, Vitrinen, Pupiden etc. zurückgeblieben sind, aber warum ist dann nur *Helix hortensis* übergewandert und nicht auch *nemoralis* oder irgend eine der anderen nord-europäischen Arten? und warum hat sie sich nur unter den allerungünstigsten Verhältnissen und nur in der ungebänderten seltneren Varietät erhalten? Das sind Fragen, die wohl einer Specialuntersuchung werth wären.

Diagnosen neuer Clausilien

Von

Prof. Dr. O. Boettger

1. *Clausilia (Albinaria) alajana* n. sp.

Char. Magnitudine, habitu, sculptura aff. *Cl. chiae* var. *eudilicæ* Bttgr., sed apice obtusiore, lamellis validioribus magis conniventibus, infera minus obliqua, colore diversa.— T. arcuato-rimata, regulariter fusiformis, tenuiuscula, subpellicida, pallide cornea, griseo obsolete nebulosa, sericina;

spira regulariter attenuata; apex obtusiusculus, submammillatus, concolor. Aufr. $10\frac{1}{2}$ — $11\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura impressa, tenuiter filomarginata disjuncti, subtilissime costulato-striati, costulis capillaceis, acutis, parum obliquis, sursum saepe bifidis, ultimus deorsum attenuatus, duplo distantius costulatus quam penultimus, costulis prope suturam biramosis, albidis, caeterum latere subimpressus, basi subsulcatus et obsolete bicristatus, cristis parallelis, rimali distinctiore. Apert. subrecta, regulariter ovalis, intus concolor, sinulo subquadrangulo; perist. continuum, solutum, undique latiuscule expansum, reflexiusculum, sublabiatum. Lamellae validae, compressae, conniventes, supera marginalis, longa, flexuosa, lamellam spiralem disjunctam, distantem humilem intus valde transcurrentes; infera subprofunda e basi callosa subhorizontaliter in medium aperturam prossiliens, intus subsfurcata et subito angulata ascendens; parallela distincta; subcolumellaris immersa, sed oblique intuenti conspicua. Plica suturalis longa suturae approximata; principalis modica, lunellam arenatam vel angulatam dorso-lateralem perspicuum basi saepe pliculae instar protractam intus non transgrediens. Clasium et oblique intuenti parum conspicuum.

Alt. 15—18, diam. maj. $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm; alt. apert. $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ lat. apert. $2\frac{3}{4}$ — $2\frac{7}{8}$ mm.

Hab. Alaja. südöstlich von Adalia, Kleinasien.

Bemerkungen. Steht im System der *Cl. petrosa* P. am nächsten, ist aber kleiner, mehr spindelförmig, weniger bauchig, die Mündung relativ kleiner, die Unterlamelle mehr horizontal, die Costulierung des Nackens doppelt so breit wie die des vorletzten Umgangs und der Doppelkiel besser entwickelt.— Die Ähnlichkeit mit *Cl. chia* Bttgr. und ihren Varietäten ist nur eine scheinbare, da die starke, tauförmig aufgesetzte, winkelig geknickte Unterlamelle erheblich anders gebaut ist und die Subcolumellare deutlich sichtbar bleibt.

2. *Clausilia (Albinaria) brevicollis* P. var. *inauris* nov.

Char. Differt a var. *superba* Bttgr. (Verz. Claus. Oertzen pag. 37) anfr. convexioribus, sutura magis impressa disjunctis, mediis magis laevigatis, apert. magis ovata, intus flava, sinulo acutiore, peristomate infra sinulum distinctius calloso-compresso.

Alt. $15\frac{1}{2}$ —19, diam. 4— $4\frac{1}{4}$ mm; alt. apert. $3\frac{3}{4}$ — $4\frac{1}{4}$, lat. apert. $2\frac{7}{8}$ — $3\frac{1}{8}$ mm.

Hab. Alaja, südöstlich von Adalia, Kleinasien.

3. *Clausilia (Albinaria) rollei* n. sp.

Char. E. grege *Cl. ungeri* Zel. et *Cl. virgo* Mouss., sed major, fere omnino laevis, apert. majore, lamella subcolumellari distincta, submersa, peristomate nullo modo calloso. — T. areuato-rimata, elongato-fusiformis, solida, nitida, caerulecenti-alba, punctis maculisque corneis copiose adspersa, anfr. 3 primis rufis; spira turrita lateribus vix concaviusculis, apex acutiusculus. Anfr. $11\frac{1}{2}$ — $12\frac{1}{2}$ sat convexi, sutura impressa, in anfr. junioribus subpapillata disjuncti, obsoletissime striatuli, fere laeves, ultimus decrescens, cer-vice media parte leviter impresso, deorsum obsoletissime sulcatus et indistincte subbicristatus, crista rimali sat distincte striata. Apert. magna rotundato-rhomboidea, subverticalis, intus flavescenti-fusca; perist. continuum, breviter solutum, latiuscule expansum, non labiatum marginibus vix reflexiusculis. Lamellae validae compressae, similes uti in *Cl. ungeri* Zel., sed infra validior, oblique fere in medium aperturam prosiliens, stricta e basi deorsum non concava ascendens, subcolumellaris oblique intuenti perdistincta. Lamella parallelala bene conspicua. Caeterum apparatus claustralis et clau-silium uti in *Cl. ungeri* Zel., sed lunella basi subcalcarata.

Alt. $23\frac{1}{2}$, diam. max. $4\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. $5\frac{1}{4}$, lat. apert. $3\frac{3}{4}$ mm.

Hab. Gebirge Pentadactylo auf Cypern.

Bemerkungen. Die schöne Art ist durch die glatte und selbst auf dem Nacken nur unten obsolet gestreifte Schale, das Fehlen des verdickten Mundsaumes und die bei schiefem Einblick in die Mündung sehr deutliche, lang herabziehende Subcolumellarfalte von den übrigen cyprischen Clausilien leicht zu unterscheiden und, obgleich zu der nämlichen Gruppe gehörend, mit *Cl. virgo* und *ungeri* weniger nahe verwandt als diese unter einander.

4. *Clausilia (Euxina) maesta* Fér. var. *multiserrata* nov.

Char. Differt a var. *sublaevi* Bttgr. simulo multo acutiore, margine peristomatis ipso valde plicato, lamella supera magis obliqua, spiralem distinete distantem intus non transgrediente, plica palatali tertia minus elongata, a lunella valde distante.

Alt. 16—17, diam. $4\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. $3\frac{3}{4}$, lat. apert. $2\frac{3}{4}$ mm.

Hab. Giosna bei Mersina, Kleinasien.

Bemerkungen. Gross und in der Mitte der Schale fast glatt, die Mündung wie bei *Serrulina serrulata* (Pfr.) am Saume selbst aufs zierlichste gefaltet.

5. *Clausilia (Oligptychia) sowerbyana* P. var. *imperialis* nov.

Char. Differt a typo t. multo majore, anfr. persistentibus 8 subtilius striatis, plicis suturalibus 3 distinctioribus principali brevi antelunellari in apertura conspicua, prope peristoma in tuberculo desinente, palatali infera valida cum lunella connexa verticaliter descendente.

Alt. (decoll.) 24, diam. max. 6 mm; alt. apert. 6, lat. apert. $4\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Jenische-Pass bei Adalia, Lykien.

Diagnose eines neuen Buccinum.

Von
H. Rolle.

Buccinum Martensianum n.

Testa ovato-acuminata, apice exerto. solidula, albida, apicem versus lutescens, epidermide crassa fusca confertissime plicatula. haud ciliata induita. Anfractus 8—9 superi rotundati, convexi, a tertio spiraliter lirati, dein subcarinati, inferi superne decliviter tabulati, liris 4 fortibus cariniformibus cincti, lirulis 4 minoribus, singulis intercedentibus, intersuturam distincte impressam et carinulam superam confertius lirati, ultimus spirae altitudinem superans, striis incrementi filiformibus perdistinctis sculptis, carinulis 4 superis irregulariter noduliferis, dein infra peripheriam liris confertis spiralibus sculptus, inflatus, antice ascendens, basi compressus, emarginatus. Apertura quadrangulari-ovata, nitide alba; columella vix obsolete biangulata, callo tenuissimo appresso induita; labium externum acutum eversum, intus vix levissime albo-incerassatum, supra profunde sinuatum, effusum, dein productum, basi profunde emarginatum.

Alt. 62, diam. max. 35, alt. apert. obl. 30 mm.

Hab Japan.

Zu der nächsten Verwandtschaft des *Buccinum terrae novae* Beck von Spitzbergen (Kobelt in Mart. Ch. II t. 83 fig. 3.4) gehörend, aber ausser der Heimath durch die ganz weisse Mündung und die Details der Skulptur gut verschieden. Ich habe leider nur ein Exemplar direkt von Japan erhalten.

Zur systematischen Stellung von *Sphyradium* („*Pupa*edentulum* Drp.*

Im „Nautilus“ (X. No. 7) veröffentlicht Dr. Sterki die Mittheilung, dass die oben genannte Art nicht zu *Pupa*

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Achtundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Aeltere Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Landschnecken von Celebes.

Von

Dr. O. von Möllendorff.

Die nachstehende Liste beruht auf den Sammlungen, welche Herr Fruhstorfer 1895 und 1896 auf Nord- und Süd-Celebes gemacht hat. Die Ausbeute im Süden fällt z. Th. mit der von Everett zusammen, über welche E. Smith (Proc. Malac. Soc. II, 1896, p. 94—103, t. VII) schon berichtete; fünf der neuen Smith'schen Arten fand Fruhstorfer nicht, dafür aber eine Reihe anderer, welche Everett entgangen waren. Danach ist wohl mit Bestimmtheit zu erwarten, dass eine gründliche Durchforschung der Insel

die Artenzahl noch sehr erheblich vermehren wird. Es fehlen noch Vertreter einer Reihe von Gattungen, die sicherlich noch aufzufinden sind, wie z. B. Diplommatinidae.

1. *Helicarion celebensis* Pfr.

— Smith l. c. p. 95.

Die mir vorliegenden Exemplare, von denen nur eins leidlich erhalten ist, sind sichtlich identisch mit der von Smith besprochenen Form. Wie er selbst sagt, stimmen sie nicht ganz zu Pfeiffers Beschreibung, doch wird er mit der Identificirung wohl Recht haben.

2. *Euplecta (Pareuplecta) ribbei* (Dohrn).

— *Nanina Ribbei* Dohrn J. D. M. G. X, 1883, p. 345, t. XI, f. 1—3.

Diese bisher sehr seltene Art, welche Herr Ribbe bei Maros in der Nähe von Macassar in einem Stück gesammelt hatte, war Fruhstorfer so glücklich am Bua Kraeng wieder aufzufinden. Wegen der dünnen Schale, der Verschiedenheit der Skulptur auf der Ober- und Unterseite und des Kieles gehört sie sicher zu Euplecta und zwar am besten in die Sektion Pareuplecta wegen des stark abgesetzten, einfachen Kieles. Zu derselben Gruppe rechne ich auch N. riedeli v. Mart.

3. *Sitala diplotropis* v. Mlldff. n. sp.

T. pro genere sat aperte perforata, turbinata, tenuis, pellucida, parum nitens, virescenti-flavida. Spira sat elevata, lateribus convexiusculis, apice plano. Anfractus 6 convexi, sutura filiformi subeanaliculata disjuncti, striatuli, medio carinulis 2 filiformibus approximatis cincti, ultimus infra peripheriam carina subexserta carinatus, basi distinctius striatus. Apertura parum obliqua, elliptica, modice exserta,

peristoma rectum, acutum, margine columellari superne dilatato reflexo.

Alt. et diam. max. 2,75 mm.

Bua Kraeng (5000').

Mit *S. carinifera* Stol. (Pinang) und *bicarinata* Bttg. (Java) verwandt, aber durch die sehr genäherten 2 Kielchen ausgezeichnet.

4. *Sitala jarana* Bttg. var. *celebesiana* Mlldff.

Differet a typo testa majore, magis nitente, anfr. paullo convexioribus.

Bua Kraeng.

Von Boettgers Art, ebenfalls von Fruhstorfer auf Java entdeckt, nur wenig verschieden. Ob und wo der Typus inzwischen publicirt worden ist, weiss ich nicht.

5. *Kaliella celebesiana* v. Mlldff. n. sp.

T. rimata, turbinata, tenuis, pellucida, leviter striatula, nitidula, luteo-cornea. Spira valde elevata lateribus convexiusculis apice acutulo. Anfr. 6 convexiusculi, sutura linearis disjuncti, ultimus ad peripheriam angulatus, basi convexior. Apertura sat obliqua, peristoma rectum, acutum, margine columellari superne breviter reflexo.

Alt. 3,9, diam. max. 3,75 mm.

Bua Kraeng.

Zur Gruppe der philippinischen *K. pseudositala* n. gehörig, aber grösser, breiter und batichiger.

6. *Kaliella platyconus* Bttg. var. *intermedia* v. Mlldff.

Differet a typo javano spira magis elevata, a varietate elatiore Bttg. ejusdem insulae spira magis depressa.

Alt. 3, diam. 3,5 mm.

Bua Kraeng.

Auch von dieser Art, die Fruhstorfer auf Java entdeckte, ist mir eine Publication noch nicht bekannt geworden.

7. *Xesta dimidiata* Smith.

— Smith l. c. p. 96, t. VII f. 19.

Süd-Celebes, 2—5000' (Everett), Bua Kraeng 5000' (Fruhstorfer).

8. *Xesta wallacei* (Pfr.)

Makassar (Wallace). Wasserfall bei Maros (v. Martens), Bantimurong und Tete-adje (Weber), Süd-Celebes 2000' (Everett), Batu Besi (A. B. Meyer). Bua Kraeng und Batumuang (Fruhstorfer).

9. *Xesta fulvizona* Mouss. var. *nitida* v. Mlldff.

— *Nanina fulvizona* var. v. Martens Mal. Bl. XX 1873 p. 164.

Tolitoli, N. Celebes (Fruhstorfer).

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die mir vorliegenden Stücke zu der Form gehören, welche v. Martens durch A. B. Meyer von Nord-Celebes erhielt und als Varietät zu fulvizona Mouss. rechnet. Aber wie schon Dohrn (J. D. M. G. X 1883 p. 344) hervorhebt, ist die Identificirung der nördlichen Form mit der Stammart von Süd-Celebes doch recht zweifelhaft. Gestalt, Skulptur, Färbung und Bänderung sind ziemlich verschieden. Ich habe eher Verdacht, dass die obenerwähnte *Xesta dimidiata* Smith der rechten fulvizona Mouss. näher steht. Da ich aber die letztere Art weder in Orignalexemplaren noch vom Originalfundort kenne, so schliesse ich mich doch vorläufig von Martens an; jedoch muss dann die nördliche Form unbedingt einen eigenen Varietätnamen haben. Ich finde sie, abgesehen von der Grösse, in Gestalt, Glätte und Glanz der X. vitellus nahestehend und unterscheide in dem mir vorliegenden Material die folgenden Formen:

1. Oben fast einfarbig gelblich weiss, an der Peripherie ein weisses Band, Unterseite mit einer bräunlichen nach der Mitte verschwimmenden Zone.

2. Dunkelbraune Suturalbinde, ebenso Nabelfleck, an der Peripherie zwei mehr oder weniger zerfliessende hellbraune Binden.

3. Oberhalb der Peripherie eine breite schwarzbraune, unterhalb derselben eine schmälere Binde und Nabelfleck derselben Farbe, Grundfarbe weisslich.

4. Bänderung ähnlich Form 3, aber Grundfarbe gelblichbraun.

5. An der Peripherie ein schmales schwarzbraunes Band, darunter eine gelbbraune Zone, ganze Unterseite schwarzbraun.

Formen 3 und 4 scheinen den Abbildungen in Nov. Conch. IV, t. 128, f. 3, 4, zu entsprechen.

10. *Xesta colorata* (Mouss.)

— *Helix colorata* (Mouss. Java 1849 p. 113 t. XXI f. 4 (juv.). — Pfr. Mon. III p. 271. — *Helix sulphurea* Reeve Conch. ic. f. 476. — *Nanina trochus* v. Martens Ostas. p. 210 (non Müller).

Makassar (Zollinger, Wallace u. a.) Süd-Celebes 2000' (Everett), Bua Kraeng und Batunuang (Fruhstorfer).

v. Martens sagt in seiner Bearbeitung der Weber'schen Ausbeute (Zool. Erg. II 1892 p. 227) dass er die echte *Nanina trochus* in der Form von Flores wiedererkenne, die er auf t. XIII f. 11—14 abbildet. Er fährt dann fort: „es ist mir jetzt wieder zweifelhaft geworden, ob die kleineren lebhaft gelb gefärbten, nach oben schärfer zugespitzten Stücke mit schmäleren Bändern, angeblich von Makassar, welche als *Helix colorata*, *circumpicta* und *sulphurea* bezeichnet worden sind, nicht doch eine besondere Art bilden, welche nur auf Celebes vorkommt.“ Dieser Auffassung schliesse ich mich nach dem Fruhstorfer'schen

Material und den Abbildungen der echten *X. trochus* von Flores voll und ganz an. Der Mousson'sche Name hat dann für die Celebes Art einzutreten.

11. *Xesta succincta* v. Middff. n. sp.

T. anguste et semiobtecte perforata, depressa, solidula, leviter striatula, lineis spiralibus minutissimis decussata, albida, superne lutescens, ad peripheriam taenia mediocri fusca ad suturam anfractuum superiorum conspicua ornata. Spira breviter conoidea. Anfr. $4\frac{1}{2}$ planulati, ultimus convexior, ad aperturam sat celeriter dilatatus. Apertura sat obliqua, ovalis, valde excisa, peristoma rectum, acutum, ad perforationem superne breviter reflexum.

Diam. maj. 22,5, min. 19, alt. 13,5, apert. 13, long. 10, alt. 9 mm.

Sichtlich mit *X. cincta* Lea nahe verwandt, aber kleiner, viel flacher, Windungen flacher, Spirallinien erst unter der Lupe deutlich, Nabelfleck fehlt.

12. *Rhysota (Hemiplecta) bonthainensis* Smith.

— *Hemiplecta bonthainensis* Smith I. c. p. 97 t. VII f. 20.

S. Celebes, Bonthain Peak, 4000' (Everett), Bua Kraeng, 5000' (Fruhstorfer).

13. *Rhysota (Hemiplecta) limbifera* v. Mart.

Nanina limbifera v. Mart. Mal. Bl. XX p. 165. Nov. Conch. IV, p. 121, t. 128 f. 1,2. — Tryon Man. Pulm. II p. 28 t. 7, f. 15,16.

Nord Celebes (A. B. Meyer), Tolitoli (Fruhstorfer).

14. *Rhysota (Hemiplecta) rugata* Mart.

Nanina rugata v. Mart. Ostas. p. 294, t. XVII f. 4. Tryon Man. Pulm. II p. 36, t. 9 f. 32,33.

Wasserfall bei Maros (v. Martens). Süd-Celebes 2000' (Everett), Bua Kraeng (Fruhstorfer).

Meine Stücke übertreffen z. Th. die Martens'schen Masse, das grösste hat 55 mm. Durchmesser bei 42 Höhe.

15. *Trochomorpha planorbis* (Less.)

Nord-Celebes (A. B. Meyer), bei Makassar (Wallace), Süd-Celebes (Fruhstorfer).

Es scheint bei unsrern amerikanischen und englischen Fachgenossen die Sucht altgewohnte Namen durch angeblich nach strengem Prioritätsprinzip ältere zu ersetzen zu einem förmlichen Sport auszuarten. So hat denn jüngst Godwin Austen (Proc. Mal. Soc. I 1895 p. 287) den Versuch gemacht, auch *Trochomorpha* zu entthronen und kommt zu dem wunderlichen Resultat. *Discus* Alb. (1850) dafür einzusetzen. Das geht nun freilich ganz und gar nicht wegen *Discus* Fitzinger (1833), aber selbst wenn diese einfache Lösung nicht vorhanden wäre, müsste der Vorschlag schon deshalb abgelehnt werden, weil der einzige Grund, der gegen *Trochomorpha* Alb. geltend gemacht wird, dass sie nämlich Arten enthält, die nach heutiger Auffassung nicht hineingehören, auf *Discus* Alb. ebenso gut passt. Will man, wie Godwin Austen zu beabsichtigen scheint, die 3 Abtheilungen von *Trochomorpha*, nämlich *Nigritella*, *Videna* und *Sivella*, als besondere Gattungen behandeln, so würde allerdings der Gesamtnname in Wegfall kommen können; dann müsste aber die zweite Gruppe (*Discus* Godw. Aust.) unbedingt *Videna* Ad. heissen. Während aber *Sivella* nach der Schale und den Weichteilen gut geschieden und wohl als Gattung abzutrennen ist, glaube ich nicht, dass eine solche Trennung zwischen *Videna* und *Nigritella* möglich sein wird. Es giebt eine Reihe Südsee-Arten, welche deutlich den Uebergang vermitteln. So wird denn *Trochomorpha* mit den Sektionen

Nigritella und Videna bestehen bleiben können, während ihnen Sivella als Gattung oder Untergattung gegenüber tritt.

16. *Obbina papilla* (Müll.) var. *platybasis* v. Mlldff.

Differt a typo forma magis conica, basi latiore, et spira magis cuspidata, rugis multo minus fortibus, apertura latiore, dextrorsum protracta.

Diam. 31, alt. 26 mm.

„ 29, „ 24 „

Tolitoli.

Verglichen mit meinem einzigen Exemplar von *O. papilla* würde die obige Form unbedenklich als neue Art aufzufassen sein, nicht sowohl der auffallend verschiedenen Skulptur wegen, denn wie diese bei Obbinen schwanken kann, wissen wir von philippinischen Arten zur Genüge, als vielmehr wegen der sehr abweichenden Gestalt. Aber auch diese scheint stark zu schwanken; mein Stück ist noch mehr bienenkorbartig, als z. B. Tryon's Figur 4 (Man. Puhl. VI t. 53) und seine fig. 3 nähert sich schon in der Gestalt der neuen Varietät. Nach den Erfahrungen, die die Obbina-Arten der Philippinen geboten haben, gehört ein sehr grosses Material dazu die Variabilitätsgrenze innerhalb derselben Art festzustellen. Es ist auffallend, dass die analogen Arten von Celebes immer nur einzeln und selten in den Verkehr kommen, während die philippinischen Arten meist sehr gesellig zusammenleben.

Das Vorkommen von Obbina in Nord-Celebes wird mit der Hauptverbreitung der Gattung auf den Philippinen verknüpft durch die Vorkommen auf den dazwischen liegenden Inseln. Auf der Insel Sarangani südlich von Mindanao haben wir *O. saranganica* Hid., eine grosse Form aus der Gruppe der *O. marginata* Müll., und von den Taland-Inseln *O. meyeri*, die ich kürzlich beschrieb (Abh. & Ber. K.

Zool. Mus. Dresd. 1896/97 No. 4). Letztere leitet zu *O. sororecula* v. Mart. von Nord-Celebes über.

17. *Planispira bulbulus* (Mouss.)

— *Helix bulbulus* Mouss. Jav. p. 114 (juv.) — *Helix bulbulus* Mouss. (mss.) v. Martens Ostas. p. 285 t. 17 f. 2, 19. f. 4. — Chemn. ed. II p. 574, t. 169, f. 7—9.— Tryon Man. Pulm. VI p. 258, t. 44, f. 1, 2, 3, 16, 17.—

Wasserfall bei Maros (v. Martens). — Bua Kraeng und Patunuang (Fruhstorfer).

Wenn ich diese schöne, sonst allgemein zu Chloritis gerechnete Art jetzt in Planispira unterbringe, so veranlassen mich dazu 1) die für Chloritis sehr ungewöhnliche Färbung und Zeichnung, 2) der glatte, nicht punktirte Apex, 3) die nicht regelmässige Anordnung der Haare oder Haarnarben. Für diejenigen, welche Pilsbry darin folgen, dass Planispira und Chloritis im System sehr nahe zu stehen haben, will diese Umstellung nicht viel besagen. Wenn man aber, wie ich immer noch verfechten möchte, Planispira an Obbina anreihet, so ist die Frage doch nicht ohne Wichtigkeit. Definitiv kann da nur die anatomische Untersuchung entscheiden. Von der nächstverwandten Art, *tuba* Alb., sagt v. Martens (Weber II p. 239), dass ihre Geschlechtsorgane denen von Planispira ähnlich seien: keine Anhangsdrüsen, *retractor penis* in dessen halber Länge inserirt, aber kein Flagellum vorhanden. Dies würde mithin für meine Auffassung sprechen; dagegen ist aber zu erwähnen, dass der Kiefer nicht oxygnath ist, sondern nach v. Martens 5 kurze Rippen hat. Es würde das allerdings auch so zu erklären sein, dass die Bildung des Kiefers in derselben Gattung wechseln kann, wie es Pilsbry von *Caracolus* behauptet.

18. *Patula (Macrocyloides) aberrans* v. Mlldff. n. sp.

T. aperte umbilicata, conoideo-depressa, tenuiuscula, confertim et subtiliter striata, subsericina, olivaceo-cornea. Spira modice elevata lateribus convexiusculis. Anfr. $4\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus convexus ad peripheriam indistincte angulatus, vix descendens. Apertura valde obliqua, subcircularis, valde excisa, peristoma rectum, acutum, ad umbilicum subexpansum.

Diam. 2, 5, alt. 1, 5 mm.

Bua Kraeng, 5000'.

Wegen des Nabels, des graden Mundsaums, der Streifung ist diese kleine Form wohl nirgends anders unterzubringen als bei den Patuliden. Zu *Macrocyloides* v. Mart. passt die grünliche Farbe, allerdings ist nur ein schwacher Seidenglanz vorhanden, während die typischen Arten nach v. Martens Firnißglanz aufweisen. Auch an *Pyramidula* (Fitz. nee Pilsbry!) erinnert die kleine Art.

19. *Satsuma bembicodes* v. Mlldff. n. sp.

T. perforata, trochacea, tenuiuscula, striatula, microscopice granulosa, sericina, luteo-brunnea. Spira valde elevata, fere regulariter conica apice obtusulo, laevi, nitente. Anfr. $6\frac{1}{2}$ paullum convexiusculi, sutura sat impressa disjuncti, ultimus acute carinatus, basi distinctius granulosus. Apertura diagonalis, ovalis, modice excisa, peristoma superne fere rectum, extus paullum, basi magis expansum, ad umbilicum dilatatum.

Diam. 9,5, alt. 9,25 mm.

Bua Kraeng, 5000'.

Das Vorkommen eines Vertreters dieser interessanten Gattung auf Celebes kann um so weniger überraschen als dieselbe einerseits auf den Philippinen in reicher Artenzahl nachgewiesen ist, andererseits auch im malayischen Archipel

mehrfach auftritt, z. B. *conulus* v. Mart. und *rufofilosa* Bock auf Sumatra, *bantamensis* Smith auf Java, *niahensis* G. Aust., *tigaensis* G. Aust. und *subflava* G. Aust. auf Borneo. Ob *Helix leucophloea* v. Mart. von Nord-Celebes, die auf ein junges Stück basirt wurde, wirklich hierher gehört, ist mir noch etwas zweifelhaft; es könnte auch eine ganz junge *Galycia*, welche Gattung Everett auf Celebes in einer Vertreterin entdeckt hat, gewesen sein. Es fehlt nun noch die Verbindung von den grossen Sunda-Inseln zu Neu-Guinea, wo Satsuma-Arten wieder auftreten, da bisher von den Molukken noch keine Art bekannt ist.

20. *Eulota suffodiens* Btg.

Helix fodiens Wallace Proc. Zool. Soc. 1865 p. 408 non Pfr. — *Helix (Dorcasia) suffodiens* Btg. B. Senck. Ges. 1891 p. 267, t. III f. 10 a—c. — *Helix (Eulotella) textoria* Martens, Zool. Erg. Weber II p. 236, t. XIV, f. 9—12.

Makassar (Wallace), Gorontalo, N. Celebes (Strubell), Loka bei Bonthain und Insel Saleyer (Weber), Bua Kraeng (Fruhstorfer).

Während meine Exemplare, die nicht weit von Weber's Fundort gesammelt sind, sehr gut zu Boettger's Beschreibung und Abbildung stimmen, glaube ich auch der Identität der *textoria* v. Mart. mit *suffodiens* Btg. sicher zu sein. Allerdings erwähnt v. Martens die Kantung des letzten Umgangs und die Granulirung nicht, aber die erstere ist bei meinen Stücken (wie bei der philippinischen *fodiens*) sehr verschieden ausgeprägt und verschwindet bei alten Exemplaren fast völlig und die letztere wird erst bei recht starker Vergrösserung erkennbar. Alles Uebrige stimmt vortrefflich. Es ist auch in hohem Grade unwahrscheinlich, dass 2 Arten derselben Gruppe ganz nahe bei einander leben sollten.

21. *Chloritis flavidula* v. Mart.

Helix flavidula v. Mart. Ostas. p. 302, t. XIV f. 4.

(*Planispira*). — Pfr. Mon. V, p. 378. — Tryon Man. Pulm. VI p. 288, t. 45, f. 47, 48, 49.

Wasserfall bei Maros (v. Mart.), Bua Kraeng (Fruhstorfer).

Im Gegensatz zu der obenerwähnten *H. bulbulus* stelle ich diese bisher zu *Planispira* gerechnete Art in die Gattung *Chloritis*. Sie hat skulptirten Apex, regelmässig angeordnete Haarnarben, auch die Mündung und der ganze Habitus sind viel mehr *Chloritis* ähnlich. Ich bin auch fast sicher, dass *Chloritis plena* var. *celebensis* Smith (I. c. p. 97), welche Everett in Süd-Celebes sammelte, identisch mit unserer Art ist.

Die Dimensionen wechseln; schon v. Martens gab 17,5 bis 19 mm als Durchmesser. Mein grösstes Stück hat 20, mein kleinstes 17 mm. diam.

22. *Chloritis howesii* Smith.

Smith I. c. p. 98, t. VII f. 21,22.

Süd-Celebes 2000' (Everett), Bua Kraeng (Fruhstorfer).

23. *Chloritis bonthainensis* Smith.

— *Chloritis howesii* var. *bonthainensis* Smith I. c. p. 98.

Pik Bonthain (Everett), Bua Kraeng (Fruhstorfer).

Wenn das mir vorliegende Exemplar, wie ich annehme mit der Smith'schen Varietät identisch ist, so sind doch so bedeutende Unterschiede von der vorigen Art vorhanden, dass die beiden Formen unbedingt artlich geschieden werden müssen. Die Gesamtform ist eine andre; *howesii* hat 30 mm diam. bei 15 Höhe (Smith: 33: 16), *bonthainensis* 28: 16,5, das Gewinde ist bei der ersten gar nicht hervortretend, sondern etwas eingesenkt, bei der letzteren deutlich erhoben, so dass alle Windungen ausser der ersten sichtbar sind. Der letzte Umgang ist bei *howesii* schwach aber deutlich oben gewinkelt, bei *bonthainensis* gleichmässig gerundet. Der Mundsaum der letzteren hat eine feine braune Grünsäumung, welche der andern fehlt. Den Ausschlag giebt

aber für mich die Skulptur und Behaarung. Bei *C. howesii* zähle ich auf einem Strich von 2 mm. 7 Haare, bei *bonthainensis* nur drei.

24. *Camaena (Pseudobba) papilliformis* v. Müll.

T. anguste et semiobtecte umbilicata, conoideo-ovata, solida, oblique subruditer et irregulariter plicata, minute punctato-granulata, opaca, castanea. Spira ovato-conoidea, apex magnus (anfr. 3), pallidior, subnitens, subcostatus. Anfr. $6\frac{1}{2}$ sat lente accrescentes, sutura sat impressa disjuncti, modice convexi, ultimus antice subdistortus, ad aperturam breviter valde deflexus. Apert. diagonalis, ovalis, modice excisa, peristoma sat expansum, albolabiatum, marginibus callo elevato junctis, supero valde flexuoso, infero medio protracto, columellari dilatato, umbilicum medio obtegente.

Diam. 34, alt. 33,5, apert. lat. 22, long. 17, alt. 10 mm.
Tolitoli (Fruhstorfer).

Eine schöne Bereicherung der kleinen ausschliesslich celebesischen Sektion *Pseudobba*, von *C. mamilla* Fér. durch die Gestalt und die ganz andere Skulptur sehr verschieden.

25. *Amphidromus perversus* (L.)

S. Celebes, 2000' (Everett), Bua Kraeng (Fruhstorfer),
Bulu-Sipong bei Maros, Loka bei Bonthain (Weber).

26. *Amphidromus interruptus* Müll.

Tempe (Weber), S. Celebes (Everett), Bua Kraeng (Fruhstorfer).

So sehr es anzuerkennen ist, dass Fulton in seiner tüchtigen Arbeit über *Amphidromus* (Ann. Mag. Nat. Hist. XVII 1896 p. 66—94) eine Reihe von unnötig abgetrennten Arten eingezogen hat, so scheint er mir doch in der Gruppe des *A. perversus* zu weit mit der Combinirung gegangen zu

sein. Mit der Zusammenziehung von interruptus und sultanus bin ich sehr einverstanden, möchte aber lieber die combinierte Art dem A. perversus selbständige gegenüberstellen. Bei dem mir vorliegenden Material ist mir noch aufgefallen, dass unter 6 perversus nur ein rechtsgewundenes Stück war, dagegen unter 6 interruptus nicht ein einziges linkes.

Zu dieser Art gehören zweifellos als Höhenform 2 Stücke aus der Höhe von 5000 Fuss am Bua Kraeng, die ich besonders benenne:

var. contracta v. Mlldff. Differt testa breviore, ventricosiore. Alt. 41, diam. 26 mm. (sp. dextr.)

Ein linkes Stück misst 27 Durchmesser bei 40 Höhe.

27. *Amphidromus contrarius* Müll. var. *maculata* Fulton
l. c. p. 78, t. VII f. 4.

Makassar (Fulton), Bua Kraeng (Fruhstorfer).

Zu den von Fulton angeführten Unterschieden ist noch ein wichtiger hinzuzufügen: der ganz schwache Mündungscallus und in Folge dessen Fehlen der zahnartigen Verdickung auf der Mündungswand neben der Einfügung des äusseren Mundsaums.

28. *Amphidromus jucundus* Fulton.

A. filozonatus var. *jucunda* Fult. l. c. p. 78, t. VII f. 8.

Makassar (Fulton), Bua Kraeng (Fruhstorfer).

Zwar kenne ich A. filozonatus Mouss. nur nach v. Martens' Abbildung, aber nach derselben kann von einer Combination der allerliebsten Form von Celebes mit der javanischen Art nur dann die Rede sein, wenn man die ganze Reihe der kleinen nur linksgewundenen Amphidromen (Gruppe des A. contrarius) als Varietäten einer Art auffasst. Grösse, Gestalt, Textur, und Färbung, Zeichnung, Mündung, kurz alles ist abweichend.

29. *Rhachis zonulata* (Pfr.) var. *celebensis* v. Mart.

Buliminus zonulatus var. *celebensis* v. Mart. Ostas p. 368 t. 21, f. 13.

Kema in Nord-Celebes (v. Martens), Celebes (Fruhstorfer).

Den Typus wollte Cuming auf Luzon gefunden haben, was ich stark bezweifeln möchte. Auf den Philippinen kommt die Art jedoch wirklich vor und zwar auf den Calamianes-Inseln Culion und Busuanga. Meine Exemplare von Celebes unterscheiden sich von denen von Culion und durch geringere Grösse und etwas schlankere Gestalt.

30. *Clausilia (Euphaedusa) subpolita* Smith.

— Smith l. c. p. 99, t. VII f. 26.

S. Celebes (Everett), Bua Kraeng (Fruhstorfer).

Wegen des breiten Clausiliums sicher Euphaedusa, ohne dass ich eine näher verwandte Art namhaft machen könnte. Eigenthümlich ist der Mangel an Palatalfalten oder einer Lunella. Dagegen fand sich beim Aufbrechen eines Exemplars eine sehr auffallende Bildung der Unterkamella. Sie steigt innen sehr rasch und hoch an und ist dann plötzlich im rechten Winkel abgestutzt.

31. *Clausilia (Euphaedusa) usitata* Smith.

— Smith l. c. p. 100, t. VII f. 27.

Mit voriger Art.

Mondfalte vorhanden, aber kaum als „distincta“ zu bezeichnen, wie Smith will. Es sind zwei deutliche Palatalfalten vorhanden, welche durch einen viel schwächeren Bogen verbunden sind; bei einzelnen Stücken ist er kaum zu sehen.

32. *Clausilia (Euphaedusa) alternata* v. Mlldff.

T. sinistrorsa, rimata, ventricosulo-fusiformis, solidula, confertim costulato-striata, subsericina, alternatum brunnea

et flava. Spira inferne ventricosula, tum apicem versus fere concava. Anfr. 8 convexiusculi, ultimus paullulum distortus, basi inflatus, rotundatus. Apertura verticalis, sat ampla, ovalis, peristoma continuum, modice expansum. Lamella supera modica, subobliqua, infera valida, valde spiraliter torta, intus illi approximata. Plica principalis sat brevis, palatales 3, mediae breves, infera longior.

Alt. 10,5, diam 3, apert long. 2,8, lat. 2,2 mm.

Bua Kraeng.

Nur 1 Exemplar; durch die kurze, ziemlich bauchige Gestalt, die Färbung, die verhältnissmässig grosse Mündung sehr ausgezeichnet. Im Schliessapparat schliesst sie sich der aculus-Gruppe am ehesten an.

33. *Clausilia (Euphaedusa) simillima* Smith.

— Smith l. c. p. 99, t. VII f. 25.

Süd-Celebes (Everett), (Fruhstorfer).

Die von Smith hervorgehobene Unterschiede von *Cl. moluccensis* v. Mart. scheinen mir zur Abtrennung der Celebes-Form als besondere Art zu genügen.

34. *Clausilia (Hemiphaedusa) celebensis* Smith

— Smith l. c. p. 99, t. VII f. 24.

Pik Bonthain 5—6000' (Everett), Bua Kraeng (Fruhstorfer), auch weiter unten 2000' (Everett).

Nach den ziemlich schmalen, zugespitzten Clausilium, der ventralen, kräftigen, fast gradlinigen Mondfalte, der vortretenden Spindellamelle eine sichere Hemiphaedusa, von welcher Sektion meines Wissens noch kein Vertreter so weit südlich nachgewiesen war.

35. *Pythia trigona* Trosch.

Tolitoli, Nord-Celebes.

36. *Leptopoma ritreum* Less.

Ganz typisch.

37. *Leptopoma menadense* Pfr.

Menado (Adams, Riedel). Tolitoli, Nord-Celebes (Fruhs-torfer).

38. *Leptopoma celebesianum* v. Mlldff. n. sp.

T. perforata, globoso-turbinata, tenuis, pellucida, subtiliter striatula, lineis spiralibus valde confertis decussata, albida, taeniis 2 castaneis picta aut lutea taeniolis albidis variegata. Spira modice elevata. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, ultimus tumidulus. Apert. modice obliqua, circularis, peristoma duplex, internum brevissime porrectum, externum anguste patens, margine columellari profundiuscule sinuato.

Diam. et alt. 9,5 mm.

Bua Kraeng.

39. *Lagochilus pachytropis* v. Mlldff. n. sp.

T. anguste umbilicata, trochiformis, striatula et lineis spiralibus confertis decussata, flava, strigis latiusculis subflammulatis fuscis picta. Spira sat elevata lateribus subconcaavis, apice obtusulo. Anfractus 6 convexiusculi, sutura per carinam exsertam subceanalieulata disjuncti, ultimus carina crassa oblusa sed bene exserta carinatus. Apertura modice obliqua, subcircularis, peristoma duplex, internum continuum, porrectum, superne breviter excisum, externum interruptum, breviter patens, ad insertionem breviter excisum.

Diam 9,5, alt. 8,5.

Bua Kraeng.

40. *Lagochilus euconus* v. Mlldff. n. sp.

T. anguste umbilicata, sat elata turbinata, solidula, opaca, brunnea; spira valde elevata, regulariter conica,

apice acutulo. Anfr. 6 convexi, sutura profunda disjuncti, leviter striatuli, minute decussati, liris 3 elevatis cincti, pilis longiusculis, valde deciduis hirsuti. Apertura fere diagonalis, subcircularis, peristoma parum expansum, intus albolabiatum, ad insertionem subexcisum.

Diam. 4, alt. 4,75 mm.

Bua Kraeng.

41. *Pterocyclus celebensis* (Smith).

Cyclotus Celebensis Smith I. c. p. 101, t. VII f. 4—6.

Süd-Celebes 2000—4000' (Everett), Bua Kraeng (Fruhstorfer).

Mein ganz mit Smith's Beschreibung übereinstimmendes Exemplar hat allerdings ganz das Aussehen eines *Eucyclotus*, aber der Deckel verweist die Art zu *Pterocyclus*. Seine Beschreibung durch Smith ist ganz verfehlt. Er nennt ihn aus abwechselnd hornigen und kalkigen Lamellen bestehend, was freilich auch zu *Cyclotus* nicht passen, sondern zur Schaffung einer neuen Gattung nöthigen würde. In Wirklichkeit sind die Ränder der Windungen lamellenartig erhoben und von festerer Substanz als die innere horngige Platte, aber doch nicht kalkig. Die Aussenseite ist nicht nur nicht konkav, sondern etwas konvex. Im Ganzen also ein typischer *Pterocyclus*-Deckel. Der Flügel am oberen Mundsaum, den die Beschreibung nicht erwähnt, die Abbildung aber wiedergibt, ist nur mässig entwickelt.

42. *Cyclotus (Eucyclotus) fasciatus* v. Mart.

Ostas, p. 118. t. I f. 3.

Wasserfall bei Maros (v. Martens), Süd-Celebes 2000' (Everett), Bua Kraeng (Fruhstorfer).

Zur Gruppe von *C. variegatus* Swains. gehörig, dem *C. euzonus* Dohrn von Paragua in der Zeichnung sich nähernd.

43. *Cyclotus (Eucyclotus) pyrostoma* Smith.

— Smith l. c. p. 100, t. VII f. 1—3.

Süd-Celebes 2000' (Everett), Bua Kraeng (Fruhstorfer).

Smith macht mit Recht auf die überraschende Ähnlichkeit dieser Art mit philippinischen flachen Cyclophorus aufmerksam, doch ist der Deckel ein typischer Cyclotus-Deckel.

44. *Cyclotus (Eucyclotus) semiliratus* v. Mlldff. n. sp.

T. late et aperte umbilicata, discoidea, solida, opaca, luteo-brunnea, indistincte maculata, infra peripheriam taenia angusta fusca ornata. Spira brevissime conoidea apice mucronato, glabrato, acutulo. Anfr. 5 perconvexi, ad suturam profunde impressam planati, primi 3 striatuli, ultimi carinulis crassiuseculis consertis et striis transversis magis distinctis sculpti, ultimus ad peripheriam carinulatus, basi glabratus, nitens, antice breviter descendens. Apertura diagonalis, intus pallide flavescens, peristoma duplex, internum flavescens, continuum, superne appressum, brevissime porrectum, externum modice expansum, vix incrassatum, ad insertionem triangulariter dilatatum, appressum. Operculum ut spec. praeced.

Diam. 19,5, alt. 10 mm.

Bua Kraeng.

Ganz das Miniaturbild der vorigen Art, aber abgesehen von der Grösse von ihr doch so abweichend, dass man sie als eigene Art auffassen muss. Die Mündung ist innen nicht roth, sondern schwach gelblich, ebenso der innere Mundsaum; die Windungen sind zur Naht deutlicher abgeflacht, die letzte bis kurz vor der Mündung horizontal, dann kurz herabsteigend; bei C. pyrostoma ist die letzte Windung erst deutlich ansteigend, dann länger und stärker herabgebogen, daher Mündung viel schiefer. Der Mundsaum ist bei C. semiliratus viel weniger verdickt und am Nabel fast gar nicht gebuchtet.

45. *Cyclotus (Pseudocyclophorus) longipilus* v. Mart.

v. Martens Ostas. p. 124, t. II f. 9.

Bei Maros (v. Martens), Batunuang (Fruhstorfer).

46. *Cyclotus (Pseudocyclophorus) fulminulatus* v. Mart.

v. Martens Ostas. p. 123, t. II f. 1, 16. —

Cyclotus politus Smith I. c. p. 100 (an Sow.) ?

Wasserfall bei Maros (v. Martens), Süd-Celebes 2000' (Everett), Batu Sipong (Weber), Bua Kraeng (Frnhstorfer), Minahassa (Dr. Warburg).

Wenn man, wie Smith will, C. fulminulatus v. Mart., amboinensis Pfr. und den jetzt durch v. Martens wiedererkannten echten C. politus Sow. von Flores (Zool. Erg. Weber II p. 213 t. XII f. 4) nur als Varietäten einer Art auffassen will, so muss die combinierte Art allerdings den Sowerby'schen Namen als ältesten tragen. Ich halte aber eine solche Combination noch für verfrüht, da sich die verschiedenen Lokalrassen gut auseinander halten lassen und von vielen Punkten, wo sich Uebergänge erwarten lassen, Vergleichsmaterial noch fehlt. Fruhstorfer hat die Art in mehreren Formen gesammelt, die eine in Form und Grösse ganz typisch, diam. 19,5, alt. 16,5, apert. diam. 10, aber Färbung heller und Zickzackzeichnung fast verschwindend; eine andre kleiner, diam. 18, alt. 14, apert. diam. 8,5, und bunt gezeichnet, wie v. Martens' Typus. Die Form aus der Minahassa ist noch kleiner, diam. 16,5, alt. 13,5, apert diam. 8, und hat einen etwas weiteren Nabel.

47. *Cyclotus (Pseudocyclophorus) amboinensis* Pfr. var.
stenomphala v. Mlldff.

Diam. 11, alt. 9,5, apert. diam. 6. mm

Differt spira paullo elatiore, umbilico angustiore, operculo paullo magis concavo.

Loka bei Bonthain (Weber), Süd-Celebes (Fruhstorfer).

Mit den durch Fruhstorfer gewonnenen Zusätzen stellt sich unsre Kenntniss der Fauna auf den Norden und Süden vertheilt, wie folgt:

		Nord	Süd
1	<i>Helicarion flammulatus</i> Q. & G.	—	+
2	" <i>viridis</i> " "	—	+
3	" <i>celebensis</i> Pfr.	—	+
4	" <i>idae</i> "	—	+
5	" <i>wallacei</i> Smith.	—	+
6	<i>Euplecta ribbei</i> Dohrn.	—	+
7	" <i>riedeli</i> v. Mart.	+	—
8	<i>Macrochlamys fulvocarnea</i> v. Mart.	+	—
9	" <i>indifferens</i> Smith.	—	+
10	<i>Sitala diplotropis</i> v. Mlldff.	—	+
11	" <i>javana</i> Bttg. var. <i>celebesiana</i> v. Mlldff.	—	+
12	<i>Kaliella celebesiana</i> v. Mlldff.	—	+
13	" <i>platyconus</i> Bttg. var. <i>intermedia</i> v. Mlldff.	—	+
14	<i>Lamprocystis consors</i> Smith.	—	+
15	" <i>consimilis</i> "	—	+
16	<i>Xesta dimidiata</i> Smith.	—	+
17	" <i>fulvizona</i> Mouss.	—	+
17a	" " var. <i>nitida</i> Mlldff.	+	—
18	" <i>vitellus</i> Shuttlew.	+	—
19	" <i>wallacei</i> Pfr.	—	+
20	" <i>cineta</i> Lea.	+	—
21	" <i>succincta</i> Mlldff.	+	—
22	" <i>colorata</i> Mouss.	—	+
23	? " <i>nemorensis</i> Müll.	?	?
24	? " <i>stuartiae</i> Sow.	?	?
25	<i>Ariophanta celebensis</i> Pfr.	?	?
26	" <i>semisculpta</i> v. Mart.	+	—

			Nord	Süd
27	Rhysota (Hemiplecta) bonthainensis Sm.		—	+
28	" " limbifera v. Mart.		+	+
29	" " sibylla T. G.		—	+
30	" " rugata v. Mart.		—	+
31	Trochomorpha planorbis Less.		+	+
32	" gorontalensis v. Mart.		+	—
33	" ternatana Le Guill.		?	—
34	Obbina sororecula Mart.		+	—
35	? " listeri Gray		?	—
36	" papilla Müll.		+	—
37	" heroica Pfr.		+	—
38	Planispira bulbulus Mouss.		—	+
39	" tuba Alb.		—	+
40	" zodiacus Fér.		—	+
41	Patula (Macrocyloides) aberrans Mlldff.		—	+
42	Plectotropis winteriana Pfr.		+	—
43	Satsuma bembicodes Mlldff.		—	+
44	? " leucophloea v. Mart.		+	—
45	Eulota suffodiens Bttg.		+	+
46	" (Eulotella) similaris Fér.		+	—
47	Chloritis flavidula v. Mart.		—	+
48	" biomphala Pfr.		+	—
49	" howesii Smith.		—	+
50	" bonthainensis Smith.		—	+
51	" pilisparsa v. Mart.		+	—
52	? " lansbergiana Dohrn.		?	?
53	Camaena (Pseudobba) quoyi Desh.		+	—
54	" " mammilla Fér.		+	—
55	" " papilliformis Mlldff.		+	—
56	Papuina euchroes Pfr.		?	?

		Nord	Süd
57	<i>Cochlostyla leucophthalma</i> Pfr.	?	?
58	<i>Calycia everetti</i> Smith.	—	+
59	<i>Amphidromus perversus</i> L.	—	+
60	" <i>interruptus</i> Müll.	—	+
61	" <i>beccarii</i> T. C.	—	+
62	" <i>sinistralis</i> Rve.	+	—
63	" <i>contrarius</i> Müll. vr. <i>maculata</i> Fult.	—	+
64	" <i>jucundus</i> Fult.	—	+
65	<i>Rhachis zonulata</i> Pfr. var. <i>celebensis</i> v. Mart.	+	+
66	<i>Pupa celebensis</i> T. C.	—	+
67	<i>Clausilia subpolita</i> Smith.	—	+
68	" <i>usitata</i> "	—	+
69	" <i>alternata</i> Mlldff.	—	+
70	" <i>moluccensis</i> v. Mart.	—	+
71	" <i>simillima</i> Smith.	—	+
72	" <i>celebensis</i> "	—	+
73	<i>Opeas gracile</i> Hutt.	—	+
74	<i>Vaginulus graffi</i> Simr.	—	+
75	<i>Pythia trigona</i> Trosch.	+	—
76	" <i>reeeveana</i> Pfr.	?	?
77	" <i>albovaricosa</i> Pfr.	?	?
78	" <i>celebensis</i> Pfr.	?	?
79	" <i>pantherina</i> A. Ad.	?	?
80	<i>Leptopoma vitreum</i> Less.	+	+
81	" <i>menadense</i> Pfr.	+	+
82	" <i>celebesianum</i> Mlldff.	—	—
83	" <i>moussonii</i> v. Mart.	—	+
84	<i>Lagochilus bellum</i> v. Mart.	+	—
85	" <i>ciliocinctum</i> vr. <i>quinquefilosum</i> v. Mrt.	—	—
86	" <i>pachytropis</i> Mlldff.	—	+

		Nord	Süd
87	<i>Lagochilus euconus</i> Mlldff.	—	+
88	<i>Cyclophorus</i> (? <i>Lagochilus</i>) <i>nigricans</i> v. Mart.	+	—
89	<i>Pterocyclus temulabiatus</i> Metc.	+	—
90	" <i>celebensis</i> Smith.	—	+
91	<i>Cyclotus</i> (<i>Euecyclotus</i>) <i>fasciatus</i> v. Mart.	—	+
92	" " <i>pyrostoma</i> Smith.	—	+
93	" " <i>semiliratus</i> Mlldff.	—	+
94	" (<i>Pseudocyclophorus</i>) <i>guttatus</i> Pfr.	+	—
95	" " <i>fulminulatus</i> v. Mrt.	+	+
96	" " <i>amboinensis</i> Pfr. var. <i>stenomphala</i> Mlldff.	—	+
97	" " <i>longipilis</i> v. Mart.	—	+
98	" " <i>depictus</i> T. C.	—	+
99	<i>Alycaeus jagori</i> v. Mart.	—	+
100	" <i>celebensis</i> "	—	+
101	<i>Helicina parva</i> Sow.	+	—
102	" <i>oxytropis</i> Gray.	—	+

Ein neuer Fundort für *Trigonostoma holosericea* Stud.

Von
W. Baer. Niesky, O. L.

Bei dem vorwiegenden Vorkommen dieser Art in einer Meereshöhe von mehr als 700 m. ist es wohl bemerkenswert, dass ich zwei Exemplare derselben in dem niedrigen Saalwalde und zwar in den feuchten Schluchten der Heinrichsteinfelsen bei Lobenstein, Reuss j. L. in einer Höhe von weniger als 500 m. im Juli 1888 gefunden habe.

Sie hielt sich dort in Gesellschaft von *Trigonost. obvoluta* Müll. und *Triodops. personata* Lam. auf, die auf dem mit einer üppigen Gebirgsflora bedeckten Humus und in dem Mulm der an den unzugänglichen Stellen verfaulten Buchenstöcke häufig waren. So weit ich urteilen kann, ist dieses Vorkommen neu. Die Stücke habe ich Herrn Dr. W. Kobelt übersandt.

Literaturbericht.

Oppenheim, Paul, neue Binnenschnecken aus dem Vicentiner Eocän. — In Zeitschr. d. Deutschen Geologischen Gesellschaft. Vol. 47. 1895 p. 57—193. Mit Taf. 3 und 4.

Durch die Entdeckung einer neuen Schicht mit gut erhaltenen, wenn auch sehr zerbrechlichen Fossilien im Val de Mazzini bei Pugnella ist es dem Autor möglich geworden, einen sehr erheblichen Nachtrag zu seiner früheren Arbeit zu geben. Die Zahl der Arten beläuft sich jetzt auf 58. An dem Gesamtcharakter der Fauna wird durch die neuen Arten nicht viel geändert, nur dass die recentpaläarktischen Züge etwas mehr hervortreten. Es sind die Bewohner eines reich gegliederten wahrscheinlich gebirgigen Festlandes, welche * mit vulkanischer Asche zusammen geschwemmt wurden. Charakteristisch sind die grossen *Helices* westindischer Verwandschaft (*Prothelidomus* und *Dentellocaracolus*), die zahlreichen *Clausilien* aus den Sectionen *Disjunctaria*, *Emarginaria*, *Euclausta*, *Phaedusa*, *Oospira* und die eigenthümlichen *Pneumonopomen*. Von paläarktischen Gattungen sind hinzugekommen *Coelostele* und *Acme*; auch *Limnaea*, *Planorbis*, *Neritina* sind gut entwickelt. Von grossem Interesse ist die totale Verschiedenheit von der pariser Eocänsfauna, welche beweist, dass der Unterschied der nördlicheren von der mediterranen Fauna älter ist, als die Erhebung der Alpen. Die angehängten Betrachtungen über die geographische und zoogeographische Bedeutung des vicentinischen Eocän sind von grossem Interesse und verdienen allgemeine Beachtung.

Oppenheim, Paul, Beiträge zur Binnenfauna der provençalischen Kreide. In Palaeontographica Vol. 42 p. 309—387 Taf. 16—19.

Der Autor hat besonders das Lignitbecken von Fuveau untersucht, eine auf der Grenze zwischen Kreide und Tertiär stehende Bildung, welche er jetzt definitiv der Kreide zuweist. Die Molluskenfauna ist von ganz besonderem Interesse durch den Reichthum an Formen, welche im Alter den letzten Umgang loslösen und nach oben biegen, oder die früheren Umgänge damit einhüllen (die Gattungen *Lychnus*, *Anadromus*, *Anostomopsis*, *Nicolosia*, etc.). Sie schliesst sich sonst schon innig an die alttertiäre, obschon gemeinsame Arten nicht vorhanden sind. Von hohem Interesse ist das Vorkommen zweier *Clausilia*, die seither aus der Kreide noch nicht bekannt waren. Die Deckelschnecken sind vertreten durch *Cyclostoma*, *Cyclotus*, *Bauxia* (= *Leptopoma Sandb.*), *Rognacia* n. und die sehr verdächtige *Ajkaia*; *Helix* fehlt, aber *Bulimus* wird durch eine Art vertreten. Für die angeblichen eocänen *Megaspira* wird die Gattung *Palaeostoa Andreæ* anerkannt, der nichts mit *Bulimus* zu thun hat, sondern eine Mitteltorm zwischen *Clausilia*, *Triptychia* und *Megaspira* zu sein scheint. Die Existenz einer *Spatha* ist sehr zweifelhaft, dafür scheint wirklich eine *Cleopatra* vorzukommen, der einzige afrikanische Zug in der Fauna. *Margaritana* ist durch sechs Arten vertreten; *M. toulouzani* erinnert in der Schlossbildung an *Castalia*.

Proceedings of the Zoological Society of London 1895.

- p. 97. Smith Edg. A., on a Collection of Land-Shells from Sarawak British North Borneo, Palawan and other neighbouring islands. With pl. II—IV.
- p. 241. Collinge, Walter E. and H. H. Godwin-Austen, on the structure and affinities of some new species of Mollusca from Borneo. — *Neu Damayantia smithi* p. 242 t. 4 fig. 1—6, Poeh Mts., zur Subfamilie Durgellinae gehörend; — *Micoparmarion pollonerai* p. 244 fig. 13—25, Kinabalu, 10,000'; — *M. simrothi* p. 245 fig. 26—29 ibid.
- p. 438. Godwin-Austen, H. H., List and Distribution of the Land-Mollusca of the Andaman and Nicobar Islands, with description of some supposed new species. — *Neu Sitala homfrayi* p. 448, fig.; Süd Andaman; — *Planispira winterleyi* p. 449, Nicobaren; —

Pupisoma constrictus p. 451 fig. B., Süd Andaman; — *Vaginulus giganteus* p. 451; — *Acmella mellila* p. 453 f. C. *ibid.*; — *Gyathopoma natalicum* p. 453 fig. D., Camorta; — *Omphalotropis (Realia) brevis* p. 455, Camorta. —

- p. 664. Kerr, I. Graham, on some points in the Anatomy of *Nautilus pompilius*. With pl. 38 & 39. —

Annals and Magazine of Natural History (6) XVI. (1895 II).

- p. 155. Pilsbry, H. A., a new Pupoid type of Helicinae. — *Cylindrus Fitz.* ist (nach den Untersuchungen von Martens-Protz) entweder zwischen *Leucocroa* und *Xerophila* oder zwischen diese und *Fruticicola* zu stellen. —

- p. 434. Godwin-Austen, H. H., Description of a supposed new species of Land-Shell of the Genus *Parmarion* from Pulo Laut, an island off the south-east Coast of Borneo (*P. dohertyi*). —

- p. 478. Melvill, J. Cosmo et John Ponsonby, Descriptions of five new species of *Emnea* from South Africa (*cimolia* p. 478 t. 18 f. 2; — *farghali* p. 479 t. 18 f. 3—5; — *labyrinthea* p. 479 t. 18 f. 7, 8; — *margarettae* p. 479 t. 18 f. 1; — *wolboni* p. 479 t. 18 f. 6, alle von Grahamstown. —

Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, Jahrgang 49.

- p. 53. Kobelt, Dr. W., die Molluskenfauna der makaronesischen Inseln.

The Journal of Conchology Vol. VIII No. 8. October 1896.

- p. 241. Smith, Edg. A., a List of the Land- and Freshwater Mollusca of Trinidad (cont.). — *Neu Drymaeus trinitarius* p. 242 t. 8 f. 7; — *Dr. mossi* p. 243 t. 8 f. 8; — *Dr. broadwayi* p. 243 t. 8 f. 9.

- p. 252. Tregelles, Marine Mollusca of Cornwall (cont.).

- p. 262. Horsley, J. W., the Mollusca of Plumstead Marshes.

Kobelt, W., Rossmässlers Iconographie der Land- Süsswasser-Mollusken. Neue Folge. Bd. VII. Lfg. 5 u. 6 (Schluss).

Die Schlusslieferung des siebenten Bandes enthält Glaesilien (meist mit den Böttger'schen Figuren) und Bivalven. Zum erstenmal abgebildet sind *Albinaria broemmei* sp. 1300; — *Anodonta arnouldi* Bourg. sp. 1308; — *Unio palustris* Drouët sp. 1310; — *U. directus* Drouët sp. 1311; — *U. quelleneci* Drouët sp. 1312; — *U. thermalis* Mtrs. sp. 1313; — *U. segregatus* Mtrs. sp. 1314; — *U. pamisinus* Drouët sp. 1315; — *U. copaisanus* Glessin miss. sp. 1316.

Wagner, G., über die Verbreitung der Pilze durch Schnecken. —
In Sorauers Zeitschr. für Pflanzenkrankheiten. Vol. VII.
1896 p. 144.

Dass die Schnecken Pilze fressen und die Sporen in keimfähigen Zustand wieder von sich geben, ist schon mehrfach beobachtet worden; der Verfasser hat die Uebertragung von Pilzkrankheiten durch dieselben direkt experimentell nachgewiesen.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 1896. Pl. 1.

- p. 15. Pilsbry, H. A., new species of the helicoid genus Polygyra. — Neu *P. latispira* p. 15 t. 3 f. 13—16 West Texas; — *mater-nomontana* p. 16 t. 3 f. 10—12, Colima, S. Madre; — *ponsonbyi* p. 17 t. 2 f. 1—3, Mexiko; — *euelypta* p. 18 t. 2 f. 7—9, Cinaloa und Mazatlan; — *albicostulata* p. 18 t. 2 f. 4—6.
- p. 21. Pilsbry, H. A., Descriptions of new species of Mollusks. — *Marginella veliei* p. 21, Florida; (fig.); — *Siphonalia semiplicata* p. 21, Jokohama; — *Ischnochiton aspidaulax* p. 22, Panama; — *Sagda? gabbi* p. 23, S. Domingo.

Schepman, M. M., the Mollusca of the Dutch scientific Borneo-Expedition, with description of the new Species. — In Notes from Leyden Museum. Vol. XVII. With. Pl. 2—4.

Als neu beschrieben werden *Parmarion goedhuisi* p. 146 t. 2 f. 1; — *Microparmarion litteratus* p. 148 t. 2 f. 2; — *Helicarion semi-calcareus* p. 149 t. 2 f. 3; — *Hemiplecta büttikoferi* p. 150 t. 3 fig. 1; — *Dyakia densestriata* p. 154 t. 3 f. 2; — *Unio veltmuizeni* p. 160 t. 4 f. 1; — *U. infrarostratus* p. 161 t. 4 f. 2 (= *caudiculatus* v. Martens); Zusammen 42 sp.

Heincke, Dr. Fr. Nachträge zur Fisch- und Molluskenfauna Helgolands. I. In Beitr. Meeresfauna Helgoland, herausgegeben von der Biologischen Anstalt auf Helgoland, 1897.

Zahlreiche für Helgoland neue Arten, welche die Gesamtzahl der von dort bekannten Arten auf 165 bringt. Als ausgesprochen südliche Formen kommen hinzu *Triopa claviger* und *Amphorina coerulea*, von beschalten Arten *Astarte triangularis*, *Rissoa lactea* und *Trivia europaea*. — Als neu beschrieben wird *Cratena longicauda* p. 249 f. 4 (Radula).

Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft auf der sechsten Jahresversammlung zu Bonn. Leipzig 1896.

p. 155. Goette, Prof. A., Bemerkungen zur Entwicklungsgeschichte der Mollusken. — Der Autor kommt im Gegensatz zu seinen Vorgängern zu der Ansicht, dass der unmittelbare Vorfahr unserer Gastropoden, das *Protrhynchoglossum*, bereits einen hinten überhängenden Eingeweidesack, besass, aber keinen Kriechfuss; der Eingeweidesack stellt bereits eine Anpassung an das Schwimmen dar, es gab also eine noch weiter zurückliegende Stammform ohne diesen Eingeweidesack und seine tief ausgehöhlte Schale, also mit flachem Rücken und terminalem After, die wohl nicht schwamm, sondern wie die Solenogastres mit der Bauchseite kroch. Auch die Chitonen haben sich von dieser ersten Stammform abgezweigt. Aus der zweiten noch symmetrischen, aber schon schwimmenden Stammform mit Eingeweidesack, ventraler Mantelhöhle, tiefer Schale und Flossen nebst Deckelträger entsprangen ohne eingreitende Abänderung aber mit weitergehender Differenzierung die Cephalopoden, dann entsprangen durch Umwandlung des Flossenpaars in einen Kriechfuss einerseits die symmetrischen Lamellibranchiaten, andererseits die asymmetrischen anisopleuren Gastropoden.

p. 168. Plate, Dr. L., über die Organisation einiger Chitonen. Die Organisation ist viel mannigfaltiger, als man bisher annahm. Bezüglich der Richtung, in welcher Kiemen und Herz sich vervollkommen haben, kommt Plate zu Ansichten die denen von Haller vollkommen entgegengesetzt sind. Eine ausführliche Publikation wird in Aussicht gestellt.

p. 177. Hartlaub, Dr. Clemens, über die königliche biologische Anstalt auf Helgoland.

Dall, W. H., Insular Landshell Faunas, especially as illustrated by the data obtained by Dr. G. Baur in the Galapagos Islands. From the Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, August 1896.

Eine eingehende Analyse dieser interessanten Arbeit bringen wir vorstehend.

Proceedings of the Malacological Society of London. Vol. II Nr. 3.

p. 105. Kennard, A. S., Mollusca from a Rainwash at Darent.

p. 107. Sykes, E. R., *Flammulina chion* n. sp. from New Zealand (fig.)

p. 108. Melvill, J. C., New marine Shells from Bombay. With pl. 8. —

Ocinebra brachys p. 273 t. 9 f. 1; — Nassa rotunda p. 273 t. 9 f. 2; — N. tacklefordi p. 274 t. 9 f. 3; — N. eostilla p. 274 t. 9 f. 4; — Columbella paciei p. 275 t. 9 f. 5; — Mitrella sigaloëssa p. 276 t. 9 f. 6; — Scalaria errana p. 276 t. 9 f. 7; — Sc. exomila p. 277 t. 9 f. 8; — Drillia ione p. 277 t. 9 f. 9; — Dr. theineropis p. 278 t. 9 f. 10; — Dr. xanthoporphyria p. 278 t. 9 f. 11; — Mangilia agna p. 279 t. 9 f. 12; — M. bascauda p. 279 t. 9 f. 13; — M. calathiscus p. 280 t. 9 f. 14; — M. eumerista p. 280 t. 9 f. 15; — M. himerodes p. 281 t. 9 f. 16; — M. himerta p. 281 t. 9 f. 17; — M. orophona p. 282 t. 9 f. 18; — M. stibarochila p. 283 t. 9 f. 19; — M. thalyra p. 283 t. 9 f. 20; — M. thiasotes p. 284 t. 9 f. 21; — Cythara euselma p. 284 t. 9 f. 22; — C. psalterium p. 285 t. 9 f. 23; — C. signum p. 287 t. 9 f. 24; — Glyphostoma chrysolitha p. 286 t. 9 f. 25; — Gl. dialitha p. 287 t. 9 f. 26; — Gl. latirella p. 287 t. 9 f. 27; — Gl. notopyrrha p. 288 t. 9 f. 28; — Gl. rhodaeme p. 288 t. 9 f. 29; — Gl. thalera p. 289 t. 10 f. 30; — Gl. theoteles p. 289 t. 10 f. 31; — Gl. theopalea p. 290 t. 10 f. 32; — Gl. thereganum p. 290 t. 10 f. 33; — Gl. thesaurista p. 291 t. 10 f. 34; — Gl. thyridota p. 292 t. 10 f. 35; — Clathurella caletria p. 293 t. 10 f. 36; — Cl. enephaea p. 293 t. 10 f. 37; — Cl. episema p. 294 t. 10 f. 38; — Cl. lita p. 294 t. 10 f. 39; — Cl. longa p. 295 t. 10 f. 40; — Cl. rogersi p. 295 t. 10 f. 41; — Cl. spridula p. 296 t. 10 f. 42; — Daphnella terina p. 296 t. 10 f. 43; — D.thespesia p. 297 t. 10 f. 44; — Costellaria dorotheae p. 297 t. 10 f. 45; — Bittium acolomites p. 298 t. 10 f. 46; — B. albocinctum p. 299 t. 10 f. 47; — B. marileutes p. 299 t. 10 f. 48; — B. uveanum p. 299 t. 10 f. 49; — Cerithiopsis aurantiaca p. 300 t. 10 f. 50; — C. catenaria p. 300 t. 10 f. 51; — C. entrapeia p. 301 t. 10 f. 52; — C. fosterae p. 301 t. 10 f. 53; — C. hedista p. 302 t. 10 f. 54; — C. adelpha p. 302 t. 10 f. 55; — Turbonilla belonis p. 303 t. 10 f. 56; — Pyrgulina gliriella p. 303 t. 10 f. 57; — Syrnola jaculum p. 304 t. 11 f. 58; — S. violacea p. 305 t. 11 f. 59; — Alaba zadela p. 305 t. 11 f. 71; — Litiopa limnophysa p. 305 t. 11 f. 72; — Alvania pisinna p. 305 t. 11 f. 60; — Rissoina baculum pastoris p. 306 t. 11 f. 61; — R. catholica p. 306 t. 11 f. 62; — R. enteles p. 307 t. 11 f. 63; — R. nesiotes p. 307 t. 11 f. 64; — R. quasillus p. 308 t. 11 f. 65; — R. sincera p. 308 t. 11 f. 66; — R. zonula p. 308 t. 11 f. 67; — Barleeia chrysomela p. 309

Nachrichtsblatt

der Deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Neunundzwanziger Jahrgang.

Redigirt

von

Dr. W. Kobelt

in Schwanheim (Main).

FRANKFURT AM MAIN.

Verlag von MORITZ DIESTERWEG.

1897.

Inhalt.

	Seite
<i>Möllendorff, Dr. O. von</i> , Ueber Trochonanina und Dendrotrochus.	5
<i>Strubell, Br.</i> , Neue Süsswasserconchylien aus Sumatra und Java.	8
<i>Naegeli, G.</i> , Einige neue syrische Land- und Süsswasserschnecken.	13
<i>Böttger, Dr. O.</i> , Neue Helix-Formen aus dem Mainzer Tertiär.	16
<i>Kobelt, Dr. W.</i> , Diagnosen neuer Arten aus Kükenthals Ausbeute.	25
<i>Möllendorff, Dr. O. von</i> , Drei neue Arten	28
— —, Diagnosen neuer kritischer Landdeckelschnecken	31
— —, Neue Landschnecken von Java	57. 89
<i>Kobelt, W. & Möllendorff, Dr. O. von</i> , Catalog der gegenwärtig lebend bekannten Pneumonopomen	73. 137
<i>Möllendorff, Dr. O. von</i> , Cochlostyla-Studien	105. 153
— —, Neue und kritische Realiiden	164
<i>Rolle, H.</i> , Eine neue Anodonta	172
<i>Möllendorff, Dr. O. von</i> , Studien zur Zoogeographie von Dr. W. Kobelt	173
<i>Martens Ed. von</i> , Neue Arten und Varietäten	178
 — — — — —	
Mitgliederverzeichniss	1
Kleinere Mittheilungen	21. 104
Literaturbericht	22. 46. 98. 136. 180

Berichtigung.

Seite 145 ist in dem Katalog der Pneumonopomen die ganze Reihe der Arten von Hargravesia ausgelassen worden und fehlt darunter die Ueberschrift *Moulinsia* Grat. Wir bitten unsere Leser, davon einstweilen Notiz zu nehmen.

Druck von Peter Hartmann, Schwanheim a. M.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Neunundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwaneheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen nach auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab, **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Audere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Verzeichniss der Mitglieder der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft.

<i>Blum, J.</i> , Oberlehrer a. D.	Frankfurt a. M.
<i>Boettger, Professor Dr. O.</i>	"
<i>Heynemann, D. F.</i>	"
<i>Kinkel, Professor Dr.</i>	"
<i>Kraetzer, Dr. J.</i>	"
<i>Senckenberg, naturforsch. Gesellschaft.</i>	"
<i>Strubell, B.</i>	"
<i>Andreae, Prof. Dr.</i>	Hildesheim.
<i>Arndt, C.</i> , Oberlehrer.	Neubrandenburg.
<i>Arnold, Hermann.</i>	Nordhausen.
<i>Bauer & Raspe.</i>	Nürnberg.

<i>Lasser, V. S. Ritter von,</i>	Taxenbach b. Salzburg.
<i>Linnaea, Naturhistor. Museum.</i>	Berlin.
<i>Löbbecke, Th. Rentier.</i>	Düsseldorf, Schadowstr. 51.
<i>Martens, Prof. Dr. E. von,</i>	Berlin N. W., Paulstr. 28 ^{tt} .
<i>Meissner, Dr. M.,</i>	Berlin N. 4, Invalidenstr. 43.
<i>Merkel, E.</i>	Breslau, Tiergartenstr. 43.
<i>Metzger, Geh. Reg. Rat. Prof. Dr.</i>	Münden (Hannover).
<i>Miller, Prof. Dr. K.</i>	Stuttgart, Bahnhofstr. 11.
<i>Möllendorff, Dr. O. F. von</i>	Görlitz.
<i>Monsterberg, von, k. preuss. Major z. D.,</i>	Bamberg.
<i>Museum, Naturhistorisches,</i>	Hamburg.
<i>Museum, Naturhistorisches,</i>	Lübeck.
<i>Museum, K. K. naturwissenschaftliches.</i>	Wien.
<i>Museum, Grossh. Oldenburg. Herr Direktor Wiepken.</i>	Oldenburg.
<i>Nägele, G., Pfarrer.</i>	Waltersweier.
<i>Neumann, Robert.</i>	Erfurt.
<i>Otting, Graf Max von,</i>	München, Brienerstr. 8a.
<i>Paar, L. A.</i>	Reutte, Tirol.
<i>Pastor, Erzpriester.</i>	Bitsch, Lothringen.
<i>Pässler, städt. Lehrer.</i>	Berlin O., Pallisadenstr. 77.
<i>Petersen, Hartwig.</i>	Hamburg, Hühnerpochen
<i>Pfeiffer, K.</i>	Kassel. [3a.]
<i>Protz, Albert.</i>	Königsb. i. Pr., zool. Mus.
<i>Reinhardt, Professor, Dr. O.</i>	Berlin W., Weissenburg-
<i>Riemenschneider, Eisenbahnassistent.</i>	Nordhausen, Bergerstr. 4 a.
<i>Rolle, H.</i>	Berlin N. W., Emdenerstr. 4.
<i>Roos, H.</i>	Karlsruhe.
<i>Salm-Salm, Fürst zu,</i>	Anholt i. W.
<i>Sammlung, Zoologische d. Kgl. Museums für Naturkunde.</i>	Berlin.
<i>Schacko, G.</i>	Berlin S. O., Waldemar-
<i>Schaufuss, Direktor.</i>	Meissen. [str. 14.]
<i>Schlüter, Wilh.</i>	Halle a. S.

<i>London, Zoological Society c. o.</i>	
<i>P. W. Slater, Esq.</i>	<i>London, Hanover Square.</i>
<i>Mela, A. J.</i>	<i>Helsingfors.</i>
<i>Platania, G.</i>	<i>Acireale, Sieilien.</i>
<i>Ponsonby, John, Esq.</i>	<i>London S.W., 15 Chesham Place.</i>
<i>Puppe, W. E.</i>	<i>Warschau, Senatorskastr. [24.</i>
<i>Retoieski, Dr. O., Staatsrat.</i>	<i>Theodosia.</i>
<i>Rosen, Otto, Baron.</i>	<i>Stawropol, Russl.</i>
<i>Scharff, Dr. R. F.</i>	<i>Dublin, 9 Leeson Park.</i>
<i>Schedel, Jos.</i>	<i>Yokohama, 77 MainStreet.</i>
<i>Schepmann, M. M.</i>	<i>Rhoon b. Rotterdam.</i>
<i>Schnacker, B.</i>	<i>Schanghai.</i>
<i>Schneider, G.</i>	<i>Basel, zool. Comptoir.</i>
<i>Smith, Edgar A., Esq.</i>	<i>London S. W., Cromwell Road.</i>
<i>Societa malacozoologica italiana.</i>	<i>Pisa.</i>
<i>Société royale malacozoologique Belge.</i>	<i>Bruxelles.</i>
<i>Stazione zoologica.</i>	<i>Neapel.</i>
<i>Sterki, Dr. med.</i>	<i>New-Philadelphia, Ohio.</i>
<i>Westerlund, Dr. C. A.</i>	<i>Ronneby, Schweden.</i>

Ueber *Trochonanina* und *Dendrotrochus*.

Von

Dr. O. von Möllendorff.


Bei Gelegenheit der Aufstellung der Sektion *Coneuplecta* (Jahresb. Senck. N. G. 1893 p. 65) habe ich schon hervorgehoben, dass die von Mousson 1869 aufgestellte Gattung *Trochonanina* ein Gemisch von mehr oder weniger konischen, gekielten Naniniden war, deren Arten wir heute sehr verschiedenen Gattungen zuweisen müssen. Nach Ausscheidung der afrikanischen *Martlesia*- und *Trochozonites*-Arten, sowie der *Rotulas* verblieben noch zwei Gruppen, die der glashellen Formen, welche sich *Sitala* nähern und die ich als

Coneuplecta abtrenne, und die der festschaligeren, braungefärbten und oft gebänderten Arten wie *conicoides* Metc., *conus* Phil. u. a. Mousson macht keinen Typus namhaft; da er aber die Gattung bei Besprechung der glashellen Arten von den Fidschi-Inseln aufstellt, so liegt eine gewisse Berechtigung vor. *Tr. schmeltziana* Mouss. als historischen Typus aufzufassen und den Mousson'schen Namen, wie Pfeffer (Naninid. p. 22) es thut, auf diese Arten zu fixiren. In diesem Falle würde *Coneuplecta* einzuziehen sein und *Trochonanina* als Sektion zu *Euplecta* zu treten haben. Da aber Mousson ausdrücklich die Gattung nicht nur für jene Art, sondern gleichzeitig für die erwähnten andern Formen aufstellt, so erscheint es mir weder angängig den Namen sowie Pfeffer anzuwenden, noch auch wie bisher die meisten andern Forscher auf die Gruppe der *conicoides* zu beziehen. In solchem Fall ist es jedenfalls zur Vermeidung von Verwechslungen besser den so unkritisch angewendeten Namen ganz zu unterdrücken.

Aus ähnlichen Gründen ist auch der ältere van Hasselt'sche Name *Geotrochus* nicht verwendbar. Dass seine Beziehung auf die Neu-Guinea-Schnecken, die wir heute *Papuina* v. Mart. nennen, ein arger Missgriff war, hat schon Martens nachgewiesen. Von den Arten, die van Hasselt zu seiner Gattung rechnete, war mindestens eine eine *Trochonanina* im bisherigen Sinne, nämlich *conus* Phil. Aber einerseits ist auch hier keine Typus namhaft gemacht, andererseits scheint die Gattung auch *Trochomorpha* und *Plectotropis* mit einzubegreifen, und dann ist der Name, wenn auch irriger Weise, so lange und so oft für *Papuina* angewendet worden, dass seine Wiedereinführung für die in Rede stehenden Naniniden nur zu weiterer Verwirrung führen würde. Solche alte ungenau beschriebene und unsicher umgrenzte Gattungsnamen auf einzelne Arten fixiren zu wollen, halte ich für vergebliche Mühe.

Ich würde deshalb zur Neubenennung der Gruppe geschritten sein, wenn nicht unerwartet ein andrer Name zu Gebote stände. *Dendrotrochus* Pilsbry wurde 1894 als Sektion für einige vermeintliche Papuina-Arten aufgestellt, die durch den nicht umgeschlagenen Columellartrand ein sehr fremdartiges Element unter den Papuinen bildeten. Hedley (Rec. Austr. Mus. II. 6. p. 90) hat denn auch bei der anatomischen Untersuchung der typischen Art, *D. helicinoides* Hombr. & Jacq. von den Salomoninseln, sofort erkannt, dass sie mit Papuina gar nichts zu thun hat, sondern zu den Zonitiden (Naniniden) gehört. Wunderlicherweise stellt er sie trotzdem zu Trochomorpha, statt zu Nanina, obwohl sie in jeder Beziehung zu letzterer passt, auch nach der Schale. Die letztere schliesst sich sehr gut an die Gruppe der *conus* Phil. von den Sundainseln an und z. B. *D. layardi* Hartm. von den Neuen Hebriden lässt sich direkt mit einer neuen, noch unbeschriebenen Art von Lombok vergleichen. Diese Zusammengehörigkeit wird durch die anatomische Untersuchung Hedley's verglichen mit der von *conicoides* Metc. durch Godwin-Austen (Proc. Mal. Soc. I 1895, p. 286) vollauf bestätigt. Beide Arten haben eine dreigetheilte Sohle, Schleimpore am Fuss mit Horn, glatten Kiefer, typische Radula der Naniniden und die Geschlechtsorgane sind nach den Beschreibungen und Abbildungen fast ganz identisch. Hiernach besteht für mich kein Zweifel, dass die beiden Gruppen, welche durch diese typischen Arten vertreten werden, generisch zusammengehören, der vereinigten Gattung mithin der Name *Dendrotrochus* zukommt. Es könnte sich höchstens noch darum handeln, ob man den indomalayischen Arten wegen der einfacheren Färbung und der Lebensweise als Erdschnecken eine eigene Sektion zuweisen will.

Die Synonymie stellt sich hiernach wie folgt:



antice tenui, ferrugineo, postice crasso, nigro obtecta, valde inaequilatera, antice rectilineo truncata, postice perelongata. Margo dorsalis vix ascendens, cum antico brevissimo angulum formans, postice in posteriore rotundato-angulato declivem sensim abiens; ventralis horizontalis, postice quoque haud ascendens, cum postico rostrum depresso subverticaliter truncatum formans. Umbones anteriores, profunde erosi; areola subnulla; area elongata, compressa, cristis obsoletis 2 ex umbone decurrentibus; ligamentum tenue, sat longum. Cardo tenuis, dentibus elongatis, obliquis, compressis, humilis duobus in valva dextra marginem anticum fere attingentibus; lamina cardinalis elongata, lamellis obsoletis; impressiones musculares indistinctae. Margarita albido-coerulea, postice iridescens.

Long. 55, alt. 23, crass. 12.5 mm.

Südsumatra, ebenfalls von Herrn Hofrath Hagen gesammelt.

Sie unterscheidet sich von *M. hageni* nicht nur durch die viel gestrecktere Gestalt, sondern auch durch die erheblich stärkere Entwicklung der Schlosszähne.

3. *Microcondylaea bicristata* n.

Concha fere regulariter ovata, tenuiuscula, parva, vix tumida, subtiliter striatula, parum nitida, olivaceo-fusca. Pars antica abbreviata, postica modice elongata, dilatata, altitudine maxima ad angulum dorsali-posticum sita. Margo dorsalis brevis, fere rectilineus, ascendens, postice angulum distinctum, antice indistinctum formans, anticus brevissime rotundatus, basalis vix arcuatus, postice levissime ascendens, cum postico primum biangulato, dein truncato rostrum breve rectum formans. Umbones anteriores, depresso, late sed superficialiter erosi; areola nulla; area elongata, compressa, distincte bicristata, cristis ad marginem posticum angulatum prominentibus; ligamentum angustum, fere superstructum.

Cardo angustissimus, dentibus sere obsoletis, lamina angusta: impressiones musculares superficiales; margarita coerulescens, umbones versus livida.

Long. 42, alt. 25, crass. 12 mm.

Südsumatra, von Herrn Hofrath Hagen gesammelt.

4. *Unio hageni* n.

Concha medioculis, angulato-ovata, tumidula, parum crassa, concentrica striatula costellisque majoribus distantibus sculpta, pone umbones rugulis transversis ziczaeformibus insignis, vix nitens, castaneo-olivacea, limo temni ferrugineo obtecta. Pars antica abbreviata, postica tumida, altitudine et crassitudine maxima pone dimidiā longitudinem sitis. Margo dorsalis rectilineus brevis, valde ascendens, utrinque angulum formans, angulo antico distinctiore; margo anticus breviter rotundatus, basalis parum arcuatus, postice ascendens, cum postico rotundato-declivi rostrum rectum subdepressum formans. Umbones ad $\frac{1}{3}$ longitudinis positi, depresso, erosi, apicibus late separatis; areola distincta rhomboidea, area lata, medio compressa; ligamentum tenue, ab umbonibus remolum; sinus angustus, sat longus. Cardo debilis, dentibus elongatis, lamellosis, duobus in valvula dextra, interno majore; lamellae elongatae, spatio longo a dentibus sejunctae; lamina cardinalis medio angulum perobtusum formans; impressiones musculares et palliares superficiales, callus humeralis subnullus; margarita carneo-albida, umbones versus lutescenti-livida.

Long. 44, alt. 25, crass. 17,5 mm.

Südsumatra, von Herrn Hofrath Dr. Hagen gesammelt.

5. *Unio palembangensis* n.

Concha perlongate ovata, valde inaequilatera, subtilissime confertim striatula, hic illic ruditer costato-sulcata, postice distincte bicristata, vix nitens, tenuiscula, olivacea,

limo temni griseo obtecta. Pars antica brevissima, postica elongata. Margo superior perparum ascendens, cum antico brevissime rotundato, subtruncato angulum distinctum, cum postico declivi indistinctum formans; margo basalis fere rectus, postice ad rostrum depresso rotundato-acuminatum vix ascendens. Umbones ad $\frac{1}{4}$ longitudinis siti, depresso, profunde erosi, apicibus haud contiguis; areola angusta, fere lanceolata: area compressa, crista distincta ex umbone decurrente marginata; ligamentum angustum, sat longum. Cardo tenue lamina angusta, dentibus lamelliformibus elongatis curvatis, duobus aequalibus in valvula dextra, uno et accessorio postico obsoleto in sinistra, lamellis elongatis angulum cum dentibus formantibus; impressiones pallidaris et musculares vix conspicuae; margarita coeruleo-albida, ad umbones tantum livida.

Long. 43, alt. 17,5, crass. 11 mm.


Südsumatra, ebenfalls aus der Ausbeute des Herrn Hofrath Dr. Hagen.

6. *Melania strigata* n.

Testa ovato-turrita, spira acuminata, apice acutissimo, laeviuscula, longitudinaliter striatula, hic illuc vix conspicue costellata, sculptura spirali versus aperturam tantum sub vitro conspicua, coerulecenti-cinerea, strigis sparsis fuscis, in anfractu ultimo lutescenti-fusca. Anfractus 9 vix convexiusculi, sutura impressa, plus minusve luteo vel albo marginata discreti. leniter crescentes, ultimus vix $\frac{2}{3}$ altitudinis occupans, basi compressus, minime spiraliter sulcatus. Apertura utrinque acuminata, basi effusa margine tenui, in adultis levissime labiato, columellari infra contorto-exciso, callo tenuissimo cum insertione marginis externi juncto.

Long. 26, diam. 11, alt. apert. obl. 11 mm.

Aufenthalt bei Sockoboeni auf Java, von dem früheren javanischen Diener meines Sohnes gesammelt.



Einige neue syrische Land- und Süßwasserschnecken.

Von

Pfarrer G. Naegele, in Waltersweier bei Offenburg.

Vor einiger Zeit erhielt ich vom nördlichen Libanon verschiedene Binnenschnecken, von dem einige noch unbeschrieben sind. Es sind folgende:

Ancylus (Ancylastrum) libanicus Naeg. n. sp.

Testa capuliformis, laevis, colore corneo, tumida; apex permagnus, recurvus, basin paululum superans. Peristoma late oviforme.

Dim.: long. 5, lat. 4, altit. 3 mm.

Habitat in fontibus Libani superioris.

Dieser *Ancylus* ist neu aus Syrien. Bourguignat und Locard kennen diese Gattung im syrischen Gebiete nicht. Er steht dem *Ancylus pileolus* Fer. sehr nahe, unterscheidet sich aber von ihm besonders durch den Mangel der Radialstreifung. Der glatte *Anc. recurvus* K. ist wesentlich schmäler und meist auch höher.

Buliminus (Chondrulus) sexdentatus Naeg. n. sp.

Testa rimata, fusiformis, striolata, colore corneo, spira elongata, apice subacuto; anfractus $7\frac{1}{2}$ regulariter acrescentes; apertura dentibus 6 ornata; in medio pariete 1 plica robusta eminens, supra minor magis intus, 1 plica in insertione 1 columellaris horizontalis, 2 in margine exteriore; peristoma incrassatum albi coloris.

Diam. 8:3 mm.

Habit. in Libano septentrionali.

Diese Art steht dem *Bul. septemdentatus* Roth nahe, unterscheidet sich aber hauptsächlich durch seine schlanke Form und den Mangel des unteren Spindelzahns.

denen ich noch eine Anzahl *Cl. Dupouxi* Naeg., *laericollis* var. *tocatensis* Naeg., *Buliminus tournefortianus* Für. aus Armenien und *Stenogyra decollata* L. grosse Form aus Algier gesellte. Der Platz an der Nordseite meines Hauses war gerade kein günstiger, allein ein besserer konnte nicht gewählt werden. Als ich mich einige Tage nach der Aussetzung der Ankömmlinge umschaute, hatte fast alles die Flucht ergriffen. *Hel. syriaca* Ehr. konnten wir noch nach Wochen an Gesträuchern finden, auch *Buliminus tournefortianus*, dagegen hatte sich *Leucochroa* an keiner Pflanze gezeigt, sondern kroch auf dem Erdboden herum. *Cyclot. glaucum* lebte versteckt im Moos. Dagegen stiegen die Clau-silien sofort ausschliesslich an die Mauer des Hauses empor und setzten sich den ganzen Sommer daran fest. Erst im Spätherbst zeigten sie etwas Leben und veränderten ihre Stelle, stiegen aber nicht höher als einen Meter über den Erdboden. Von was sie sich nährten, konnte ich nicht ermitteln. Da der Winter 1895—96 sehr milde war, sah ich noch am 15. Dezember einen Theil der *Cl. Boissieri* Ch. am Mauerwerk herumkriechen. Bei eintretendem Frost verschwanden dann auch diese. Im kommenden Frühling war ich sehr darauf gespannt ob auch wieder welche zum Vorschein kommen würden. Aber von der ganzen Sippschaft kommen nur 2 einzige *Cl. Boissieri* wieder ans Tageslicht um wie im Jahre zuvor wieder an der Mauer den ganzen Sommer über Siesta zu halten. Ob nun ihre Genossen insgesamt dem Klima erlegen sind oder sonstigen Umstände, weiss ich nicht. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch Häher und Amseln an der Stelle Umschau gehalten haben, wo die Schneeklein ihren Winterschlaf hielten. Da auch wie letzten Herbst wieder eine Anzahl von *Cl. Boissieri* hier Herberge genommen haben, so wollen wir nochmals sehen, wie viele im nächsten März zum Vorschein kommen.

Neue *Helix*-Formen aus dem Mainzer Tertiär.

Von

Prof. Dr. O. Boettger in Frankfurt a. M.

Subgen. *Hemistenotrema* n.

Char. Differt a subgeneribus *Triodopsis* Raf. et *Stenotrema* Raf. defectu completo lamellae magnae parietalis: caeterum et praecipue forma peristomatis illis simillimum.

In der Gestalt der rechten Mundlippe gleicht diese ausgestorbene *Helix*-Form, von der ich die gleich zu beschreibenden zwei Arten aus dem Oberoligocaen von Hochheim kenne, durchaus den nordamerikanischen Arten der Untergattungen *Triodopsis* und *Stenotrema*, die sich der Schale nach bekanntlich wenig von einander unterscheiden und nur durch die Breite der Rippen auf dem Kiefer an lebenden Thiere zu trennen sind. Namentlich ist die eine der fossilen Formen in Grösse, Gehäuseform und Aussenlippe mit *St. hirsutum* Say direkt vergleichbar, während die andere mehr an *St. monodon* Rack. erinnert. Der schwerwiegende Umstand, dass diesen fossilen Formen die für *Stenotrema* und *Triodopsis* so charakteristische, kräftige, radial gestellte Parietallamelle, die die Mündung von oben her verengern hilft, gänzlich abgeht, zeigt uns zwar, dass an eine direkte Verwandtschaft der tertiaeren Arten mit den heutigen Nordamerikaneru nicht zu denken ist, ihre sonst völlige Uebereinstimmung, die eine Beziehung zu indo-malayischen *Helix*-Formen absolut ausschliesst, mit amerikanischen Arten bestätigt aber wieder die Richtigkeit meiner schon häufig ausgesprochenen und namentlich gegen Pilsbry vertheidigten Ansicht, dass die Landschnecken der europaeischen Eocän- und Oligocänzeit in erheblichem Masse sich an solche des Faunengebiets der Südstaaten Nordamerikas anlehnen. Mit der chinesischen, sich an *Gonostoma* anschliessenden Untergattung *Moellendorffia* besteht keine Beziehung.

Helix (Hemistenotrema) quadrisinuosa n. sp.

Char. T. minute perforata, perforatione semiobtecta, depresso-subglobosa; spira breviter conica; apex obtusulus. Anfr. 5 lente accrescentes parum convexi, sutura distincta separati, superne distinctius quam inferne striati, ultimus ad peripheriam rotundato-angulatus, inferne subinflatus, ante aperturam subito et valde deflexus et undique profunde constrictus, parte supera anfr. ultimi ante constrictionem fere cristiformi-inflata. Apert. obliqua, contracta, angusta, tri- vel potius quadrisinuosa; perist. latissime expansum et plane reflexum, margine interno arcubus tribus distincte trisinuoso; sinulus internus praeterea tuberculo parvo in columella sito subbifidus.

Alt. $4\frac{1}{2}$, diam. maj. 7, min. $6\frac{1}{2}$ mm.

Fundort. Oberoligocäner Landschneckenkalk der Steinbrüche zwischen Flörsheim und Hochheim. — Von diesem seltenen Schneckchen sind bis jetzt zwei Stücke bekannt, die erst im Laufe des letzten Jahres gesammelt worden sind. Das prächtige, ganz tadellos erhaltene Originalstück, nach dem die obige Diagnose gemacht worden ist, befindet sich in der Sammlung der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M. und wurde mir von meinem Freunde Prof. Dr. Friedr. Kinkelin zur Beschreibung anvertraut, das andre weniger vollständiger, aber immerhin noch recht gut erhaltene Exemplar besitzt Herr Dr. Aug. Müller (Linnaea) in Berlin.

Beimerkungen. Ob diese Art behaart war, wie es die folgende ist, lässt sich an den bis jetzt gefundenen Stücken mit Sicherheit nicht entscheiden. Ich wenigstens habe Haargruben daran nicht entdecken können.

Helix (Hemistenotrema) heydeni n. sp.

Char. Differt a *H. quadrisinuosa* Bttgr. t. aliquantulum majore, spira ut videtur minus elata, foveolis crinum dis-


Helix (Gonostoma) jungi n. sp.

Char. Differt ab *H. osculum* Tho. umbilico semper omnino clauso, lamina columellari peristomatis obtecto.

Alt. $5\frac{1}{2}$ —7, diam. maj. $9-10\frac{1}{2}$, min. $8\frac{1}{4}-9\frac{1}{2}$ mm.

Fundort. Im untermiocaenen Hydrobienkalk von Budenheim bei Mainz, zuerst von Herrn Karl Jung, Kaufmann in Frankfurt a. Main, entdeckt und ihm zu Ehren benannt. Ich besitze zwei tadellose Stücke von diesem Fundort in meiner Sammlung. Ein Stück habe ich auch aus den etwas älteren, aber ebenfalls noch untermiocaenen Kalken der Kurve bei Wiesbaden, wo die Art neben der typischen *Hx. osculum* Tho., aber ohne Uebergänge mit ihr zu bilden, vorkommt.

Bemerkungen. Der Grund, weshalb ich diese fünf Umgänge zeigende, der *Hx. osculum* sehr nahe stehende Form specifisch von dieser Art abtrenne, liegt vornehmlich darin, dass sie nicht blos in einer wesentlich jüngeren Schicht (im Untermiocaen) auftritt — die tief genabelte *Hx. osculum* Tho. lebte bei uns besonders zahlreich im oberoligocaenen Landschneckenkalke von Hochheim —, sondern weil sie in den höheren Schichten, z. B. bei Budenheim, konstant, ohne Uebergänge zu zeigen, und mit Ausschluss der Stammart angetroffen wird. — Von der sonst noch vergleichbaren, nabellosen *Hx. devexa* Rss. unterscheidet sich *Hx. jungi* durch derbere Schale, domförmiges Gewinde und das die (bei der böhmisch-steierischen Art deutliche) Perforation überkleidende Spindelblech und von der noch etwas näher stehenden schwäbischen *Hx. osculina* Sbgr. durch gedrückt-domförmiges, nicht kegelförmiges Gewinde, bedeutendere Grösse und ebenfalls durch die starke Verbreiterung des Peristoms in der Nähe der Durchbohrung, die bei der neuen Art breit und callös verdeckt wird. Am nächsten steht ihr aber *Hx. coarctata* Klein aus dem Ober-



aperturam subampliatus, nullo modo descendens, superne fere planus, peripheria leviter angulato-rotundatus, basi planatus. Apert. truncato-ovalis, latior quam alta; peristoma simplex, acutum, in faucibus distincte labiatum, labio per profundo, late, calloso, marginibus subdistantibus, callo tenuissimo junctis, supero strictiusculo, oblique decurrente, basali bene curvato, columellari leviter incrassato, protracto, sed haud reflexo.

Alt. 5, diam. maj. 8, min. $6\frac{3}{4}$ mm.

Fundort. Oberoligocaener Landschneckenkalk der Steinbrüche zwischen Flörsheim und Hochheim, nur in dem einen tadellosen Stücke meiner Sammlung bekannt.

Bemerkungen. Diese höchst auffallende Schnecke könnte man für eine starkschalige, tief innen nach Art einer *Xerophile* gelippte *Hyalinia* oder für einen weitgenabelten *Mesomphix* halten; auch mit *Omphalosagda* oder *Macrocytoides* möchte man sie vergleichen können, die in diesem Falle eine atypische Lippenbildung besitzen würden. Da Haargruben fehlen, die Schale auffallend solid ist und auch der Spindelrand keinen Umschlag hat, ist eine Verwandtschaft mit *Fruticicola* wohl ausgeschlossen; gegen *Xerophila* spricht der ganze Habitus. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als zu erklären, dass mir die Verwandtschaft des vorliegenden Schneckchens noch vollkommen dunkel ist.

Necrologie.

Am 30. August 1896 starb in Genf Dr. Aug. Brodt, der genaueste Kenner der Melanien, im Alter von 75 Jahren.

— 22 —

Kleinere Mittheilungen.

Unser verstorbenes Mitglied B. Schmäcker hat ausser seinen Sammlungen und seiner reichen Bibliothek seiner Vaterstadt Bremen auch ein erhebliches Kapital vermacht, von dessen Zinsen ein wissen-

Glyptostoma lamproideum, jousseaumei; — auf Taf. 2;
Glyptostoma leucostigmatum, gaidei, aubrianum, globulosum
crosseanum, disconicum, subspurcum, goubini; — auf Taf. 3:
Glyptostoma parthenicum, melanoxytum, tigroidellum, fastigiatum
strombilum, trigonostomum, alphonsianum, callistum. —

p. 109 Necrologie. Die Todtenliste von 1895 enthält Necrologie von
Bayle, Saint-Simon, Huxley, Loven, Strobel und Doderlein.

The Journal of Conchology, (Leeds) Vol. VIII No. 10.

p. 329. Robertson, D., Obituary of

p. 339. Marshall, J. T., Additions to British Conchology (To be cont.)
Giebt zahlreiche neue Fundorte und Beobachtungen über
Vorkommen.

*Proceedings of the Royal Physical Society of Edinburgh
Session 1895—1896.*

p. 166. Scott, Thomas. Report on a Collection of Marine Dredgings
and other Natural History Materials made on the West Coast of
Scotland by the late George Brook. Enthält auch ein Verzeich-
niss dort gedrakter Mollusken; keine n. sp.

*Möllendorff, Dr. O. von, Binnenmollusken von den Talaut-
Inseln.* In Abh. Zool. Museum Dresden 1896/97 No. 4.

Neu *Obbina meyeri* p. 1. — Ferner noch *Corasia physalis*,
tukanensis, 2 *Batissa* sp. — Gleichzeitig wird in einer An-
merkung durch Herrn A. B. Meyer *Hemitrichia guimarasensis*
Thiele für identisch mit *H. obliqua* Möldff. erklärt und eingezogen.


*Fulton T. W., the past and present condition of the Oyster
Beds in the Firth of Forth.* In Rep. Fish. Board
Scotl. 1896. — Non vidi.

Jatta, G., i Cefalopodi viventi nel Golfo di Napoli. (Sistematica).
In Fauna und Flora des Golfes von Neapel Monographie XXIII.

Mit dem Erscheinen des 31 Tafeln umfassenden Atlas ist dieses
prächtige Werk jetzt abgeschlossen.

L' Echange. Revue Linnéenne. Année 12.—

No. 144. Locard, Arnould. Notices Conchyliologiques. No. 41. Sur le
Ranella gigantea de Lamarck. — Entwickelt die Unterschiede
zwischen der mediterranen und der atlantischen Form, welche
letztere mit der fossilen der Subappaninschichten übereinstimmt.
— — Année 13.



Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Neunundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehörende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Diagnosen neuer Arten aus Kükenthals Ausbente.

Von

W. Kobelt.

1. *Helicarion kükenthali* n.

Testa rimata, depresso-globosa, tenuis, pellucida, subtiliter plicato-striatula, lineis spiralibus leviter impressis decussata, nitens, corneo-fulva, subitus pallidior. Anfractus 4 rapide crescentes, convexi, sutura appressa, marginata, crenulata disjuncti, ultimus tumidus, magnus. Apertura valde obliqua, per ampla, rotundato-ovalis, modice excisa; peristoma rectum, acutum, margine columellari superne breviter reflexo.

Diam. maj. 24, alt. 18, apert. lat. 14,5, long. 15,5 mm.
Halmahera alt. 3000'.

2. *Everettia möllendorffii* n.

Testa rimata, depressa, solidula, striatula, nitens, straminea; spira breviter elevata, lateribus fere strictis. Anfractus 5 lente accrescentes, sutura profunda discreti, sat convexi. Apertura parum obliqua, late elliptica, sat excisa; peristoma rectum, acutum, margine columellari superne brevissime reflexo.

Diam. 13, alt. 7,5 mm.

Minahassa.

3. *Vitrinoconus celebesianus* n.

Testa late et pervie umbilicata, umbilico subcylindrico circiter $\frac{1}{3}$ diam. adaequante, trochiformis, tenuis, subpellucida, curvatum striatula, nitidula, corneo-fulva; spira sat elevata, lateribus concavis; anfr. 8 plani, leptissime crescentes, sutura per carinam exsertam brunneam filomarginata disjuncti, ultimus acute carinatus, basi vix convexiusculus, circa umbilicum angulatus. Apertura modice obliqua, angusta, securiformis; peristoma simplex, rectum.

Diam. maj. 6,5, alt. 3,5 mm.

Minahassa. Der erste sichere Vitrinoconus ausserhalb der Philippinen.

4. *Dendrotrochus celebesianus* n.

Testa imperforata, depresse tectiformis, solidula (? corneo-brunnea); spira breviter elevata, lateribus strictis. Anfractus $6\frac{1}{2}$ plani, lente accrescentes, acute carinati, sutura per carinam exsertam canalicularia disjuncti, striatuli, pone carinam lineolis spiralibus consertis cincti, ultimus carina utrinque exserta, peracuta munitus, basi glabratus. Apertura modice obliqua, arcta, securiformis; peristoma superne rectum, basi modice expansum, undique intus labiatum.

Diam. maj. 9, alt. 4,5 mm.

Minahassa. Die erste Art der Gattung von Celebes.

5. *Ruphaulus kükenthali* n.

T. sat aperte umbilicata, oblique ovato-oblonga, solidula, subpellucida, confertim costulato-striata, sericina, olivaceo-brunnea; anfractus 6, primi 4 sat convexi, regulariter accrescentes, spiram subregulariter conicam efficientes; duo ultimi distorti, ultimus descendens, pone aperturam paululum ascendens, ventresubapplanatus; apertura verticalis, circularis; peristoma late expansum, breviter reflexiusculum; canalis suturalis longus; orificium anfractui penultimo adnatum, ovale, a latere apertum. Operculum corneum sat concavum, anfr. 6.

Alt. 12, diam. maj. 8, apert. cum perist. 5,5, intus $3\frac{1}{3}$ mm.

Hab. ad fluvium Baram ins. Borneo septentrionalis.

Steht in der Grösse zwischen *R. bombycinus* Pfr. (14 mm) und *pfeifferi* Issel (10,5 mm). Die streptaxide Abweichung der letzten Windung ist stärker als bei der ersteren, aber schwächer als bei der zweiten, von beiden scheidet sie der seitlich geöffnet Nahtkanal; die Oeffnung ist bei den beiden älteren Arten von vorn sichtbar.

6. *Cyclotus (Pseudocyclophorus) euryomphalus* n.

Testa late et aperte umbilicata, depressa, solida, leviter striatula, lutea, strigis flammulatis castaneis picta; spirae brevissime conoidea. Anfractus 5 teretes, sat celeriter accrescentes, sutura profunda tere canaliculata disjuncti, ultimus ad aperturam brevissime campanulatus. Apertura parum obliqua, sat ampla, circularis; peristoma duplex, internum breviter porrectum, externum brevissime expansum.

Diam. maj. 18, alt. 10,5, diam. apert. c. perist. 7,7 mm.

Halmahera.

7. *Pupina (Siphonostyla n.) longituba* n.

Testa oblique ovata, subirregularis, solidula, laevigata, nitens, (aurantiaca vel fulvo-brunnea?); anfractus 5 convexiusculi, superiores spiram subregulariter breviter cono-

ideam efficients, penultimus paullum, ultimus valde devians, distortus, ventre applanatus, valde descendens, ad aperturam breviter ascendens. Apertura verticalis circularis; peristoma rectum, valde incrassatum, late porrectum, margo superus in anfractum penultimum protractus. Canalis superus subcircularis, inferne horizontalis, angustus, a latere longissime sursum usque ad peripheriam anfractus ultimi protractus, lamella columellari late recurvata obtectus.

Diam. 12, alt. 14, alt. obl. 15, lat. anfr. ult. 9, diam apert. cum perist. 6,5, long. canalis inf. 8 mm.

Halmahera.

Eine durch die eigenthümliche Verlängerung des unteren Kanales ausgezeichnete Art, welche mit *Popina lobifera* Mrts. zusammen eine eigene Untergattung bilden muss, für welche Möllendorff und ich in den in (nächster Nummer beginnenden) systematischen Katalog der Pneumonopomen den Namen *Siphonostyla* vorschlagen.

— — — — —

Drei neue Arten.

Von

Dr. O. von Möllendorff.

1. *Plectopylis linterae* Mlldff.

T. sinistrorsa, latissime umbilicata, discoidea, solidula, subtiliter plicato-striata, lineis spiralibus tenuibus decussata, luteoflava, strigis castaneis regulariter variegata. Spira vix prominula. Anfractus 6 lente accrescentes, planiusculi, ultimus supra peripheriam subdistinete angulatus, tum convexiusculus, circa umbilicum subangulatus, antice breviter deflexus. Apertura maxime obliqua, oblique cordiformis; peristoma sat expansum, reflexum, valde incrassatum, albo-labiatum, marginibus callo vallido elevato continuis. Lamella

parietalis marginem attingens, intus producta, in tertia parte anfractus lamellam transversam duplicatam attingens; lamellae palatales 4, superne 2 spirales quarum supera longior, tum verticalis 1 longa, denique infera spiralis brevis.

Diam. 16,5, alt. 6,5 mm.

Hab. Pechu (Miss J. E. Linter).

2. *Gonostoma (Drepanostoma) omphalospirum* Mldff.


T. late, aperte et profunde umbilicata, discina, tenuiuscula, transverse striatula, opaca, pruinosa, punctis impressis subregulariter dispositis et in illis setis brevibus deciduis induita, brunnneo-sulva. Spira profunda, modo umbilici immersa. Anfr. 7 arctissimi, lentissime accrescentes, ultimus lateraliter valde compressus, superne et inferne obtuse angulatus, medio convexiusculus, antice paullulum ascendens, tum longiuscule descendens. Apertura modice obliqua, angusta, inverse auriformis, peristoma modice expansum, vix reflexiusculum, hepatico-labiatum.

Diam. maj. 10,5, min. 9,75, alt. 5,5 mm.

Hab. Badung provinciae sinensis Hubei.

Diese sehr auffällige Art besitze ich seit geraumer Zeit von dem Missionar L. Fuchs, habe sie aber nicht beschrieben, um ein Zusammenfallen mit einem Gredler'schen oder Heude'schen Namen zu vermeiden, da ich annehmen konnte, dass auch sie die Art erhalten hätten. Sie ist aber von keinem der beiden Collegen beschrieben worden. Von ihren Nächstverwandten, *G. biconcavum* Heude und *diplomphalum* Mldff., ist sie durch die ausserordentlich engen, zahlreicheren, Windungen und das fast ebenso tief wie der Nabel eingesenkte Gewinde scharf geschieden.

Die drei chinesischen Arten gehören mit *G. nautiliforme* Porro zu *Drepanostoma*, wozu ich auch das fossile *G. involutum* Tho. aus dem Oberen Oligocän von Tuchorie rechne. Letztere Art steht den Chinesen auffällig nahe.



Von diomedes scheidet sie der schärfere Kiel, das niedrigere Gewinde, der plötzlich herabgebogene letzte Umgang und die S förmige Krümmung des oberen Mundsaumes.

Diagnosen neuer und kritischer Landdeckelschnecken.

Von

Dr. O. von Möllendorff.

Truncatella stimpsoni Stearns.

T. rimata, subcylindrica, truncata, pallide fulva, costulis sat validis — 25 in anfr. ultimo — sculpta. Anfr. qui restant $4\frac{1}{2}$ sat convexi, sutura profunde impressa disjuncti, ultimus pone aperturam crista transversa valida indutus. Apert. verticalis, oblique ovalis, peristoma superne appressum leviter expansum.

Diam. 1,9, alt. 4,5 mm.

Truncatella Stimpsoni Stearns Proc. Calif. Acad. IV. 1872 p. 248, t. I f. 5 (teste Pfr. Mon. Pneum. Suppl. III p. 21).

Hab. in California (comm. R. Damon).

Taheitia anctostoma Quadr. et Mlldff.

T. rimata, subcylindrica, solidula, costis elevatis sat distantibus — 21 in anfr. penultimo — sculpta, fulva aut rubella. Spira truncata. Anfr. qui supersunt 5 planulati, sutura profunda disjuncti, ultimus basi fortiter cristatus, crista cum peristomate externo continua. Apertura perareta, oblique oviformis, peristoma exterrimum late patens, valde incrassatum, internum solutum, porrectum, modice expansum.

Alt. 6,5, diam. 2,75 mm.

Hab. in parte septentrionali insulae *Mindanao* et ad oppidum Puerto Princesa insulae Paragua leg. J. Quadras.

Diam. 13,5, alt. 12, apert. diam. 8,25 mm.

L. vitreum var. *latilabre* Mart. Ostas. p. 144, t. IV, f. 5.

Hab. Ceram.

Leptopoma fibulinum Quadr. et Middff.

T. anguste et semiobtecte perforata, globoso-turbinata, tenuis, subpellucida, subtiliter striatula, lineis spiralibus tenuissimis confertis et liris parum elevatis 5 cincta, alba. Spira sat elevata, subregulariter conica. Anfr. 6 planulati, ultimus convexiusculus, subacute carinatus, carina antice evanescente. Apertura valde obliqua, late ovato-acuminata, peristoma sat expansum, ad perforationem profunde sinuatum, subexcisum.

Diam. 17, alt. 17,5 mm.

Hab. in insulis Calamianes dictis.

Leptopoma antonii Kob.

T. anguste et semiobtecte perforata, solidula, elate trochiformis, subtiliter striatula, lineis spiralibus tenuissimis, maxime confertis decussata, liris elevatis 5 plus minusve distinctis cincta, albida maculis parvis luteo-corneis seriatim picta. Spira valde elevata, subregulariter conica. Anfr. 7 planulati, sutura per carinam exsertam late marginata disjuncti, ultimus convexiusculus, carina peraeuta utrimque valde exserta carinatus. Apert. diagonalis, rotundato-rhomboidea, peristoma modice expansum, albolabiatum, ad carinam protractum, subcanaliculatum, ad perforationem dilatatum.

Diam. 17, alt. 19,5 mm.

Leptopoma pileus var. *antonii* Kobelt Landdeckelschm. Phil. p. 38, t. V, f. 19—21.

Hab. ad vicinum Pamplona insulae Luzon provinciae Cagayan,

Lagochilus romblonense (Hid.)

T. anguste et semiobteete umbilicata, globoso-turbinata, tenuiuscula, subpellucida, striatula, liris spiralibus numerosis, quarum 4 fortiores, cineta, costulis membranaceis valde diciduis induta, pilis longiusculis confertis hirsuta, luteo-fulva, strigis flammulatis castaneis saepe interruptis et ad suturam maculis castaneis et flavidis regulariter alternantibus pecta. Spira modice elevata, lateribus fere strictis. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, ultimus tumidus. Apert. modice obliqua, ampla, fere circularis, peristoma modice expansum, albo-labiatum, superne ad insertionem subangulatum.

Diam. 14,5, alt. 13, apert. diam. 7,5.

Cyclophorus romblonensis Hid. J. de Conch. 1888 p. 83 (nomen).

Hab. Romblon Philippinarum.

Lagochilus reticulatum Middff.

T. sat aperte umbilicata, depressa, solidula, costulis transversis et lineis spiralibus elevatis confertis quasi reticulata, flava, strigis fulguratis castaneis regulariter pecta. Spira depresso conoidea. Anfr. 5 convexi, sutura profunda disjuncti, ultimus subcompressus, subangulatus, antice paullum descendens. Apert. sat obliqua, circularis, peristoma modice expansum, labiatum, superne ad insertionem breviter excisum.

Diam. 7,8, alt. 5,5 mm.

Hab. in parte septentrionali insulae Celebes leg. cl. H. Fruhstorfer.

Lagochilus barbatum Gld.

T. anguste perforata, sat elate turbinata, tenuis, subpellucida, lineis spiralibus confertis et costulis membranaceis quasi reticulata, brumea. Spira sat elevata lateribus

strictis. Anfr. 5 valde convexi, sutura profunde impressa disjuneti, ultimus ad peripheriam indistincte biangulatus, in angulo utroque serie setorum longiusculorum indutus. Apertura valde obliqua, subcircularis, peristoma vix expansum, ad insertionem distincte excisum.

Diam. 4,5 alt. 4,5.

Cyclostoma barbata Gould Proc. Bost. Soc. N. H. VI 1959 p. 425, *Japonia barbata* Gld. Olia p. 104. Kob. Jap. p. 114. — *Lagochilus* b. Mldff. J. D. M. G. XII p. 364.

Hab. in insula Nippon.

Seabrina laotica Mldff.

T. late et aperte umbilicata, conoideo-depressa, solidula, subtiliter striatula, costulis membranaceis confertis fasciatim interruptis induta, lutea, strigis flammulatis castaneis et infra peripheriam taenia angusta castanea ornata. Spira breviter conoidea. Anfr. 5 $\frac{1}{2}$ teretes, sutura modice impressa disjuncti. Apert. modice obliqua, circularis, peristoma vix expansum, multiplicatum, subporrectum, superne ad insertionem breviter excisum.

Diam. 9,5 alt. 5,5 mm.

Hab. prope Luang-Prabang regionis Lao leg. cl. C. Roebelen.

Leptopomatoides valcatus Blfd.

T. sat late et pervie umbilicata, depresso turbinata, solidula, subtiliter striatula, olivaceo-flavida, nitidula. Anfr. 5 teretes, ultimus non descendens. Apertura parum obliqua, circularis, peristoma simplex, rectum, obtusum.

Diam. 7, alt. 5 mm.

Hab. in Canara meridionali Indiae.

Pterocyclus comitis Beddome.

T. latissime umbilicata, depressa, fere discoidea, solida, plicato-striatula, lutea, strigis flammulatis castaneis regulatiter picta. Spira brevissime conoidea. Anfr. 5½ teretes, sutura profunda subcanaliculata disjuncti, ultimus antice longiuscule descendens. Apert. diagonalis, circularis, peristoma duplex, internum superne profunde excisum, externum superne in alam tubuli instar compressam antice deflexam productum.

Diam. 16,33, alt. 8,66 mm.

Hab. in montibus Anamalli Indiae.

Pterocyclus pseudocumingi Nev.

T. latissime umbilicata, discoidea, solidula, subtiliter striatula, pallide lutea, strigis flammulatis castaneis et taenia peripherica alba, altera castanea infra illam picta. Spira vix prominula. Anfr. 5½ teretes, sutura profunda impressa disjuncti, ultimus paullum descendens. Apert. modice obliqua, circularis, peristoma duplex, internum superne valde excisum, externum in alam magnum anfractui penultimo adnatam productum. Operculum intus profunde excavatum, extus lamella subtestacea anfr. 7 floris instar convergentibus indutum.

Diam. 14,25, alt. 5 mm.

Pt. cumingi var. *Nevill Handl.* p. 267. — *Pt. pseudocumingi* Nev. *Mss.*

Hab. Tranyvancur.

Pterocyclus schmuckeri Middff.

T. latissime umbilicata, discoidea, subtiliter plicato-striata, corneo-fulva, strigis fulminulatis castaneis interdum dilutis marmorata, ad peripheriam fusco-taeniata. Spira brevissime prominula. Anfr. 5 teretes, ultimus breviter des-

cendens. Apertura diagonalis, circularis, peristoma duplex, internum breviter porrectum, superne profunde excisum, externum latissime expansum, superne in alam compressam anfr. penultimo longe adnatam productum, extus et basi anfractum leviter involutum, ad umbilicum attenuatum. Operculum intus valde concavum, extus sat convexum marginibus anfractuum lamellatum elevatis.

Diam. maj. 22.5, min. 18, alt. 10.5 apert. diam. (intus) 7, e. perist. 9.5 mm.

Hab. in monte Omi provinciae sinensis Sytshuan.

Platyrhaphis expansilabris Middff.

T. late umbilicata, conoideo-depressa, solidula, subpellucens, transverse plicato-striatula, lineis spirabilis microscopicis decussatula, opaca, subpruinosa, caerulescenti-brunnea, basi pallidior. Spira gradata, apice obliqua, mammillari, glabro. Anfr. 5 teretes, celeriter accrescentes, ad suturam applanati, ultimus longe descendens. Apert. valde obliqua, subcircularis, peristoma late expansum, haud reflexum, superne valde protractum, ad umbilicum attenuatum. Operculum normale, lamina externa sat concava, anfr. 9 oblique striatulis.

Diam. maj. 14, min. 11, alt. 9, apert. diam. 6.25 mm.

Hab. in insulis Busuanga et Tangat archipelagi Calamianes dicti.

Platyrhaphis schmackeri Middff.

T. late et aperte umbilicata, discoidea, solidula, subtiliter plicato-striatula, lineis spiralibus confertis decussata, opaca, brunneo-grisea. Spira vix elevata, apice mucronato, obliqua. Anfr. 5 teretes, ad suturam profunde impressam applanati, fortius plicati, ultimus antice breviter deflexus. Apertura valde obliqua, ampla, subcircularis, peristoma late expansum, subincassatum, superne protractum, adnatum, ad umbilicum

Pupina miokoana Mouss.

T. subcylindraceo-oblonga, tenuis, pellucida, laevigata, pallide lutescens. Anfr. $5\frac{1}{2}$ plani, sutura parum distincta, submarginata disjuncti, superi spiram convexo-conoideam efficientes, ultimus paullum devians, antice brevissime ascendens. Apert. verticalis, circularis, peristoma vix expansum, incrassatum, margo superus pone insertionem calloso-subdentatus, cum lamella parietali humili sed valida canalem superum formans, canalis inferus angustus, lateraliter in foramen circulare desinens.

Diam. 3, alt. 5,5 mm.

Hab. in insulis Mioko et Nova Lanenburg archipelagi Bismarckiani

var. minor. Diam. 3,5, alt. 6.

Hab. in insula Duke of York (Neu Lauenburg).

var. aperta Mouss. minor, anfr. paullo convexioribus.
Diam. 3,9, alt. 6,5 mm.

Hab. ?

Hargravesia luzonica Middff.

T. oblique ovato-oblonga, solidula, subpellucida, laevis, valle nitens, fulvo-cornea. Anfr. $5\frac{1}{2}$ planulati, superi spiram subregularem, convexo-conoideam efficientes, penultimus paullum, ultimus sat distortus, antice breviter ascendens. Apert. paullum retrorsum inclinata, circularis; peristoma rectum incrassatum, margo dexter longe in anfractum penultimum productus, cum lamella parietali valida canalem superum formans, tum sinuosus, basalis sat protractus, columellaris profundiuscula sinnatus, haud scissus.

Diam. 6, alt. 8.

Hab. prope Dingalan provinciae Nueva Ecija in insula Luzon leg. coll. indigena.

Dioryx cariniger Mlldff.

T. anguste perforata, irregulariter turbinata, tenuis, pellucida, striis costuliformibus maxime confertis et lineis spiralibus magis distantibus sculpta, pallidissime cornea, sericina. Spira sat elate conoidea apice acutiuseulo glabratato brunneo. Anfr. 4 convexi, ultimus paullum distortus, compressus, carina exserta sat acuta cinctus, basi gibbus, pone aperturam valde constrictus. Tubulus suturalis perlongus, a strictura usque ad medium anfr. ult. productus. Apert. parum obliqua, circularis, peristoma duplex, exte num campanulatum, expansum, incrassatum, concentricè striatum, ad columellam attenuatum. internum porrectum paullum expansum. Operculum terminale, corneum, tenue, subconca-
vum, paucispirum, anfr. 4.

Diam. 5,5 alt. 5 mm.

Hab. Prope oppidum Luang-Prabang in regione Laos dicta leg. cl. C. Roebelen.

Alycaeus (Charax) subhumilis Nev.

T. anguste umbilicata, depresso-globosa, solidula, subpellucida, subtiliter striatula, costulis valde distantibus deciduis sculpta. Spira convexo-conoidea, sursum rubella. Anfr. 4 convexi, ultimus a medio tumidus, basi gibbus, tum valde constrictus, post stricturam crista valde elevata, cinctus. Apertura modice obliqua, subcircularis, peristoma extus sat expansum, valde incrassatum, quasi multiplicatum, intus porrectum, vix expansum, ad insertionem et basi sinuatum, sat excisum.

Diam. 2,8. alt. 2,2 mm.

Hab. in montibus Darjiling Indiae, comm. cl. R. Hungerford.

Palaina doliolum Mouss. (miss.)

T. sinistrorsa, non rimata, ovata, tenuis, costulis filiformibus, acutis, valde distantibus sculpta, cornearufa.

Cylindropalaina Mlldff. n. sect. Palainae.

T. parva, plus minusve cylindrica, peristoma continuum.
Typus: *P. chrysalis* Mlldff.

Palaina (Cylindropalaina) beddomei Braz.

T. sinistrorsa, vix rimata, subovato-oblonga, tenuis,
pellucida, tenuiter costulato-striata, luteo-cornea. Spira
sensim attenuata apice obtuso. Anfr. 6 bene convexi,
ultimus initio constrictus, antice breviter ascendens. Apert.
parum obliqua subcircularis, peristoma duplex, utrumque
latiuscule expansum, sulco profundiusculo separatum.

Diam. 0,8, alt. 1,75 mm.

Hab. in colonia Queensland.

Macropalaina Mlldff. n. sect. Palainae.

T. spira acuminata, elongata.
Typus: *P. pomatiaeformis* Mouss.

Palaina (Macropalaina) scalarina Mouss. (mss.)

T. sinistrorsa, rimata, ventricoso-pyramidalis, solidula,
costis crassiusculis sat distantibus — 20 in anfr. ultimo —
sculpta, corneo-brunnea. Spira subregulariter pyramidalis
lateribus fere strictis, apice acuto. Anfr. $7\frac{1}{2}$ convexi,
ultimus initio leviter constrictus, ad stricturam arctius cos-
tatus, paullum distortus, antice sat ascendens, basi crista
obtusa, bene exserta cinctus, interdum medio flavotaeniatu-
sus. Apert. verticalis, subcircularis, peristoma duplex, ex-
ternum breviter expansum, ad insertionem paullum dilatatum,
tum excisum, ad columellam in processum liberum
alaeformem productum, supra alam valde excisum, internum
continuum breviter porrectum, superne appressum, ad colu-
mellam valde sinuatum.

Diam. 2, long. 4 mm.

Hab. in insula Ponape Carolinarum.

anfr. ultimi, lamella palatalis brevis in prima tertia parte ejusdem. Apertura verticalis, subcircularis, peristoma duplex, extnum interruptum, late patens, internum superne appresum, expansum, sulco lato ab illa separatum.

Diam. 1,5, alt. 2,75 mm.

Diplommatina macrostoma Mouss. ms.

Hab. in insula Vitilevu comm. cl. A. Mousson.

Diplommatina leptospira Mlldff.

T. vix rimata, gracillime turrita, tenuis, pellucida, costulis distantibus tenuibus (verosimiliter in alas productis) sculpta, alba. Spira gracillima lateribus subconcaavis apice obtusulo. Anfr. 8 convexi, penultimus paullum prominens, ultimus angustus, initio leviter constrictus, antice vix ascendens. Apertura parum obliqua, subcircularis, peristoma duplex, internum continuum parum expansum, superne adatum, extnum latissime expansum, patens, ad columellam parum excisum.

Diam. 0,75, alt. 2,5 mm.

Hab. ad vicum Loon insulae Bohol, comm. cl. O. Koch.

Mychopoma exul Mlldff.

T. medioeriter umbilicata, turbinato-depressa, solidiuscula, transverse striata et lineis spiralibus confertis decussata, costulis membranaceis in series setorum brevium prolongatis hirsuta, ad peripheriam setis perlongis circumdata, pallide cornea. Spira modice elevata, convexo-conoidea apice obliqua, papillari. Anfr. 5 convexi, sat celeriter accrescentes, ultimus paulisper descendens. Apert. modice obliqua, ovalis, peristoma rectum, obtusum, superne sat protractum, sinuosum, ad umbilicum subexcisum, callo crasso adatum.

Diam. maj. 10,5, min. 8,5, alt. 7,5, apert. long. 5, lat. 4,5.

Hab. prope Constantinhafen Novae Guineae Germaniae leg. cl. J. Kubary.

Literaturbericht.

Gude, G. K. Armature of Helicoid Landshells. In Science Gossip Vol. III. No. 31, Decbr. 1896 p. 178 (Cont.). 204. Enthält Beschreibung und Abbildung der Innenzähne von *Plectopylis ponsonbyi*, *fultoni*, *simbriosa*, *azona*, *pulvinaris*, *cutisculpta*, *multispira* und *invia*; — dann von *Pl. stenochila* Middff., *laminiifera* Middff., *serica* G. Aust., *pinaeis* Bens., *nagaensis* G. Aust.

Martens, E. von, Beschalte Weichthiere Deutsch-Ost-Afrikas. Mit zahlreichen Text-Abbildungen und 7 Tafeln, nach der Natur gezeichnet von Hedwig von Zglinika. — Berlin, Reimer, gr. 8°, 308 S.

Eine schwer empfundene Lücke in unserer Literatur wird durch das vorliegende Werk ausgefüllt, das uns zum ersten Male eine übersichtliche Zusammenstellung der Molluskenfauna von Deutsch-Ost-Afrika gibt. Dem Berliner Museum ist aus verschiedenen Quellen nach und nach ein reiches Material zugeflossen, das hier die denkbar sorgfältigste Verarbeitung gefunden hat. Die Hauptmasse ist Dr. Stuhlmann zu verdanken, dem Begleiter Emin's auf seiner letzten Reise, ihm zu Liebe hat der Bearbeiter auch die Grenzen des deutschen Gebietes einigermaßen überschritten und das Runssoro-Gebirge, das Gebiet des Jturi, sowie die Nordostseite des Victoria-Nyansa eingeschlossen, dann auch den Kenia, Ukaumba und Mombas, von wo durch Neumann, Hildebrandt und von der Decken authentisches Material vorliegt. Tanganyika und Nyassa sind dagegen etwas stiefmütterlicher behandelt, da die dort stationirten deutschen Beamten noch wenig gesammelt zu haben scheinen.

„Die Fauna ist wesentlich die tropisch-afrikanische, wie die Gattungen *Ennea*, *Streptaxis*, *Streptostele*, *Helicarion*, *Thapsia*, *Trochonania*, *Buliminus* (*Rhachis*), *Achatina*, *Limicolaria*, *Pseudoglossula*, *Sabulina*, *Hapalus*, *Isidora*, *Ampullaria*, *Lanistes*, *Cleopatra*, *Aetheria*, *Spatha* und *Mutela* zeigen, die alle auch in West-Afrika zu Hause sind. Eine Identität der Arten zwischen Ost- und West-Afrika konnte ich nur bei *Helicarion sowerbyanus*, bei *Limicolaria rohlfsi* und bei *Aetheria* annehmen; einige andere Arten von *Limicolaria*, einzelne von *Ennea* (*Edentulina*) *Spatha* und *Mutela* sind auch westafrikanischen sehr ähnlich. Eigenthümlich für den Osten und theilweise für den Süden ist *Cyclostoma*, *Physopsis*, die reiche Vertretung von *Vivipara*, die

Untergattungen *Martensia*, *Ledoulxia* und *Bloyetia* innerhalb *Trochonanina*, ferner *Livinhacia*, *Leroya*, *Grandidieria* und *Cameronia*. Von westafrikanischen Gattungen oder Untergattungen fehlen in Ostafrika *Pseudachatina*, *Perideris*, *Columna*, *Megadesma* (*Galatea*), *Pleiodon* im engeren Sinne und *Chelidonopsis*, letztere aus dem Kongo-Gebiet, endlich die Brakwasser-Gattungen *Vibex* und *Iphigenia*, letztere Westafrika mit Amerika gemeinsam. Von kleineren, leicht zu übersehenden Arten ist für Westafrika allein noch *Greef's Thyrophorella*, für Ostafrika allein noch *Zingis*, *Colpanostoma*, und *Tayloria*, falls diese sich als gute Gattungen bewähren, anzuführen. Dabei ist von der eigenthümlichen Süßwasserfauna des Tanganyika abgesehen. Einzelne der Unterschiede, aber nicht alle, mögen mit einer stärkeren Regenmenge im Golf von Guinea zusammenhängen. Eine Uebereinstimmung der ostafrikanischen Süßwasserfauna mit der indischen, welche auf Madagaskar und Mauritius (hier vielleicht durch Einschleppung) so auffallend hervortritt, zeigt sich nur bei *Melania* und *Neritina*, und auch hier hauptsächlich nur im Küstengebiet, entschiedener noch im Betreff der Brakwasser- und Litoralbewohner. Die charakteristischen grossen *Helix*-Arten Madagaskars, wie *Ampelita* und *Helicophanta*, fehlen dem Festland von Ostafrika gänzlich: *Achatina* ist auf Madagaskar vielleicht nur eingeführt, aber die Cyclostomen (*Tropidophora* und *Ligatella*) bilden einen gemeinschaftlichen Zug der Landschneckenfauna Madagaskars und des ostafrikanischen Festlandes, sind aber auf letzterem weniger reich an Zahl und Grösse der Arten und setzen sich nach Norden auch noch durch etwas abweichende Formen (*Otopoma*), ins Somali-Land und nach Süd-Arabien einschliesslich Sokotra fort.


„Mit Südafrika verglichen fehlen in unserem Gebiet hauptsächlich nur die weissen, trockenem dürrem Boden angehörigen Landschnecken Südostafrikas (*Dorcasia*, und *Helix globulus*, *alexandriæ*, ferner *Helix reticulata*, *Bulininus damarensis*), welche dem Klima entsprechend an der Westseite einen so deutlichen Abschnitt zwischen der tropischen Westküste und dem Cap bilden, während an der Ostseite die tropische Fauna mehr allmälig und mehr durch Verarmung als durch Auftreten neuer Gattungen oder Untergattungen (doch z. B. *Aërope caffra*) in die speziell südafrikanische übergeht. Nach Norden erstreckt sich die ostafrikanische Landschneckenfauna bis zur Grenze der

tropischen Regenzeit (*Limicolaria* noch im Seminar), aber viele charakteristische Süßwassermollusken, die eigentlich dem tropischen Afrika angehören, hat der Nil bis Unter-Egypten verbreitet*.

Betreff's der Vertheilung innerhalb unseres Gebietes liegt für die Landschnecken nahe des Küstenland im Osten, ein ansteigendes Stufenland mit massigen Bergzügen (Ukami, Ussagara, Kondoa, Uqua und Ussambara, soweit dieses nicht zum Küstensaum gehörig) und das Steppengebiet des Binnenlandes (Ugogo, Unyamwesi und bis zu den grossen Seen), zu unterscheiden; dazu kommen noch als besondere natürliche Gebiete der Kilimandjaro und Kenia, die Ufer des Victoria-Nyansa (vielleicht noch zum Steppengebiet zu rechnen), dann die Umgebung des Albert-Edward-Sees und des Albert-Nyansa, innerhalb deren sich des Runssoro-Gebirge und die westliche Waldzone wieder besonders hervorheben, endlich, mehr geographisch als physikalisch abgegrenzt, die Ufer des Nyassa.

Reich vertreten im Küstenland (zunächst Korallenkalk und dann auch Jura, Gebiet der indischen Monsune) sind die Cyclostomen, was mit ihrer Fortsetzung nach Madagaskar und Süd-Arabien übereinstimmt, die Trochomatten, *Conularius* und *Rhachis* dann die Achatinen, worunter namentlich die schöne *Achatina reticulata* zu nennen ist, während die nahe verwandten *Limicolaria* hier noch ganz zu fehlen scheinen. Im Allgemeinen kennen wir aber noch wenige Arten aus dem Küstenlande, sei es, dass es wirklich ärmer ist, sei es, dass nur weniger dort gesammelt wurde, indem Reisende erst bei dem Vordringen in weniger besuchte Gegenden es für der Mühe werth hielten, auch Schnecken zu sammeln. Am artenreichsten erscheint das Stufenland (Parklandschaft mit Laterit, Granit und krystallinischen Schiefern), theilweise vielleicht nur deshalb weil daselbst von englischen und französischen Geistlichen bei ständigem Aufenthalt in den Missionen erfolgreicher gesammelt wurde, namentlich die kleineren Arten, wie *Emea* und *Streptaxis*, *Thapsia*, *Pseudoglossula* und *Hapalus*, die von Durchreisenden leicht übersehen werden. Doch mag auch hier ein ähnliches Verhältniss obwalten, wie zwischen dem deutschen Küstenland und Mitteldeutschland: dieselben Schneckenarten sind im Bergland überall vorhanden und zahlreich, im Küstenland lokal und wenig zahlreich, so dass sie längere Zeit übersehen werden

können. . . Die eigentlichen Limicolarien scheinen auch hier zu fehlen; diese treten aber sofort im Steppengebiet auf und pflegen dem Durchreisenden ihrer Grösse wegen meist aufzufallen; auch mehrere Achatinen sind vorhanden, dagegen sind hier die Cyclostomen, Enneen, Helicarion, Pseudoglessula und Subulina, die Schnecken feuchter, schattiger Stellen, schwach vertreten, Thapsia, Pseudoglessula und Hapalus scheinen ganz zu fehlen. Von den Landschnecken des Kilimandjaro und Kenia ist unsere Kenntniss noch dürftig; sie sind grösseren Theils Arten aus Gattungen, die auch sonst in Ostafrika verbreitet sind und keinen besonderen Habitus zeigen, wesentlich dem unteren Kulturland bis 1300 oder 1700 m. angehörig. Bei 1000 m. sind schon einige kleinere bis jetzt dem Kilima-Ndjaro eigenthümliche Arten (*Cyclophorus volkensi*, *Ennea tudes*) in den frischen Rodungen gefunden; im Gürtelwald (1900—2700m.) werden die feuchteren Umgebung bedürftigen *Helicarion* heutiger und tritt eine ächte *Vitrina* (*V. nigrocineta*) hinzu. Unter den Trochonaninen treten als sehr eigenthümliche Formen *Tr. simulans* und *Tr. rufofusca* in Höhen von 1200—2700 m. auf, in der Färbung an die *Helix arbustorum* der europäischen Alpen erinnernd; die höchsten Schnecken, welche Dr. Volkens am Kilima Ndjaro fand, sind ein *Helicarion* und eine kleine den europäischen kleineren *Fruticicolen* ähnliche und bis jetzt diesem Berge eigenthümliche *Helix Kilimae*, glänzend braun und wahrscheinlich behaart, in einer Höhe von 3800 m., aber von wirklichen Vertretern europäischer Gebirgschnecken ist nur eine *Vitrina* zu nennen; *Clausilien* und *Puppen*, die doch noch in Abyssinien vorkommen, sind bis jetzt nicht gefunden worden. Auf dem Runssoro (Ruwenzori) tritt auch wieder eine *Vitrina* und der ihr in der Lebensweise ähnliche *Helicarion* in verhältnismässig reicher Artenzahl auf, eigenthümliche *Buliminus* mit dickem Mündungsrand (*B. trapezoideus* u. *refrigoris*), die ich nur, wenn auch etwas entfernt, mit abessynischen und vorderindischen vergleichen kann, und endlich *Glessula russoriana*, ebenfalls an abessynische (*montana* Martens) und vorderindische Bergschnecken erinnernd; auch findet sich hier die grösste *Subulina* (*S. castanea*) mit eigenthümlich glänzender, saftiger Schalenhaut, alle diese in Höhen von 2500—3800 m. Die glänzende, gut ausgeprägte Schalenhaut, welche den meisten dieser Schnecken des Runssoro zukommt, deutet auf bedeutende und beständige Feuchtigkeit ihrer Fundorte. Vom Urwald ge-



auffallender Weise in allen. Sogenannte Seeformen, dickschalig, mit kurzem Gewinde, an diejenigen der Seen am Fusse der europäischen Alpen erinnernd, finden sich hauptsächlich im Victoria Nyansa, so *Limnaea nyansae*, *Isidora trigona* und *transversalis*. Ganz eigenthümliche Untergattungen und Gattungen oft mit eigenthümlich ausgebildeter Skulptur, sind bis jetzt noch nicht aus den nördlicheren Seen (Victoria Nyansa, Albert Nyansa und Albert-Edward See) bekannt, wohl aber unter den Melanien im Nyassa, am zahlreichsten und sonderbarsten im Tanganyika*.

„Die Brakwasser-Mollusken sind meistens Arten, die auch sonst an den Küsten des Indischen Oceans weit verbreitet sind, und wenn nicht (*Melampus hypoleucus*), doch solchen ähnlich*.

Die meisten aus Afrika gekommenen Arten sind schon früher in den Sitzungsberichten der Gesellschaft naturforschender Freunde oder im Nachrichtenblatt veröffentlicht worden, die Zahl der hier neubeschriebenen Arten ist deshalb verhältnissmäßig gering. Es sind: *Cyclostoma anceps* var. *liederi* p. 4; — *Cycl. letourneuxi* var. *stuhlmanni* p. 5, t. 2, fig. 1; — *Cyclophorus intermedius* p. 8, t. 2, fig. 3; — *Paucidentina* n. subg. *Enneae* p. 16, für Arten mit Zähnen an Mündungsrand und Außenrand, aber nicht an Columnellar- und Basalrand; Typus *E. curvilamella* Smith; — *Ennea subhyalina* var. *addita* p. 25; — *Steptaxis pusillus* p. 32, t. 2, fig. 31; — *Tayloria iterata* p. 33, fig.; — *Vitrina nigrocincta* p. 39, t. 3, fig. 7; — *Thapsia curvatula* p. 41, t. 3, fig. 12; — *Th. hanningtoni* var. *stuhlmanni* und var. *fasciata* p. 42; — *Trochonanina similaris* var. *kretschmeri* p. 52, t. 3, fig. 14; — *Buliminus* (*Gonulinus*) *sordidulus* p. 65, t. 3, fig. 30; — *Rhachis brauni* var. *lunulatus* p. 72; var. *hypostictus* p. 73; — *Rh. melanacme* var. *neumannii* p. 76; — *Achatina pauthera* var. *neumannii* p. 84, fig.; — *Limicolaria nilotica* var. *schweinfurthi* p. 95; — *Lim. colorata* var. *fulvescens* p. 105, t. 4, fig. 2, 6, var. *infrafusca* p. 106, t. 4, fig. 10; — *Lim. dimidiata* var. *volkensi* p. 107; — *Sub. conradti*, p. 124, t. 5, fig. 28; — *Opeas subvaricosum* p. 126, t. 5, fig. 21, 29; — *Op. limpidum* p. 127, t. 5, fig. 31; — *Op. streptostyloides* p. 127, t. 5, fig. 30; *Hapalus kretschmeri* p. 129, t. 5, fig. 22; — *Hap. suturalis* p. 129, t. 5, fig. 45; — *Hap. delicatus* var. *gracilior* p. 130;

— *Geostilbia stuhlmanni* p. 131, t. 5, fig. 33; — *Limnaea humerosa* p. 135, t. 6, fig. 1; — *L. undussumae* p. 135, t. 1, fig. 18, t. 6, fig. 2, 5; — *Isidora strigosa* p. 139, t. 6, fig. 11; *Is. transversalis* p. 139, t. 6, fig. 9; — *Physopsis tanganyiae* p. 144, t. 6, fig. 12; — *Planorbis choanomphalus* var. *basisulcatus* p. 149, t. 6, fig. 17; — *Ancylus stuhlmanni* p. 151, t. 1, fig. 19; — *Ampullaria erythrostoma* var. *stuhlmanni* p. 155, fig.; — *Amp. gordoni* var. *bukobae* p. 156, t. 1, fig. 22; var. *volkensi* p. 157; — *Amp. ovata* var. *deckeni* p. 159; var. *emini* p. 160, fig.; — *Lanistes ovum* var. *plieosus* p. 167; — *Lan. stuhlmanni* p. 171, t. 6, fig. 37; — *Vivipara unicolor* var. *conoidea* p. 176, var. *elatior* p. 177, t. 6, fig. 25; — *Viv. rubicunda* var. *subturrata* p. 179, t. 6, fig. 26; — *Viv. meta* p. 179, t. 6, fig. 27; — *Viv. constricta* var. *pagodella* p. 182, t. 6, fig. 18; — *Vivipara costulata* var. *trilirata* p. 183, t. 6, fig. 23 24; — *Bithynia (Gabbia) puteana* p. 191; — *B. (G.) neumanii* p. 191, t. 6, fig. 33; — *Melania pergracilis* p. 190, t. 6, fig. 48; — *Mel. areuatula* p. 201, t. 6, fig. 39; — *Unio böhmi* p. 223, t. 7, fig. 9; — *U. gerrardi* p. 223, t. 7, fig. 5; — *U. emini* p. 225, t. 7, fig. 14; — *U. ambifarius* p. 225, t. 7, fig. 20; — *U. lieberi* p. 226, t. 7, fig. 19; — *U. hypsiprymnus* p. 230, t. 7, fig. 1; — *U. stuhlmanni* p. 231, t. 7, fig. 13; — *U. ngesianus* p. 234, t. 7, fig. 7; — *U. multicolor* p. 236, t. 7, fig. 4; — *U. burtoni* var. *sturanyi* p. 238; — *U. rostralis* p. 238 mit var. *brevior*; — *Spatha rotundata* p. 242, fig.; — *Sp. trapezia* p. 243, fig.; mit var. *senilis* p. 244; — *Sp. kirki* var. *lieberi* p. 245; — *Sp. wahlbergi* var. *dorsalis* p. 247; — *Sp. divaricata* p. 250, fig.; — *Sp. stuhlmanni* p. 250, fig.; — *Mutela nilotica* var. *emini* p. 253; — *M. bourguignati* var. *smithi* p. 255; — var. *truncata* p. 255, t. 7, fig. 17; — *Sphaerium stuhlmanni* p. 261, t. 7, fig. 8; — *Melampus hypoleucus* p. 263, t. 6, fig. 44; — *Aferulus* n. subg. für die afrikanischen Cyclophorus.

Fewkes, Pacific Coast Shells from Prehistoric Tusayan Pueblos.

In the American Anthropologist, November 1896. —
Non vidi. —

Fulton, Hugh, on new species of Nanina, Helix, Amphidromus and Porphyrobaphe. In Ann. Mag. N. H. (6) XVIII. 1896 p. 100. —

Neu *Nanina (Oxytes) fidelis* p. 100 von den Khasi-Hills in Nordost-

Indien: — *Helix (Xenothauma n.) Baroni* n. p. 101 vom Fluss Jonan in Peru, eine der merkwürdigsten seit langer Zeit bekannt gewordenen Formen, im Habitus und Skulptur an die madeirenser *Hel. delphinulus* erinnernd, aber wohl die nächste Verwandte des isolirten *Bostryx reentsi* Phil. aus der Wüste Atacama: — *Amphidromus sumbaensis* p. 102, Sumba Insel: — *Amph. kalaoensis* d. 102, Kalao; — *Porphyrobaphe approximata* p. 103, Bogota: — *Porph. vicaria=labeo* Reeve ex parte, nec Brod sp. 207b, nec 207, Leimabainba, Peru. —

Meisenheimer, Joh., Entwicklungsgeschichte von Limax maximus L. I. Furchung und Keimblätterbildung. — Inaugural-dissertation. Sep. Abz. aus Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie Bd. 61 Heft 3 8° 56 S. mit 3 Tafeln.

Die durch eine sorgfältige Verfolgung der ganzen Entwicklung erhaltenen Resultate schliessen sich im Ganzen den Ansichten von Koford an, aber der Autor kommt im Gegensatz zu diesem zu der Folgerung, dass sich bei *Limax* nicht der After aus dem Blastoporus bildet, sondern der Mund.

Rolle, H. und Kobelt, Dr. W., Beiträge zur Molluskenfauna des Orients. — Supplementband zu Rossmässlers Iconographie. Neue Folge. Lfg. 5. 6. (Schluss)

Neu beschrieben oder zum erstemal abgebildet werden *Pomatia bituminis* p. 49, t. 19; fig. 4. 5. Tschengen-kiöi Cilicien: — *Pomatia pericalla* Bgt. mss. p. 49, t. 19, fig 3, t. 20, fig. 3; Giosna in Cilicien: — *Pomatia issica* p. 50, t. 20, fig. 1, 2. Alexandrette: — *Pomatia antiochiensis* p. 51, t. 21, fig. 1. 2. 22, fig. 1. 2 Antiochia; — *Pomatia epidaphne* p. 52, t. 21, fig. 2—5, Antiochia: — *Pomatia adanensis* p. 52, t. 23, fig. 1—4. Adana, Cilicien; — var. *sarica* p. 53, t. 23, fig. 5—6, Adana: — *Pomatia nucula* var. *mersinae* p. 53, t. 23, fig. 7—8, Merssina: — *Pomatia infidelium* p. 54, t. 24, fig. 5—6, Giaur Dagh bei Alexandrette; — *Levantina spiriplana* var. *transjordanica* p. 54, t. 22, fig. 3—4, Ostjordanland; — *Xerophila cyparissias* Parr. t. 22, fig. 8—9; — *Xerophila larnacensis* p. 55, t. 22, fig. 10—11, Larnaka, Cypern; — *Cressa lusignani* p. 56, t. 22, fig. 12—13, Cypern; — *Patula sudensis* var. *cypria* p. 56, t. 22, fig. 12—13, Cypern; — *Petraens rollei* Kob. p. 57, t. 10, fig. 7—8, Lycrien: — *Galaxis rothi* var. *cypria* p. 59, t. 20 fig. 6—7 Cypern; — *Isidora rollei* p. 60, t. 19, fig. 6—8, Jaffa. —

Martini-Chemnitz, Conchylien Cabinet. Neue Auflage.

Lfg. 424. Dentaliidae, von Glessin (Schluss), und Schluss des Manuskripts von Bullidae von Kobelt. *Neu Antalis columbianus* t. 10, fig. 4, und *Dentalium goreanum* t. 10, fig. 9—10.

Lfg. 425. Scalariidae, von Glessin. Keine n. sp. —

Grieg, James A., Bidrag til kundskaben om Vestlandets Mollusker. In Bergens Museums Aarbog 1896 No. 10.

1. Sognesens Mollusker. 77 Arten werden aufgeführt, keine neu. Im Ganzen sind 186 Arten von dort bekannt. — 2 Nogle nudibranchiater. *Tritonia (Candiella) plebeia* Johnst var. wird mit zahlreichen Details abgebildet.

Dall W. H., Report on the Mollusks collected by the International Boundary Commission of the United States and Mexico 1892—1894. From Pr. U. St. Nat. Musenn vol. XIX. 1896.

Als neu beschrieben werden aus der sonorischen Region *Polygyra ashmuni* p. 342; — *Pol. pseudodonta* p. 343; — *Coelocentrum nelsoni* p. 352 t. 33 fig. 5—6; — *C. pfefferi* p. 352 t. 33 fig. 1—2; — *Anisospira stebeli* p. 353 t. 33 fig. 7—8; — *Streptostyla nebulosa* p. 364, t. 33 fig. 4. — Zum erstenmal abgebildet werden. *Epiphragmophora arizonensis* Dall t. 31 fig. 11—12; — *Ephachitana* Dall p. 339 t. 31 fig. 7—8; — *Polygyra chiricahuina* Dall t. 32 fig. 9,10,12; — *Pol. mearnsii* Dall t. 32 fig. 7,8,11; — *Holospira crossei* Dall t. 31 fig. 2; — *Hol. pasonis* Dall t. 31 fig. 4—5; — *Hol. bilamellata* Dall t. 31 fig. 3; — *Hol. mearnsii* Dall t. 31 fig. 1; — *Orthotomium ramentosum* (*Columna*) Cooper t. 31 fig. 8; — *Bythinella palomasensis* Pilsbry t. 31 fig. 9; — *Unio mitchelli* Stimp. t. 32 fig. 1—3; — *Audonta dejecta* Lewis t. 32. fig. 4—5.

Guppy, R. J. Lechmere and W. H. Dall, Description of Tertiary Fossils from the Antillean Region. From Pr. U. St. Nat. Mus. vol. XIX. 1896.

Die beschriebenen Arten entstammen allen Horizonten des Tertiärs von Pliocän bis zum Eocän und wurden von Guppy gesammelt. Als neu beschrieben werden: *Clathurella amieta* Guppy p. 305 t. 27 fig. 12, Oligocän von Jamaica; — *Cl. vendryesiana* Dall p. 306 t. 27 fig. 1, ibid; — *Cythara gibba* Guppy, p. 306 t. 27

fig. 9, *ibid.*; — *G. guppyi* Dall p. 306 t. 27 fig. 5, *ibid.*; — *G. mucronata* Guppy, *obtusa* Guppy t. 27 fig. 6 und 7, *ibid.*; — *Mangilia consentanea* Guppy p. 307 t. 27 fig. 4, *ibid.*; — *Cancellaria rowelli* p. 307 t. 29 fig. 1, Oligocän von Haiti; — *Oliva plicata* Guppy t. 30 fig. 12, *Olivella indivisa* Guppy t. 30 fig. 10, Oligocän von Jamaica; — *Marginella solitaria* Guppy t. 29 fig. 14, *Persicula arcuata* Guppy t. 29 fig. 13, Trinidad; — *Marg. latisima* Dall, *limonensis* Dall, *amina* Dall t. 29 fig. 11—13 und 15 Pliocän von Costa Rica; — *Marg. domingoensis* Dall p. 310, Oligocän, S. Domingo; — *Ph. gabbii* Dall p. 310 t. 29 fig. 4, Oligocän, S. Domingo Jamaica; — *Ph. fasciolatus* Dall p. 311 t. 28 fig. 12, Oligocän, S. Domingo; — *Ph. chipolanus* Dall p. 311, Oligocän Florida; — *Strombinella* (n. gen.) *acuformis* Dall p. 312 t. 29 fig. 6, Oligocän S. Domingo; — *Strombina mira* Dall p. 312 t. 29 fig. 7, Oligocän Isthmus von Darien; — *Aclis acuminata* Guppy p. 313 t. 27 fig. 9, Oligocän, Jamaica; — *Acl. (Amblyspira) teres* Guppy p. 314 t. 25 fig. 6, Trinidad; — *Acl. (Ambl.) prominens* Guppy p. 314 t. 27 fig. 11, Oligocän Jamaica; — *Eulima egregia* Guppy p. 314 t. 28 fig. 11, Trinidad; — *Liostraea nobilis* Guppy p. 315 t. 30 fig. 9, Oligocän, Jamaica; — *Pyramidella jamaicensis* Dall p. 315 t. 29 fig. 10, Oligocän, Jamaica; — *Pyr. forulata* Guppy p. 315 t. 28 fig. 13, Oligocän, Jamaica; — *Turbanilla plastica* Guppy p. 316 t. 28 fig. 4, Trinidad; — *Turb. angulata* Guppy p. 316 t. 28 fig. 10, *ibid.*; — *Turb. simplicior* Guppy, *tenuilirata* Guppy p. 317 t. 28 fig. 1—8, *ibid.*; — *Turb. octona* Guppy, p. 317 t. 27 fig. 8, Trinidad; — *Oscilla indiscreta* Guppy p. 317 t. 28 fig. 14, Oligocän, Jamaica; — *Ultimus precursor* Dall p. 318 t. 29 fig. 2—3, Pliocän, Costa Rica; — *Carinaria caperata* Guppy p. 318 t. 27 fig. 11, Trinidad; — *Bittium praeformatum* Guppy p. 318 t. 28 fig. 2, Oligocän, Jamaica; — *Fossarus mundulus* Guppy p. 320 t. 27 fig. 16, Oligocän, Jamaica; — *Alaba turrita* Guppy p. 321 t. 28 fig. 7, *ibid.*; — *Alvania pariana* Guppy p. 321 t. 29 fig. 9, Trinidad; — *Hipponyx tortilis* Guppy p. 322 t. 27 fig. 15, Oligocän, Jamaica; — *Dillwynella errata* Guppy p. 323 t. 27 fig. 2, Trinidad; — *Solariorbis clypeatus* Guppy 324 t. 27 fig. 17, *ibid.*; — *Liotia siderea* Guppy p. 324 t. 27 fig. 18, *ibid.*; — *L. veresimilis* Guppy p. 324 t. 27 fig. 13, *ibid.*; — *Cadulus parianus* Guppy p. 325 t. 30 fig. 7, Trinidad; — *Limopsis subangularis* Guppy p. 325 t. 30 fig. 2, *ibid.*; — *Anomia umbonata* Guppy p. 325 t. 30 fig. 6, *ibid.*; — *Crassatellides guppyi* Dall p. 326 t. 30 fig. 5, Oligocän, Jamaica;

— *Lucina pauperata* Guppy, *textilis* Guppy Oligocän, Jamaica, p. 326 t. 30 fig. 1; — *Divaricella prevaricata* Guppy p. 327 t. 30 fig. 4, Oligocän, Jamaica; — *Clementia taeniosa* Guppy p. 327 t. 30 fig. 8, Trinidad; — *Sanguinolaria unioides* Guppy p. 327 t. 30 fig. 11; Trinidad; — *Dimya grandis* Dall p. 328, Oligocän, S. Domingo.

Gude, G. K., Armature of Helicoid Landshells. With a new section of Plectopylis. In Science Gossip III No. 35.

Für die dünnchaligen Arten von Südindien und Ceylon wird eine neue Untergattung *Austenia* errichtet. Typus *Pl. clathratula* Pfr. — Diese und *Pl. retifera* werden im Holzschnitt abgebildet.

Nordenskiöld, Erland, Nagra iakttagelser rörande varor vanligare sötvattens — molluskers lif under vintern. — In Ofvers. Königl. Vetensk Forhandl. 1897 No. 2.

Beobachtungen über das Winterleben von 22 Süßwasserarten und deren Widerstandsfähigkeit gegen Einfrieren.

Wohnortsveränderung.

Herr Postpraktikant Bickhardt wohnt vom 1. April ab in Düsseldorf (Postamt 1).

Eingegangene Zahlungen:

Heise, N., Mk. 6.—; Müller, St., Mk. 6.—; v. Koch, Br., Mk. 6.—; Wehner, W., Mk. 6.—; Scholvien, H., Mk. 6.—; v. Möllendorff, G., Mk. 6.—; Schacko, B., Mk. 6.—; v. Heimburg, O., Mk. 6.—; Fruhstorfer, R., Mk. 6.—; Museum, Kön., Berlin, Mk. 6.—; Friedel, B., Mk. 6.—; Rolle, B., Mk. 6.—; Metzger, M., Mk. 6.—; Arndt, N., Mk. 6.—; Borchering, V., Mk. 6.—; Bickhardt, W., Mk. 6.—; Andreae, H., Mk. 6.—; Schlüter, H., Mk. 6.—; Museum, Naturhist., Lübeck, Mk. 6.—; Andreae, H., Mk. 6.—; Institut, Zoolog., Kiel, Mk. 6.—; Petersen, H., Mk. 6.—; Krause, L., Mk. 6.—; Hesse, V., Mk. 6.—; Wagner, W., Mk. 18.—; Gysser, S., Mk. 6.—; Retowski, Th., Mk. 6.—; Otting, Gr., Mk. 6.—; Neumann, E., Mk. 6.—; Scharff, M., Mk. 18.—; Museum, Grossherzogl., Oldenburg, Mk. 18.—; Nägele, W., Mk. 6.—; Schepmann, R., Mk. 6.—; v. Ihering, S. P., Mk. 18.—; Jetschin, P., Mk. 12.—; Schmalz, B., Mk. 6.—.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben 7. Mai.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Neunundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Aeltere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **K. Friedländer & Sohn** in Berlin zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Neue Landschnecken von Java.

Von

Dr. O. von Möllendorff.

Die nachstehend beschriebenen Arten stammen aus der Ausbeute des Herrn H. Frühstorfer, welcher die Insel in den Jahren 1891—93 bereiste und namentlich auch die Hochgebirge besuchte. Eine ausführliche Bearbeitung seiner reichen Sammlungen muss ich mir für später vorbehalten; hier möchte ich nur auf die wichtigsten Resultate kurz hinweisen. Der Nachweis der Gattungen *Ditropis*, *Palaena*, *Diplominalina*, *Boysidia*, *Hypselostoma*, *Tornatellina* füllt sehr sichtbare Lücken in unsrer Kenntniss der geographischen Verbreitung aus. Sehr überraschend ist die Auflistung eines *Carychium* in 7000' Meereshöhe, von welcher

Gattung allerdings schon 2 Arten aus Indien bekannt waren. Ebenfalls von den höchsten Gipfeln stammen die beiden Arten, welche ich nicht anders unterzubringen weiß als bei Acanthinula, und eine Patula, welche sich nur bei Pyramidula einreihen lässt, alle drei paläarectische Typen, deren Auftreten auf Java zunächst ein schwer zu lösendes Rätsel aufgibt.

1. *Helicarion perfragilis* Mlldff.

T. vix rimata, depressa, tenuissima, pellucida, subtiliter striatula, corneo-flavesceus, subitus pallidior. Spira brevissime prominula apice plano. Anfr. 4 convexiusculi, rapide accrescentes, sutura appressa, anguste marginata disjuncti, ultimus bene convexus, tumidulus. Apertura sat obliqua, subcircularis, modice excisa, peristoma rectum, acutum, margine columellari brevissime reflexo.

Diam. maj. 9, min. 6,5, alt. 5,5 mm.

2. *Helicarion fruhstorferi* Mlldff.

T. depressa, tenuis, pellucida, sublaevigata, pallide virescenti-flavida; spira brevissime conoidea. Anfr. 4 convexiusculi, rapide accrescentes, sutura marginata subcrenata disjuncti, ultimus bene convexus, basi subapplanatus. Apertura diagonalis, cordiformis, peristoma rectum, obtusum, margo superus medio sat protractus.

Diam. maj. 11,5, min. 9, alt. 7,5 mm.

3. *Sitala javana* Mlldff.

T. rimata, sat elate trochiformis, tenuis, pellucida, subtiliter striatula, lineis spiralibus sat confertis cincta. Spira subregulariter conica. Anfr. 5½ modice convexit, ultimus sat acute carinatus, basi planior, sublaevigatus, nitens. Apertura sat obliqua, late securiformis, peristoma

rectum, acutum, margine columellari superne brevissime reflexo.

Diam. 2,33, alt. 2,25 mm.

4. *Kaliella acutiuscula* Middff.

T. rimata, pyramidata, tenuis, pellucida, subtiliter et confertim striatula, albida. Spira valde elevata lateribus paullum convexiusculis. Anfr. 7 planulati, sutura per carinam exsertam filomarginata disjuncti, ultimus acute carinatus, basi convexior. Apertura sat obliqua, late elliptica, modice excisa, peristoma rectum, acutum, ad rimam breviter reflexum.

Diam. 3, alt. 3,33 mm.

5. *Kaliella sitaliformis* Middff.

T. anguste et semiobtele perforata, sat clate trochiformis, tenuis, pellucida, subtiliter striatula, pallide lutescens. Spira valde elevata lateribus strictis apice obtusulo. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura filiformi disjuncti, ultimus carina acuta bene exserta cinctus. Apertura valde obliqua, late securiformis, peristoma rectum, acutum, margine columellari subcalloso superne valde reflexo.


Diam. 2,5, alt. 2,33 mm.

6. *Kaliella platyconus* Btg.

T. perforata, depresso trochiformis, tenuis, pellucida, tenuiter et confertim, sed distincte striatula, corneo-lutea. Spira modice elevata lateribus vix convexiusculis. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus carina peracuta utrinque exserta cinctus. Apertura parum obliqua, late securiformis, peristoma rectum, acutum, margine columellari superne breviter reflexo.

Diam. 3,66, alt. 2,5 mm.

Kaliella platyconus Btg. MSS. ... Middff. Nachr. Bl. D. M. G. 1896 p. 135 (nomen).



ultimus subangulatus, basi nitidulus. Apertura modice obliqua, late elliptica, sat excisa, peristoma normali.

Diam. 2,75, alt. 2,25 mm.

11. *Kaliella viridula* Mlldff.

T. pro genere sat aperte umbilicata, clate turbinata, solidula, leviter striatula, viridula. Spira valde elevata, lateribus convexiusculis, apice obtuso. Anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus subangulatus, basi planiusculus. Apert. parum obliqua, subcircularis, modice excisa, peristoma rectum, acutum, margo columellaris superne breviter reflexus.

Diam. 3,25, alt. 3,75 mm.

12. *Koliella macrostoma* Mlldff.

T. rimata, globoso-conica, tenuissima, pellucida, subtiliter plicato-striatula, olivacea. Spira subregulariter conica. Anfr. 5 convexiusculi, sat celeriter accrescentes, ultimus tumidulus, ad peripheriam subangulatus. Apertura sat obliqua, ampla, subcircularis, sat excisa, peristoma rectum, acutum, margine columellaris superne breviter reflexo.

Diam. 5, alt. 5 mm.


13. *Kaliella pisum* Mlldff.

T. anguste perforata, depresso-globosa, tenuis, pellucida, distanter subtiliter plicato-striata, pallide virescens. Spira breviter convexo-conoidea. Anfr. 5 convexiusculi, ultimus bene convexus, haud angulatus. Apert. fere verticalis, subcircularis, valde excisa, peristoma rectum, acutum, margine columellaris superne breviter reflexo.

Diam. 4, alt. 3 mm.

14. *Lamprocystis gedeana* Mlldff.

T. anguste et fere obtecte perforata, discoidea, tenuissima, subtiliter striatula, pallide olivacea. Spira breviter



Apertura fere verticalis, subcircularis, valde excisa, peristoma rectum, acutum, margo columellaris superne leviter sinuatus, breviter reflexus.

Diam. 3,5, alt. 2,5.

18. *Lamprocystis exigua* Mlldff.

T. rimata, depressa, tenuis, pellucida, subtiliter sed distincte striatula, pallide lutescens; spira breviter conoidea. Anfr. $4\frac{1}{2}$ modice convexi, ultimus supra peripheriam subangulatus, basi laevigatus. Apertura vix obliqua, late elliptica, valde excisa, peristoma normale.

Diam. 2,5, alt. 1,5 mm.

19. *Lamprocystis nana* Mlldff.

T. rimata, discoidea, tenuis, pellucida, superne regulariter et confertim striatula, pallide corneo-lutescens; spira brevissime prominula. Anfr. $4\frac{1}{2}$ subplani, ultimus convexior, subangulatus, subtus laevigatus. Apertura parum obliqua, subcircularis, valde excisa, peristoma normalis,

Diam. 2,25, alt. 1,2 mm.


20. *Lamprocystis radiatula* Mlldff.

T. perforata, convexo-depressa, subtilissime radiostriatula, tenuis, pellucida, pallide flavescens. Spira breviter conoidea lateribus convexiusculis. Anfr. 5 convexiusculi, ultimus bene convexus. Apertura perlata elliptica, fere circularis, valde excisa, peristoma normale.

Diam. 7, alt. 4 mm.

21. *Lamprocystis vitreiformis* Mlldff.

T. anguste perforata, discoidea, tenuis, pellucida, striis radialibus, subtilibus, pliciformibus, sat distantibus sculpta, hyalino-alba. Spira valde depressa, vix prominula. Anfr. $4\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura distincte marginata disjuncti,



sed bene exserta cinctus, basi laevigatus, nitens. Aertura modice obliqua, elliptica, parum excisa, peristoma rectum, obtusum, incrassatum, ad perforationem breviter reflexum.

Diam. 19, alt. 10,25, apert. lat. 10,5, long. 7,5, alt. 7 mm.

25. *Ariophanta acelidota* Mlldff.

T. sat aperte perforata, depresso-conoidea, tenuiuscula, subpellucens, striis subrudibus transversis et lineis spiralibus confertis minute granulosa, corneo-lutescens, sericina. Spira sat elevata, convexo-conoidea. Anfr. $5\frac{1}{2}$ planulati, ultimus sat acute carinatus, infra carinam taenia angusta castanea ornatus, basi laevigatus, nitens, unicolor lutescens. Aertura modice obliqua, late elliptica, sat excisa, peristoma rectum, obtusum, margine columellari superne breviter reflexo.

Diam. 19, alt. 12, apert. lat. 10, long. 8,5, alt. 7,5 mm.

var. robusta. Major, solida, peristoma incrassatum, longe porrectum.

Diam. 23, alt. 15 mm.

26. *Inozonites imitator* Mlldff.

T. sat aperte umbilicata, umbilico pervio subcylindrico $\frac{1}{6}$ diametri adaequante, discoidea, tenuis, pellucida, superne subtiliter striatula, nitidula, pallide flavescentia. Spira brevissime conoidea. Anfr. 5 planulati, ultimus supra medium obtuse angulatus, basi sublaevigatus, magis nitens. Aertura valde obliqua, elliptica, sat excisa, peristoma rectum, acutum, margo columellaris superne brevissime reflexus.

Diam. 6,5, alt. 3 mm,

27. *Patula (Pyramidula) javana* Mlldff.

T. pro genere modice umbilicata, depresso conoidea, costulis tenuibus sat distantibus obliquis sculpta, olivaceo-lutea. Spira convexo-conoidea. Anfr. 4 convexi. Aper-

forma subfasciata. Anfractus ad suturam pallescentes.
forma castanea. T. obscurior, brunnescens aut
castanea.

31. *Plectotropis epiplatis* Mlldff.

T. latissime umbilicata, umbilico $\frac{1}{2}$ diametri adaequante, discina, tenuiuscula, dense et subirregulariter plicato-striatula, lineis spiralibus microscopicis decussata, corneo-lutea. Spira brevissime conoidea aut vix prominula. Anfr. $6\frac{1}{2}$ lentissime accrescentes, plani, ultimus acute carinatus, circa umbilicum subacute angulatus. Apertura diagonalis, securiformis, peristoma superne rectum, extus et basi breviter expansum, ad umbilicum subdilatatum.

Diam. 17, alt. 6 mm.

, 18, , 5,5 "


32. *Plectotropis trichotrochium* Mlldff.

T. late umbilicata, umbilico infundibuliformi fere $\frac{1}{3}$ diametri adaequante, discina, tenuis, subpellucens, striatula, lineis spiralibus confertis decussata, costulis membranaceis deciduis, squamulatim interruptis induta, luteo-cornea. Spira planulata, vix prominula. Anfr. 5 fere plani, ultimus carina obtusula, subexserta, fimbrias deciduas gerente cinctus. Apertura fere diagonalis, late securiformis, peristoma superne rectum, extus et basi breviter expansum, ad umbilicum subdilatatum.

Diam. 11,66, alt. 5 mm.

33. *Plectotropis ciliocincta* Mlldff.

T. sat late umbilicata, umbilico $\frac{1}{3}$ diametri subaequante, depressa, tenuiuscula, subpellucens, striis transversis subtilibus, lineis spiralibus valde confertis et costulis membranaceis interruptis sculpta, albida, taenia rufula angusta ad peripheriam ornata. Spira breviter conoidea. Anfr. 6 con-



Anfr. 5 convexi, ad suturam bene impressam subapplanati, ultimus circa umbilicum subangulatus. Apert. modice obliqua, cordiformis, peristoma latiuscule expansum, ad umbilicum sat sinuatum.

Diam. 19, alt. 11, apert. lat. 10, long. 9,5, alt. 8,5 mm.

37. *Buliminus (Ena) tenuiliratus* Mlldff.

T. semiobtecte perforata, oblongo-conica, solidula, tenuiter striatula, lineis spiralibus tenuibus et confertis, sub lente perdistinctis cineta, corneo-brunnea. Spira valde elongata, lateribus paullum convexiusculis. Anfr. 8 convexiusculi, ultimus magnus, $\frac{2}{3}$ altitudinis superans. Apert. modice obliqua, elongate ovalis, parum excisa, peristoma sat late expansum, tenue, ad perforationem sat dilatum.

Diam. 10, alt. 22,5, apert. lat. 7, long. 10, alt. 9,5 mm.


38. *Buliminus (Ena) tenggericus* Mlldff.

T. profunde rimata, conico-oblonga, tenuiuscula, subpellucida, plicato-striatula, minute et oblique rugulosa, sericina, luteo-cornea. Spira elongata lateribus convexiusculis. Anfr. 8 planiusculi, ultimus $\frac{1}{3}$ altitudinis vix adaequans. Apertura modice obliqua, ovalis, parum excisa, peristoma tenue, latiuscule expansum, marginibus conniventibus.

Diam. 8, alt. 21, apert. lat. 5,5, long. 7,5, alt. 7 mm.

39. *Buliminus (Ena) prillwitzi* Mlldff.

T. profunde rimata, ventricosulo-oblonga, solidula, subruditer et irregulariter striatula, lineis spiralibus microscopicis decussata, luteo-cornea, strigis brunneis variegata. Spira valde elongata lateribus convexiusculis. Anfr. 8 vix convexiusculi, sutura albofilosa disjuncti, ultimus $\frac{1}{3}$ altitudinis vix attingens. Apert. modice obliqua, ovalis, modice



sutura profunda disjuncti, ultimus medio obtuse angulatus, tum applanatus, circa umbilicum denno angulatus, antice sat ascendens, breviter solitus, pone aperturam coaretatus, tum campanulatus. Apertura retrorsum inclinata, rotundato-pentagona, peristoma continuum, breviter patens. Lamellae parietales 2, angularis marginem fere attingens, altera recedens, valida elevata, columellaris profunda, palatales 6, quarum 2 majores, longe productae, columellaris et parietali in formam crucis oppositae.

Diam. 2,5, alt. 2,25 mm.

43. *Clausilia (Aerophaedusa) schepmani* Mlldff.

T. rimata, fusiformis, tenuis, pellucens, subtiliter dense striata, luteo-cornea aut brunneosens. Anfr. 11 convexisculi, sutura sat impressa disjuncti. Apert. verticalis, piriformis, peristoma parum expansum, vix labiatum. Lamella supera humili, sat obliqua, cum spirali continua, infera recedens, ab illa remota, parum conspicua, subcolumellaris immersa. Plica principalis sat longa, lineam lateralem superans, palatales 3 breves, media brevior. Clausilium sat angustum.

Diam. 3,5, alt. 16,5 mm.

44. *Clausilia (Aerophaedusa) nubigena* Mlldff.

T. profunde rimata, ventrosulo fusiformis, solida, dense costulato-striata, brunnea. Spira ventrosula, sursum panum concava. Anfr. 9½ fere plani, ultimus basi rotundatus. Apertura fere verticalis, rotundato-piriformis, peristoma modice expansum, incrassatulum. Sinulus sat protractus, latiusculus. Lamella supera marginalis valde obliqua, cum spirali continua, infera humili, sat recedens, subcolumellaris immersa. Plica principalis modica, palatales 3 breves. Clausilium sat angustum, basi compressum.

Diam. 4,33, alt. 17,5 mm.

45. *Clausilia (Acrophaedusa) fruhstorferi* Mlldff.

T. rimata, gracillime claviformis, solidula, deuse striata, corneo-brunnea. Spira valde elongata, subitus ventrosula, tum paullum concava, sursum cylindrica. Anfr. $17\frac{1}{2}$ fere plani, ultimus basi rotundatus. Apert. fere verticalis, piformis, peristoma breviter expansum, sublabiatum. Lamella supera marginalis, sat valida, obliqua, infera valde recedens, antice vix conspicua, subcollumellaris iminera. Plica principalis modica, palatales 3 breves.

Diam. 3,5, alt. 22 mm.

46. *Prosopeas holosericum* Mlldff.

T. non rimata, turritō-conica, tenuis, subpellucida, confertim plicato-striatula, lineis spiralibus microscopis decussata, brevissime pilosa, sericina, pallide straminea. Spira turrita apice obtusulo. Anfr. 9, primi 3 convexi, costulati, reliqui convexiusculi, sutura profundiuseule impressa disjuncti. Apertura modice obliqua, guttiformis, peristoma rectum acutum, margine columellari calloso, superne appreso.

Diam. 5, alt. 19, apert. lat. 2,5, long. 6, alt. 5,5 mm.

47. *Prosopeas hastatum* Mlldff.

T. vix rimata, graciliter turrita, tenuis, pellucida, subtiliter arcuatim striata, brevissime pilosa, pallide straminea. Spira turrita lateribus strictis, apice obtusulo. Anfr. $11\frac{1}{2}$ vix convexiusculi, sutura parum impressa suberenuata disjuncti. Apertura modice obliqua, elongate ovalis, peristoma rectum acutum, margine columellari calloso-incrassato, superne appreso.

Diam. 7, alt. 33,5, apert. lat. 4, long. 9, alt. 8,5 mm.

(Fortsetzung folgt.)

Eingegangene Zahlungen:

Weinland, H., Mk. 12.—; v. Gallenstein, G., Mk. 6.—; Ehrmann, L., Mk. 6.—; Schedel, Y., Mk. 6.—.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben 15. Juni.

Catalog

der gegenwärtig lebend bekannten Pneumonopomen.

Von

Dr. W. Kobelt und Dr. O. von Möllendorff.

Pneumonopoma Latreille.

I. Tribus. **Pneumonopoma taenioglossa.**

A. Subtribus **Opisophthalmia** Pfr.

1. **Familie Aciculidae.**

Genus **Acme** Hartm.

a. Subgenus **Platyla** Moq. Tandon.

banatica Rossm.	.	.	.	Banat, Siebenbürgen, Bosnien.
cryptomena de Folin	.	.	.	Pyrenäen.
delpretei Paul	.	.	.	Oberitalien.
dupuyi Pal.	.	.	.	Frankreich.
foliniana Nev.	.	.	.	Mentone, subfossil.
var. emaciata Nev.	.	.	.	"
var. pachystoma Nev.	.	.	.	"
gracilis Clessin	.	.	.	Oestreichisches Litoral.
microspira Pini.	.	.	.	Oberitalien.
oedogyra Pal.	.	.	.	Polen, Siebenbürgen, Rumän.
perpusilla Reinh.	.	.	.	Banat.
politae Hartm.	.	.	.	Mitteleuropa.
similis Reinh.	.	.	.	Siebenbürgen.
stussineri Btg.	.	.	.	Krain.
subdiaphana Biv.	.	.	.	Palermo.
trigonostoma Pal.	.	.	.	Elsass.

b. Subgenus Auricella Moq. Tand.

beneckeii Andree	Oberitalien.
benoiti Bgt.	Sicilien.
lallemandi Bgt.	Algerien.
lineata Drp. (fusca Mtg.) . .	Mittteleuropa.
moussonii Bltg.	Caucaus.
reitteri Bttg.	Kaphalonia.
sublineata Andr.	Oberitalien.

c. Subgenus Pupula (Agass.) Kobelt.

gentilei Poll.	Oberitalien.
letourneuxi Bgt.	Algerien.
pironae Poll.	Oberitalien, Friaul.
spectabilis Rossm.	Südöstr., Norditalien, Bosnien.
veneta Pirona	Südtirol, Friaul.

d. Subgenus Renea Nevill.

bourguignati Nevill	Mentone, subfossil.
moutoni Dup.	Grasse, Südfrankreich.

2. Familie Geomelaniidae.

Genus **Geomelania** Pfr. 1845.

affinis C. B. Ad.	Jamaica.
conica C. B. Ad.	"
costulosa C. B. Ad.	"
elegans C. B. Ad.	"
exilis C. B. Ad.	"
expansa C. B. Ad.	"
fortis C. B. Ad.	"
gracilis C. B. Ad.	"
hilliana C. B. Ad.	"
inornata Chitty	"
jamaicensis Pfr.	"
magna C. B. Ad.	"
media C. B. Ad.	"

minor C. B. Ad.	Jamaica.
parva Chitty	"
pauperata C. B. Ad.	"
procera C. B. Ad.	"
pyramidata C. B. Ad.	"
striosa C. B. Ad.	"
typica C. B. Ad.	"
vicina C. B. Ad.	.	,	.	.	"

Genus **Chitty** (Lives.) Adams 1858.

sinuosa Chitty	Jamaica.
----------------	---	---	---	---	----------

Genus **Blandiella** Guppy 1871.


beardsleana C. B. Ad.	.	.	Jamaica.	
elongata Poey	.	.	.	Cuba.
filicosta Gdl.	.	.	.	"
greyana C. B. Ad.	.	.	.	Jaimaica.
haitensis Weinl.	.	.	.	Harti.
lirata Poey	.	.	.	Cuba.
pygmaea C. B. Ad.	.	.	.	Jamaica.
reclusa Guppy	.	.	.	Trinidad.
wrighti Pfr.	.	.	.	Cuba.

3. Familie Truncatellidae.

Genus **Truncatella** Risso 1826.

adamisi Pfr. (scalariformis Ad.	
---------------------------------	--


nec Rve.)	Jamaica.
aurantia Gray	Borneo.
avenacea Garr.	Viti.
bairdiana C. B. Ad.	Panama.
barbadensis Pfr.	Westindien.
bilabiata Pfr.	„ Mexiko.
californica Pfr.	Californien.
capillacea Gld.	Cuba.




scalaroides Mrts.	Ambon, Molukken.
semicostata Montrz.	Neu Caledonien.
semicostulata Jick.	Dahlak Inseln i. rothen Meer.
stimpsoni Stearns	Californien.
subcylindrica Gray	Westindien.
subsulcata Gass.	Lifu, Loyalitätsinseln.
tatarica Schr.	Amurland.
teres Pfr.	Mauritius bis Australien.
truncata Mtg. (truncatula Drp., subcylindrica L. auct., costu- lata Risso, laevigata Risso, montagui Thorpe, hammer- schmidti Ch. etc)	Europa.
valida Pfr.	Indischer Ozean bis Samoa.
vitiana Gld. (conspicua Bronn)	Polynesien.
wrighti Pfr.	Yateras, Cuba.
yorkensis Cox	Cap York, Australien.

Genus **Taheitia** A. Ad.


albida Mlldff.	Leyte, Masbate.
anctostoma Quadr. et Mlldff.	Mindanao, Paragua.
arcasiana Crosse (alternans Mouss.)	Viti Inseln.
brazieri Cox	Sidney.
clathrata Ad. et Ang.	Salomonen.
cristata Crosse	Vavao, Tongatabu, Ellice Isl.
expansilabris Q. et Mlldff.	Mariannen.
ferruginea Cox.	Cap York.
labiosa Souv.	Neu Caledonien.
lamellicosta Quadr. et Mlldff.	Mariannen.
pallida Pfr.	Tahiti, Huahine.
orrecta Gld.	Tahiti.
quadrasi Mlldff.	Mariannen.
scalariformis Rve (arctecostata Mouss.)	Paumotus, Annaa, Tahiti.




callichloros Tapp.	.	.	.	Ramoi, West Neuguinea.
cinctellum Pfr.	.	.	.	Ternate.
conicum Sow.	(pellucidum Pfr.)	.	.	Philippinen.
crenilabre Strub.	.	.	.	Halmahera.
decipiens Pfr.	.	.	.	Batchian, Mysole.
dohrni Ad. et Ang.	.	.	.	Neu Irland.
dubium Kob.	.	.	.	Tabuntug, Philippinen.
eucomis Mlldff.	.	.	.	Calamianes. "
gianellii Tapp.	.	.	.	Süd-Neuguinea.
globulosum Pfr.	.	.	.	Batchian.
halmahericum Strub.	.	.	.	Halmahera.
hanleyanum Pfr.	.	.	.	Admiralitäts Inseln.
hargravesi Cox	.	.	.	Salomonen.
igneocens Pfr.	.	.	.	Neu Irland.
intermedium Marts.	.	.	.	Ceram.
jacquinoti Pfr.	.	.	.	Salomonen.
latelimbatum Pfr. (portei Pfr.)	.	.	.	Polillo, Philippinen.
latilabre Mrts.	.	.	.	Ceram.
lowi Pfr.	.	.	.	Borneo, Labuan; Malacca?
luteostomum Sow.	.	.	.	Philippinen, Guimaras.
melanostomum Pfr.	.	.	.	Nenguinea, Aru Inseln.
nigrilabrum Tapp.	.	.	.	West-Nenguinea.
nigricans Pfr.	.	.	.	Menado, Celebes.
papuanum Dohrn	.	.	.	Neuguinea, Batchian, Ceram.
poecilum Quadr. et Mlldff.	.	.	.	Masbate, Philippinen.
pulchellum Quadr. et Mlldff.	.	.	.	Calamianes, ",
pulicarium Pfr.	.	.	.	Batchian.
puniceum Tapp.	.	.	.	Geelvink Bai, Neuguinea.
quadrasii Mlldff.	.	.	.	Leyte, Philippinen.
semiclausum Pfr.	.	.	.	Ceylon.
signatum Pfr.	.	.	.	Borneo, Labuan.
vitreum Sow. (luteum Quoy, nitidum Sow., pellucidum				



innaculatum Chemn. (laeve Rve., maculatum Lea, mae- losum Soul.)	Philippinen, (Nicobaren?).
var. minor Nev.	"
var. subperlucida Nev.	"
leucorhaphe Mrts.	Halmahera, Batchian.
mathildae Dohrn	Mindanao.
maubanense Kob. (maubanense ex err.)	Luzon, Marinduque, Polillo.
menadense Pfr. (laeve Ad. et Rve.)	Menado, Celebes.
mouhoti Pfr.	Kambodscha; Christmas Insel?
moussoni Mrts.	Celebes, Timor, Adenare.
natunense Smith.	Natuna Inseln.
perplexum Sow.	Nord-Luzon.
pfeifferi Dohrn.	Camiguin de Luzon Philippin.
pileolus Quadr. et Mlldff. . .	Cagayan, Luzon.
pileus Sow.	N. W. Luzon.
polillanum Mlldff.	Polillo, Philippinen.
polyzonatum Mlldff.	Hainan.
pyramis Kob.	Malamanni, Mindanao, Philip- pinen.
regulare Pfr.	Philippinen.
roepstorfianum Nev.	Andamanen, Nicobaren.
roseum Mlldff.	Morong auf Luzon.
sericatum Pfr.	Borneo.
skertchleyi Smith.	Nord-Borneo.
subalatum Quadr. et Mlldff. .	Nord-Luzon.
superbum Dohrn	Paragua.
tayninense Heude	Tayninh, Cochinchina.
trochus Dohrn	Mindanao.
undatum Mete.	Borneo.
varians Mlldff.	Mittel-Luzon.
venustum Tapp.	Port Dorey, Neu Guinea.



eucounum	Mildff.	.	.	.	Süd-Celebes.
curyomphalum	Mildff.	.	.	.	Samar, Philippinen
exiguum	Smith	.	.	.	Natuna Inseln.
fischeri	Morlet	.	.	.	Tongking.
fornicatum	Pfr.	.	.	.	Neue Hebriden.
galatheae	Mörch.	.	.	.	Nicobaren.
grande	Mildff.	.	.	.	Leyte, Philippen.
grandipilum	Btg. (=longipilum Btg. nec Mildff.)	.	.	.	Gumung Sala auf Java.
guimarasense	Sow.	.	.	.	Guimaras, Panay Philippinen.
var. transitans	Mildff.	.	.	.	Cebu, Negros.
var. solida	Mildff.	.	.	.	Sibuyan.
var. solidula	Mildff.	.	.	.	Tablas.
humile	Mildff.	.	.	.	Java.
inornatum	Smith	.	.	.	Nordborneo.
jucundum	Smith	.	.	.	Nordostborneo.
keppeli	G. Austen	.	.	.	Niah, Nordborneo.
kinabaluense	Smith	.	.	.	Kinabalu, Nordborneo.
klobulowskii	Morlet	.	.	.	Kambodscha.
landesi	Morlet	.	.	.	"
leporinum	Blfd.	.	.	.	Pegu.
limbiferum	Blfd.	.	.	.	Pulney Berge, Südindien.
liratulum	Mildff.	.	.	.	Samui, Golf von Siam.
laomontanum	Pfr.	.	.	.	Laos, Hinterindien.
malleatum	Blfd.	.	.	.	Shevroy Berge, Südindien.
metcalfi	Issel	.	.	.	Saravak, Borneo.
macromphalum	Mildff.	.	.	.	Java.
var. alticola	Mildff.	.	.	.	"
mundyanum	G. Aust. (allus E. A. Smith)	.	.	.	Nordborneo.
natunense	Smith	.	.	.	Natuna Inseln.
omphalotropis	Mildff.	.	.	.	Mittel-Luzon.
pachytropis	Mildff.	.	.	.	Süd-Celebes.
parvum	Sow.	.	.	.	Cebu, Philippinen.




- v. micromphala Mlldff. . . . Java.
tumidulum Quadr. et Mlldff. Negros, Masbate, Philippinen.
turbanatum Pfr. (helicoides Sow). Bohol, Philippinen.
umbilicare Kob. Philippinen.
warnefriedianum Nev. . . . Andamanen, Nicobaren.

b. Subgenus *Japonia* Gld.

- barbatum Gld. Japan.
clathratulum Heude Tschen-keu, China.
concolor Mlldff. Leyte, Philippinen.
crossei Morlet Tongking.
glabratum Mlldff. . . . Hunan, China.
gradatum Mlldff. . . . Busuanga, Philippinen.
hagenmüllerii Mab. . . . Tongking.
hungerfordianum Mlldff. . . Canton, China.
longipilum Mlldff. . . . Hainan.
mariei Morl. Tongking.
mendieans Mab. Tongking.
michaui Crosse et Fischer . Pulo Condor.
mueronatum Mlldff. . . . Mittel-Luzon.
pellicosta Mlldff. . . . Hongkong, Macao, Fudshou
in China.
pilosum Mlldff. Hainan.
sexfilare Heude Hunan, China.
subcarinatum Mlldff. . . . Cebu, Philippinen.
subconicum Pfr. Cochinchina.
tenuipile Gredl. Hunan, China.
trichophorum Mlldff. . . . Guangdung, China.

c. Subgenus *Cytoria* Kob. et Mlldff.


- calvum Hutton Neuseeland.
chiltoni Suter "
cytoria Gray "
fasciatum Suter "
hedleyi Suter "



fruhstorferi Mlldff.	.	.	.	Java.
gradata Quadr. et Mlldff.	.	.	.	Bohol, Philippinen.
mira Mlldff.	.	.	.	Siquijor, Philippinen.
papillaris Marts.	.	.	.	Butumbi, Nilquellen.
planorbis Blsd.	.	.	.	Travankur, Südindien.
pusilla Quadr. et Mlldff.	.	.	.	Masbate, Philippinen.
pyramidata Mlldff.	.	.	.	Cebu, Philippinen.
quadrasii Mlldff.	.	.	.	Mindanao „
salemensis Bedd.	.	.	.	Salem, Prov. Bombay.
tricarinata Smith	.	.	.	Natuna Inseln.
whitei Braz.	.	.	.	Fitzroy Insel, Australien.

7. Genus **Ptychopoma** Möllendorff, 1885.

applanatum Mlldff.	.	.	.	Guidshou.
aubryatum Heude	.	.	.	China.
chinense Mlldff. (recognitum Heude, bifrons Heude)	.	.	.	Kiu-kiang, China.
cyclotatum Gredl.	.	.	.	Hunan, „
delavayanum Heude	.	.	.	Talifu, „
expoliatum Heude	.	.	.	Setschuan, China.
fischerianum Morl.	.	.	.	Kambodscha.
hensanense Gredl.	.	.	.	Hunan, China.
humile Heude	.	.	.	Setschuan, China.
humillimum Gredl.	.	.	.	Hubei „
juvenile Gredl.	.	.	.	„ „
lienense Gredl.	.	.	.	Guang-Dung, China.
liuanum Gredl.	.	.	.	Hunan, „
mediastinum Heude	.	.	.	User des Kin-tscha-Kiang, China.
papilio Pf. (parilis Rve.)	.	.	.	?
setchuanense Heude	.	.	.	Setschuan, China.
subalatum Heude	.	.	.	“ “
tortile Heude	.	.	.	“ “
tubulare Heude	.	.	.	“ “



Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Neunundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.- für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn Dr. W. Kobelt in Schwambheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), Zahlungen und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von R. Friedländer & Sohn in Berlin zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende Mittheilungen, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn D. F. Heynemann in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

New Landschnecken von Java.

Von

Dr. O. von Möllendorff.

(Fortsetzung u. Schluss.)

48. *Opeas curricosta* Mddff.

T. rimata, graciliter turrita, tenuis, pellucida, costulis arcuatis sculpta, sericina, pallide straminea. Spira turrita lateribus convexiusculis. Aufr. 7 sat convexi, sutura profunde impressa marginata, suberulata disjuncti. Apert. fere verticalis, rotundato-rhomboidea, peristoma rectum, acutum, margine columellari superne dilatato, appresso.

Diam. 2,5, alt. 7 mm.

evanescens picta. Spira valde elevata, gradata. Anfr. 5½ convexi, sutura profunde impressa disjuncti, striatuli, liris elevatis numerosis, quarum 5 fortiores, sculpti, ultimus antice sat descendens. Apertura valde obliqua, subcircularis, peristoma subduplex, parum expansum, superne leviter excisum, protractum.

Diam. 7, alt. 7,25 mm.

var. *palabuana* Mlldff. minor, diam. 4,5, alt. 4,6, strigis usque ad basin distinctis, liris minus, carinulis 2 magis distinctis.

53. *Lagochilus humile* Mlldff.


T. late umbilicata, valde depresso turbinata, solidula, fulva, strigis castaneis fulguratis, picta. Spira parum elevata lateribus concavis. Anfr. 5 modice convexi, striatuli, spiraliter lirati, carinulis 4 elevatis cincti, ultimus compressus, ad peripheriam subacute carinatus, in carina ciliatus, basi usque in umbilicum confertim liratus. Apertura diagonalis, subcircularis, peristoma parum expansum, incrassatum, superne leviter excisum.

Diam. 7, alt. 4,5 mm.

54. *Lagochilus macromphalum* Mlldff.

T. pro genere late et aperte umbilicata, depresso turbinata, sat tenuis, pellucens, transverse leviter striatula, liris spiralibus numerosis, quarum 3 fortiores, et costulis membranaceis sculpta, setis brevibus in peripheria longioribus hirsuta, luteo-fulva, ad suturam regulariter castaneo maculata. Spira subregulariter conica lateribus paullulum concavis. Anfr. 6 convexi, sutura subcanaliculata disjuncti ultimus subcompressus, ad peripheriam lira fortiore cinctus, antice paullum descendens. Apertura diagonalis, subcircularis, peristoma parum expansum, subduplicatum, superne breviter sed distinete excisum.

Diam. 10, alt. 7,6 mm.



58. *Alycaeus (Orthalycaeus) crenilabris* Middff.

T. medioeriter umbilicata, globoso-conica, solidula, costulis tenuibus acutis sat distantibus sculpta, fulva; spira sat elevata, gradata. Aufr. 5 tumidi, ultimus inflatus, basi gibbus, tum sat late constrictus, ad aperturam campanulatus. Tubulus suturalis brevis. Apertura valde obliqua, subcircularis, peristoma duplex, externum sat expansum, superne et inferne dilatatum, internum breviter porrectum, superne leviter excisum, margine dextro crenulato.

Diam. 3,25, alt. 3 mm.


59. *Alycaeus (Orthalycaeus) reticulatus* Middff.

T. anguste umbilicata, turbinata, tenuis, pellucens, costulis tenuibus, sat distantibus et lineis spiralibus distinctis sculpta, albida. Spira pyramidata, gradata apice glabro obtuso. Aufr. $4\frac{1}{2}$ perconvexi, ultimus a medio inflatus, in parte inflata arctius costulatus, tum latiuscule constrictus, laevigatus, ad aperturam campanulatus. Apertura modice obliqua, subcircularis, peristoma duplex, externum latiuscule expansum, incrassatum, internum sat porrectum, breviter expansum, superne sat excisum.

Diam. 2,5, alt. 2,5 mm.

60. *Alycaeus (Chamalycaeus) fruhstorferi* Middff.

T. sat late umbilicata, conoideo-depressa, costulata, lineis spiralibus sat confertis decussata, pallide lutescens. Spira modice elevata apice intonato. Aufr. $4\frac{1}{2}$ perconvexi, ultimus a medio tumidus, magis confertim costulatus, basi valde gibbus, tum modice constrictus, antice denudo tumidulus, breviter deflexus. Apertura diagonalis, subcircularis, peristoma duplex, externum late patens, ad insertionem recedens, ad umbilicum subito attenuatum, internum sat porrectum, superne profundiuscule excisum, ad umbili-



fulvo-cornea. Anfr. 6 modice convexi, primi 3 sat distanter costulati, reliqui subtiliter et confertim costulato-striati, ultimus initio valde constrictus, paullum distortus, sat ascendens, medio leviter impressus, basi crista crassula cinctus. Apertura modice obliqua, sat ampla, rotundato-trapezoidalis, peristoma modice expansum, superne late appressum, margo basalis cum columellari angulum distinctum subcalcaratum formans. Lamella columellaris humili, crassiuscula.

Diam. 1,5 alt. 2,5 mm

65. *Diplommatina (Sinica) cyclostoma* Mlldff.

T. dextrorsa, rimata, ovato-acuminata, tenuis, pellucida, densissime costulato-striata, albida aut pallide fulva. Anfr. 6 valde convexi, ultimus paullum distortus, modice constrictus, paulisper ascendens. Apertura parum obliqua, subcircularis, peristoma sat expansum, incrassatulum. Lamella columellaris debilis, antice vix conspicua, palatalis longiuscula, crassula.

Diam. 1,6. alt. 3,2 mm.

forma minor: diam. 1,4, alt. 2,5 mm.

66. *Diplommatina (Sinica) auriculata* Mlldff.

T. dextrorsa, non rimata, conico-turrita, tenuiuscula, pellucens, regulariter sat confertim costulata, fulva. Anfr. 9 bene convexi, superi spiram fere regulariter conicam efficienes, ultimus initio modice constrictus, decrescens, paullum ascendens. Apertura modice obliqua, subauriformis, peristoma duplex, externum late expansum, superne ad insertionem breviter auriculatum, ad columellam angulatum, subcalcaratum, tum subito attenuatum, internum valde incrassatum, subexpansum, ad columellam appressum, profundiuscule sinuatum. Lamella columellaris sat valida, subhorizontalis, palatalis mediocris.

Diam. 2, alt. 4 mm.

var. abbreviata Mlldff. Arctius costulata, paullo minor,
ventricosior. Diam. 2, alt. 3.6 mm.

var. biangulata Mlldff. minor, diam. 1.75, alt. 3,
lamella palatalis paullo longior, peristoma ad insertionem
et basi angulatum.

var. gracilior Mlldff. minor, paullo distantius costulata.
Diam. 1.6, alt. 3.66 mm.

67. *Diplommatina (Sinica) tetragonostoma* Mlldff.

T. dextrorsa, rimata, oblongo-conica, tenuis, pellucida,
costulata, luteo-cornea. Anfr. 7 convexiusculi, ultimi
2 valde distorti, ultimus initio valde constrictus, sat aseen-
dens. Apertura sat obliqua, rotundato-tetragona, peristoma
duplex, internum breviter expansum, incrassatum, superne
late appressum, externum latius expansum, superne et in-
ferne breviter alatum,

Diam. 1.5, alt. 2.5 mm.

68. *Diplommatina (Sinica) perpusilla* Mlldff.

T. dextrorsa, vix rimata, ovato-acuminata, tenuis,
pellucida, dense costulato-striata, albida. Anfr. 6 sat con-
vexi, superi spiram conoideam lateribus convexiusculis
efficients, ultimus paullum distortus, breviter ascendens.
Apertura sat obliqua, subcircularis, peristoma parum ex-
pansum, vix incrassatum. Lamella columellaris mediocreis,
palatalis perlonga.

Diam, vix 1, alt. 1.75 mm.

69. *Diplommatina (Sinica) planicollis* Mlldff.

T. sinistrorsa, vix rimata, conico-turrita, solidula,
subpellucida, fulva. Anfr. 8 modice convexit, superi spiram
subregulariter conicam apice obtusulo efficientes, dense
costulati, ultimi 2 sublaevigati, ultimus parum distortus,
breviter ascendens, a strictura medio applanatus, basi

crista crassula cinctus. Apertura sat obliqua, ovalis, peristoma modice expansum, incrassatum, margo columellaris attenuatus, rectus, cum basali angulum subdistinctum formans. Lamella columellaris humilis, palatalis brevis.

Diam. 2,25, alt. 4,6 mm.

70. *Diplommatina (Sinica) javana* Mlldff.

T. sinistrorsa, rimata, ovato-acuminata, solidula, fulvo-cornea. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, superi sat distanter costulati, costulis paullatim approximatis, ultimi 2 costulato-striati, ultimus initio valde constrictus, tum tunidulus, subgibber, sat ascendens. Apertura modice obliqua, sub-circularis, peristoma duplex, modice expansum, incrassatum. Lamella columellaris validiuscula, palatalis punctiformis.

Diam. 1,5—1,6 alt. 2,5—2,75 mm.

71. *Georissa javana* Mlldff.

T. sat elate turbinata, solidula, valde confertim spiraliter lirata, fulva. Spira sat elevata lateribus strictis. Anfr. 4 valde convexi. Apertura sat obliqua, truncato-ovalis, peristoma rectum, obtusum, columella valde dilatata, late appressa.

Diam. 1, alt. 1,5 mm.

var. *intermedia* Mlldff. Paullo major, diam. 1,25 alt. 1,75, sculptura minus distincta, color pallidior, flavescens.

72. *Georissa laeviuscula* Mlldff.

T. elate turbinata, solidula, transverse subtilissime striatula, sculptura spiralis evanescens, sub lente fortiore vix conspicua. Inteo-cornea. Spira valde elevata lateribus convexiusculis. Anfr. 4 perconvexi. Apertura et peristoma praecedentis.

Diam. 1,4, alt. 1,8 mm.

Literaturbericht.

- Proceedings of the Malacological Society of London*, Vol. II, No. 4.
p. 137. Sowerby, G. B., on three new shells from the collection of M. B. G. Thomas of Brest (Lotorium armatum p. 137 t. 11 f. 1, Marquesas?; — Pecten thomasi p. 138 t. 11 f. 2 unbekannten Fundortes; — Cardium mendanaense p. 138 t. 11 f. 3, Marquesas.)
p. 139. Bednall, W. H., the Polyplacophora of South Australia. With Pl. XII. 37 sichere und 6 zweifelhafte Arten. Neu Stenochiton pilsbryanus p. 142; — Ischnochiton pilsbryi p. 143 t. 12 f. 2; — Ischn. tateanus p. 147; t. 12 f. 3; — Ischn. thomasi p. 149 t. 12 f. 45; — Chiton exoptandus p. 152 t. 12 f. 7.
p. 160. Murdoch, R., Description of new species of Endodonta and Flammulina. — Neu Endodonta vortex, End. conica var. multicostata, Flammulina perplexa, Allodiscus mossi, alle zinkographisch abgebildet.
p. 164. Melvill, J. Cosmo and E. R. Sykes, Notes on a collection of Marine Shells from the Andaman Islands with Descriptions of new species. 97 Arten, davon neu Drillia booleyi p. 165 t. 13 f. 6.7. — Dr. ochroleuca p. 165 t. 13 f. 4.5; — Ancilla booleyi p. 166 t. 13 f. 13; — Imbricaria isomeres p. 167 t. 13 f. 9. — Nassa eucomista p. 169 t. 13 f. 11; — Turritella leptomita p. 171 t. 13 f. 12.
p. 173. Godwin Austen, H. H., Notes on the genus Euplecta of Semper, with descriptions of supposed new species from Ceylon. With pl. 4. — Neu E. prestoni p. 177 t. 14 f. 1; — Kaliella salicensis p. 178 t. 14 f. 3; — Lamprocystis? sinhila p. 178 t. 14 f. 2; — Lamp.? nuwaraensis p. 178 t. 14 f. 4.
p. 179. Ausstellung einer Anzahl Röntgen-Photographien (skiographs) von Mollusken, davon Nautilus pompilius auf Taf. 15 abgebildet.
Hedley, C., Description of a new Papuan Land Shell. — In Records Australian Museum Vol. III No. 1 p. 11.
(Thersites septentrionalis vom Musa River an der Nordostküste von Britisch Neu Guinea in Holzschnitt abgebildet).
Protz, Albert, Bericht über die vom 22 Juni bis 19 Juli 1895 in den Kreisen Schicetz, Tuchel, Konitz und Pr. Star-gard von mir unternommenen zoologischen Excursionen.
In Schriften Naturf. Gesellsch. Danzig N. D. IX.
Heft 2. 1896.

Für Westpreussen neu sind *Hyalina alliaria* Mill., *Unio pictorum* var. *area* Held und *Sphaerium duplicatum* Cless. Sehr auffallend ist das Vorkommen von *Tachea austriaca* bei Sartovitz.

Pillary, Paul, Description de quelques nouvelles espèces d'Helices du Département d'Oran. In Assoc. française Avanc. Sc., Congrès de Carthage 1896.

Als neu werden beschrieben und leider ziemlich unkenntlich abgebildet *Macularia kebiriana* f. 1 von Ain Türk; — *Xerophila mortilleti* f. 2; — *Xer. arabophila* f. 4; — *Xer. doumergei* f. 5 — *Xer. berberica*, sämtlich aus der nächsten Nähe von Oran.

Journal de Conchyliologie. Vol. 44 (1896) No. 3 (ersch. Mai 1887).

- p. 169. Bernard, E., Etudes comparatives sur la coquille des Lamellibranches. — *Goudylocardia*, type nouveau de Lamellibranche.
- p. 207. Crosse, H., Note sur le genre *Pterosoma* de Lesson.
- p. 213. Hidalgo, G., Observations sur quelques *Cochlostyla* des Philippines
- p. 217. — —. Description d'une nouvelle espèce de *Cassis* (*C. Crossei* von den Philippinen).
- p. 218. Crosse H., Note sur la distribution géographique du *Cyprea achatidea* Gray (*C. physis* auct. non Brocchi), dans la Méditerranée (mit var. *auricoma*, *oranensis* und *nana*).
- p. 222. Dautzenberg, Ph., Description de deux espèces nouvelles de *Bulinulus* (*Gonostomus bouvieri* p. 222 t. 7 f. 1 von Pernambuco, — und *Bostryx moniezi* p. 224 t. 7 fig. 3, wahrscheinlich aus Ober-Peru).

Schmidt, L., Neuere Beobachtungen über Zuwachs zu unserer Molluskenfauna. — In Blätter für Gothaische Heimatkunde 1897 No. 8.

Neu zugewandert respektive eingeschleppt nach Thüringen sind *Cyclostoma elegans* bei Frankenroda und Falken; — *Helix candidans* Zgl. an verschiedenen Stellen; — *Hyalina draparnaldi* Beck in Gärten bei Gotha; — *Hyalina septentrionalis* Bgt. (*draparnaldi*, var.) in Gewächshäusern bei Gotha. Schon länger eingeschleppt resp. angesiedelt ist *Vivipara vera* im Schlossteich in Gotha. Dagegen ist *Buliminus radiatus*, der gleichfalls ausgesetzt wurde, bald wieder verschwunden. Die 1877 von Dr. Funk am Staffelstein ausgesetzte *Helix cingulata* Stud. vom Mte. Cristallo gedeiht dagegen vorzüglich.

*d'Ailly, Adolf. Contributions à la connaissance des
ques terrestres et d'eau douce de Kameroun.* —
til K. Svenska Vet. Akad. Handl. Bd. 12 Afsl. IV
137 pg. mit 5 Tafeln.

Eine wichtige Arbeit, gewissermassen die Ergänzung zu Martens über Ost-Afrika. Sie enthält die Ausbeute des Ingenieur Dusen, Dr. Spösted und Dr. Jungner in den Jahren 1890—92. Als neu beschrieben werden: *Streptaxis cassis* p. 5 t. 1 f. 1—5; — *Ennea gemma* p. 10 t. 1 fig.; — *Ennea bongeensis* p. 10 t. 1 f. 34—37; — *Ennea* p. 15 (= *complicata* Mts. Monatsber. Berl. Acad. 1891 f. 17—18 nec descr.); — *Ennea perforata* p. 16 t. 1 f.; — *Ennea serrata* p. 17 t. 1 f. 38—41; — *Ennea* (*Excisa*) *duseni* p. 20 t. 1 f. 22—25; — *Em. (Exc.) boangolensis* t. 1 f. 26—27; — *E. (Ptychotrema) tullbergi* p. 23 t. 1 f.; — *Streptostele pusilla* p. 26; — *Helicarion pertenuis* p. 27 t. 1 f. 49—54; — *Helicarion columellaris* p. 31 t. 2 f. 1—8 *depressus* p. 32; — *Hel. subglobosus* p. 33 t. 2 f. 9—10; — *Thapsia sjostedti* p. 39 t. 2 f. 15—20; — *Trochozonellula* *culatus* p. 43 t. 2 f. 26—31; — *Tr. lindströmi* p. 44 t. 2 f. 1—2; — *Tr. suturalis* p. 45 t. 2 f. 43—46; — *Tr. bystrix* p. 46 t. 2 f. 22—35; — *Tr. pilosus* p. 50 t. 2 f. 36—39; — *Tr. tu-* p. 51 t. 2 f. 47—48; — *Tr. theeli* p. 55 t. 2 f. 21—22; — *Helix camerunensis* p. 57 t. 5 f. 11—13; — *Helix jungueri* t. 5 f. 14—16; — *Hapalus sulcatus* p. 60 t. 5 f. 5; — *Achatina* *camerunensis* p. 64 t. 3 f. 1—4; — *Ganomidos* n. gen. seltsame goldglänzende *Achatina shuttleworthi* Pfr. *imbariana* Shuttl.; — *Limicolaria kobelti* p. 79; — *Pseudodennisoni* var. *connectens* p. 92 t. 4 f. 1—3; — *Ps. imbariana* p. 95 t. 4 f. 7—9; — *Ps. liljevallii* p. 98 t. 5 f. 6—7; — *Ps. duseni* p. 107 t. 5 f. 8—10; — *Opeas egens* p. 112; — *Dolium dolinum* p. 118; — *Dreissensia holni* p. 130 t. 5 f. 17—18; — *Cyrenella rosea* p. 131 t. 5 f. 24—30. — Im Ganzen sind 100 Arten aufgeführt, davon 35 neu. Die Abbildungen sind sehr befriedigend ausgeführt.

Melvill, James Cosmo, Descriptions of thirty-four Species of Marine Mollusca from the Arabian Sea, Persian Gulf and Oman, mostly collected by F. W. Townsend Esq. In: *Proc. Manchester Literary and Philosophical Soc.*

Session 1896—97. Vol. 41 pl. 3. — With 2 plates.

Als neu beschrieben werden *Nassa* (*Niotha*) *mamillifera* p. 4 t. 6 f. 2; — *N.* (*Hima*) *townsendi* p. 4 t. 6 f. 1; — *Sistrum rawsoni* p. 5 t. 6 f. 7; — *Coralliophila persica* p. 6 t. 6 f. 4; — *Costellaria stephanucha* p. 6 t. 6 f. 7; — *Marginella* (*Gibberula*) *charbarensis* p. 7 t. 6 f. 16; — *Marg.* (*Cryptospira*) *shoplandi* p. 8 t. 6 f. 15; — *Mitrella cartwrighti* p. 8 t. 6 f. 14; — *Terebra severa* p. 9 t. 6 f. 8; — *Ter.* (*Euryta*) *thyraea* p. 10 t. 6 f. 13; — *Natica strongyla* p. 11 t. 6 f. 20; — *Scalaria fimbriolata* p. 11 t. 6 f. 10; — *Syrnola karachiensis* p. 12 t. 6 f. 9; — *Elusa brunneomaculata* p. 13 t. 6 f. 5; — *Eulima epiphanes* p. 13 t. 6 f. 6; — *Turritella fultoni* p. 14 t. 6 f. 12; — *Gibbula* (*Cantharidella*) *phaedra* p. 15 t. 6 f. 17; — *Monilea astrolabensis* p. 15 t. 7 f. 21; — *Minolia climacota* p. 16 t. 7 f. 22; — *Min. nedyma* p. 17 t. 7 f. 23; — *Thalotia beluchis*, *tana* p. 17 t. 6 f. 19; — *Gallistoma funiculare* p. 18 t. 6 f. 18; — *Ethalia carneolata* p. 19 t. 7 f. 25—26; — *Ethminolina* p. 20 t. 7 f. 24; — *Fissurella townsendi* p. 20 t. 1 f. 27; — *Dentalium conspicuum* p. 21 t. 7 f. 28; — *Leucotina jaskensis* p. 21 t. 6 f. 11; — *Chione mekranica* p. 21 t. 7 f. 30; — *Dosinia globa* p. 22 t. 7 f. 35; — *Tapes oncodes* p. 23 t. 7 f. 34; — *Tellina* (*Maera*) *methoria* p. 23 t. 7 f. 31; — *Donax aperittus* p. 24 t. 7 f. 33; — *Pectunculus mascatensis* p. 24 t. 7 f. 32; — *Yoldia tropica* p. 25 t. 7 f. 29.

The Journal of Conchology, Vol. VIII No. 11 April 1897.

p. 353. Marshall, J. T., Additions to „British Conchology“ (cont.).

p. 373. Chaster, Geo. W., *Adeorbis unisulcatus* n. sp. from the Irish Coast (woodcut).

p. 375. Derbyshire R. D., a visit to a Snail Farm.

p. 379. Melvill, J., Cosmo and Robert Standen, Notes on a collection of shells from Lifu and Uvea, Loyalty Islands formed by the Rev. James and Mrs. Hadfield with list of Species. Part II. (cont.) Neu *Drillia cygnea* p. 379 t. 11 f. 84; — *Olivella williamsi* p. 380, (woodcut).

p. 383. Taylor, John W., on two remarkable atavie specimens of *Planorbis spirorbis* Mull. (woodcuts).

Journal de Conchyliologie Vol. 44 No. 2 (1896, erschienen April 1897.)

p. 113. Vayssiére, A., Description des Coquilles de quelques espèces nouvelles ou peu connues de Pleurobranchides. Neu *Berthella*

brocki p. 120 t. 5 f. 8, Amboina; — Berth. edwardsii p. 122, Azoren; — Bouireria scutata Mrts. p. 123, Mauritius; — Pleurobranchus perrieri p. 126, Philippinen, Tahiti; — Pl. moebii p. 123, Querimbainseln; — Pl. forskalii Rüpp. p. 130, Rothes Meer; — Susania mamillata Quoy p. 132; — Oscanius semperi n. p. 134, Philippinen.

- p. 138. Hervier, R. P. J., Description d'espèces nouvelles de Mollusques provenant de l'Archipel de la Nouvelle — Calédonie (suite). Neu Clathrella ephelia p. 140; — Cl. squarrosa p. 140; — Cl. phaedra p. 141; — Cl. spelaeodea p. 141; — Cl. rufolirata p. 142; — Cl. euzonata p. 143; — Cl. subfelina p. 144; — Cl. iospira p. 145; — Cl. edychroa p. 146; — Cl. idiomorpha p. 147; — Cl. perangulata p. 147; — Cl. subcylindrica p. 148; — Daphnella galactosticta p. 150; — D. lifouana p. 150.

Martini- Chemnitz Conchylien Cabinet Neue Auflage.

Lfg. 427 Turritella, von Dr. W. Kobelt. Keine n. sp. Zum erstenmal abgebildet T. monterosatoi Kob. t. 2 f. 3—4.

Kobelt, Dr. W., Studien zur Zoogeographie. Die Mollusken der palaearktischen Region. Wiesbaden, Kreidel 1897. Gr. 8°. 354 S.

Eine eingehende Besprechung folgt in nächster Nummer.

L'Echange. Revue Linnéenne. Vol. XIII. 1897.

- p. 9. Locard, Arnould, Notices Conchyliologiques. XLIV. Dentalium nouveaux ou peu connus. Neu Dentalium vestitum P. Fischer p. 9, Saharaküste, 830—1100 m; — D. scannatum P. Fischer p. 10, Azoren und Sargassomeer, 12—2100 m; — D. esuberans p. 10, Westafrika, und Azoren, 1250—3650 m; — D. milne-edwardsi p. 10, Westafrika, 1435 m.

Vol. XLV. p. 46. Sur un genre nouveau dans la Faune marine. Assiminopsis n. gen. für Assiminopsis abyssorum n., vom Travailleur südlich von Portugal in 1200 m Tiefe gedrakt, klein, genabelt, Mundrand nicht zusammenhängend, Aussenrand schneidend, Spindelrand umgeschlagen.

The Journal of Conchology. Vol. VIII. No. 12:

p. 385. Marshall, I. T., Additions to British Conchology. (Cont.)

p. 395. Wright, C. E., a Colony of Caeciloides acicula Mull. in Northamptonshire.

p. 396. Melvill, L. C., and Standen, Rob. Notes on a Collection of Shells from Lifu and Uvea, Loyalty Islands, formed by the Rev. James and Mrs. Hadfield, with List of Species. (Part III).

Die Zahl der von den Loyalitätsinseln bekannt gewordenen Arten beläuft sich jetzt auf 800.

- p. 421. Moss, W., a premiliminary Note on the Genitalia of *Hyalinia* (*Zonitoites*) *nitida* Müll. and *Hy excavata* Beau.
p. 429. Johnson, James Yate, Description of *Helix Watsoni*, a new species of Land Shell discovered at Madera by Señor J. M. Moniz.
p. 431. Marschall, I. T., the Marine Shells of Scilly.

Some Observations by English Naturalists on the Fauna of Rathlin Island and Ballycastle District. Reprinted from the Irish Naturalist 1897.

- p. 173. Standen, R., General Observations.
p. 179. Adams, Lionel E., Land and Freshwater Mollusca of the Ballycastle District.
p. 184. Chaster, George W., Notes on the Marine Mollusca of Rathlin Island. (mit Abbildung von *Neolepton obliquatum* Mtrs.)

Journal de Conchyliologie vol. 44 No. 4 (1896, ausgegeben 1. Juli 1897.)

- p. 233. Fischer, H., Note sur le bras hectocotylisé et sur le dimorphisme du sépion de *Sepia Orbigniana* Ferussac.
p. 237. Hidalgo, Dr. J. G., Catalogue des espèces du genre *Cochlostyla*, Feruss. vivant dans les îles Philippines. Eine eingehende Besprechung dieser Arbeit durch Möllendorff folgt demnächst.
p. 353. Vayssiére, A., Description de deux espèces nouvelles de Pleurobranchides. (Pl. Crossei und Pl. Giardi, erstere von den Antillen, letztere von den Philippinen).
p. 356. Mayer-Eymar, C. Description de Coquilles fossiles des terrains tertiaires inférieurs (suite). Neu *Ostrea eothina*, *Vulsella anomoides*, *Lithodomus praecedens*, *Nucula edwardsi* N. münzingeri, *Astarte bakeri*, *Cardita nubica*, *Crassatella matercula*, *Cr. syenensis*).
p. 366. Mayer-Eymar, C., Description d'un sous-genre nouveau du genre *Cardita* (*Cossmannella*, für *Cardium aegyptiacum* Fraas.)

Gude, G. K., Armature of Helicoid Landshells. In Science Gossip III. 1897. p. 332 *Plectopylis clathratuloides* n. aus den Anamullays.

Der Name *Austenia* Gude wird, weil schon vergeben, in *Sykesia*

Kleinere Mittheilungen.

Unter dem Titel „The Malacological Review“ beabsichtigt Herr Walter E. Collinge, Mason College, Birmingham ein internationales Journal herauszugeben, das wesentlich dem Studium der Nacktschnecken dienen soll. Es soll vierteljährlich erscheinen und kostet jährlich Rm. 4.40.

Die Perlmuschel des rothen Meeres (*Meleagrina radiata* Desh.) scheint sich jetzt mit auffallender Schnelligkeit im Mittelmeer auszubreiten. Nachdem sie Vassel schon nicht lange nach der Vollendung des Suez-Canales in Port-Said nachgewiesen, und später Tiberi sie als *M. conemenosi*, Monterosato als *M. savignyi* von Alexandria beschrieben, hat sie jetzt nach Dautzenberg die Yacht Melita in grösserer Menge in der Bai von Surkennis bei Gabes gefunden. Die Wanderung scheint also längs der nordafrikanischen Küste zu erfolgen.

Necrologie.

Am 16. Decbr. 1896 starb in Wilfersdorf in Niederösterreich unser langjähriges Mitglied, der frühere Münzbeamte Josef Uhlertsch, im Alter von 68 Jahren. Obwohl vorwiegend Botaniker hat er auch sehr eifrig Conchylien gesammelt und namentlich der Höhlenfauna seine Aufmerksamkeit gewidmet; die meisten Stücke von *Patula hauffeni*, welche in den europäischen Sammlungen liegen, stammen aus seiner Hand.

Zeitungsbüchern zu Folge starb zu Ende vorigen Jahres in Verona Edoardo de Bettà, der bekannte Erforscher der venetianischen und trientiner Molluskenfauna.

Am 10. Januar d. J. starb in Neapel Salvatore Trinchese, Professor der Vergleichenden Anatomie.

Am 15. März d. J. starb zu Havanna der Erforscher von Cuba, J. Gundlach im Alter von 86 J.

Eingegangene Zahlungen:

Hocker, G. (Gotha) Mk. 6.—.

Redigirt von Dr. W. Kobell. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M., Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben 23. Juli.

Fortsetzung des Catalogs von No. 5 u. 6 des Nachrichtblattes.

deplanatus Pfr.	:	:	:	:	:	Kundah-Berge, Südindien.
layardi H. Ad.	:	:	:	:	:	Ceylon.
loxostomus Pfr.	:	:	:	:	:	Südindien.
maculosus Sow.	:	:	:	:	:	"
orites Nev.	:	:	:	:	:	Sikkim.
parapsis Bens.	:	:	:	:	:	Ceylon.
parma Bens.	:	:	:	:	:	"
phaenotopicus Bens.	:	:	:	:	:	Darjiling, Himalaya.
ravidus Bens.	:	:	:	:	:	Nilgherries.
shiplayi Pfr.	:	:	:	:	:	"
stenostomus Sow.	:	:	:	:	:	"
subplicatus Bedd.	:	:	:	:	:	Ceylon.
thwaitesi Pfr.	:	:	:	:	:	"
tristis Pfr.	:	:	:	:	:	Süd-Canara, Südindien.

12. Genus Cyclophorus Montf.

a. Subgenus Litostylus Kob. & Middff.

amoenus Pfr.	:	:	:	:	:	?
annamiticus Grosse	:	:	:	:	:	Cochinchina.
cambodjensis Morl.	:	:	:	:	:	Kambodscha.
ceylanicus Pfr. (indicus Sow.,						
menkeanus Rve.)	:	:	:	:	:	Ceylon.
cornu venatorium Sow.	:	:	:	Ava.		
dodrans Mab.	:	:	:	Tongking.		
involvulus Müll. (volvulus Wood)				Südindien, Ceylon.		
jerdoni Bens.	:	:	:	Nilgherries.		
labiosus Pfr.	:	:	:	?		
menkeanus Phil.	:	:	:	Ceylon.		
monachus Morel.	:	:	:	Cochinchina.		
muspratti G. Aust.	:	:	:	Naga Berge.		
nagaensis G. Aust.	:	:	:	"		
nilagiricus Bens. (pirriacus Pfr.)				Südindien.		
pocciloneurum G. A.	:	:	:	Naga Berge.		

polynema Pfr.	Südindien.
pyrotrema Bens	Bengalen.
semisulcatus Sow. (semistriatus Nev.)	Malacea.
spironema Pfr.	Vorderindien.
tetrachrous Mab.	Tongking.
unicus Mab.	"

b. Subgenus Glossostylus Kob. & Mlldff.

acutimarginatus Sow.	Philippinen: Samar, Leyte, Siargao, Mindanao.
aëtarum Mlldff.	Mittel-Luzon.
alabatensis Kob.	Mittel- und Südost-Luzon. Alabat, Catanduanes, Polillo, Philippinen.
v. alticola Mlldff.	Morong, Luzon.
v. simulabris	Kamarines, Luzon.
altivagus Bens	Mabaleschwarz, Südindien.
appendiculatus Pfr.	Marinduque, Philippinen.
var. minor	Tablas, "
aurora Bens	Darjiling, Himalaya.
barandae Hid.	Philippinen, Bataan a. Luzon.
bataniensis Quadr. et Mlldff.	Insel Batan (Baschi Gruppe).
benguetensis Hid.	N. W. Luzon.
var. sericea Mlldff.	Sual, Luzon, N. W.
bensonii Pfr.	Nordostindien.
var. cryptomphaloides Nev.	"
borneensis Mete. (subinvolvulus Eyd. et Soul.)	Borneo, Labuan, Sumatra, Perak.
bustoi Hid.	Balagnan, Mindanao.
canaliferus Sow.	Philippinen.
ceratodes Mlldff.	Südost-Luzon.
cochranei G. Austen	Nordborneo.
coronensis Mlldff.	Calamianes, Philippinen.

<i>crassilabella</i> G. Austen	.	.	Shan Staaten, Birma.
<i>cruentus</i> Mrts.	.	.	Samar, Philippinen.
<i>cryptomphalus</i> Bens.	.	.	Ava.
<i>daraganicus</i> Hid.	.	.	Südost-Luzon.
var. <i>gigas</i> Mlldff.	.	.	Kamarines, Luzon.
„ <i>platyomphala</i> Mlldff.	.	.	Polillo.
<i>ectopoma</i> Mlldff.	.	.	Samar, Philippinen.
<i>eximius</i> Mouss.	.	.	Sumatra.
<i>exul</i> Bens.	.	.	Darjiling, Sikkim.
<i>fulguratus</i> Pfr.	.	.	Birma, Pegu.
<i>himalayanus</i> Pfr.	.	.	Sikkim.
<i>indicus</i> Desh.	.	.	Elefante bei Bombay.
<i>jourdyi</i> Morel.	.	.	Tongking.
<i>leucostomus</i> Pfr.	.	.	Philippinen: Leyte, Panaon, Mindanao.
<i>lingulatus</i> Sow.	.	.	Cebu, Siquijor, Bohol, Philippinen.
var. <i>semperi</i> Kob.	.	.	Cebu.
„ <i>depressa</i> Mlldff.	.	.	„
<i>luridus</i> Pfr.	.	.	?
<i>massiei</i> Morl.	.	.	Tongking.
<i>niahensis</i> G. Austen	.	.	Nordborneo.
<i>oculus capri</i> Wood (<i>rafflesii</i> Brod. et Sow., <i>indicus</i> Phil.)	.	.	Java.
<i>palawanensis</i> Smith	.	.	Paragua, Balabac.
<i>patens</i> Blfd.	.	.	Pegu.
<i>personi</i> Bens	.	.	Annam, Khasiaberge.
var. <i>minor</i> Nev.	.	.	„
„ <i>subalabastrum</i> Nev.	.	.	„
„ <i>fuscolabris</i> G. Austen	.	.	„
<i>prietoii</i> Hid.	.	.	Catanduanes, Philippinen.
var. <i>stenochaeta</i> Mlldff.	.	.	Garamuan, Südost-Luzon.
<i>plerocycloides</i> Mlldff.	.	.	Luzon.
<i>quadrasi</i> Hid.	.	.	Paragua.

sericinus Quadr. et Mldff.	.	Busuanga, Philippinen.
smithi Hid.	.	Busuanga, Philippinen.
stenomphalus Pfr.	.	Khasiaberge, Nordostindien.
talboti G. Aust.	.	Nordborneo.
telfifer Mldff.	.	Luzon.
thersites Shuttl.	.	Philippinen.
tigrinus Sow.	.	Panay, Guimaras, Negros.
var. zebra Grat. (nee Pfr.)	.	Marinduque.
„ grandis Mldff.	.	Negros.
„ masbatica „	.	Masbate.
„ acutecarinata Mldff.	.	Tablas.
tryblium Bens	.	Darjiling, Himalaya.
validus Sow.	.	Mindanao, Leyte, Samar.
var. elevata Mldff.	.	Leyte.
„ linguifera Sow.	.	Bohol, Leyte, Samar.
woodianus Lea (luzonicus Sow.)		
gironnieri Soul.	.	Luzon.
var. arayatensis Kob.	.	"
„ pallens Mldff.	.	NW Luzon
„ ambubukensis Kob.	.	NO "
„ intercedens Kob.	.	Tayabas, Luzon.
„ depressa Mldff.	.	Kamarines, Luzon.
„ insularis "	.	Polillo.
„ expansilabris Mldff.	.	Masbate.
zebrinus Bens	.	NO Indien, Barma, Mergui.
var. aureolabris Mrts.	.	Mergui
„ ambigua "	.	"

c. Subgenus *Salpingophorus* Kob. et Mldff.

alabastrinus Pfr.	.	Ceylon.
aquila Sow.	.	Singapore.
arthriticus Theob.	.	Pegu.
var. fulgorans Hanl. et Theob.	.	"

aurantiacus Schum.	(lowi Morg.)	Mergui, Tavoy, Perak.
malayanus Morg.)	var. andersoni Mrts.	..
„ nevilli Mrts.
„ pernobilis Gld.
„ reevei Mrts.
balteatus Bens.	..	Pegu.
bankanus Mrts.	..	Banka.
cucullatus Gld.	..	Barma.
debeauxi Crosse	..	Singapore.
diplochilus Mlldff.	..	Samui, Golf von Siam.
everetti Smith	..	Barit, Nordborneo.
excellens Pfr.	..	Mulmein, Burma.
expansus Pfr.	..	Tenasserim, Mergui, Perak.
flavilabris Bens.	..	Pegu.
fultoni G. Aust	..	Naga Berge.
haughtoni Theob.	..	Mulmein, Tenasserim.
var. phayrei Nev.
„ picta Nev.
kinabaluensis Smith	..	Kinabalu, Nordborneo.
malayanus Bens (volvulus Soul.)	Penang, Perak, Samui.	
ophis Hanley	..	Tenasserim, Mergui.
pealianus Nev.	..	Naga Hills.
perdix Brod et Sow. (variegatus		
Val., aglae Sow.)	..	Java, Sumatra.
pfeifferi Rve.	..	Pulo Penang.
phlegethon G. Aust	..	Nordborneo.
porphyriticus Bens.	..	Ostküste des bengalischen Meerbusens.
saturinus Pfr.	..	Kambodscha, Laos.
siamensis Sow. (khasiensis Nev.)	Khasiaberge.	
speciosus Phil.	..	Siam, Pegu.
var. aureolabris Nev.
songmaensis Mork.	..	Songma, Tongking.

sublaevigatus Blsd.	.	.	.	Irawaddithal.
taeniatus Pfr.	.	.	.	Sumatra.
theobaldianus Nev.	.	.	.	Assam, Arakan, Pegu.
zollingeri Mouss.	.	.	.	Java.

d. Subgenus Encylophorus Mlldff. 1886.

affinis Theob.	.	.	.	Mulmein, Tenasserim.
cantori Bens	.	.	.	Penang.
charpentieri Mouss.	.	.	.	Java? Nicobaren?
cicatricosus Gredl.	.	.	.	Südwest Hubei, China.
clouthianus Mlldff.	.	.	.	Guangdong, China.
consociatus Smith	.	.	.	Annam.
courbeti Ancey	.	.	.	Tongking.
delavayanus Heude	.	.	.	Yünnan, China.
dilatatus Heude	.	.	.	" "
elegans Mlldff.	.	.	.	Guangdong, China.
endeli Smith	.	.	.	Annam.
exaltatus Pfr.	.	.	.	Hongkong.
ferruginosus Heude	.	.	.	Yünnan, China.
fargesianus Heude	.	.	.	Tschenkou, China.
floridus Pfr.	.	.	.	Siam.
formosensis Nev.	.	.	.	Formosa
friesianus Mlldff.	.	.	.	"
frinianus Heude	.	.	.	Kiang-si, China.
herklotsi Mrts.	.	.	.	Japan.
ibyatensis Pfr.	.	.	.	Batanes Inseln.
loloënsis Heude (soloënsis ex err.)	.	.	.	Yünnan, China.
martensianus Mlldff.	.	.	.	Mittel-China.
var. nankingensis Heude	.	.	.	
„ pallens Heude	.	.	.	
ngankingensis Heude	.	.	.	Anhui und Hubei, China.
paviei Morlet	.	.	.	Kambodscha.
punctatulus Heude	.	.	.	Se-tschuan, China.

punctatus Grat. (irroratus Sow.)	Guangdung, China.
pyrostoma Mlldff.	Hainan.
scurra Bens	Pegu, Arakan, Tenasserim.
var. davisoniana Nev.	" "
subcarinatus Mlldff.	Guangdung, China.
theodori Ancey	Tongking.
tornatus Morl.	Tongking.
translucens Heude	Guang-si, China.
turgidus Pfr.	Liukiu.
volvulus Müll.	Pulo Condor, Cochinchina.

e. Subgenus *Cyclohelix* Mörch.

denselineatus Pfr. (commutatus Behn)	Nicobaren.
foliaceus Chemn.	"
leai Tryon	Andamanen.
nicobaricus Behn (trochoides Mörcb)	Nicobaren.
turbo Chemn.	"

f. Subgenus *Cricophorus* Kob. & Mlldff.

atramentarius Sow.	?
fernandezi Hid.	Mindoro, Philippinen.
philippinarum Sow. (zebra Pfr., Kob.)	Luzon, Marinduque, Catanduanes.
var. crassula Mlldff.	Mittelluzon.
„ obtecta „	Nordwestluzon.
reevei Hid. (zebra Rve.)	Luban, Tablas, Philippinen.
sowerbyi Hid.	Philippinen.
trochiformis Kob.	"

g. Subgenus *Aferulus* Martens.

angolensis Dohrn	Angola.
elatior Mrts.	Butumbi, Nilquellen.

hildebrandti Mrts.	Uganda.
intermedius Mrts.	"
leonensis Morel	Sierra Leone.
lilliputianus Morel.	Gabun.
magilensis Grav.	Magila, Ostafrika.
mollerii Nobre	San Thomé, Golf von Guinea.
olivaceus Bgt.	Nguru Berge, Ostafrika.
preussi Mrts.	Buea, Kamerun.
vandellianus Nobre	San Thomé.
völkensi Mrts.	Kilimandscharo.
wahlbergi Pfr. (<i>translucidum</i> Kr.)	Natal.				

b. Subgenus Rhytidorhaphe Müll. f.

kubaryi Müll. f.	Constantinhafen, Neu Guinea.
------------------	---	---	---	---	------------------------------

13. Genus *Ostodes* Gould 1862.

adjunctus Mouss.	Tutuila.
albidus Jacq.	Samoa.
ammonis Gass.	Nencaledonien.
artensis Montr.	"
bocegeanus Gass.	"
couderti Fisch et Bern.	Fichteninsel.
forbesianus Pfr.	Lord Howes Insel, Neue Hebriden.
gassiesi Sow.	Polynesien?
guestierianus Gas.	Neu Caledonien, Insel Art.
montrouzieri Sow.	" "
plicatus Gld. (<i>apiae</i> Recl., pulverulentus Phil.)	Upolu, Schifferinseln.
strigatus Gld.	" "
tiara Gld.	" "
upoleensis Mouss.	" "
vieillardii Gossies	Neu Caledonien.

14. Genus **Aulopoma** Troschel 1847.

- grande Pfr. Ceylon.
helicinum Chemn. "
itieri Guérin (cornu venatorium
Pfr., hoffmeisteri Troschel.) ..
sphaeroideum Dohrn "

Subfamilie **Pterocyclinae.**

15. Genus **Coelopoma** A. Ad. 1867.

(*Spirostoma* Heude.)

- barcheti Schm. et Bltg. . . . Ningpo, China.
frinianum Heude Lopin, "
japonicum A. Adams . . . Japan.

16. Genus **Pterocyclus** Benson 1832.

- albersi Pfr. Khasiaberge? Birma?
anguliferus Soul. Cochinchina.
ater Stol. Mulmein, Birma.
aureus (Myx.) Heude . . . China.
berthae Dautz et Ham. . . Tongking.
bifrons Pfr. Ceylon.
bilabiatus Bens. Südindien bis Madras.
var. conica Nev. . . . Nilgherries.
blandi Bens Penang.
celebensis Smith (Cyclot.) . . Süd Celebes, Saleyer.
cetra Bens. Birma, Mulmein.
cingalensis Bens Ceylon.
comitis Bedd Anamali Berge, Indien.
euellus G. Austen Nordborneo.
cumungi Pfr. Ceylon, Travancore.
cyclophoroideus Nev. . . . Anamallis.
eudaedaleus Grosse. . . . Borneo.
feddeni Blfd. Pegu, Bhamo.
insignis Theob. Shan Staaten.
latilabrum Smith Nordborneo.
magnus G. Austen Dafla Berge.

moluccensis Kob.	.	.	.	Halmahera.
manus Benson	.	.	.	Nilgherries.
niahensis G. Austen	.	.	.	
var. baramensis Kob.	.	.	.	Nordborneo.
parvus Pears	.	.	.	"
var. major Nev.	.	.	.	Assam, Chittagong, Arakan.
" aracanensis Nev.	.	.	.	Arakan.
" assamensis Haul. et	.	.	.	Theob.
Theob.	.	.	.	Assam.
perrieri Morlet	.	.	.	Sian.
pseudocumingi Nev.	.	.	.	Travankur, Tinevelli.
pullatus Bens	.	.	.	Birma.
regelspergeri Morg.	.	.	.	Perak.
rupestris Bens. (pictus Trosch.)	.	.	.	Südindien.
var. puriensis Nev.	.	.	.	"
schmackeri Mlldff.	.	.	.	Setschuan, China.
sluiteri Bttg.	.	.	.	Gunung Gedeh, Java.
sumatranaus Mrts.	.	.	.	Sumatra, Borneo.
tenuilabiatus Metc.	.	.	.	Borneo, Celebes.
troscheli Bens.	.	.	.	Ceylon.

17. Genus **Spiraculum** Pearson 1838.

a. Subgenus **Spiraeulum** s. str.

andersoni Blfd.	.	.	.	Irawaddy Thal.
avanum Blfd.	.	.	.	Ava, Shangebiet.
beddomei Blfd.	.	.	.	Madras.
hispidum Pears.	.	.	.	Khasiaberge, Nordostindien.
massiei Morl.	.	.	.	Laos, Hinterindien.
mastersi Haul et Theob.	.	.	.	Assam, "
simplex Nev.	.	.	.	Naga Hills.
travancoricum Bedd.	.	.	.	Travankur.

b. Subgenus **Diplopterum** Mlldff.

fairbanki Blfd.	.	.	.	Pulney Berge, Südindien.
-----------------	---	---	---	--------------------------

18. Genus **Rhiostoma** Benson 1858.

- asiphon Mlldff. Samui, Golf von Siam.
bernardii Pfr. Siam.
cambodjensis Morl. Kambodscha.
hainesi Pfr. "
haughtoni Bens. Mulmein in Birma.
housei Haines Siam, Samui.
jousseaumi de Morg. Perak, Malakka.
simplicilabre Pfr. Kambodscha.

Subfamilie Cyclotinae.

19. Genus **Platyrhaphé** Mlldff.

- anocaimptus Mlldff. Samar, Philippinen.
anthopoma Mlldff. Luzon, "
bongaoensis Smith Bongao, Suluarchipel.
coptoloma Mlldff. Nordluzon.
erroneus Heude Hunan, China.
eurystoma Mlldff. Luzon.
exiguus Sow. ?
expansilabris Quadr. et Mlldff. Calamianes, Philippinen.
fodiens Heude China.
fossor Heude "
gradatus Mlldff. Calamianes, Philippinen.
harukuanus Btg. Molukken.
hunanus Gredl. Hunan, Guangsi, China.
latecostatus Kob. Mindanao, Cebu.
lateplicatus Mlldff. Tablas, Philippinen.
var. stenostoma Mlldff. . . . ,
linitus G. Austen Nordborneo.
lowi de Morgan (Aulopoma)
(hungerfordianus Mlldff.) Perak.
mamillatus Quadr. et Mlldff. Nordluzon.
minutus H. Ad. Formosa.
mueronatus Sow. Luzon.
parvulus Mrts. Molukken.

plebejus Sow.	Luzon, Katanduanes, Polillo.
var. <i>globulus</i> Mlldff.	Luzon, Marinduque.
plicosus Mrts.	Halmahera.
ptychorhaphe Mrts.	Westborneo.
pusillus Sow.	Philippinen,
var. <i>nana</i> Nev.	„ mittlere Inseln.
scalaris Pfr.	Calamianes, Philippinen.
schnackeri Mlldff.	Guangdung.
sordidus Pfr.	Cochinchina, Paragua?
substriatus Sow.	Siquijor, Philippinen.
swinhoci Ad.	Formosa.

20. Genus *Cyclotus* Guild.

a. Subgenus *Pseudocyclophorus* Mlldff.

amboinensis Pfr.	(marmoratus Pfr.)	.	.	.	Amboina, Ceram.
var. <i>stenomphala</i> Mlldff.	Süd Celebes.
canaliculatus Mlldff.	Constantinhafen, Neu Guinea
cyclophoroides Mlldff.	Cebu, Philippinen.
dimidiatus Kob.	Balante, Nordost Celebes.
discoideus Sow.	(opalinus Mouss.)	.	.	.	Java, Sumatra.
distomellus Sow.	(hebraicus Pfr.)	.	.	.	?
erytomphalus Kob.	Halmahera.
fulminatus Mrts.	(pelitus Smith nec Sow.)	.	.	.	Celebes.
hebraicus Less.	(papua Quoy)	.	.	.	Neu Guinea
leytensis Mlldff.	Leyte, Philippinen.
longipilus Mrts.	Maros, Süd Celebes.
naturensis Smith.)	Natuna Inseln.
novoguineensis Tapp.	Neuguinea.
politus Sow.	Flores, Adenare, Solor, Timor.
subflammulatus Pfr.	(guttatus Wall., obesus Mrts.)	.	.	.	Aru Inseln, Molukken,? Celebes?

succinctus Mrts.	Timor.
suluanus Mildff.	Sulu Inseln.
vicinus Smith	Jampeo und Kalao, südlich von Celebes.

b. Subgenus Procyclotus Fischer.

bourgignati Doum. Adans	Lenkoran.
campanulatus Mrts.	Südjapan, Korea
chinensis Pfr.	Hongkong.
danieli Morl.	Tongking.
difficillimus Schm. et Bttg.	Kiukiang, Ning-po, China.
ortunei Pfr. (approximans Heude)		Mittelchina.
gassiesianus Grosse	Tay-ninh, Cochinchina.
herzi Bttg.	Asterabad, Transkaspien.
lindstedti Pfr.	Ophir, Malacea.
microchilus Grosse	?
sieversi Pfr.	Lenkoran.
stenomphalus Heude	Human, China.
taivanus Ad.	Formosa.
tourannensis Soul.	Touranne, Annam.
tubaeformis Mildff.	Guangdong.

c. Subgenus Eucyclotus Mildff.

angulatus Mrts.	New Beland, Sulusee.
auriculatus Kob.	Mindanao, Samar.
var. deflexa Mildff.	Leyte.
batchianensis Pfr.	Batchian.
bernsteini Mrts.	Obi.
biangulatus Mrts.	Flores.
caroli Kob.	Philippinen.
euzeonus Dohrn	Palawan.
fasciatus Mrts.	Makassar, Süd-Celebes.
floresianus Mrts.	Flores.

- lowianus Pfr. Labuan.
 mindaiensis Bock Mindai auf Borneo.
 minor Smith Nutuna Inseln.
 palawanicus Smith. . . . Palawan.
 pruinosus Mrts. . . . Molukken.
 pyrostoma Smith. . . . Süd Celebes.
 semiliratus Mlldff. . . . "
 sulcatus Mlldff. . . . Gebu, Philippinen.
 trusanensis G. Austen . . . Trusan, Borneo.
variegatus Swains. (*planorbulum*
 Sow., *cornu venatorium* Petit) Philippinen.
 var. *grandis* Mlldff. . . . Sulu Inseln.
volvuloides Sow. . . . ?

d. Subgenus **Aulacopoma** Mlldff.

- boxalli G. Austen Molu, Nordborneo.
 labuanensis Pfr. . . . Labuan.

21. Genus **Opisthoporus** Benson.

- bieiliatus* Mouss. (*taylorianus*
 Pfr., *charbonieri* Recluz) . Nordborneo.
birostris Pfr. Borneo.
borealis Mlldff. (*hyperborealis*
 Heude) Hubei, China.
cavernae G. Austen . . . Sarawak, Nordborneo.
conchinchinensis Pfr. . . . Cochinchina.
corniculum Mouss. (*javanus* Pfr.) Java.
deflexus Mlldff. (*borealis* Heude
 non Mlldff.) Hubei, Setschuan, China.
euryomphalus Pfr. Borneo.
gordoni Bens. Barma, Mulmein.
gwendolenae G. Austen . . . Nordborneo.
hainanensis H. Ad. . . . Hainan.
hungerfordi G. Austen . . . Nordborneo.

<i>iris</i> G. Austen	Borneo.
<i>latistrigus</i> Marts. (<i>uryomphalus</i> Mrts. nec Pfr.).	West Borneo.
<i>penangensis</i> Stol.	Penang, Perak.
<i>pertusus</i> Morel.	Borneo.
<i>pteroeycloides</i> Pfr. (<i>anomalus</i> Rve.)	"
<i>pulchellus</i> Morl.	Siam.
<i>quadrasii</i> Crosse	Balabac, Paragua, Calamianes, Philippinen.
<i>rostellatus</i> Pfr.	Singapore, Sumatra, Borneo.
<i>schomburgianus</i> Mlldff.	Südchina.
<i>setosus</i> Mlldff.	Samui, Golf von Siam.
<i>siamensis</i> Mrts.	Siam.
<i>simonianus</i> Heude	Tay-ninh, Tongking.
<i>solutus</i> Stol.	Penang.
<i>spiniferus</i> Morel.	Borneo.
<i>sumatrensis</i> Mrts.	Sunatra.
<i>tener</i> Mke.	Touranne, Annam.
<i>tubuliferus</i> Pfr.	?

Subfamilie Cyathopomatinae.

22. Genus *Cyathopoma* Blanford 1864. *)

a. Subgenus *Cyathopoma* s. str.

<i>album</i> Bedd.	Südindien, Ceylon.
<i>atrosetosum</i> Bedd.	*
<i>beddomeanum</i> Nev. (<i>blanfordi</i> Bedd., nec H. Ad.)	Tinewelli Südindien.
<i>blanfordi</i> H. Ad. —	Mahé, Seychellen.
<i>coonoorense</i> Blfd.	Nilgiris, Südindien.
<i>dickroyense</i> Nev.	Ceylon.

*) Die philippinischen Arten siehe unter *Heteropoma* bei den Realidae.

deccanense Blfd.	Sylhed-Berge bei Bombay, Mauritius?
kalryense Blfd.	Südindien.
kolamullyense Blfd.	"
latilabre Bedd.	"
natalicum G. Austen	Gamorta, Nicobaren.
ovatum Bedd.	Salem Südindien.
shevroyanum Bedd.	"
sivagherianum Bedd.	Südindien.
travancoricum Bedd.	"
trochleum Bens.	"
vitreum Bedd.	"
wynaadense Blfd.	"

b. Subgenus *Jerdonia* Blanford 1894.

anamullyanum Bedd.	Südindien, Anamallis.
ceylanicum Bedd.	Ceylon.
elatum Bedd.	Südindien, Golkonda.
imperforatum Nev.	Südindien, Anamallis.
malabaricum Blfd.	" Nilgherries.
nitidum Bedd.	Südindien, Anamallis.
procerum Blfd.	" Malabar.
tignarium Bens.	Andamanen.

23. Genus *Mychopoma* Blfd. 1869.

convexusculum Pfr.	Kap. Natal.
hirsutum Bedd.	Südindien, Calcad Berge.
nevilli Morelet	Comoren.
seticinctum Bedd.	Südindien, Anamallis.
exul Mldff.	Constantinhafen, NeuGuinea.

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Neunundzwanziger Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn in Berlin** zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Cochlostyla-Studien.

Von

Dr. O. von Möllendorff.

Hidalgo hat im letzten Jahrgang des Journ. de Conch. die Literatur über Cochlostyla um 3 Arbeiten bereichert, nämlich:

1. Observations sur quelques Cochlostyla des Philippines I. p. 1—46.—

Das betreffende Heft ist vom 1. Januar 1896 datirt, aber meines Wissens erst Anfang 1897 ausgegeben.

2. Observations etc. II. p. 213—217. (Heft 3, datirt, 1. Juli 1896, wirklich ausgegeben Mai 1897),

3. Catalogue des espèces du genre Cochlostyla Fé.

qui vivent dans les îles Philippines. p. 237—353. (Heft 4. datirt 1. Oktober 1896, ausgegeben Ende Juni 1897).

Alle drei Aufsätze enthalten vieles Brauchbare, namentlich mit Bezug auf Literaturhinweise, aber auch vieles Irrige und Nichtverständliche, besonders in der Auffassung von Arten, Unterarten und Varietäten, in der wir häufig weit auseinandergehen. Ich trenne oft was Hidalgo zusammenzieht, und manche Formen, die er als besondere Arten stehen lässt, sind für mich nur Varietäten, u. s. w. Die hierüber nothwendigen Auseinandersetzungen würde ich am Liebsten einer zusammenfassenden Arbeit über die ganze Gattung einverleiben; da ich aber nicht weiss, wie lange es noch dauern kann, bis dieselbe zum Abschluss und zum Druck kommen wird, so ziehe ich es vor meine entgegenstehenden Ansichten theilweise schon jetzt darzulegen, zumal Hidalgo sich vielfach polemisch gegen mich und die von mir aufgestellten Arten wendet.

Er macht (p. 30) die sehr richtige Bemerkung, dass von andern Autoren („de renom“ setzt er hinzu, zu welcher Klasse er mich sichtlich nicht rechnet) aufgestellte Arten nur nach sorgfältigstem Studium und nur von solchen Forschern eingezogen werden sollten, welche im Besitz eines sehr reichhaltigen Materials sind. Dieses Prinzip, welches ich ihm gegenüber wiederholt verfochten habe, befolgt er leider mir gegenüber durchaus nicht. Er thut sich sichtlich etwas darauf zugute, dass er 1400 Exemplare von *Cochlostylen* besitzt und noch etwa ebensoviel in Madrider Sammlungen studirt hat. Wenn ich nur meine eigene Sammlung mit den Doubletten rechne, so werden 20000 kaum reichen; es sind nur wenige Arten, von denen ich nicht Hunderte in den Händen gehabt hätte, und bei manchen geht es mit allen Fundortsverschiedenheiten und Varietäten in die Tausende. Und wenn ich hinzuzählen wollte, was ich in andern Sammlungen, namentlich

der Quadras'schen, Berliner, Frankfurter u. s. w. gesehen und verglichen habe, so könnte ich die obige Zahl leicht verdoppeln. Der Vortheil des grösseren Materials wäre also jedenfalls auf meiner Seite. Was ich aber viel höher anschlage, ist die persönliche Anschauung über die geographische Verbreitung, die Entwicklung und Abgrenzung der Rassen, und wenn ich auf Grund dieser Erfahrung eine neue Art aufstelle, so kann sich Hidalgo darauf verlassen, dass sein Nörgeln, zu dem er a priori geneigt ist, wenn jemand anders als er eine neue *Cochlostyla* benennt, an der Artgiltigkeit derselben nichts ändern wird. Er hat namentlich nie verstanden, obwohl ich wiederholt darauf hingewiesen habe, welcher Unterschied zwischen Varietät in meinem, d. h. in dem in Deutschland allgemein angenommenen Sinne, und seiner Anwendung dieser Bezeichnung besteht. Meine Varietäten sind Lokalrassen, die sich von Species und Subspecies nur graduell unterscheiden und die ich in Zukunft auch lieber als Unterarten bezeichnen werde; die seinigen sind promiscue individuelle Spielarten und (zum kleinsten Theile) geographische Abänderungen. Er wird daher auch nie finden, dass ich vom gleichen Fundort Typus und Varietät oder mehrere Varietäten citire. Ihm passirt das öfters, wie er sogar Formen einer Art, die im gleichen Walde friedlich durcheinander hausen, als verschiedene Arten aufführt z. B. *subcarinata*, *romblonensis* und *möllendorffii*, die ganz sicher nur individuelle Abänderungen einer Art sind. Ich mache ihm das nicht zum Vorwurf, da er wie alle Forscher in Europa mit einzelnen Exemplaren und oft unsicherer Fundortsangaben arbeiten muss, während wir an Ort und Stelle aus dem Vollen schöpfen. Wohl aber gereicht es ihm zum Tadel, dass er diesen Umstand nicht berücksichtigt, wenn er meine Resultate kritisirt. Ueberhaupt sucht er es in seiner neusten Arbeit so hinzustellen, als

habe ich mich darauf beschränkt in Manila stillzusitzen und das mir von Quadras und andern gebrachte Material zu verarbeiten, wenigstens schweigt er in seiner Darstellung von der Entwicklung unsrer Kenntnisse über *Cochlostyla* von meinem eigenen Reisen und Sammlungen gänzlich. Es heist bei ihm lapidarisch: „Im Allgemeinen kann man sagen, dass den Herren Cuming, Semper und Quadras die Kenntniß der schönen *Cochlostyla*-Arten zu verdanken ist.“ Von mir ist bloss insoweit die Rede, als ich einige der Quadras'chen Funde beschrieben habe. Man kann es Hidalgo nicht verdenken, dass er meinen Freund Quadras, der unter seinen Landsleuten als weisser Rabe erscheint, über die Gebühr herausstreicht, nachdem unsre Kenntniß von der Fauna der spanischen Colonie fast ausschliesslich durch Ausländer geschaffen worden ist. Aber Quadras' Verdienste als Sammler sind an sich gross genug, um die Schmückung mit fremden Federn entbehren zu können. Unkenntniß kann Hidalgo auch nicht vorschützen, da aus meinen Publikationen ganz genau hervorgeht, was auf meinen eigenen Beobachtungen, auf denen der meinerseits angelernten und bezahlten Sammler oder auf Quadras'schem Material beruhte. Was speziell neue *Cochlostylen* anbelangt, so hatte z. B. Quadras an der Entdeckung der folgenden keinerlei Anteil: *accedens*, *erythrospira*, *intercedens*, *lamellicostis*, *olivacea*, *pulchella*, *roebeleni*, *roseolimbata*, *streptostoma*, *trisculpta*, *versicolor*.

Mit Recht hebt Hidalgo als besonderes Verdienst Quadras' hervor, dass er von vielen Arten die genauen Fundorte festgestellt hat; weder er noch Quadras selbst haben aber meinen wiederholten Hinweis gebührend berücksichtigt, dass leider nicht auseinander gehalten worden ist, ob die Fundorte auf eigener Beobachtung oder auf Mittheilung anderer beruhten. Hierdurch ist die Autorität meines Freundes für die Fundortsangaben einigermassen

entwerthet worden, da natürlich nur die ersteren Fälle absolut zuverlässig sind. In der That ist Quadras dadurch für eine Reihe sicher falscher Angaben verantwortlich geworden, während ihm auf der andern Seite das Verdienst mancher richtiger Fundortfeststellungen, welches andern Sammlern zukommt, irrthümlich zugeschrieben worden ist.

Ich hebe von den ersteren hervor:

C. annulata Sow. Benguet. Die Art kommt sicher nicht in Benguet vor, wo Quadras auch bisher nicht gewesen ist, sondern nur in Ilocos Norte.

C. bicolorata Lea. Iloilo. Vorkommen daselbst gänzlich ausgeschlossen.

C. calobapta Jon. Cebu. Weder Semper, noch ich, Koch oder Quadras selbst haben die Art auf Cebu gefunden.

C. cincinnus . Mindoro.

C. circe . Loquiloion, Samar. (Nur auf Mindanao !)

C. collodes . Samboanga.

C. faunus . Masbate.

C. gilva . Siquijor.

C. iloconensis . Mindanao (!!)

C. imperator . Iloilo (?)

C. lignaria . Benguet.

C. metaformis . Bohol.

C. norrisi . Leyte.

C. pithogastra . Cebu.

C. portei . Infanta, Laguna. (nur auf Polillo !)

C. roissyana . Surigao.

C. zonifera . Laguna (?)

Von allen diesen Fundortsangaben weiss ich bestimmt, dass sie nicht auf Quadras' eigenen Beobachtungen beruhen, sie sind auch nicht bloss zweifelhaft, sondern nach unsren jetzigen Erfahrungen über die Verbreitung der Cochlostylen direkt falsch. Sie stammen meist aus der ersten Zeit seines Aufenthaltes auf den Philippinen, als er

die Mittheilungen einheimischer und spanischer Sammler, die oft sehr unzuverlässig sind, noch kritiklos hinnahm. Schade nur, dass er sie später nicht widerrufen und ihre Veröffentlichung verhindert hat. Nur wer wie ich seine Reisen und Sammlungen genau kennt, kann nun zwischen sicheren und unsicheren oder falschen Fundorten unterscheiden.

Was nun die Differenzpunkte zwischen Hidalgo und mir anbelangt, so kann ich hier dieselben nicht alle einzeln erörtern. Schon in der Abgrenzung der Gattung selbst gehen unsre Ansichten weit auseinander. Er schliesst Corasia und Axina aus, hat aber z. B. *C. sphaerion* bei *Cochlostyla*, die doch von manchen Formen der *intorta* nur schwierig specifisch, aber sicher nicht generisch zu trennen ist. Aehnlich liegt der Fall mit Axina und es ist nach Sempers klarer Beweisführung schwer begreiflich, wie man diese ganz unwissenschaftliche Trennung noch aufrecht erhalten will. Warum er ferner *fragilis* Sow. (*Leytia*), *aurata*, *erubescens*, *pudibunda*, *lividocincta* weglässt, ist aus seiner Arbeit nicht ersichtlich! Da sie als *Cochlostyla* beschrieben sind, hätte er diesen Ausschluss doch motiviren müssen. Die *Leytia* steht freilich ganz isolirt, aber wegen der hydrophanen Bänderung doch näher bei *Callicochlias* als bei *Corasia*. Die Gruppe von *C. aurata*, *Poecilosphaera* Pilsbry, ist meiner Ansicht nach *Pfeifferia* als Sektion einzuverleiben und *Pfeifferia* als Gattung abzutrennen, da doch einige anatomische Unterschiede vorhanden sind; immerhin aber gehört sie zur engeren Verwandschaft von *Cochlostyla*. Auf der andern Seite lässt Hidalgo die *Phoenicobius*-Arten bei *Cochlostyla*, welche doch, wie Dohrn, Pilsbry und ich klar nachgewiesen haben, zu *Camaena* gehören.

Auf seinen Versuch der Gruppierung der Arten kann ich hier nicht näher eingehen, da ich dieselbe fast durch-

weg bekämpfen muss. Auch die Vertheilung nach geographischen Gesichtspunkten in fünf „centres“ scheint mir wenig glücklich und schon durch die grosse Zahl falscher oder unsicherer Fundortsangaben sind die daraus gezogenen Schlüsse über die Verbreitung vielfach irreführend. Vorläufig muss ich mich darauf beschränken, einige kritische Arten zu besprechen.

(1. u. 2.) *C. dubiosa* Pfr., *batanica* Rve. u. *speciosa* Jay.

Hidalgo sucht mit unöthiger Breite zu beweisen, dass die vielfach verkannte, weil unvollkommen beschriebene *Helix speciosa* Jay nicht, wie Pilsbry will, mit *C. dubiosa*, sondern mit *batanica* Rve. identisch sei. Es handelt sich mit andern Worten einfach darum: hat Hidalgo Recht, wenn er *dubiosa* und *batanica* artlich trennt oder ist die Combination beider, welche Pfeiffer und nach ihm Pilsbry befürwortet, gerechtfertigt? Auf den 6 Seiten, welche er mit der Besprechung dieser Frage füllt, sucht man vergebens auch nur ein Wort der Begründung seiner Ansicht, irgend ein Kennzeichen, durch das er die beiden Arten unterscheiden will. Ich habe ein nach hunderten zählendes Material von *C. dubiosa* aus der Provinz Tayabas auf Luzon sorgfältig durchgemustert und konnte etwa 1 Dutzend Exemplare der *batanica* von der Insel Batan vergleichen und bin zu der Ueberzeugung gekommen, dass sie sich die beiden Formen nicht als Arten, kaum als Varietäten trennen lassen. Da nach meinen Beobachtungen für die oft schwierige Artabgrenzung bei den Cochlostylen grade die geographische Verbreitung ein sehr wichtiger Faktor ist, so war mir das gänzlich unvermittelte Auftreten der auf einen kleinen Theil vom östlichen Mittelluzon beschränkten *C. dubiosa* in einer nahezu identischen Form auf den nördlich von Luzon gelegenen Batanes in hohem Grade störend, und ich habe mir deshalb besondere Mühe gegeben greifbare Unterschiede an beiden Formen zu finden. Die Rasse von Batan ist durchschnittlich etwas

stumpfer und es fehlt die braune Binde um die Spindel, wenigstens bei den von mir gesehenen Exemplaren. Hierauf eine Art zu gründen ist mehr als ich verantworten möchte, und wenn ich sie als var. *batanica* bestehen lasse, so geschieht dies hauptsächlich der merkwürdigen weiten räumlichen Trennung wegen. Dieser Sprung in der Verbreitung widerspricht so vollständig meinen Erfahrungen, dass ich annehmen möchte, die Art sei, etwa mit Pflanzen, verschleppt worden und nicht ursprünglich auf den nördlichen Inseln einheimisch.

C. dubiosa variiert ungemein und zwar in der Stärke der Schale, der Höhe des Gewindes, der Bänderung, indem die mittleren Binden oft verschwinden, der Zahl und Anordnung der hydrophanen Cuticula-Bänder, der Länge der Mündung, die oft schon wie bei *C. mirabilis* ausguss-artig verlängert ist. Die letztere Form scheint auch räumlich vom Typus getrennt zu sein und ich nenne sie *var. submirabilis*. Stücke wie Hid. Atl. t. 47, f. 4 leiten zu ihr über.

Betreffs des Fundorts von *C. dubiosa* ist Hidalgo theilweise im Irrthum. Quadras hat dieselbe niemals im Distrikt Morong gesammelt, den wir genau genug kennen, um die Abwesenheit dieser Art in ihm behaupten zu können. Vielleicht hat er sie mit falscher Fundortsangabe von einem einheimischen Sammler erhalten. Sie lebt im östlichen Theil der Provinz Tayabas bis an die Grenze der Provinz Kamarines, wo sie durch *mirabilis* und *generalis* ersetzt wird, ferner auf der Insel Alabat. Nach Norden - kenne ich die Grenze noch nicht genau, aber schon in der Provinz Nueva Ecija tritt *C. roebeleni* für sie ein und in den Provinzen Isabela und Kagayan fehlt jede Art dieser Gruppe. Die Fundorte Marinduque, Samar und Batan für *dubiosa* sind endgültig zu streichen; den letzten genannten hatte Pfeiffer selbstverständlich nur deshalb an-

gegeben, weil für ihn batanica Rve. ein Synonym von dubiosa war.

Nach der sehr mangelhaften Figur in Jay's Katal. (3. Ed. 1839, t. III f. 9) entscheiden zu wollen, welche von diesen beiden sich so nahe stehenden Formen gemeint war, halte ich für ein sehr kühnes Unterfangen, da nicht einmal der einzige von mir herausgefundene Character, nämlich das Vorhandensein der Spindelbinde, ersichtlich ist. Ich bin mit Pilsbry der Ansicht, dass man den Jay-schen Namen endgültig in der Synonymie lassen soll, nachdem er in Folge der unkenntlichen Beschreibung und Abbildung auf so verschiedene Arten wie *C. cocomelos*, *zonifera* und *dubiosa* bezogen worden ist. Die Art von Tayabas hat hiernach wie bisher *C. dubiosa* Pfr. zu heissen, die Form von Batan kann als var. *batanica* abgetrennt werden.

Gänzlich verschlägt ist meiner Ansicht nach der Versuch Hidalgos, *C. peraffinis* Pilsbry mit *dubiosa* zu vereinigen, wobei ihn höchstens die nicht sehr gelungene Figur entschuldigen kann. Eine Cochlostyla nach einer solchen Figur mit Sicherheit zu bestimmen ist schwer, doch unterliegt es für mich keinem Zweifel, dass Pilsbry's Art lediglich eine individuelle Abänderung von *C. polillensis* ist. Letztere ist freilich überhaupt nur eine vikariirende Form von *dubiosamirabilis*, die sie auf Polillo vertritt, aber doch schon genügend modifizirt, um sie als Art abzutrennen.

(3.) *C. fuliginata* Mrts.

Die Bemerkungen enthalten vieles richtige; namentlich dass die von mir als *fuliginata* betrachtete Cochlostyla aus den Bergen östlich und nordöstlich von Manila besser mit *C. fenestrata* als mit *montana* Semp. zu vergleichen ist. Es ist das ziemlich unwesentlich, da beide zu derselben Gruppe gehören; ich verglich sie eben mit der einzigen

Art, die ich besass. Nach Vergleich des Originalexemplars von fuliginata bin ich nunmehr zu einem andern Resultat gekommen. Die Form von Montalban, welche sich durch die Gebirge von Morong und Bulacan bis in den südlichen Theil der Provinz Nueva Ecija erstreckt, gehört als var. (oder subsp.) bifenestrata m. zu fenestrata. Sie unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch, dass sie auch an der Basis eine Reihe Unterbrechungsflecken („Fenster“) in der hydrophanen Oberhaut aufweist. Hierzu stimmt auch vortrefflich der Fuudort der typischen fenestrata, nämlich der nördliche Theil der Provinz N. Ecija am Südabhang des Karavallo-Gebirges. Die echte fuliginata Mts., die sich als Art halten lässt, lebt in den Provinzen Tarlac und Pangasinan. Mittglieder zwischen ihr und fenestrata würden im nordöstlichen Pangasinan zu suchen sein. Die Synonymie stellt sich mithin wie folgt:

C. fenestrata Sow. — Nueva Ecija

var. *bifenestrata* Mlldff. = fuliginata Mlldff. olim, Hidalgo, non Mts. — N. Ecija, Bulacan, Morong, Manila.

C. fuliginata Mts. = beloni Jouss. — Tarlac, Pangasinan.

(4.) *C. sowerbyi* Hid.

Der Autor setzt auseinander, was wir seit Pfeiffer schon wussten, dass *C. decipiens* Sow. Formen der mirabilis, dubiosa und eine dritte Form einschloss, und hat vollständig Recht darin, dass diese letztere, welche nicht Sowerby's Typus darstellt, nach Ausscheidung der übrigen ebenfalls nicht dem Namen decipiens behalten darf, den ihr Pfeiffer liess. Er giebt daher dem verbleibenden Rest den obigen neuen Namen. Das Schlimme dabei ist nur, dass Niemand, auch der Autor nicht, weiss, was die Art, welche auf der Insel Capul leben soll, eigentlich ist. Ich will hier erwähnen, dass ich die kleine Insel Capul von einem recht tüchtigen Sammler habe untersuchen lassen und dass derselbe keine

Cochlostyla gefunden hat, die sich auf *decipiens* Sow. ex rec. Pfr. beziehen lassen könnte. Die Abbildungen im Chemn. (t. 45, f. 5,6) deuten auf den Formenkreis von *pulcherrima*, noch dazu erscheint es zweifelhaft, ob die beiden Figuren zu derselben Art gehören. Wir sind daher zunächst um eine neue Nominalart bereichert, die der Autor selbst nicht kennt. Reeve's Abbildung (C. ic. t. V f. 23) von *decipiens* stimmt durchaus nicht zu Pfeiffers; leider ist sie nur von hinten gezeichnet. Sie ist grösser und höher als die Pfeiffersche und sieht aus wie eine Form von *zonifera* oder *samarensis*.

(5.) *C. bicolorata* (Lea).

Hier bin ich zunächst nicht damit einverstanden, dass *C. onyx* als blosse Varietät, also im Hidalgo'sche Sinne eine individuelle Spielart, die keinen Namen verdient, gelten soll. Sie ist eine ausgezeichnete Lokalrasse, welche im westlichen Theile der Provinz Kamarines Sur von Libmanan bis Baaö lebt und durch keinerlei Uebergänge mit *bicolorata* verbunden ist. Selbst die extrem schlanke Form der letzteren Art, welche Hidalgo (Atl. t. 70 f. 5) abbildet, kann nicht als Uebergang betrachtet werden, da sie wie der Typ nur 7 statt 8 Windungen hat, immer noch erheblich bauchiger und nicht gekantet ist. Aehnlich steht es mit meiner *C. amaliae*, welche mindestens eine gute Subspecies ist, da sie in den Bergen der Provinz Albay ganz gleichförmig auftritt. Hier bin ich aber eher geneigt, sie nur als Unterart gelten zu lassen, weil ich seither eine Form vom Isarog kennen gelernt habe, die sich wohl als Uebergang auffassen lässt. Sie nähert sich in der Gesamtform, auch schon etwas in der Färbung und Zeichnung der *C. amaliae*, hat aber noch eine grüne Basis. Ich nenne sie var. *subflammulata*. Keinenfalls ist es zulässig, alle diese räumlich geschiedenen Rassen ohne besondere

Bezeichnung glatt zu einer Art zu vereinigen Ich unterscheide:

C. bicolorata (Lea) typ. — Provinzen Laguna und Tayabas auf Luzon, Marinduque.

var. melanacme Mlldff. — Kamarines (nördlicher Theil)

var. gracilis Mlldff. — Polillo.

var. subflammulata Mlldff. — Berg Isarog in Kamarines (südlicher Theil).

subsp. *amaliae* Mlldff. — Provinz Albay.

C. onyx (Brod.) — Kamarines (westlicher Theil).

(6.) *C. cunctator* (Reeve)

Wenn Hidalgos Abbildung (Atl. t. 60 f. 2) in der That dieselbe Schnecke darstellt, wie Reeve's *cunctator*, so ist die letztere Art nichts weiter als eine Form, kaum Varietät von *C. daphnis*. Dagegen gehört die von Pilsbry (Man. VIII, t. 12, f. 1,2.) abgebildete Form ohne alle Frage zu *C. faunus* Brod., von der ich sie auch nicht als Varietät abzutrennen vermag. Diese letztere tauft Hidalgo *C. pilsbryi* Hid., also eine überflüssige Vermehrung der Synonymie. Nun habe ich aber eine dritte Form von R. Damon als *C. cunctator* Rve. erhalten, zu der eine Anzahl Exemplare, von Koch auf den Camotes-Inseln gesammelt, sehr gut passen. Diese lassen sich von *C. daphnis* und *faunus* als besondere Lokalrasse abtrennen, und wenn sie, wie ich nach Hidalgo annehmen muss, nicht zu *cunctator* Rve. gehört, so bedarf sie eines neuen Namens. Man kann die Gruppe mithin folgendermassen auffassen:

C. daphnis Brod. = *cunctator* Rve teste Hid. — Bohol, Siquijor, Cebu.

subsp. *faunus* Brod. = *cunctator* Pilsbry non Reeve = *pilsbryi* Hid. — Cebu.

subsp. *camotica* Mlldff. = *cunctator* Damon, Mlldff. in sched. non Reeve). — Camotes.

(8.) *C. naujanica* Hid.

Hier hat Hidalgo völlig Recht. Bei allen Arten von *Phoenicobius* kommen bezahnte und unbezahnte Formen untereinander vor, und ich habe auch von der Rasse, die auf Nord- und Nordost Mindoro beschränkt ist, wenn auch selten, deutlich gezahnte Stücke erhalten. Die typische Form von Naujan ist wesentlich kleiner als die von den Abhängen des M. Halcon bei Bakó und Kalapan, so dass ich die letzteren als var. *grandis* abtrenne. Die *Phoenicobius*-Arten, welche wie oben schon erwähnt, nicht zu *Cochlostyla* gehören, sondern zu *Camaena* zu stellen sind, bilden eine geschlossene Reihe, die man sehr wohl als Lokalrassen einer Art auffassen könnte.

Camaena (*Phoenicobius*) *oblonga* (Sow.) — Nord- und Nordwest-Mindoro.

<i>C. oomorpha</i> (Sow.)	.	Nordwest, West-Mindoro.		
var. <i>diminuta</i> Mlldff.	.	"	"	"
<i>C. arata</i> (Sow.)	.	Südwest, Süd	"	"
<i>C. adusta</i> (Sow.)	.	Südost	"	"
var. <i>subarata</i> Mlldff.	"		"	"
<i>C. brachyodon</i> (Sow.)	.	Ost	"	"
<i>C. naujanica</i> (Hid.)	.	Nordost	"	"
var. <i>grandis</i> Mlldff.	.	" Nord	"	"

Bei Bakó kommen *oblonga* und *naujanica grandis*, also die grösste und die kleinste Form, zusammen.

11. *C. indusiata* Pfr. und *saranganica* Mlldff.

Darüber dass meine Art mit der von Hidalgo als *indusiata* bestimmten identisch ist kann kein Zweifel bestehen und von einer irrthümlichen Supposition meinerseits, wie sie Hidalgo annimmt, ist keine Rede. Quadras erhielt seine Exemplare von dem Orchideensammler Micholitz, er selbst war nie auf Sarangani; später sammelte sie Roebelen für mich auf den gleichen Inseln Balut und Sarangani. Ich

habe nun nach Hidalgos Widerspruch die Pfeiffersche Beschreibung und der Abbildung der Schnecke von Tukan Besi erneut verglichen (was ich natürlich schon längst vorher gethan hatte, während Hidalgo kühn behauptet: précisément parce qu'il n'a pas vu les figures des Novitates) und finde immer noch denselben Hauptunterschied, nämlich dass *saranganica* ganz schwach gekantet ist, während *indusiata* nach der Diagnose *distincte carinata* ist, in der deutschen Beschreibung einen „deutlichen ziemlich scharfen Kiel“ besitzt. Die Abbildung, von der Hidalgo behauptet sie gesehen, aber keinen Kiel bemerkt zu haben, zeigt einen deutlich fädlich aufgesetzten Kiel, der wohl nur zu übersehen ist, wenn man ihn nicht sehen will. Ueber die geographische Schwierigkeit eine philippinische Schnecke ausserhalb der Philippinen verbreitet zu finden, geht Hidalgo leicht hinweg mit dem sehr naiven Grunde, dass ja eine Anzahl *Cochlostylen* auf mehr als einer Insel gefunden wurden; Er vergisst nur dabei 1) dass es sich in solchen Fällen immer um benachbarte Inseln handelt — sprungweises Vorkommen auf entfernten Inseln hat sich noch immer als Irrthum, sei es durch falsche Fundortsangabe oder unrichtige Bestimmung erwiesen — und 2) dass in solchen Fällen die Rassen der einzelnen Inseln stets mehr oder weniger modifizirt sind. Beweis dafür sind grade die von ihm angeführten Beispiele. *Cochl. sphaerion* kommt, nach Streichung der falschen Fundorte Mindoro, Bohol und Camotes, auf Leyte, Panaon und N. Mindanao vor, hat also einen sehr geschlossenen Verbreitungsbezirk, aber die Mindanao-Rasse, meine var. *meridionalis*, ist so stark verändert, dass man bei keinem Stück über die Herkunft zweifelhaft sein kann. Aehnlich steht es mit *G. zonifera*, die auf den Inseln Leyte, Samar, Dinagat, Siagar und Mindanao (Luzon, Catanduanes bei Hidalgo sind natürlich zu streichen) fünf sehr gut geschiedene Rassen bildet, deren jede auf eine Insel

beschränkt ist und von denen zwei, paraleuca und circæ, nach Hidalgo sogar besondere Arten sind. Nach meiner Erfahrung wäre es in hohem Grade auffällig, wenn sich die Sarangani-Schnecke in gleicher Form auch auf Tukan-besi vorsände. Ich würde sogar soweit gehen, falls sich nach den Originalexemplaren die Identität von saranganica mit indusiata herausstellen sollte — in welchem Falle freilich Pfeiffers Beschreibung und Abbildung sehr mangelhaft sein müsste — dann anzunehmen, dass Pfeiffers Fundort irrthümlich angegeben war und dass Thomson die fragliche Schnecke ebenfalls von Sarangani erhalten hätte. Uebrigens scheint es Hidalgo gelungen zu sein, die Insel Tukan-besi, nach der ich wie von Martens und A. B. Meyer u. a., vergeblich gesucht habe, endlich aufzufinden, da er sie „assez voisine de Sarangani“ nennt. Wir vermuthen in ihr eine der Talant-Inseln, die durch einen tiefen und ziemlich breiten Meeresarm von Mindanao getrennt sind.

13. *C. pictor* Brod.

Hidalgo bespricht hier die ausserordentlich schwierige Gruppe von pictor, frater, fulgetrum nobilis, decorata etc., die sich alle um ventricosa Pfr. gruppiren, und kommt u. A. zu dem Resultat, dass frater Fé = pictor Brod. sei, behält aber trotzdem den Namen pictor bei, weil frater von späteren Autoren vielfach missverständlich aufgefasst worden sei. Dass ein Autor seine Priorität durch Fehler Anderer verliern soll, ist ein neues, sehr merkwürdiges Princip. Ich stimme Hidalgo völlig darin bei, dass die Figur bei Féruccac ein abgeriebenes Exemplar der Schnecke von Dingle und Dueñas (Berg Putian) auf Panay darstellt, und da pictor Brod. ebenfalls von Panay angegeben wird, so wird er auch darin Recht behalten, dass pictor nur ein Synonym von frater ist. In diesem Falle ist aber die Rasse der Insel Negros, die wir bisher mit pictor be-

zeichneten, nicht mehr dazu zu stellen; sie ist viel bauchiger, anders gefärbt und gezeichnet und entschieden eine andre Art. Hidalgo mischt daher in seinem pictor wiederum zwei Arten. Für mich ist die ganze Frage nur geographisch zu lösen, was ich an der Hand meines sehr reichen Materials mit Abbildungen möglichst vieler Formen demnächst versuchen werde.

(Schluss folgt.)

Literaturbericht.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 1896 Part. II. III.

p. 315. Pilsbry, Henry A. and E. G. Vanatta, Catalogue of the Species of Cerion, with description of new forms. Es werden vier Untergattungen unterschieden: Eostrophia Dall für die miocäne C. anodonta; — Cerion s. str. C. uva; — Strophiops Dall (welcher alle die Maynard'schen Untergattungen zugerechnet werden) für die Hauptmasse, — und Diacerion Dall für die Gruppen von striatum und rubicundum. Als neu beschrieben werden: C. uva desculptum p. 328, t. 11, fig. 1, von Curacao; — C. incrassatum microdon t. 11, fig. 5, Cuba; — C. iostomum arangoi p. 330, t. 11, fig. 12; — C. hyperlissum p. 330, t. 11, fig. 10, Cuba; — C. regina p. 330, t. 11, 23, 14, Bahamas; — C. sarcostomum p. 331, t. 11, fig. 16, Little Jnagua; — C. abacense p. 332, t. 11, fig. 11, var. bendalli fig. 13, Bahamas; — C. eleutherae p. 333, t. 11, fig. 19, 20; — C. blandi p. 334 t. 7, Turks Insel; — C. multistriatum p. 335, t. 11, fig. 8, Crooked Island; — C. basistriatum p. 335, t. 11, fig. 28, Cuba; — C. tridentatum p. 336, t. 11, fig. 27, Cuba; — C. duplonotum p. 337, t. 11, fig. 26, Bahamas.

Neues Mitglied:

Herr Pfarrer **Ricklefs** in Minsen, Amt Jever.

Eingegangene Zahlungen:

Gude, L., Mk. 6.—; v. Lasser, M., Mk. 6.—; Ricklefs, M., Mk. 6.—; Sinroth, L., Mk. 6.—; Hofer, W., Mk. 6.—; Paar, L., Mk. 12.—.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M., Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben 17. Oktober.

Fortsetzung des Catalogs von No. 7 u. 8 des Nachrichtenblattes.

5. Familie Neocyclotidae.

a. Subfamilie Neocyclotinae.

Genus **Neocyclotus** Crosse et Fischer.

a. Subg. Neocyclotus s. str.

bartletti Pfr.	Ostperu.
bisinuatus Mrts.	Costarica.
bogotensis Pfr.	Neu Granada
boucardi Angas	Costarica.
cingulatus Sow.	Neu Granada.
connivens H. Ad.	Ost-Peru.
corpulentus Smith	Neu Granada.
distinctus Sow.	West Columbien.
dunkeri Pfr.	Ecuador.
dysoni Pfr.	Zentralamerika.
giganteus Gray	Columbia, Panama
glaucostoma Pfr.	Venezuela.
granadensis Shuttl.	Trinidad, Granada.
granulatus Pfr.	Ecuador.
inca d'Orb.	Bolivia, Brasilien.
incomptus Sow.	Neu Granada.
irregularis Pfr	Costarica.
laxatus Sow.	Columbia.
martinicensis Shuttl.	Martinique.
?minimus Gdl.	Ostcuba.
pazi Crosse	.	.	,	.	Ecuador.
perezi Hid.	,	.	.	.	"
popayanus Lea	Neu Granada.
prominulus Fer.	Brasilien.
quitensis Pfr.	Neu Granada, Ecuador.
rugatus Guppy	Trinidad.
stramineus Rve.	Merida, La Guayra.
translucidus Sow.	Columbien.
vortex Weinl.	Haiti.

b. Subgen. *Platystoma* (Klein).

asperulus Sow.	Jamaica.
bairdianus Chitty	"
beswicki Chitty	"
corrugatissimus Chitty	"
var. notatus Chitty	"
crassus C. B. Ad.	"
cycloatus Chitty	"
deburgheanus Chitty	"
dentistigmatus Chitty	"
duffianus C. B. Ad.	"
gemma Chitty	"
inutilis Chitty	.	,	.	.	"
jamaicensis Chemn.	"
jugosus C. B. Ad.	.	,	.	.	"
nodosus Chitty	"
notatus Chitty	"
novae spei Chitty	"
novus-saltus Chitty	"
pallescens C. B. Ad.	"
perpallidus C. B. Ad.	"
portlandensis Chitty	"
portoricensis Bttg.	Portorico.
pretiosus Chitty	Jamaica.
ruber Chitty	"
rudisplanusque Chitty	"
rupis-fontis Chitty	"
seminudus C. B. Ad.	"
subrugosus Sow.	"
varians C. B. Ad.	"
westmorelandensis Chitty	"
zigzag Chitty	"

b. Subfamilie Amphicyclotinae.

Genus **Amphicyclotus** Crosse et Fischer.

acutiliratus Drouët	Martinique.
amethystinus Guppy	Dominica.
beauianus Petit (inornatus Recl).	Guadeloupe
boucardi Sallé	Vera Cruz, Mexiko.
boucieri Pfr.	Ecuador.
cayennensis Shuttl.	Cayenne.
cinereus Drouët	Martinique.
crosseanus Hid.	Ecuador.
cousini Jouss.	"
cumingii Sow. (striatus Lea)	Columbia.
delphinulus Mouss.	"
esmeraldensis Mill.	Ecuador.
gayi Hupé	Nordchile.
goldfussi Bttg.	Honduras.
guyaquilensis Sow.	Guayaquil.
haematomma Pfr.	Ecuador.
hidalgoi Crosse	"
liratus Drouët	Martinique.
maleri Crosse et Fischer . .	Tabasco, Mexiko.
moricandi Pfr.	Brasilien.
nigrofasciatus Mill.	Ecuador.
orbignyi Ancey	Bolivia.
ponderosus Pfr.	Guatemala.
psilomitus Pfr.	Venezuela.
purus Fbs.	Westcolumbien.
rufescens Sow.	Martinique.
schrammi Shuttl.	Guadeloupe.
texturatus Sow.	Guatemala.

Genus **Buckleyia** Higgins.

bifasciata Mouss.	Bogota.
---------------------------	---------

- martinezii* Hid. (*montezumi*
Higg.) Ecuador.

Genus **Cyrtotoma** Mörch.

- berendti* Pfr. Südmexiko.
lutescens Pfr. "
var. *cooperi* Tryon "
mexicanum Menke "
salleanum Mrts. "

6. Familie Pupinidae.

Genus **Pseudopomatias** Mlldff. 1885
(*Fargesia* Heude) 1886.

- amoenus* Mlldff. (*corneus*
Heude) Hubei, Setschuan.
var. *tumidula* Mlldff. . . . Hunan.
grandis Austen Shengorh.
himalayae Bens. Rungun, Darjiling.
peguensis Theob. Pegu.
pleurophorus Bens. Khasiaberge.

Genus **Rhaphaulus** Pfr.

- assamicus* G. Austen Brahmakund.
bombycinus Pfr. Sarawak, Borneo.
chrysallis Pfr. Tenasserim.
kükenthali Kob. Nordborneo.
lorraini Pfr. Pulo Penang.
pachysiphon Theob et Stol. . Mulmein.
pfeifferi Issel Sarawak, Borneo.

Genus **Streptaulus** Bens.

- blanfordi* Bens. Sikkim, Himalaya.
var. *intubus* G. Aust. "
— *tubulus* G. Aust. "
— *tortuosus* G. Aust. "

Genus **Braziera** Brazier.

typica Braz. (*brazierae* Smith) D' Entrecasteaux Inseln.

Genus **Coptocheilus** Gould.

<i>altus</i> Sow.	Philippinen (Insel Negros).
var. <i>protracta</i> Mlldff.	Sibuyan, Tablas, Mindoro.
<i>anostoma</i> Bens. (<i>sectilabrum</i> Pfr., <i>lowei</i> Sow.)	Labuan.
<i>doriae</i> Issel	Sarawak, Borneo.
<i>funiculatus</i> Bens.	Darjiling.
<i>leferi</i> Morel.	Borneo.
<i>pauperculus</i> Sow.	Sikkim.
<i>quadrasi</i> Hid.	Busuanga, Philippinen.
<i>sectilabris</i> Gld.	Birma, Perak.
<i>sumatranaus</i> Dohrn	Sumatra.
<i>tanycheilus</i> G. Austen	Borneo.

Genus **Cataulus** Blanford.

<i>albescens</i> Blfd.	Travankur.
<i>aureus</i> Pfr.	Ceylon.
<i>austenianus</i> Bens.	"
<i>blanfordianus</i> Dohrn	"
<i>calcadensis</i> Bedd.	Travankur.
<i>costulatus</i> Blfd.	Tinevelly Ghats, Südindien.
<i>cumingi</i> Pfr.	Ceylon.
<i>decorus</i> Bens.	"
<i>duplicatus</i> Pfr.	"
<i>eutremia</i> Pfr.	"
<i>haemastomus</i> Pfr.	"
<i>layardi</i> Gray	"
<i>marginatus</i> Pfr.	"
<i>nictneri</i> Nev.	"
<i>pyramidalis</i> Blfd.	"

- ceramica Mrts. Ceram, Ambon.
costata Hedl. et Mus. Queensland.
coxi Morel. "
crossei Braz. Yule Insel.
grandis Forbs. (forbesi Pfr.) . Louisiaden.
hedleyi Sm. Neu Guinea.
humilis Jacq. (antiquata Sow.) " "
loheri Mlldff. Benguet, Luzon.
luteola Brancs. (fultoni Smith). Astrolabe Bai, Neuguinea.
macgregori Smith Rossel Insel.
mindorensis Ad. et Rve. . . Mindoro.
minor Smith Rossel Insel.
moulinsiana Fisch. et Bern.
 (leucostoma Montr.) . . . Woodlark Insel.
petterdi Crosse Nordaustralien.
planilabris Pfr. (whartoni Cox) Queensland.
pupiniformis Sow. Nordluzon.
 var. pallidolabris Mlldff.
 var. gracilis Mlldff. "
 var. contracta Mlldff. "
quadrasi Mlldff. "
rosseliana Smith Rossel Insel.
strubelli Smith Djamna Insel, Neu Guinea.
tapparonei Braz. Fly Fluss, Neu Guinea.

b. Subg. *Pupinopsis* H. Ad.

- rufa Sow. (japonica Kob.) . Japan.
swinhoei H. Ad. Formosa.
 var. meridionalis Schm. et
 Bttg.
 var. morrisonia H. Ad.

Genus *Bellardiella* Tapp. Canefri.

- martensiana Tapp. Port Dorey, Neu Guinea.
minor Hedl. Südost-Neuguinea.

- rufa Sow. Japan.
swinhoei H. Ad. Formosa.
var. meridionalis Bttg. "
— morrisiana H. Ad. "
strubelli Smith Djamna Insel, Neu Guinea.

Genus **Bellardiella** Tapp. Canefri.

- martensiana Tapp. Port Dorey, Neu Guinea.

Genus **Hedleya** Cox.

- macleayi Cox Nord Queensland.

Genus **Pupina** s. str.

a. Subg. **Pupina** s. str.

- brazieri Crosse Erromango, Neue Hebriden.
complanata Pease Carolinen, Marschallinseln.
cumingiana Pfr. Tanau, Neu Hebriden.
difficilis O. Semp. Palaos, Yap.
gracilis Mlldff. Cebu, Philippinen.
keraudreni Vign. Salomonen.
miokoana Mouss. Mlldff. Bismarck Archipel.
mitis Hinds. " "
pfeifferi Dohrn Cap Flattery, Australien.
quadrasi Mlldff. Luban, Philippinen.
solomonensis Smith Salomonen.
speculum Tapp. Can. Port Dorey, Neu Guinea.
strangei Pfr. Moreton Bai, Australien.
vitiensis Garr. Gornea, Viti Inseln.

b. Subgenus **Tylotoechus** n.

- adamsi Kob. (pfeifferi Ad. nec
Dohrn) Batchian, Molukken.
artata Bens. (blansfordi Theob.) Birma, Ava.
arula Bens. "
aurea Hinds Neu Island.

compacta	Mlldff.	Java.
crosseana	Morlet	Kambodscha.
crossei	Braz.	Queensland.
destructa	Heude (Mesost.)	Setschuan, China.
dohertyi	Smith	.	,	.	.	Flores.
doriae	G. Aust.	Busanberge, Nordborneo.
dorri	Dautz.	Haiphong in Tongking.
ephippium	Grdl.	Hunan, China.
evansi	G. Aust.	Nordborneo, Natunas.
everetti	Smith.	Natuna-Inseln.
exclamationis	Mab.	Tongking.
flava	Mlldff.	.	.	.	,	Hainan.
fuchsii	Grdl.	Henson-schien, China.
gibba	Hedl.	.	.	.	,	Neu Guinea.
guimarasensis	Nev.	Guimaras, Sibuyan, Tablas, Negros, Masbate, Philippinen.
hosei	G. Aust.	,	.	.	.	Nordborneo, Balabac, Palawan.
hungerfordiana	Nev.	Salwen Thal, Nordostindien.
hyptiostoma	Q. et Mlldff.	Philippinen.
illustris	Mab.	.	,	.	.	Tongking.
imbricifera	Bens.	Nordostindien.
japonica	Mrts.	Japan.
josephi	Mlldff.	Balabac, Philippinen.
jüdelliana	Mlldff.	Hainan.
junghuhni	Mrts.	Java.
limitanea	Godw. Aust.	Arakan.
lowi de Morg.	Perak.
meridionalis	Pfr.	.	.	,	.	Queensland.
mouhoti	Pfr.	.	,	.	.	Kambodscha.
nana	Mlldff.	Leyte, Philippinen.
nasuta	Smith.	.	.	.	,	Konstantinbasen, Neu Guinea.
nicobarica	Pfr.	.	.	,	.	Nicobaren.

ottonis Dohrn	Mindanao, Basilan, Philip-
	pinen.
var. compressa Mlldff. , .	Sulu-Inseln.
ovalis Hedl.	Neu Guinea.
pallens Mlldff.	Samui, Golf von Siam.
papuana Smith.	Neu Guinea.
paviei Morlet	Kambodscha.
peguensis Bens.	Pegu.
pineticola Cox.	Queensland.
pulchella Mlldff.	Lo-sou-schan, China.
robusta Cox	Port Curtis, Queensland.
rufilabris Dohrn , . .	Sumatra.
spectabilis Q. et Mlldff. .	Busuanga. Philippinen.
striatella Q. et Mlldff. .	Ilin bei Mindoro, Philippinen.
sucinacia Bttg.	Gunung Salak auf Java.
tchehelensis Morg.	Perak.
superba Pfr.	Sumatra.
thomsoni Fér.	Fitzroy Insel.
tongupensis Godw. Aust. .	Arakan Berge.
treubi Bttg.	Java.
turgidula Dohrn	Sumatra.
ventrosa Dohrn	Cap York, Australien.
verbeeki Mlldff.	Java.
vescoi Morel	Pulo Condor, Hinterindien.
wilcoxi Cox.	Clarence River, Australien.

c. Subgenus *Siphonostylus* n.

lobifera Mrts.	Sumatra.
longituba Kob.	Halmahera.

Genus *Hargravesia* H. Adams.

adamsiana Crosse	Viti.
luzonica Mlldff.	Luzon.
philippinica Mlldff.	Siquijor.
politae H. Ad.	Salomonen,?Bismarck Archipel

Genus **Moulinsia** Grat.

(*Registoma* Gray.)

dissimilis	Mlldff.	Luzon.
exigua	Sow.	Cebu?, Negros.
floresiana	Smith	Flores.
fusca	Gray (<i>vitreata</i> Sow.)	Philippinen.
v. ventrosula	Mlldff.	Mindanao.
v. inclinata	Mlldff.	Mittel- und S.O.Luzon.
goldfussi	Mlldff.	Camerun.
grandis	Gray (<i>nunezii</i> Sow., aurantia Mörch)	Philippinen.
obliqua	Smith	Lombok.
pellucida	Sow.	Philippinen.
v. complanata	Mlldff.	Polillo.
v. nana	Mlldff.	Bohol.
perexigua	Q. et Mlldff.	Tablas, Philippinen.
perobliqua	Q. et Mlldff.	Marinduque, „
quadrasi	Mlldff.	Nordluzon, „
semiscissa	Q. et Mlldff.	Marinduque, „
semperi	Mlldff.	Nordluzon, „
similis	Sow.	Luzon, „
solitaria	Mrts.	Molukken.
streptaxis	Mlldff.	Morong, Luzon.

Genus **Porocallia** Mlldff.

ambigua	O. Semp.	Nordluzon.
canalifera	Q. et Mlldff.	Catanduanes, Philippinen.
microstoma	Kob.	Mindanao, Bohol „
var. leytensis	Mlldff.	Leyte.
var. nana	,	Luzon, Catanduanes, Philippinen.
var. subocclusa	Mlldff.	N.O.Luzon.

Genus **Callia** Gray.

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| amboinensis Mrts. | Amboina, Ceram. |
| lubrica Sow. | Philippinen. |
| splendens Dohrn | Lizard Insel, Nordaustralien. |
| wallacei Pfr. | Ceram. |

7. Famille Alycaeidae.

Genus **Dioryx** Benson.

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| amphora Bens. | Birma. |
| bacca Pfr. | Laosgebiet. |
| carinigera Mlldff. | , |
| distorta Haines | Siam. |
| feddeniana Theob. | Mulmein; Shanstaaten. |
| globulus Mlldff. | Hubei, China. |
| kobeltiana Mlldff. | Kiukiang, China. |
| monadica Heude | Tschenkou, China. |
| pilula Gld. | Hongkong. |
| var. minor Mlldff. | Guangdung. |
| setchuanensis Heude | Tschenkou. |
| swinhoei H. Ad. | Formosa. |
| urnula Bens. | Sikkim; Shanstaaten? |

Genus **Alyceus** Gray.

a. Subgenus **Orthalyceus** Pfr.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| anceyi Mab. | Tongking. |
| bembex Bens. | Darjiling, Himalaya. |
| blanfordi G. Aust. | Naga Berge, Assam. |
| congener Smith | Nordborneo. |
| conicus G. Aust. | Nord Kaschar. |
| constrictus Bens. | Darjiling, Himalaya. |
| crenilabris Mlldff. | Java. |
| dohrni Bttg. (hochstetteri Mrts.) | |
| nec Pfr.) | Borneo. |

fruhstorferi Mlldff.	Java.
fultoni Mlldff.	Gomanton, Nordborneo.
galbanus G. Aust.	Niahberge, „
gibbosulus Stol. (chaperi Morg.)					Penang, Malacca.
gibbus Fér.	Cochinchina.
globosus H. Ad.	Sarawak Nordborneo.
granum G. Aust.	Naga Berge.
graphicus Blfd.	Shan Staaten bis Darjiling.
var. minor G. Aust.	Assam.
hochstetteri Pfr.	Java.
hosei G. Aust.	Nordborneo.
jagori Mrts.	Java.
v. trigonostoma Btg.	"
v. minor Marts.	Celebes.
kapayanensis de Morg.	Perak.
lunula Bens.	Indien.
magnus G. Aust.	"
margarita Theob.	Shan Staaten.
mouhoti Pfr.	Laos Gebiet.
muspratti G. Aust.	Indien.
otiphorus Bens.	Shan Staaten bis Darjiling.
perakensis Crosse	Perak.
politus Blfd.	Arakan.
pusillus G. Aust.	Nord Kaschar, Nordindien.
pyramidalis Bens.	Tenasserim, Birma, Salanga.
reinhardi Möreh.	Nicobaren.
requiescens Mab.	Tongking.
reticulatus Mlldff.	Java.
rimatus Btg.	Nordborneo.
roebeleni Mlldff.	Samui, Golf von Siam.
rubinus Godw. Aust.	Ober Barma.
sadongensis Smith	Sarawak, Nordborneo.
sculpturus G. Aust.	Manipur.
serratus G. Aust.	Nagaberge, Assam.

specus G. Aust.	Nordborneo.
thieroti de Morg.	Perak.
vestitus Blfd.	Arakan.
vulcani Blfd.	Ava, Ober-Birma.

b. Subgenus *Chamalycaeus* n.

andamaniae Bens.	.	.	:	.	Andamanen.
brahma G. Austen	Brahamakund.
bustyi G. Aust.	Nicobaren.
canaliculatus Mlldff.	Samui, Golf von Siam.
caroli Semp.	Luzon.
celebensis Mrts.	Luvu, Celebes.
cyphogyrus Q. et Mlldff.	Catanduanes, Luzon.
diminutus Heude	.	.	,	.	Tschenkou, China.
diplochilus Mlldff.	.	,	.	.	Perak.
dolichodeirus Heude	Tschenkou, China.
dolomiticus Heude	Kiangsi, "
elevatus Heude	Tschenkou, "
excisus Mlldff.	Sulu Inseln.
fargesianus Heude	Tschenkou, China.
helicodes Grdl.	Hunan und Hubei, China.
hungerfordianus Nev.	Nordformosa.
inflatus G. Aust.	Nagaberge, Nordostindien.
ingrami Blfd.	Arakan, Nord Kaschar.
japonicus Mrts.	Südjapan.
jousseaudi de Morg.	Perak.
latecostatus Mlldff.	Lo-fou-schan, China.
microconus Mlldff.	Perak.
microdiscus Mlldff.	"
möllendorffi Kob. (= inflatus Mlldff. nec G. Aust.)	Hunan, China.
montanus Nev.	Sikkim.
muciferus Heude	Tschenkou, China.
nagaënsis G. Aust.	Naga Berge, Nordostindien.
nanus Mlldff.	Hunan, China.

<i>neglectus</i> Heude	Ansui, China.
<i>nipponensis</i> Reinh.	Südjapan.
<i>nitidus</i> Blsd.	Arakan.
<i>oligopleuris</i> Mlldff.	Perak.
<i>parvulus</i> Mlldff.	"
<i>physis</i> Bens.	Darjiling, Himalaya.
<i>planorbulus</i> Heude	Tschenkou, China.
<i>plicilabris</i> Mlldff.	Hunan,
<i>quadrasi</i> Mlldff.	Cagayan, Luzon.
<i>rathouesianus</i> Heude	Kiangsu, China.
<i>sculptilis</i> Bens.	Thyet Myo, Birma.
<i>sinensis</i> Heude	Ansui, China.
<i>spratti</i> G. Aust.	Shanberge, Hinterindien.
<i>stoliczkai</i> G. Aust.	Nagaberge Nordostindien.
<i>strigatus</i> G. Aust.	" "
<i>tomotrema</i> Mlldff.	Montalban, Luzon.
<i>umbonalis</i> Bens.	Birma.

c. Subgenus Charax Benson.

<i>anthostoma</i> Mlldff.	Hubei, China
<i>armillatus</i> Bens.	Thyet Mio, Birma.
<i>avae</i> Blsd.	Ava, Arakan.
<i>bicrenatus</i> G. Aust.	Nagaberge, Assam.
<i>bifrons</i> Theob.	Shan Staaten, Hinterindien.
<i>birugosus</i> G. Aust.	Khasi Berge.
<i>chenelli</i> G. Aust.	Naga-Berge.
<i>erenatus</i> G. Aust.	Nord Kaschar.
<i>crenulatus</i> Bens.	Sikkim, Himalaya.
<i>crispatus</i> G. Aust.	Nordostindien.
<i>cristatus</i> Mlldff.	Hunan, China.
<i>cucullatus</i> Theob.	Shan Staaten.
<i>damsangensis</i> G. Aust.	West Bhutan.
<i>diagonius</i> G. Aust.	Nord Kaschar.
<i>digitatus</i> H. Blsd.	Darjiling, Himalaya..

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Dreissigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel zweimonatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Aeltere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn** in Berlin zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Studien zur Zoogeographie von Dr. W. Kobelt. II. Band. Die Fauna der Meridionalen Sub-Region. Wiesbaden (C. W. Kreidel) 1898, gr. 8°, 368 pp.

Von

Dr. O. von Möllendorff.

Auf den ersten ist schon binnen Jahresfrist der zweite Band des werthvollen Werkes gefolgt, welcher die Fauna des südlichen Gebietes der paläarktischen Region, nämlich die Pontus-Länder, den Kaukasus, Mesopotamien, Persien und Arabien, das Mittelmeer und seine Umgebungen behandelt. Es wird eine Uebersicht der Wirbelthierfauna sowie der Flora der Mittelmeirländer gegeben und sodann ihre Binnenmolluskenfauna eingehend behandelt, welche

sich in die mauritanisch-andalusische, die tyrrhenische Provinz, Italien, die Balkanhalbinsel, Kleinasien und Syrien-Palästina-Egypten gliedert.

Bei der überaus grossen Fülle des Stoffes muss sich die Besprechung auf eine kurze Inhaltsübersicht und gelegentliche ergänzende Bemerkungen beschränken. Im ersten Kapitel wird zunächst die Fauna des Pontus besprochen und auf seine Gliederung in ein flaches nördliches und ein tieferes südliches Becken hingewiesen. Das erstere ist eine Abtheilung der grossen aralokaspischen Senke, welche seit der mittleren Tertiärperiode Meer geblieben ist, während die südliche Hälfte ein viel jüngeres Einsturzbecken ist und seinen Salzgehalt erst verhältnissmässig spät erhalten hat, nachdem die Verbindung mit dem Mittelmeer hergestellt war. Danach ist die Fauna des Pontus aus zwei verschiedenen Quellen hervorgegangen, deren Abkömmlinge sich noch heute trennen lassen und räumlich sowohl horizontal als auch vertikal geschieden sind. Dies wird an den einzelnen Thierklassen klar nachgewiesen. Es folgt die Darstellung der Gliederung der Küstenländer und der wahrscheinlichen Entstehung des Bosporus, den Kobelt für eine spätere Grabensenke hält. Auch die Bildung der eigenthümlichen Limane Südrusslands wird besprochen; hierzu möchte ich erwähnen, dass auch A. Philippson neuerdings (Zeitschr. d. Ges. f. Erdk. Berlin XXXIII 1898 p. 108) ihre Entstehung auf Senkung der Küste in jüngster geologischer Zeit und in Folge dessen Ueberschwemmung vom Meere aus zurückführt. Vom Standpunkt des Malakologen sind zwei Thatsachen hervorgehoben, einmal dass die ganze Molluskenfauna der Küsten des Marmarameeres keinen mediterranen Charakter trägt, und dass das Gebiet östlich der unteren Maritza nicht mehr zu Europa gehört, also nicht Bosporus, Marmarameer und Hellespont die

faunistische Grenze zwischen Europa und Asien bilden, sondern der Zug tertärer Gesteine, welcher von der Maritza zum Pontus nachgewiesen ist.

Aus der Fauna der Krim ist bemerkenswerth dass auch sie aller mittelmeerischen Anklänge ermangelt, dass sie gegen 20 Arten mit der alpinen und germanisch-borealen Region gemeinsam hat, dagegen eine ausgesprochene Verwandschaft weder mit dem Balkan noch mit dem Kaukasus aufweist. Etwas mehr als die Hälfte der Arten sind endemische Formen, was für eine sehr frühe Isolirung spricht.

Das II. Kapitel behandelt den Kaukasus in ausführlicher Weise; die Hauptresultate vom malakologischen Standpunkte sind, dass mit den Algen nur die durch das ganze paläarktische Gebiet verbreiteten Arten gemeinsam, die Charaktergruppen völlig andere sind, dass der Kamm des Hochgebirges nur für wenige Arten eine Verbreitungsgrenze bildet, dass die Südgrenze der kaukasischen Provinz von der Bergkette südlich des Araxes und dem Rande des Absturzes zur Kaspischen Senke gebildet wird. Die Hauptcharaktergruppe der kaukasischen Heliciden, Fruticocampylaea, vergleicht Kobelt richtig mit der centralasiatisch-chinesischen Gruppe Cathaica; ich bin sogar fest überzeugt (obwohl eine anatomische Untersuchung der kaukasischen Arten noch aussteht), dass die beiden Gruppen generisch zusammengehören und das die Arten des Kaukasus ebenso ein Relikt aus einer früheren klimatisch günstigeren Periode bilden, wie die Phaedusa und Cyclotus-Arten Transkaspiens. Wir müssen annehmen, dass die Verbreitung dieser Arten durch die Gebirge Chorassans und Afghanistans bis zum Hindukusch und Ostturkestan in früherer Zeit eine ununterbrochene war. Auch von Ostturkestan bis Nordwestchina muss am Nordrande des Altyn Tagh und Nanschan vor der Verlössung ein für Schnecken günstigeres Klima

geherrscht haben; heute ist die Verbreitung der *Fruticocampylaea* zwar unterbrochen, aber etappenweise bis China nachweisbar.

Das merkwürdige Vorkommen von *Eulota fruticum* und *Clausilia laminata* in Cisaukasien lässt sich nach Kobelt auf zwei Weisen erklären: einmal dadurch dass die südrussische Steppe doch früher bewaldet war und die erwähnten Arten ein Relikt aus dieser Zeit bilden oder dass eine Einwanderung in späterer Zeit etwa etappenweise von Nordwesten her erfolgte, als sich in der Steppe noch mehr Waldinseln fanden als heute. Dazu möchte ich bemerken, dass die Eulotiden nach meiner Erfahrung gegen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen weniger empfindlich sind als die meisten anderen Heliciden, daher ihre reiche Entwicklung in Centralasien und China. *Eulota fodiens*, welche nach der Schale wie der Anatomie unsrer *fruticum* sehr nahe steht, hat sich in dem heissfeuchten Klima der Philippinen ebenso heimisch gemacht, wie ihre Verwandten im trocknen und durch grosse Temperaturextreme ausgezeichneten Klima Nordchinas. Dass grade diese Gattung die trennende Steppe überschritten hat, würde die zweite Erklärung Kobelts plausibler machen. Schwieriger ist aber das Ueberspringen der *Clausilia* zu erklären; für sie erscheint die erstere Lösung der Frage entschieden als die wahrscheinlichere. Zu der Frage der früheren Ausdehnung der Wälder im Steppengebiet ist ein Aufsatz von M. Bogdanow (1871) von Interesse, den der von Kobelt citirte Köppen zwar benutzt, den aber erst Nehring (Zeitschr. d. Ges. f. Erdk. Berlin 1891 p. 297—351) ausführlich ans Licht gezogen hat. Nach ihm ist der Tschernosem ein Zersetzungprodukt von Landpflanzen und zwar durchaus nicht blos der Steppen, sondern auch der Wald-Vegetation und er nimmt nach den thierischen und pflanzlichen Resten an, dass zeitweilig ein gemässigtes feuchtes

Klima in jenem Gebiet geherrscht haben muss, in welcher Periode die Wälder im Kampfe mit der Steppenflora im Vortheil waren, ohne die letztere ganz zu verdrängen. Es ist daher sehr wohl möglich, dass eine geschlossene Waldverbindung zwischen Kaukasus und dem nordeuropäischen Faunengebiet existirt hat.

Mesopotamien, Persien und Arabien behandelt das III. Kapitel, in welchem die im ersten Bande schon erfolgte Zuweisung dieser Gegenden zur paläarktischen Provinz trotz der Einmischung tropisch-indischer Typen näher begründet wird. Was speziell Arabien anbelangt, so ist die kleine Fauna des südlichen Küstengebiets schwerlich, wie Bourgnigat wollte, glatt zum „Centre malgache“ zu rechnen. Ich finde vielmehr mehrfache indische Züge darin, namentlich die vermeintliche *Trochomorpha sabaea* Marts. Sie ist eine sichere Naninide und schliesst sich am ehesten an *Bensonia* an.

Die allgemeinen Betrachtungen über das Mittelmeer, seine Fisch- und Molluskenfauna, seine Westgrenze, welche für den Geologen schon weiter als die Strasse von Gibraltar reicht, für den Zoogeographen aber das ganze als lusitanisch bezeichnete Meeresgebiet mit einbegreift, die Gliederung in mehrere wohlgeschiedene Faunengebiete, seine geologische Geschichte füllen das 4. Kapitel, dem sich in den folgenden die Besprechung der Säugetier-, Vogel-, Amphibien- und Reptiliensfauna der meridionalen Region und ihrer Flora anschliesst. Auch hier eine reiche Fülle von Beobachtungen und Ausblicken in grosse zoographische Fragen, die eines Auszugs kaum fähig sind. Mit Kapitel VIII beginnt die Uebersicht der Binnenmolluskenfauna der Mittelmeerländer. Es wird die Verbreitung der Hauptgattungen namentlich der für das Gebiet charakteristischen Gruppen geschildert und damit die Eintheilung in die Eingangs schon erwähnten Provinzen begründet. Es folgt

dann die Besprechung der einzelnen Faunen (Kap. IX—XIV), welche in lichtvoller Weise die jeweiligen Eigenthümlichkeiten und das Verhältniss zu den Nachbarfaunen hervorhebt, stets die oro- und hydrographischen, die geologischen und klimatischen Verhältnisse berücksichtigend und die Resultate der Molluskenverbreitung mit der der andern Thierklassen vergleichend. Für den reichen Inhalt dieser Kapitel, die ganz besonders geeignet sind die Wichtigkeit der Binnenmollusken für die Zoogeographie und Erdgeschichte in das rechte Licht zu setzen, muss auf das Werk selbst verwiesen werden, da auch ein beschränkter Auszug die Besprechung ungebührlich verlängern würde; ich beschränke mich vielmehr auf einzelne Bemerkungen.

p. 205. *Hyalinia tetuanensis* Kob. vergleicht der Autor mit der tertiären Gruppe *Omphalosagda*. Wenn dieser Name eine Verwandtschaft mit Sagda ausdrücken soll, so erscheint er mir unglücklich gewählt; es ist doch nur eine allgemeine habituelle Aehnlichkeit vorhanden. Ich glaube vielmehr dass *Omphalosagda* eine Naninide und zwar mit *Bensonia* und *Zonites* verwandt ist. Die Gesamtform der Tetuanerin ist der fossilen *O. goldfussi* allerdings recht ähnlich, auch die Streifung der Oberseite, doch sind bei *tetuanensis* deutliche Spirallinien vorhanden und ich möchte sie trotz dem hohen Gewinde doch bei *Retinella* lassen. Hierdurch würde die von Kobelt hervorgehobene Analogie in der Verbreitung dieser Gruppe mit *Glaudina* noch grösser.

p. 206. Die Gattung *Leucochroa*, welche auf die Mittelmeerländer beschränkt und fossil nur aus dem Pleistocän bekannt ist, hält Kobelt trotz dem wegen ihrer eigenthümlichen, lückenhaften Verbreitung für geologisch sehr alt. Wenn Pilsbrys Auffassung der anatomischen Verhältnisse richtig ist, so würde sich eher ergeben, dass sie eine spätere Weiterentwicklung von *Xerophila* ist.

Er rechnet sie zu den ersten Heliciden (Belozona) und nimmt an, dass der glatte (aber nicht dünne) Kiefer und der Verlust des Liebespfeiles „sekundäre Modifikationen“ seien, während im übrigen eine deutliche Verwandtschaft mit *Xerophila* bestehe. Wir müssten danach annehmen, dass die Entstehung dieses Typus in eine neuere Periode falle, wie ja auch *Xerophila* selbst meines Wissens geologisch nicht älter belegt ist als im Pleistocän. Auch die letztere Gattung ist wesentlich meridional, wenn auch einzelne Arten in das boreale Gebiet eingewandert sind. Weiter als Ostturkestan ist sie mir nicht bekannt. Dass sie möglicherweise bis Westchina reiche, war eine Vermuthung meinerseits, die sich nicht bestätigt hat. Die fraglichen Arten gehören zu Cathaica.

p. 222. Das Zurücktreten von *Torquilla* nach Süden wird noch deutlicher, wenn man *Modicella*, welche Westerlund mit *Torquilla* vereinigt, als Untergattung (nach Boettger sogar als Gattung) abtrennt. *Torquilla* erscheint dann wesentlich als alpin-pyrenäisch, nur wenige Arten nach Süden entsendend, *Modicella* mehr als meridional, von welcher nur ganz wenige Arten in das boreale Gebiet eingewandert sind.

p. 231. Zu der marokkanischen Gruppe *Xeroleuca* ist zu bemerken, dass die Gruppe *Craspedaria* (*delphinula* Lowe) von Madera höchstwahrscheinlich zu ihr zu rechnen ist, wie ja auch umgekehrt die makaronesische *Ochthephila* nach Marocco übergreift.

p. 258. *Pomatia melanostoma* ist in Südfrankreich doch wohl eingeschleppt, vielleicht schon zur Römerzeit zu Speisezwecken angesiedelt.

p. 307. Dass die Gruppe *Campylaea cyclolabris* zu *Cressa* hinüberleitet, ist mir schon von conchyliologischen Standpunkt nicht recht einleuchtend, nach dem anatomischen Befund aber nur dann anzunehmen, wenn auch

- die Gruppe von *cyclolabris* von den ächten *Campyläen* verschieden wäre und zu den *Fruticicolen* gehörte. Dies ist aber nach Hesse (J. D. M. G. 1884 p. 242) nicht der Fall. Uebrigens darf die Gruppe der *H. pellita* Fér. weder *Pseudocampylaea* Hesse (wegen *Pseudocampylaea* Pfr. 1877), noch *Cressa* Westerl. (wegen *Cressa* Böck. 1871) heissen, sondern muss den Ihering'schen Namen *Metafruticicola* (Z. f. wiss. Zool. 1892 p. 452) führen.
- p. 312. Dass die merkwürdige *Helicophana aegopinoides* von Kreta überhaupt zu *Hyalinia* gehört, steht wohl kaum schon fest, trotz der Untersuchung von Kiefer und Radula durch Hesse (J. D. M. G. 1884 p. 227); ich glaube eher an *Zonites*, wogegen der Befund nicht sprechen würde.
- p. 317. Der Fundort für *Campylaea hemonica* Thiesse „Kalembaka“ dürfte Kalambaka-Stagus, nordwestlich von Trikkala, sein, also, wie Kobelt richtig vermutete, noch in Thessalien.
- p. 336. Es kann wohl kaum ein Zweifel bestehen, dass *Helix lycica* und *callirhoe* Codringtonia und Levantina verknüpfen und dass die beiden Gruppen genetisch zusammengehören, denen sich die angeblichen *Macularia massylaca* und *punica* anschliessen (Sect. *Massylaea* m.). Wir hätten somit 3 Reliktengruppen, deren gemeinsame Abstammung, wie Kobelt selbst (p. 238) angiebt, in die Zeit fällt, in welcher das hintere Mittelmeer noch mit Land erfüllt war.
- p. 349. Ich glaube, dass *Cristataria* nicht mit *Albinaria*, sondern mit *Oligoptychia* näher verwandt ist, was schon durch die braunen, glänzenden Arten wie *vesicalis* wahrscheinlich wird. Wenn mit der angeblichen *Idyla* aus Syrien *cedretorum* Bgt. gemeint ist, so gehört diese Art wohl sicher zu *Bitorquata* Btg.
- p. 352. *Xerophila philamnia* würde ich nicht zu *Turricula*

stellen, sondern für sie und *X. ptychodia* Bgt., *berenice* Kob., *libyca* Kob., vielleicht auch *tuberculosa* Conr. die libysch-syrische Gruppe *Xeroptychia* Monter. annehmen. Wie Kobelt (p. 356) selbst hervorhebt, sind diese Wüstenformen eher von *Xeroleuca* als von *Turricula* abzuleiten.

Doch genug der kritischen Bemerkungen. Sie dienen eher als Beweis, wie wenig auch ein Fachgenosse dem ausgezeichneten Werke hinzuzufügen findet. Möchte Verfasser seine anregenden und gediegenen Studien bald auch auf die aussereuropäischen Länder, namentlich Asien, ausdehnen, so dass wir bald in den Besitz eines dritten Bandes gelangen!

Kowno, Juli 1898.

Literatur.

The Nautilus vol. XII.

- p. 1. Aldrich T. H., Notes on some Land and Freshwater Shells from Sumatra, with Descriptions of New Species. — Von Marang werden 38 Arten aufgeführt, davon neu: *Hemiplecta marangensis* p. 2 t. 1 fig. 9, 10; — *Sitala carinifera* var. *marangensis* p. 2 t. 1 fig. 6; — *Trochomorpha dohertyi* p. 2 t. 1 fig. 7, 8; — *Lagocheilus marangensis* p. 3 t. 1 fig. 5; — *Omphalotropis dohertyi* p. 3 t. 1 fig. 1, 2; — *Leptopoma fultoni* p. 3 t. 1 fig. 11, 12; — *Diplommatina luvaënsis* p. 4 t. 1 fig. 3, 4. —
- p. 4. Dall, W. H., on a new species of Fusus from California (*T. roperi*, Typus der neuen Sektion Roperia).
- p. 5. Wright, Berlin H., new Unionidae. (*U. strodeanus* von West-Florida; — *U. cylindricus* v. *strigillatus*, Clinch River, Va.). —

Le Naturaliste Année XIX.

- p. 222. Ancey, G. F., Description d'un Mollusque nouveau (*Leptachatina approximans* von Oahu).
- p. 250. Jousseaume, D., Description d'une Coquille nouvelle (*Cyclophorus vesconesi* aus Ecuador). —

p. 265. Jousseaume, Dr., Description d'une Coquille nouvelle. (*Dryptus flori* von Machala in Ecuador; — *Diabolica*, eine Nuculida mit vorn verkümmerten Schloss.

— — Annee XX.

p. 14. Jousseaume, Dr., Description de Coquilles nouvelles. — *Hamadryas rabuti* und *Drymaeus andai* von Tana in Ecuador. — (p. 22) *Latiaxis coutierieri* von Neu Britannien (fig.); — *Jssina issina* n. gen. et spec., *Erycina* verwandt. Djibuti p. 81; *Cardium vulva* Japan; p. 106 *Sureula bouvieri* unbekannten Fundortes, *Otitoma otitoma* n. gen. et spec. von Djibouti, *Canilla sura* von den Andamanen, *Thala malvacea* von Djibouti.

Hrvatsko Naravoslovno Drustvo. (Societas Historico-naturalis croatica). X Godina. Agram 1898.

p. 193. Brusina. Sp. Prilog za malakolosku Faunu Novoy Vinodolskoga. Kroatisch. Es werden 50 sp. aufgezählt, für *Cerithium renovatum* Mrt. = *vulgatum* var. *pulchella* Phil als ältester Name *Cer. aluchense* (Chieregh.) Nardo eingeführt.

p. 198. *Dreissensia torbari* i srodne joi palearticke vrste. Die fossile *Dreissusia* Slavoniens wird als Art abgetrennt. Br. erkennt folgende lebende Arten des paläarktischen Gebietes an: *Congeria cochleata* Kickx aus Belgien; — *Dreissensia polymorpha* Pall, weit verbreitet; — *Dr. blanci* Westerl. Albanien, Griechenland, Kleinasien; — *Dr. andrusowi* Brus., kaspisches Meer; — *Dr. caspia* Eichw., kaspisches Meer; — *Dr. bugensis* Andr. Bug; — *Dr. pallasi* Andr., Aralsee; — *Dr. bourguignati* Loc., Syrien, Mesopotamien; — *Dr. rostriformis* Desh., Kaspi; — *Dr. grimmi* Andr., Kaspi. —

Andrusov, M., Fossile und lebende Dreissensidae Eurasiens. Mit 15 Figuren im Text und 20 Tafeln. Petersburg 1897.

Russisch geschrieben. —

Gredler, P. Vincenz, zur Conchylienfauna von China. XIX. Stück. — Separatabzug aus dem Gymnasialprogramm von Bozen 1998. Mit Tafel.

Enthält eine Anzahl von Potanin in Gansu gesammelte Nova: *Napaeus Möllendorffii* var. *concolor* p. 4; — *U. vincentii* p. 5 fig. 1; — *Bul. pupopsis* p. 6 fig. 2; — *Zebrina schafewi* p. 7 fig. 3; — *Bul. hyacinthi* p. 8 fig. 4; — *Bul. rhabdites* p. 9

fig. 5; — *Serina* n. gen. für Buliminiden mit doppeltem, weit ausgebreiteten, zusammenhängendem Mundsaum mit 3 Arten: *S. cathaica* p. 11 fig. 7; — *S. ser.* p. 11 fig. 8; — *S. sub.ser.* p. 12 fig. 9. — Wir geben einen Abdruck der Diagnosen, da das Bozener Gymnasialprogramm schwerlich in viele Hände kommt.

Journal de Conchyliologie vol. 45 No. 4 (1897).

p. 209. Fischer, H., Resumé des travaux de M. F. Bernard sur le développement de la coquille des Pelecypodes.

p. 225. Hervier, le R. P. J., Descriptions d'espèces nouvelles de Mollusques provenant de l' Archipel de la Nouvelle. — Calédonie (suite). Von schon früher beschriebenen Arten werden abgebildet: *Mangilia isodoma* t. 9 fig. 1; — *M. isophanes* t. 9 fig. 2; — *M. colombi* t. 9 fig. 3; — *Mitra amaura* t. 9 fig. 4; — *Gostellaria rufobalteata* t. 9 fig. 5; — *Gost. pagodula* t. 9 fig. 6; — *C. humilis* t. 10 fig. 1; — *C. diamesa* t. 10 fig. 2; — *C. ochracea* t. 10 fig. 3; — *C. albotaeniata* t. 10 fig. 4; *C. lanceolata* t. 10 fig. 5; — *Pusia aubryana* t. 10 fig. 6; — *P. loyaltyensis* t. 10 fig. 7; — *P. rhodochroa* t. 10 fig. 8; — *P. roseotincta* t. 10 fig. 9. —

p. 249. Hervier, le Rev. P. I., Diagnoses d'espèces nouvelle de Triforais provenant de l'Archipel de la Nouvelle-Calédonie (suite). Neu *Jniforis cornuta* p. 249; — *Jn. Jousseauini* p. 250; — *Jn. goubini* p. 251; — *Jn. formosula* p. 251; — *Jn. poecila* p. 252; — (*Mastaniaeforis* (*violacea* Quoy var. *minor* p. 253; — *Jnella montrouzieri* p. 253; *Jn. episcopalis* p. 254; — *Jn. melantera* p. 254; — *Jn. rutilans* p. 255; *Jn. aurea* p. 256; — *Mastonia loyaltyensis* p. 256; — *M. monacha* p. 257; — *M. taeniolata* p. 258; — *M. fulvescens* p. 258; — *M. papillata* p. 259; — *M. mediotincta* p. 259; — *M. ustulata* p. 260; — *M. leueomys* p. 261; — *M. lucidula* p. 261; — *M. lamberti* p. 262; — *M. troglodytes* p. 263; — *M. turricula* p. 263; — *M. quadrimaculata* p. 264; — *M. amoena* p. 264; — *Viriola intergranosa* p. 266. —

The Journal of Conchology, vol. 9 No. 3. Juli 1898.

- p. 75. Melvill, J. G. and Standen, R., the Marine Mollusca of Madras and the immediate neighbourhood (cont.)
- p. 85. Melvill, J. G., Note on *Cypraea rashleighana*.
- p. 86. Oldham, C., Notes on some Anglesea Land- and Fresh-water Mollusca.
- p. 89. Hann, Rev. A., *Paludestrina jenkinsi* near Middlesborough.

- p. 91. Horsley, J. W., *Hyalinia cellaria* in Walworth.
p. 92. Adams, L. E., Observations on the pairing of *Limax maximus* L.
p. 95. Standen, R., Note on *Terebra eximia* Dh.
p. 95. Collinge, Walter, E., Note on a new variety of *Testacella maugeri*.

Kobelt, Dr. W., Studien zur Zoogeographie. Zweiter Band.
Die Fauna der meridionalen Subregion. Wiesbaden,
Kreidel 1898. No. 368 P.

Eine eingehende Besprechung dieses Bandes welcher die paläarktische Fauna zum Abschluss bringt, siehe oben.

Verrill, A. E., and Katharine J. Busch, Revision of the Deep-Water Mollusca of the Atlantic Coast of North America, with descriptions of new Genera and Species.
— Part I. *Bivalvia.* In Proc. U. S. Nat. Museum Vol. 20 p. 775—901. pl. 71—97.

Als neu beschrieben werden: *Martesia* (*Martesiella* n. subg.) *fragilis* p. 777 t. 79 fig. 10; — *Abra longicallis*, var. *americana* p. 778 t. 83 fig. 6. 7; — *Montacuta bidentata* var. *tenuis* p. 779 t. 92 fig. 7; var. *fragilis* p. 780 t. 92 fig. 8; — *M. striatula* p. 780 t. 93 fig. 9; — *M. casta* p. 781 t. 94 fig. 5; — *M. cuneata* p. 782 t. 91 fig. 4 t. 93 fig. 5; — *M. triquetra* p. 782 t. 91 fig. 3; — *Kelliopsis* n. gen. für *Montacuta elevata* Stimp. p. 783; — *Cryptodon insignis* sp. 785 t. 91 fig. 1. 2; — *Cr. croulinensis* var. *altus* p. 787 t. 88 fig. 1. 2; — *Cr. equalis* p. 788 t. 91 fig. 5. 6; — *Cr. planus* p. 788 t. 88 fig. 3. 4; — *Cr. obsoletns* p. 789 t. 89 fig. 1. 2; — *Cr. (Axinulus* n.) *brevis* p. 790 t. 89 fig. 7. 8; — *Cr. (Ax.) inequalis* p. 791 t. 90 fig. 1. 2; — *Cr. (Ax.) simplex* p. 791 t. 92 fig. 3. 4; — *Cr. (Ax.) pygmaeus* p. 792 t. 86 fig. 3. 4; — *Cr. (Ax.) ovatus* p. 793 t. 91 fig. 7, t. 93 fig. 1; — *Axinopsis orbiculata* var. *inaequalis* p. 794 t. 92 fig. 5. 6; — *Ax. cordata* p. 795 t. 97 fig. 5. 6; — *Axinodon* (n. gen.) *ellipticus* n. p. 796 t. 90 fig. 5. 6, t. 92 fig. 1; — *Leptaxinus* (n. gen.) *minutus* p. 797 t. 89 fig. 3—5; — *Cuspidaria turgida* p. 799 t. 72 fig. 7, t. 77 fig. 4; — *C. media* p. 800 t. 71 fig. 5. 6, t. 73 fig. 6; — *C. parva* p. 801 t. 74 fig. 9, t. 77 fig. 7; — *C. ventricosa* p. 802 t. 72 fig. 5, t. 76 fig. 6; — *C. formosa* p. 803 t. 74 fig. 6, t. 79 fig. 9; — *C. fraterna* p. 803 t. 71 fig. 7. 8, t. 75 fig. 6; — *Cardiomya abyssicola* p. 806 t. 73 fig. 4, t. 74 fig. 1, t. 77 fig. 9; — *C. gemma* (= *Neaera paucistriata* Busch nec. Dall.) p. 809 t. 71 fig. 3. 4, t. 14 fig.

11; — *C. glypta* Busch (=ornatissima Dall) p. 810 t. 71 fig. 1, t. 76 fig. 3. 7; — *Halonympha striatella* p. 810 t. 72 fig. 2. 3, t. 77 fig. 3; — *Myonera pretiosa* p. 812 t. 77 fig. 5; — *Poromya sublevis* var. *microdonta* p. 813 t. 76 fig. 1, 2, t. 87 fig. 1; — *Cetoconcha aptycha* p. 814; — *Lyonsiella cordata* p. 818 t. 95 fig. 7. 8; — *Lyonsia granulifera* p. 818 t. 95 fig. 1; — *Clidiophora inornata* p. 818 t. 95 fig. 5. 6; — *Kennerlia brevis* p. 821 t. 88 fig. 7; — *Periploma affinis* p. 822 t. 87 fig. 4; — *Limatula regularis* p. 823; — *L. nodulosa* p. 824; — *L. hyalina* p. 825; — *Chlamys benedicti* p. 834 t. 84 fig. 1. 2 — *Chl. costellata* p. 835 t. 86 fig. 6; — *Hyalopecten dilectus* p. 836 t. 97 fig. 9; — *Cyclopecten nainis* p. 837 t. 85 fig. 2—4; — *Cyclopecten subimbrifer* p. 840 t. 85 fig. 8. 9; — *Bathyarea abyssorum* p. 843 t. 76 fig. 9; — *B. anomala* p. 844 t. 77 fig. 8; — *Limopsis sulcata* p. 845 t. 92 fig. 2, t. 95 fig. 9, t. 96 fig. 1; — *Nucula proxima* var. *ovata* p. 852 t. 81 fig. 6, t. 88 fig. 5; — *N. subovata* p. 852 t. 81 fig. 8 t. 83 fig. 5; — *Ledella messanensis* var. *sublevis* p. 856 t. 81 fig. 7; — *Ledella parva* p. 857 t. 81 fig. 1; — *Yoldia (Abranella) n. casta* p. 858 t. 80 fig. 4; — *Yoldiella iris* p. 863 t. 80 fig. 1. 2, t. 82 fig. 11; — *Yoldiella inflata* p. 864 t. 80 fig. 8 t. 82 fig. 5. 6; — *Y. subangulata* p. 865 t. 77 fig. 3, t. 79 fig. 6; — *Y. lenticula* var. *amblia* p. 866 t. 80 fig. 9, t. 81 fig. 4; — *Y. fraterna* p. 867 t. 80 fig. 5, t. 82 fig. 8; — *Y. curta* p. 868 t. 97 fig. 8; — *Y. pachia* p. 868; — *Y. inconspicua* p. 869 t. 79 fig. 3. 5; — *Y. minuscula* p. 870 t. 79 fig. 2. 7; — *Y. dissimilis* p. 872 t. 78 fig. 8, t. 82 fig. 7; — *Malletia abyssorum* p. 875 t. 87 fig. 7; — *M. polita* p. 876 t. 82 fig. 10; — *Neilonella subovata* p. 878 t. 80 fig. 10, t. 82 fig. 3. 4; — *Tindaria callistiformis* p. 881 t. 78 fig. 1, t. 80 fig. 6. 7; — *T. lata* p. 882; — *Solemya grandis* p. 884 t. 86 fig. 1. 2. —

Sturany, Dr. Rud., Katalog der bisher bekannt gewordenen südafrikanischen Land- und Süßwasser Mollusken mit besonderer Berücksichtigung des von Dr. Penther gesammelten Materiales. Vorläufige Mittheilung in Akadem. Anzeiger Wien 1898 No. XVI.

Als neu beschrieben werden: *Ennea perspicuaeformis* p. 1; — *E. gouldi* var. *excedens* *E. transiens*, *E. differens*, *E. separata* p. 2; — *E. ingens*, *E. sejuncta*, *E. instabilis*, *E. ampullacea* p. 3; — *E. multidentata*, *E. durbanensis*, *E. perissodonta* p. 4; —

E. isipingoënsis nebst var. *discrepans*, *simillima* und *cylindrica*
E. leppani p. 5; — E. amoldi, mit var. *elongata*, E. pentheri,
Achatina pentheri p. 6; — *Livinacia arnoldi*, *Opeas durbanense*,
Rhachis dubiosus, *Rh. pentheri* p. 7; — *Buliminus movenensis*,
Pupa pentheri, *Succinea dakaënsis*, *Limnaeus dakaënsis* p. 8;
— *Vivipara unicolor* var. *sambesiensis*, *Unio casser* var. *pen-*
theri, *Spatha maitenguensis* p. 9. —

*Sarasin, Dr. P. und Dr. F., Materialien zur Naturgeschichte
der Insel Celebes. Erster Band: die Süßwasser-Mollusken
von Celebes.* Mit 13 Tafeln. Wiesbaden, Kreidel 1898.

Der erste Band eines auf drei Bände berechneten Prachtwerkes, der zweite soll die Landmollusken behandeln, der dritte die geographische Stellung von Celebes. Als neu beschrieben und vorzüglich abgebildet werden folgende meist schon im Zoolo-
gischen Anzeiger beschriebene Arten: *Melania toradjarum* p.
14 t. 1 fig. 1. 2; — *M. palicolarum* p. 16 t. 1 fig. 3. 4; —
M. patriarchalis p. 17 t. 1 fig. 5. 6; nebst var. *towietensis* p.
p. 19 t. 1 fig. 7. 8; — *M. gemmifera* p. 20 t. 1 fig. 9. 10; —
M. monacha p. 21 t. 3 fig. 37. 38; — *M. scalariopsis* p. 22
t. 2 fig. 18. 19; — *M. molesta* p. 23 t. 2 fig. 11. 12; — *M.*
carota p. 28 t. 3 fig. 28. 29; — *M. testudinaria* var. *perconica*
p. 28 t. 3 fig. 33. 34; — *M. zeamais* p. 30 t. 3 fig. 35. 36; —
M. insulae sacrae p. 32 t. 2 fig. 20. 21; — *M. tomoriensis* p.
33 t. 4 fig. 48. 49; — *M. kuli* p. 35 t. 2 fig. 15—17; — *M.*
M. centaurus p. 36 t. 2 fig. 13. 14; — *M. asperata* var. *cele-*
bicola p. 37 t. 3 fig. 30—32; — *Tylomelania* (n. gen.) *neriti-*
formis p. 52 t. 4 fig. 56. 57; — *Tyl. carbo* p. 53 t. 4 fig. 50.
51; — *Tyl. porcellanica* p. 54 t. 4 fig. 52. 53 mit var. *connec-*
tens p. 55 t. 4 fig. 54. 55; — *Vivipara crassibucca* p. 60 t. 10
fig. 131. 132; — *Niv. perculpta* p. 62 t. 10 fig. 129. 130; —
Viv. lutulenta p. 63 t. 10 fig. 133. 134; — *Viv. rudipellis* p.
65 t. 10 fig. 135. 136; — *Miratesta celebensis* p. 73 t. 10 fig.
137—139 (var. *robusta*); fig. 140—142 (var. *ampullacea*); fig.
143. 144 (var. *gracilis*); — *Jsidora callosa* p. 79 t. 11 fig. 156.
157; — *Protancylus* (n. gen.) *adhaerens* p. 84 t. 11 fig. 145—
148; — *Pr. pileolus* p. 86 t. 11 fig. 149—151; — *Corbicula*
matannensis p. 92 t. 11 fig. 158—60; — *C. possoënsis* p. 92
t. 11 fig. 161. 162. — Von hohem Interesse ist die genauere
Untersuchung der Melaniendeckel, deren Bau durch Behandeln
mit concentrirter Salzsäure deutlicher gemacht wurde. Es

lassen sich zwei Typen unterscheiden, der eine cerithienartig, spiral gewunden mit centralem Nucleus, wohl phylogenetisch älter (*Palaeomelania*), der andere fast nur aus der letzten Windung bestehend mit einem kleinen, oft verkümmerten Nucleus in der unteren Ecke (*Neomelania*). —

Hofer, Dr., Beitrag zur Molluskenfauna des Kantons Aargau.
In Mitth. aarg. naturfor. Gesellschaft 1898 Hefl
8 p. 38—57.

Aus dem Aargau war seither, nur ein Verzeichniss ohne Fundorte von Bronner veröffentlicht, das obendrein vor caa. 50 Jahren erschienen ist. Der Verfasser hat namentlich die Reussgegend von Mellingen bis Brugg, die Braunegg, die Gegend um Baden und um Kulm berücksichtigt und dem Aargenist besondere Aufmerksamkeit zugewandt. Die Fauna ist die typische der deutschen Schweiz.

Proceedings of the Malacological Society of London,
Vol. III. No. 2.

- p. 63. Sykes, E. R., Descriptions of two new Species of *Clausilia* from the Province of Che-Kiang, China. (*Claus. timalthea* und *labyrinthoides*, beide in Holzschnitt abgebildet).
- p. 65. Sykes, E. R., List of the Species of *Cataulus* found in Ceylon, with descriptions of some new Land-Shells from that Island. With pl. IV. — Neu *Cataulus nevilli* p. 68 t. 5 f. 16; — *C. Colletti* p. 69 t. 5 fig. 15; — *Nicida catathymia* p. 69 t. 5 fig. 9; — *Cyathopoma leptomita* p. 69 t. 5 fig. 8; — *Microcystina lita* p. 70 t. 5 fig. 10. 11; — *Kaliella delectabilis* p. 70 t. 5 fig. 7; — *Sitala pyramidalis* p. 70 t. 5 fig. 18. 20; — *S. operiens* p. 70 t. 5 fig. 12; — *Euplecta praeeminens* p. 71 t. 5 fig. 5. 6; — *Plectopylis* (*Sykesia*) *clathratula* var. *compressa* p. 72 t. 5 fig. 13. 14; — Pl. (S.) *caliginosa* p. 72 t. 5 fig. 21. 22; — *Thysanota eumita* p. 72 t. 5 fig. 17. 18; — *Glessula, collettae* p. 73 t. 5 fig. 1; — *Opeas prestoni* p. 73 t. 5 fig. 4; — *Scabrina brounae* p. 73 t. 5 fig. 2. 3. —
- p. 75. Smith, Edg. A. Notes on the Genus *Coxiella*. — Smith erkennt 3 sp. an: *C. striatula* Mke.=*pyrrhostoma* Cox; *confusa* n.=*striatula* Adcock, Cox, nec Mke; und *Gilesii* (*Paludinella*) Angas=*stirlingi* Tate. —
- p. 77. Kenyon, Mrs. A. F., Note on *Cypraea anguis*, Phil., with the description of a new variety of *C. caput serpentis* (var. *caput colubri*; die Varietäten abgebildet).

Kleinere Mittheilungen.

In Sorauer's „Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten“ (vol. VIII. H. 3) macht E. Rathay auf eigenthümliche wellenförmige Zeichnungen auf Baumrinde aufmerksam, welche auf *Helix hortensis* zurückzuführen sind. Diese weidet nämlich an den glatten Stämmen von Saalweiden, Eschen, Ahorn, Erlen, Platangen u. dgl. die dünne Algenschicht aus *Pleurococcus vulgaris* Menegh. ab, ohne die Rinde im Geringsten zu verletzen und bewegt dabei, während sie in gerader Linie emporsteigt, den Kopf abwechselnd nach rechts und links, und säubert dabei die Rinde. Es nähren sich also selbst grössere Schnecken mit Vorliebe von den winzigen Algen. Bekanntlich weiden die Wasserschnecken (meiner Erfahrung nach mit Ausnahme von *Planorbis corneus* L., der auch gesunde Pflanzen direkt angreift) auch die Scheiben der Aquarien ab und sind von Stein mit Erfolg verwendet worden, um im Warmhause Kulturen von *Ouvirandra fenestralis* von Algen frei zu halten. Es sind offenbar nur die Algen, welche die Tacheen und wahrscheinlich auch *Helix arbustorum* und *Limax arboreum* auf die Bäume locken.

Anzeige.

Ich beabsichtige meine Conchylien-Sammlung zu verkaufen. Dieselbe besteht nur aus Univalven und enthält zahlreiche Marine und Süsswasser-Arten, ist aber namentlich an Landconchylien sehr reich. Sie zählt mehrere tausend Arten.

Villa les Chardonnerets,

Grand Lancy, Genf.

C. P. Gloyne.

Eingegangene Zahlungen:

Dohrn, H., Stettin, Mk. 30.—; Schlüter, W., Halle, Mk. 12.—; Mela, J., Helsingfors, Mk. 30.—; Fruhstorfer, H., Berlin, Mk. 6.—; Bickhardt, H., Wiesbaden, Mk. 6.—; Wohlberedt, O., Triebes, Mk. 6.—; Gloyne, P., Lancy, Mk. 18.—; Andreae, A., Hildesheim, Mk. 6.—; Friedel, E., Berlin, Mk. 6.—; Naturhist. Museum, Lübeck, Mk. 18.—; J. Hofer, Wädenswil, Mk. 18.—; v. Fritsch, K., Halle, Mk. 12.—; Le Sourd, Paris, Mk. 28.—; Rolle, H., Berlin, Mk. 12.—; Braun, M., Königsberg, Mk. 12.—; Borcherding, F., Vegesack, Mk. 6.—; Scharff, F., Dublin, Mk. 6.—; Pfeiffer, K., Kassel, Mk. 12.—; Gude, K., London, Mk. 12.—; Goldfuss, O., Halle, Mk. 6.—; v. Lasser, S., Mittersill, Mk. 6.—; Branesik, K., Trenesin, Mk. 30.—; Pastor, N., Bitsch, Mk. 18.—; Brusina, Sp., Agram, Mk. 18.—; Metzger, A., Münden, Mk. 6.—; Simroth, H., Leipzig, Mk. 6.—; Protz, A., Königsberg, Mk. 6.—; v. Koch, V., Braunschweig, Mk. 12.—.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M., Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben 20. September 1898.

Fortsetzung des Catalogs von No. 7 u. 8 (1898) des Nachrichtenblattes.

dohertyi G. Aust.	Barma.
everetti G. Aust. (broti Aldr.)					Nordborneo.
expatriatus Blfd.	Nilgherries.
footei Blfd.	Südindien.
genimula Bens.	Sikkim, Himalaya.
glaber Blfd.	Arakan.
globulus G. Aust.	Nagaberge, Assam.
hebes Bens.	Teria Ghat, Nordostindien
humilis Blfd.	Pegu.
jaintiacus G. Aust.	Jaintiaberge, Nordostindien.
khasiacus G. Aust.	"
kurzianus Theob. et Stol.	Birma.
longituba Mrls.	Sumatra.
var. latestriata Mlldff	Java.
multirugosus G. Austen	Nagaberge, Assam.
notatus G. Aust.	Dafla Berge.
ochraceus G. Aust.	Ober Barma.
pachitaënsis Godw. Aust.	Assam.
pentagonus Heude	Tschenkou, China.
plectochilus Bens.	Sikkim, Himalaya.
polygonoma Blanf.	Arakan.
prosectus Bens.	Nordostindien.
richthofeni Blfd.	Mulmein, Birma.
spiracellum Ad. et Rve.	Borneo.
strangulatus Hutt.	Himalaya.
stylifer Bens.	Sikkim, Himalaya.
subculmen G. Aust.	Naga Berge.
subhumilis (Nev.) Mlldff.	Sikkim, Himalaya.
succineus Blfd.	Arakan.
theobaldi Blfd.	Khasia Berge, Nordostindien.

8. Familie Diplomatiniidae.

1. Genus *Helicomorpha* Mlldff.

appendiculata Mlldff. . . . Leyte, Philippinen.

conella Mlldff.	.	.	.	Negros, Guimaras, Philippinen
costulata Q. et Mlldff.	.	.	.	Busuanga, Philippinen.
depressa Mlldff.	.	.	.	Leyte, Siquijor, Katanduanes.
var. manopleuris Mlldff.	.	.	.	Südostluzon.
globulus Q. et Mlldff.	.	.	.	Busuanga, Philippinen.
linguifera Q. et Mlldff.	.	.	.	Bohol. "
pilula Q. et Mlldff.	.	.	.	" "
quadrasi Mlldff.	.	.	.	Leyte, "
var. argutecostata Mlldff.	.	.	.	" "
turricula Mlldff.	.	.	.	Cebu, "
var. globosula Mlldff.	.	.	.	Siquijor. "

2. Genus *Nicida* Blanford.

anamallayana Bedd.	.	.	.	Anamalliberge, Südindien.
catathymia Sykes	.	.	.	Ceylon.
ceylanica Bedd.	.	.	.	Ceylon.
fairbanki Blfd.	.	.	.	Pulney Berge, Südindien.
kingiana W. et H. Blfd.	.	.	.	Kolamullies, "
liricincta Blfd.	.	.	.	Khandallah bei Bombay.
nilgirica Blfd.	.	.	.	Nilgiris, Südindien.
nitidula Blfd.	.	.	.	" "
pedronis Bedd.	.	.	.	Ceylon.
prestoni Sykes.	.	.	.	"
pulneyana Blfd.	.	.	.	Pulney Berge, Südindien.
subovata Bedd.	.	.	.	Süd Kanara, "

Genus *Arinia* Ad.

a. Subgen. *Euarinia* s. str. Kob. et Mlldff.

calathiseus Q. et Mlldff.	.	.	Negros, Philippinen.
chrysacme Mlldff.	.	.	Luzon, "
cupidata Mlldff.	.	.	Calamianes "
cylindrus Q. et Mlldff.	.	.	Luzon, "
dichroa Mlldff.	.	.	"
egregia Hedl. et Mus.	.	.	Queensland.
gibbosula Mlldff.	.	.	Luzon, Philippinen.

<i>manopleuris</i> Q. et Mlldff.	.	.	Marinduque.	..
<i>minor</i> Sow. (<i>sowerbyi</i> Pfr.)	.	.	Panay, Guimaras, Tablas.	
var. <i>semisulcata</i> Mlldff.	.	.	Cebu, Siquijor, Siargao.	
„ <i>holopleuris</i>	,	.	Cebu, Bohol, Leyte, Samar.	
„ <i>intermedia</i>	,	.	„	
„ <i>abnormis</i>	,	.	Leyte.	
„ <i>elongata</i>	,	.	Negros.	
„ <i>aurantiaca</i>	,	.	Mindoro.	
<i>ovulum</i> Mlldff.	.	.	Sibuyan, Philippinen.	
<i>pallida</i> Mlldff.	.	.	Benguet auf Luzon.	
<i>scalatella</i> Dohrn	.	.	Arayat „	
<i>tablasensis</i> Hid.	.	.	Tablas, Philippinen.	

b. Subgen. Leucarinia Mlldff.

<i>blanda</i> Sm.	.	.	Flores.	
<i>borneensis</i> Smith.	.	.	Nordborneo.	
<i>contracta</i> Q. et Mlldff.	.	.	Mindanao.	
<i>costata</i> Mlldff.	.	.	Philippinen.	
<i>devians</i> Mlldff.	.	.	„	
<i>minahassae</i> Kob.	.	.	Minahassa, Celebes.	
<i>minutior</i> Mlldff.	.	.	Marinduque.	
<i>minutissima</i> Mlldff.	.	.	Philippinen.	
<i>plagiostoma</i> Mlldff.	.	.	Samal bei Mindanao.	
<i>similis</i> Smith	.	.	Barit, Nordborneo.	
<i>sinulabris</i> Mlldff.	.	.	Samal bei Mindanao.	

Genus Palaina O. Semper.

a. Subgen. Eupalaina Kob. et Mlldff.

<i>alata</i> O. Semp.	.	.	Palaus.	
<i>angulata</i> Bttg.	.	.	Ambon, Haruku.	
<i>aurea</i> Bedd.	.	.	Palaus.	
<i>australiae</i> Bens.	.	.	Mt. Warren, Ost-Australien.	
<i>bensonii</i> H. Ad.	.	.	Moreton Bai, Australien.	
<i>brazieri</i> Cox.	.	.	San Christoval, Salomonen.	

cantori Pfr.	Lord Howes Insel.
capillacea Pfr.	" "
chalarostoma Mlldff.	Tayabas, Luzon.
chordata Pfr.	Lord Howes Insel, Neuseeland?
chrysostoma Smith	Flores
conspicua Mlldff.	Nordluzon.
var. versicolor Mlldff.	"
coxi H. Ad. (wisemani Braz.)	Norfolk.
cristata Q. et Mlldff.	Nordluzon.
var. cristatella Mlldff.	"
deformis Q. et Mlldff.	Katanduanes, Philippinen.
dimorpha Semp. (wilsoni Crosse)	Palaus.
dohertyi Sm.	Neu Guinea.
doliolum (Mouss.) Mlldff.	Ponape, Karolinen.
gedeana Mlldff.	Java.
godeffroyana Mouss.	Viti Inseln.
hidalgoi Q. et Mlldff.	Bohol, Philippinen.
kubaryi Mlldff.	Ponape, Karolinen.
macgillivrayi Pfr.	Lord Howes Insel, Neue Hebriden.
martensi H. Ad. (paradoxa Crosse, distorta Mouss.)	Viti Inseln.
mirabilis Mlldff.	Leyte.
modesta Q. et M.	Nord Luzon.
montrouzieri Crosse	Neu Caledonien.
morongensis Mlldff.	Mittelluzon.
moussonii O. Semp.	Palaus.
novo-guinensis Smith	Neu Guinea.
nubigena Mlldff.	Java.
ovatula Mlldff.	Ponape, Karolinen.
patula O. Semp.	Palaus.
platychilus Bedd.	Koröre, Palaos.

orrecta Mlldff.	Leyte.
var. subcontracta Mlldff.	.	.	,	,	"
— contracta Mlldff.	Bohol.
— ceratum Mlldff.	"
quadrasi Mlldff.	Montalban, Luzon.
quadrata MSS.	Viti-Inseln.
rubella Bedd.	Palaus.
saxicola Mlldff.	Mittel-Luzon.
var. diminuta Mlldff.	"
stolli Marts.	Guatemala.
strigata O. Semp.	Palaus.
striolata O. Semp.	"
subregularis Mouss.	Viti-Inseln.
taeniolata Q. et Mlldff.	Marianen.
tuberosa MSS.	Viti-Inseln.
wilsoni O. Semp.	Palaus.
wisemani Cox.	S. Cristobal, Salomonen.

b. Subgen. Cylindropalaina Mlldff.

amurensis MSS.	Wladiwostok.
beddomei (Braz.) Mlldff.	Queensland.
carbavica Bttg.	Ambon, Haruku.
catanduanica Q. et Mlldff.	Katanduanes.
chrysalis Mlldff.	Cebu.
var. cylindrus Mlldff.	Leyte, Bohol.
lirata Gld.	Liu Kiu Inseln.
mariei Crosse	Neu Caledonien.
occidentalis Guppy	Trinidad, Westindien.
pupa O. Semper	Palaus.
pusilla Marts.	"
trachelostropha Mlldff.	Cebu.
ulingensis Mlldff.	"

c. Subgen. Macropalaina Mlldff.

? minuta H. Ad.	Upolu.
-----------------	---	---	---	---	--------

perroquini Crosse	Neu Caledonien.
pomatiaeformis MSS. . . .	Viti-Insel.
scalarina (MSS.) Mlldff. . . .	Carolinen.
xiphidium Mlldff.	"

Genus *Opisthostoma* Blfd.

a. Subgen. *Euopisthostoma* Kob. et Mlldff.

deccanense Blfd.	Südindien.
distortum Bedd.	"
fairbanki Blfd.	Bhore Ghats, bei Bombay.
macrostoma Bedd.	Braunagiriberge, Malabar.
nilgiricum Blfd.	Nilgiris, Südindien.
paulucciae Crosse et Nev. . .	Perak.
perakensis Aust. et Nev. . . .	"
wallacei Ancey (cristatum Smith) Borneo.	

b. Subgen. *Plectostoma* H. Ad.

austeni Edg. A. Smith . . .	Nordborneo.
baritense Edg. A. Smith . . .	"
busanense Edg. A. Smith . . .	"
cookei Edg. A. Smith . . .	"
crespignyi H. Ad.	Labuan.
depauperatum Edg. A. Smith	Nordborneo.
everetti Edg. A. Smith . . .	Nordwestborneo.
hosei G. Aust.	Nordborneo.
jucundum Edg. A. Smith . . .	Mantanami, Nordborneo.
otostoma Btg.	Nordborneo.
pumilio Edg. A. Smith . . .	Sarawak.

c. Subgen. *Geothauma* Crosse.

grandispinosum G. Aust. . .	Nordborneo.
linterae Sow.	Sarawak.
mirabile Edg. A. Smith . . .	Nordborneo.
pulchellum G. Aust. . . .	"

Genus **Diancta** Mrts.

a. Subgen. **Eudiancta** Kob. et Mlldff.

- constricta Mrts. Ternate, Molukken.
graeffei Mouss. Viti Levu.
macrostoma Mouss. "
torta Bttg. Batchian.

b. Subgen. **Paradiancta** Mlldff.

- everetti Smith Nordborneo.
excentrica Smith "
philippinica Q. et Mlldff. . . Siquijor, Philippinen.

Genus **Anostomella** Mrts.

- ascendens (Pupa) Mrts. . . Molukken.

Genus **Hungerfordia** Bedd.

- pelewensis Bedd. Koröre, Palaus.

Genus **Diplommatina** Bens.

a. Subgen. **Eudiplommatina** Kob. et Mlldff.

- aculus Mölldff. Marinduque, Philippinen.
affinis Theob. Shan Staaten.
aldrichi G. Aust. Nord Borneo.
ambigua G. Aust. Munipur.
angulata Theob. et Stol. . . . Mulmein.
austeni Blsd. Khasiberge.
balabacensis Smith. Balabak.
balansai Morl. Tongking.
baritensis Smith Nordborneo.
bicoronata Mrts. Südostborneo.
blanfordiana Bens. Darjiling.
burtii G. Aust. Oestl. Himalaya.
busanensis G. Aust. Nordborneo.
butleri G. Aust. Munipur.

cagayanica Mlldff.	.	.	.	Nordluzon.
cebuensis Mlldff.	.	.	.	Cebu.
var. gracilis Mlldff.	.	.	.	"
,, nematopleuris Mlldff.	.	.	Bohol.	
,, aetarum		,	.	Negros.
,, vicina		,	.	Guimaras.
chenelli G. Aust.	.	.	.	Nagaberge.
commutata G. Aust.	.	.	.	"
concinna H. Ad.	.	.	.	Borneo.
convoluta G. Aust.	.	.	.	Bureil Kette, Himalaya.
costulata Hutt.	.	.	.	Landur "
crispata Stol.	.	.	.	Mulmein.
crosseana G. Aust. et Nev.	.	.	.	Perak.
daflaënsis G. Aust.	.	.	.	Daflaberge.
decorosa „ „	.	.	.	Nagaberge.
depressa „ „	.	.	.	Khasiberge.
diplochilus Bens.	.	.	.	"
domuncula G. Aust.	.	.	.	Nagaberge.
edentula „ „	.	.	.	Mulmein.
elegans Mlldff. (gracilis Mlldff., nec Bedd.)	.	.	.	Cebu.
elegantissima Q. et Mlldff.	.	.	.	Siquijor.
elongata G. Aust.	.	.	.	Nagaberge.
exilis Blfd.	.	.	.	Barma.
exserta Nev.	.	.	.	Mulmein.
folliculus r'fr. (Carychium cos- tatum Hutt.)	.	.	.	Simla, Himalaya.
garoënsis G. Aust.	.	.	.	Garoberge.
gibberosa G. Aust.	.	.	.	Munipur.
gibbosa Blfd.	.	.	.	Garoberge.
godwini Mlldff. (concinna G. Aust. nec Ad.)	.	.	.	Nagaberge.
gomantonensis Smith (sym- metrica Sm. nec Hedley)	.	.	.	Nordborneo.

goniocampta Q. et Mlldff.	.	Mindanao.
gonostoma Mlldff.	.	Guimaras.
henzabadensis G. Aust.	.	Pegu.
herziana Mlldff.	.	Hainan.
huttoni Pfr.	.	Nordwest Himalaya.
jaintiaca G. Aust.	.	Khasiaberge.
jatingana „	.	"
labiosa Blfd.	.	"
latilabris O. Semp.	.	Nord- und Mittel-Luzon.
leptospira Mlldff.	.	Bohol.
liwaënsis Aldr.	.	Liwa, Sumatra.
lombokensis Smith	.	Lombok.
masbatica Q. et Mlldff.	.	Masbate.
minima Bedd.	.	Südindien.
minor A. Ad.	.	?
mirabilis Aust. et Nev.	.	Perak.
munipurensis G. Aust.	.	Munipur.
nana Blfd.	.	Barma.
nicobarica G. Aust.	.	Nikobaren.
var. battemalvensis Nev.	.	"
nodifera Mlldff.	.	Siquijor.
oligopleuris Blfd.	.	Arakan.
pachychilus Bens.	.	Darjiling.
parvula G. Aust.	.	Khasiaberge.
pimelodes Mlldff.	.	Cebu.
polypleuris Bens.	.	Khasiaberge.
prostoma Mlldff.	.	Marinduque.
pullula Bens.	.	Darjiling.
pupaeformis Theob.	.	Shanstaaten.
puppensis Blfd.	.	Oberbarma.
recta Smith	.	Nordborneo, Balabak.
richthofeni Theob. et Stol.	.	Mulmein.
roebeleni Mlldff.	.	Bongao, Sulu Inseln.

var. <i>siquijorica</i> Mlldff.	.	.	Siquijor.
<i>rubella</i> Mlldff.	.	.	Negros.
<i>rupicola</i> Mlldff.	.	.	Cebu, Leyte.
var. <i>contracta</i> Mlldff.	.	.	Leyte, Katanduanes,
var. <i>accrescens</i>	,	.	Masbate.
var. <i>gracilispira</i>	,	.	Cebu.
var. <i>pulchella</i>	,	.	Mindanao.
var. <i>pere exigua</i>	,	.	Bohol.
<i>saltuensis</i> G. Aust.	.	.	Nordkatschar.
<i>salwiniana</i> Theob.	.	.	Salwengebiet, Hinterindien.
<i>scalaria</i> Blfd.	.	.	Nordostindien.
<i>scalaroidea</i> Theob.	.	.	Barma.
<i>schadenbergi</i> Mlldff.	.	.	Nordwestluzon.
<i>semisculpta</i> Blfd.	.	.	Himalaya.
<i>sherafaiensis</i> G. Aust.	.	.	Nordkatschar.
<i>silvicola</i> G. Aust.	.	.	.
<i>sperata</i> Blfd.	.	.	Barma.
<i>spinosa</i> G. Aust.	.	.	Nordborneo.
<i>subcalcarata</i> Mlldff	.	.	Samal bei Mindano.
<i>symmetrica</i> Hedl.	.	.	Moresby Insel, Neu Guinea.
<i>theobaldi</i> G. Aust.	.	.	Darjiling.
<i>tumida</i> G. Aust	.	.	Nordkatschar.
<i>turritella</i> Mlldff.	.	.	Luzon.
<i>ungulata</i> Blfd.	.	.	Darjiling.
<i>venustula</i> G. Aust.	.	.	Nagaberge.
<i>whiteheadi</i> Smith.	.	.	Kinabalu, Borneo.

b. Subgen. Metadiancta Mlldff.

<i>compacta</i> G. Aust.	.	.	Munipur.
<i>distincta</i>	,	.	Nagaberge.
<i>dohertyi</i>	,	.	Oberassam.
<i>japvoënsis</i>	,	.	Nagaberge.
<i>khunhoënsis</i>	,	.	"

lapillus G. Aust.	Nagaberge.
nengloënsis	,	.	.	.	Nordkatschar.
thomsoni	,	.	.	.	Südburrail.

c. Subgen. *Pseudopalaina* Mlldff.

albata Bedd.	Palaus.
ascendens Mouss.	Viti Levu.
crassilabris Bedd.	Palaus.
floresiana Sm.	Flores.
gibboni Bedd.	Palaus.
gowlandi Braz.	Fitzroy Insel.
inflatula O. Semp.	Palaus.
isseli G. Aust.	Sarawak, Nordborneo.
lamellata O. Semp.	Palaus.
lutea Bedd.	"
polymorpha O. Semp.	"
pyramis O. Semp.	"
ringens O. Semp.	"
sulcicollis Mlldff.	Java.

d. Subgen. *Sinica* Mlldff.

animula G. Aust.	.	.	.	Nagaberge.
apicina Gredl.	.	.	.	Guidschou, China.
auriculata Mlldff.	.	.	.	Java.
var. abbreviata Mlldff.	.	.	.	"
„ biangulata	"	.	.	"
„ gracilior	"	.	.	"
balerica Quad. et	"	.	.	Nordostluzon.
bicolor	"	.	.	Mittelluzon.
var. sticta	"	.	.	Südostluzon, Katanduanes.
bisligensis	"	.	.	Mindanao.
boettgeri	"	.	.	Mittel- und Südostluzon.
var. accedens	"	.	.	Mittelluzon.
„ aberrans	"	.	.	Katanduanes.
„ plectrophora	"	.	.	Nordluzon.

boholensis Q. et Mlldff.	.	.	Bohol.
breviplica	.	.	Leyte.
brunonis Smith	(strubelli Sm.)		
nec Bttg.)	.	.	Natunas.
calcarata Mlldff.	.	.	Java.
canaliculata Mlldff.	.	.	Perak.
canarica Bedd.	.	.	Nordkanara, Südindien.
carneola Stol.	.	.	Mulmein.
collarisera Schm.	et	Bttg.	
(labiosa Mrts. nec Blsd.)	.		Nippon.
concavospira Mlldff.	.	.	Mittelluzon.
concolor Q. et Mlldff.	.	.	Nordluzon, (Paragua?).
confussa Heude	.	.	Sytschuan, China.
congener Smith	.	.	Natunas.
conica Mlldff.	.	.	Hubei, China.
consularis Gredl.	.	.	Hunan,
contracta Mlldff.	.	.	Hubei
cristata Gredl.	.	.	" "
crystalloides Q. et Mlldff.	.	.	Bohol, Philippinen.
cyclostoma	"	.	Java.
cyrtochilus Q. et	"	.	Busuanga.
decipiens	"	.	Cebu, Philippinen.
delicata G. Aust.	.	.	Nagaberge.
diminuta Mlldff.	.	.	Perak.
diploloma Q. et Mlldff.	.	.	Mindanao.
elisabethae	"	.	Mittel- und Südost-Luzon
var. laticosta	"	.	Katanduanes.
var. anchistoma	"	.	Guimaras.
filicostata	"	.	Nordluzon.
simbriosa	"	.	Mittelluzon.
futilis Gredl.	.	.	Hubei, China.
gracilis Bedd.	.	.	Südindien.
hungerfordiana Nev.	.	.	Formosa.
inermis Gredl.	.	.	Hubei, China.

irregularis Mlldff.	Cebu, Guimaras.
var. minima Mlldff.	Leyte.
var. subregularis Mlldff	Cebu.
javana	"	.	.	.	Java.
kochiana	"	.	.	.	Cebu.
leytensis	"	.	.	.	Leyte.
megaloptyx	"	.	.	.	Mittelluzon.
micropleuris	"	.	.	.	Leyte.
microstoma	"	.	.	.	Cebu.
mindanavica Q. et	"	.	.	.	Mindanao.
nevilli Crosse	Perak.
niahensis G. Aust.	Nordborneo.
nipponensis Mlldff.	Nippon.
oligogyra Mlldff.	Koron, Kalamianes.
oostoma	"	.	.	.	Mindanao.
palatalis	"	.	.	.	Mittelluzon.
paxillus Gredl.	Hunan, Hubei, China.
var. longipalatalis Schm.					
et Bttg.	Kiukiang,
var. robusta Mlldff.	Südhunan
var. latecostata Gredl.	Hunan
var. mucronata Schm. et Bttg.	Ningpo
var. lissa Gredl.	Hunan
var. orientalis Mlldff.	Shanghai
perpusilla	"	.	.	.	Java.
planicollis	"	.	.	.	"
pupinella Heude	Tschenkou, China.
pyra Heude	" "
quadrasi Mlldff.	Leyte.
rufa	"	.	.	.	Lo-fou-shan, China.
samuiana Mlldff.	Samui, Golf von Siam.
schmackeri	"	.	.	.	Guangdung, China.
sculptilis	"	.	.	.	" "
setchuanensis Heude	Sytschuan

smithi Kob. et Möldff. (*papuana*)

Sm. nec Tapp. Can.) . . .	Neu Guinea.
suberystallina Möldff. . . .	Leyte.
subcylindrica „ . . .	Fudschien, China.
subfusiformis „ . . .	Siquijor.
var. <i>sychnopleuris</i> Möldff. .	Bohol.
subrubella G. Aust. . . .	Nagaberge.
subtilis G. Aust. . . .	Oberassam.
superba G. Aust. et Nev. .	Perak.
tantilla Gld. (<i>Paxillus</i>) . .	Hongkong.
thersites Möldff. . . .	Cebu.
unicrenata G. Aust. . . .	Nagaberge.
ventriculus Möldff. . . .	Perak.
vesicans „	Siquijor.

e. Subgen. Moussonia O. Semp.

<i>fuscula</i> Mouss.	Oneata, Viti-Inseln.
var. <i>vitiana</i> Mouss.	Viti-Levu, „,
<i>papuana</i> Tapp. Can.	Aru Inseln.
<i>problematica</i> Mouss. (<i>typica</i> O. Semp.)	Upolu, Samoa.
<i>strubelli</i> Bttg.	Nordamboina.

f. Subgen. Diploptychia Möldff.

<i>heliscus</i> Möldff.	Mittelluzon.
---------------------------------	--------------

Genus *Paxillus* H. et A. Adams.

<i>adversus</i> Ad.	Sarawak; (Singapore?).
<i>beccarii</i> Issel	"
<i>borealis</i> Heude	Tschenkou, China.
<i>insignis</i> G. Aust.	Khasiaberge.
<i>laurentianus</i> Möldff.	Hubei, China.
<i>moluensis</i> Smith	Nordborneo.
<i>ruber</i> G. Aust.	"
<i>rubicundus</i> Mrts.	Westborneo, Natunas, Paragua.
<i>sulphureus</i> Smith	Nordborneo.

9. Familie Craspedopomatidae.

1. Genus *Craspedopoma* Pfeiffer 1847.

annulatum Lowe	Hierro, Palma, Canaren.
costatum Shuttl.	Palma, Canaren.
flavescens Lowe	Madera.
hespericum Morel.	Azoren.
lucidum Lowe.	Madera.
var. polita Lowe.	"
— eusticta Lowe.	"
lyonnetianum Lowe.	"
monizianum Lowe.	"
neritoides Lowe.	"
servaini Doum. Ad.	"
trochoideum Lowe.	"

2. Genus *Cyclosurus* Morelet 1881.

mariei Morelet	Mayotte, Comoren.
----------------	---	---	---	---	-------------------

10. Familie Pomatiidae.

1. Genus *Pomatias* Studer.*)

a. Subgen. *Eupomatias* Wagner.

braueri Wagn.	Kroatien.
var. latestriata Wagn.	"
cinerascens Rossm.	Ragusa, Süddalmatien.
elegans Clessin	Welebitgebirge.
var. irregularis Wagn.	"
— oostoma Westerl.	.	.	.	Zengg.	
— similis Wagn.	.	.	.	Gospic.	
— spectabilis Wagn.	.	.	.	Zengg.	
— tumida Wagn.	.	.	.	Gospic.	
henricae Strobel	Südtirol.
var. hüttneri Wagn.	.	.	.	Hallstadt, Aussee.	

*) Nach der Monographie von Wagner in Denkschr. Akad. Wissensch. Wien vol. 64.

var. illasiaca Pini	Verona.
— illyrica West.	Görz.
— plumbea West.	Kärnthen, Krain.
— strigillata Wagn. . . .	Norditalien.
lederi Bttg.	Koutais, Transkaukasien.
scalarinus Villa (formosus Let., concinnus Let., fenzianus Let.)	Istrien, Dalmatien.
var. hirci Stoss.	Buccari.
— schmidti de Betta (valiae West.)	Görz, Triest.
septemspiralis Raz.	Südalpen.
var. agardhi Pini (intermedius Pini)	Valle Cavallina.
— bosniaca Bttg.	Bosnien.
— heydeniana Cless.	Krain, Südsteiermark, Kroatien.

b. Subgen. *Rhabdotacra* Wagner.

apricus Mousson (carthusianum Drap., sabaudianus Bgt., simbriatus Pfr.?)	Südostalpen.
berilloni Fagot	Pyrenäen.
var. kobelti Wagn.	Bilbao.
hidalgoi Crosse	Nordspanien.
var. hispanica St. Simon .	Asturien.
— iratyense Fol. et Ber. .	Pyrenäen.
?hueti Kob.	Constantinopel.
insubricus Pini (canestrinii Ad.)	Bergamasker Alpen.
martorelli Serv. (labrosus West.)	Pyrenäen.
var. mabilleanus St. Simon	"
— noguerae Fag.	Noguerathal.
— rericosta Bof.	"
— spelaeus Fagot	Pyrenäen.
nouleti Drap.	Arriège, Aude, Hte. Garonne.

- var. arriense St. Simon (mar-
quetianus St. Simon) . Arriège.
obscurus Drap. (crassilabrum
Dup.) Pyrenäen.
fagoti Bgt. Arriège.
var. jetschini Wagn. . . Garde, Htes. Pyrénées.
— partioti St. Simon. (lapur-
dense Fag., crosseana
St. Simon) . . . Lourdes.
striolatus Porro. . . . Riviera.
var. apistus Westerl. . . . „
— defilippii Pini . . . „
— isselianus Porro . . . „
— arturi Lessona . . Ronco Scrivia.
— lunense de Stef.. . Spezzia.
— veranyi Bgt. . . Ronco Scrivia.
- c. Subgen. *Stereopoma* Wagner.
- alleryanus Paul. (inonterosati
Bgt.) Calatafimi.
letourneuxi Bourg. . . . Guelma, Algerien.
var. henoni Bourg. . . Col des Oliviers, Algerien.
perseianus Kob. (beloiri Let.,
doumeti Let., latasteanus
Let., tunetanus Let., punicus
Let., ziguense Kob.) . . Nordtunis.
sardous Maltz. . . . Sardinien.
var. apostata Westerl. . . . „
turriculatus Phil. (blancianus
West., boettgeri West., fischeri-
anus Paul., paladilhianus St.
Simon) Sizilien.
var. cacifici Ben. . . . Mte. Gallo bei Palermo.
— eiretica West. . . . Mte. Pellegrino.
— pirajnoi Ben. . . . Favignana.

d. Subgen. *Auritus* Westerl.

- adamii Paul. Calabrien.
var. rudis Paul. "
atlanticus Bourg. Kabylie.
var. maresi Bourg. "
— pechaudi Bourg. "
dalmatinus Pfr. (turritus Wald.) Dalmatien.
elongatus Paul.,(uzziellii de Stef.) Apuaner Alpen.
var. cassiniacus St. Simon . Mte. Cassino.
var. elegantissimus Paul. . Monte Forato.
euboicus West. Euböa.
? var. banatica Fagot . . ? Banat.
eupleurus West. (affinis Ben). Madonien.
gracilis L. Pfr. (rugosus Cless.) Dalmatien.
var. bosnicus Serv. . . . Bosnien.
— croatica Pfr. . . . Croatian.
— liburnicus Hirc . . . Istrien.
— martensiana Mlldff. . Bosnien.
— möllendorffi Serv. . . . "
— reitteri Bttg. . . . Croatian.
— sturanyi Wagn. . . . Priboj.
— stussineri Wagn. . . . Krain.
gualfinensis de Stef. . . . Mittelitalien.
var. agriotes West. . . . Umbrien.
— crosseana Paul. . . . Lucca.
klecaki Braun Lesina.
nanus West. Welebit, Südkrain.
var. dubia Wagn. "
— stossichi Hirc. . . . Buccari, Kroatiens.
patulus Drap. Südfrankreich.
var. alloglyptus West. . . Pyrénées-orientales.
— attivanica Fagot . . Iles de Frioul bei Marseille.
— bourguignati St. Simon Pyrénées-orientales.
— galloprovincialis Loc. . Seealpen.

var. macei Bourg.	.	.	.	Grasse.
— nevilli Bourg.	.	.	.	Mentone.
— pinianus Bourg.	.	.	.	"
— planata Wagn.	.	.	.	Serrone, Schweiz.
— simonianus Bourg.	.	.	.	Saint-Auban, Seealpen.
— subprotractus Palad.	.	.	.	Lamalou, Herault.
philippianus Gredl.	.	.	.	Venetianer Alpen.
var. decipiens de Betta	.	.	.	"
— protractus St. Simon	.	.	.	"
porroi Strob.
var. gredleri West.	.	.	.	Val Ampola.
— reconditus Pini	.	.	.	Val Sassina.
— stabilei Pini	.	.	.	"
— valsabinus Pini	.	.	.	Val Sabbia.
sospes West.	.	.	.	Lago del Matese.
subalpinus Pini	.	.	.	Val de Pesio, Seealpen.
tergestinus West.	.	.	.	Triest.
var. macrocheilus West.	.	.	.	Mte. Maggiore, Istrien.
villae de Betta (segnis West.)	.	.	.	Venetianer Alpen.
waldemari Wagn.	.	.	.	Krain, Kroatien.

e. Subgen. *Pleuropoma* Wagner.

corcyrensis West.	.	.	.	Korfu.
dionysi Paul.	.	.	.	Syrakus.
var. agathocles Ben.	.	.	.	"
hellenicus Bourg.	.	.	.	Ostgriechenland.
var. achaica Bttg.	.	.	.	Santameri.
— athenarum Bourg.	.	.	.	Athen. Böotien.
— coerulea Wagn.	.	.	.	Taygetos.
— excisus Mouss.	.	.	.	Epirus.
— grisea Mouss. (densestriata				
Hesse, mousonni Bttg.)				Kephalonia, Korfu, Sta.
				Maura, Epirus.
— oribates West.	.	.	.	Parness.

westerlundi Paul. . . . Calabrien.

var. yapygius Blanc. . . Otranto.

f. Subgen. Titanopoma Wagner.

auritus Rossm. (*callistoma* Let.,

tschernagoricus Let.) . . Süd-Dalmatien.

var. *chelys* West. . . Cattaro.

— *lamellaris* West. . . . "

— *meridionalis* Bttg. (*regularis* Let.) "

— *montenegrina* Wagn. . Montenegro.

— *panleius* Let. . . . Canali.

g. Subgen. Macaropoma n.

barthelemyanus St. Simon . Canaren.

Sedis incertae.

cretensis Maltz. . . . Sphakia, Creta.

cyrniacus Mab. . . . Corsika.

enhalius , "

11. Famille Realiidae.

1. Genus *Realia* Gray.

carinella Pfr. . . . Neuseeland.

egea Gray "

hochstetteri Pfr. "

turriculata , "

2. Genus *Omphalotropis* Pfr.

a. Subgen. Eurytropis Kob. et Mlldff.

acutilirata Pfr. . . . Neue Hebriden.

albocarinata Mouss. . . . Insel Norfolk.

albolabris Mlldff. . . . Mauritius.

andersoni Blsd. . . . Andamanen.

annatonensis Pfr. . . . Neue Hebriden.

aurantiaca Desh Mauritius.

bilirata Mouss.	Upolu.
var. elongata Mouss.	Savai.
borbonica H. Ad. (teste Nevill =rangi Pot. et Mich.)	Bourbon.
brevis G. Aust.	Camorta, Nikobaren.
bulimoides Hombr. et Jacq.	Ruk, Yap, Karolinen, (? Salomonen, ? Bismarck-Archipel).
caldwelliana Nev.	Mauritius (subfossil).
catenata Mlldff.	Korror, Palaus, Marschallinseln.
ceramensis Pfr. (bicarinata Mts.)	Seram, Buru, Ambon, Haruku, Halmahera.
cheynei Dohrn et Semp.	Palaus.
clavulus Mor.	Mauritius.
coronata Mlldff.	Yap, Karolinen.
costellata H. Ad. (an = multi- lirata Pfr. ?)	Mauritius.
costulata Mouss.	Viti.
distermina Bens.	Andamanen.
dupontiana Nev.	Mauritius (subfossil).
elegans Quadr. et Mlldff.	Mariannen.
elongatula „ „ „ „ „ „	"
var. chrysostoma „ „ „ „ „	"
„ brunnescens „ „ „ „ „	"
erosa Quoy et Gaim.	"
expansilabris Pfr.	Bourbon, Mauritius.
exquisita Pfr.	Lord Howes Insel.
fragilis Pse.	Ebon, Marschallinseln.
globosa Bens.	Mauritius.
granum Pfr.	Fichteninsel, Neu Caledonien.
guamensis Pfr.	Mariannen.
hameliana Crosse	Rodriguez, Maskarenen.
harpula Bens. (an = plicosa Pfr. var. ? teste Nevill).	Mauritius.
hieroglyphicula Fér.	"

- huaheinensis Pfr. (robusta Pse.) Huaheine, Raiatea.
laticosta Quadr. et Mlldff. . Mariannen.
latilabris
layardiana Garr. (rosea Mouss.
non Gld.. bythiniaeformis
Mouss. teste Garr.) . . . Viti.
littorinula Crosse . . . Rodriguez.
major Morel. Mauritius.
malleata Pfr. Australien.
moebii Mts. Mauritius.
moreleti Desh. (=rubens var.
teste Nev.) Bourbon.
multilirata Pfr. (costellata H.
. Ad. teste Nev.) Mauritius.
mutica Semp. Palaus.
navigatorum Pfr. Schifferinseln.
nebulosa Pse. Salomonen.
ochrostoma Pse. (ochroleuca
Paetel) Hervey Inseln.
ochtogyra Quadr. et Mlldff. . Mariannen.
perforata Mouss. (=zebriolata
Mouss. teste Garr.) . . . Viti.
pfeifferi Crosse Neue Hebriden, Lord Howes
Insel.
picta Quadr. et Mlldff. . . Mariannen,
picturata H. Ad. (? =varie-
gata Morel.) Mauritius.
plicosa Pfr.
var. harpula Bens. teste Nev. ..
quadrasi Mlldff. Mariannen.
var. dimidiata Mlldff.
rangi Pot. et Mich. teste Pfr.
=rubens Q. et. G., teste

Nev. species distincta, syn.	
borbonica H. Ad.) . . .	Mauritius.
rosea Gld.	Viti.
rubens Q. et Gaim. . . .	Maskarenen.
(var. moreleti Desh. teste Nevill).	"
rudis Mrts.	Seram.
striatipila Semp.	Palaus.
subsoluta Mouss.	Viti.
taeniata Crosse	Rodriguez.
varians Mlldff.	Vate, Neue Hebriden.
variegata Morel. (? picturata H. Ad.)	Mauritius.
vestita Pfr.	Neuseeland.
vitiensis Liard.	Taviuni, Viti.
zebriolata Mouss. (perforata Mouss. teste Garr.) . . .	Viti.

b) Subgen. *Stenotropis* Kob. et Mlldff.

bicarinata Baird	Tongatabu; Savage Insel.
bifilaris Mouss.	Viti.
var. angusta Mouss ,	
„ gracilior „ „	
„ teretiformis „ „	
circumlineata „ „	
conoidea „ Upolu, Uvea.	
ducalis Bttg.	Insel Duke of York.
geometrica Mouss.	Moorea.
f. angulosa „ „	
ingens „ Oneata, Viti.	
laevis Pse.	Ualan u. Ponape, Karolinen.
longula Mouss.	Viti.
maritima Montr.	Neukaledonien.
moussonii Pse. (ovata Mouss. non Pse.)	Viti.

<i>oceanica</i> Hombr. et Jacq.	.	Vavao.
<i>parva</i> Mouss. (<i>laevis</i> Baird, non Pse., teste Pfr.)	.	Viti, Samoa, Ellice Insel.
<i>scitula</i> Gld.	.	Tahiti, Eimeo, Manua.
<i>submaritima</i> Quadr. et Mlldff.	.	Mariannen.
<i>suturalis</i>	,	" "
<i>tenuiuscula</i> Mouss.	.	
<i>tumidula</i> Mlldff.	.	Ponape, Karolinen.
<i>vallata</i> Gld. (<i>vavaoensis</i> Baird teste Pfr.)	.	Tongatabu, Vavao, Hapai.
<i>variabilis</i> Pse.	.	Hervey und Tonga Inseln.

c. Subgen. *Atropis* Pse.

<i>abbreviata</i> Pse.	.	Tahiti.
<i>affinis</i> Pse.	.	Hervey Inseln.
<i>albescens</i> Pfr.	.	Opara.
<i>boraborensis</i> Dohrn	.	Borabora, Raiatea.
<i>elongata</i> Pse.	.	Raiatea.
<i>oblonga</i> Pfr.	.	Marquesas.
<i>producta</i> Pse.	.	Tahaa.
var. <i>raiateensis</i> Mouss.	.	Raiatea.
<i>rubella</i> Pfr.	.	Huaheine.
<i>scherzeri</i> Zel.	.	Tahiti.
<i>solidula</i> Pfr.	.	Lord Howe's Insel.
<i>terebralis</i> Gld.	.	Tahiti, Eimeo.
<i>ventricosa</i> Jacq.	.	Marquesas.
<i>viridescens</i> Pse.	.	Huaheine.

d. Subgen. *Scalinella* Pse.

<i>costata</i> Pse.	.	Tahaa.
<i>gracilis</i> Quadr. et Mlldff.	.	Mariannen.
<i>pilosa</i> Quadr. et	,	" "
var. <i>pilosella</i>	,	" "
<i>scalariformis</i> Pse.	.	Hervey Inseln.

tahitensis Pse. Gesellschafts Inseln.

var. maupitiensis Garr. . . Maupiti.

e. Subgen. **Paratropis** Bttg.

crassilabris Mlldff. Kamarines, Luzon.

ornata Bttg. Haruku, Molukken.

trochomorpha Mlldff. Südostluzon, Katanduanes,
Samar, Cebu, Mindanao.

var. dimidiata Mlldff. . . Leyte, Siargao.

var. mimula „ . . Siquijor, Bohol.

f. Subgen. **Sychnotropis** Mlldff.

denselirata Quadr. et Mlldff. Kulion, Philippinen.

semperi Mlldff. Nordluzon.

g. Subgen. **Chalicopoma** Mlldff.

laevigata Quadr. et Mlldff. . Mariannen.

semicostulata Quadr. et Mlldff. „

3. Gen. **Acmella** Blfd.

a. Subgen. **Acmella** s. str.

decolor Bttg. Banda Gruppe.

gradata Mlldff. Kamarines, Luzon.

hungerfordiana Nev. Guimaras, Negros, Cebu,
Siquijor, Bohol

var. ventrosula Mlldff. . . Leyte, Limansaua, Tablas.

hyalina Theob. & Stol. . . Moulmein, Barma.

mellilla G. Aust. Süd-Andamanen.

?milium Bens. Khasia Berge.

moreletiana Nev. Nikobaren.

politata Mlldff. Mittelluzon.

pusilla Quadr. et Mlldff. . . Nordluzon.

roepstorfiana Nev. Nikobaren.

tersa Bens. Khasia Berge.

b. Subgen. **Solenomphala** Heude.

brazieri Hedl.	Neu Guinea.
caledonica Crosse	.	.	.	,	Neu Caledonien.	
collumellaris Quadr. et Mlldff.	Luzon.					
conica	"	"	"	Mariannen.		
conjungens Mlldff.	Leyte.	
coturnix Crosse	,	.	.	.	Neu Caledonien.	
crosseana Gass.	"	"
diaphana	"	"	"	"	"	"
filocincta Quadr. et Mlldff.	.	Nordluzon.				
insularis Crosse	Gambier Inseln.	
isseliana Tapp. Can.	Aru	"
ovata Pse.	Mangier Insel.	
papuensis Sm.	Neu Guinea.	
parvula Morel.	Komoren.	
rubra Gass.	Neu Caledonien.	
stricta Gld. (scalaris Heude)	.	Liukiu Inseln, China, Hainan.				
turrita Gass.	Neucaledonien.	
vescoi Dohrn	Tahiti.	

4. Gen. **Cyclomerpha** Pse.

flava Brod.	Anaa, Gambier Inseln.
margarita Pfr.	Rapa,
vulpina Pfr.	Fox Inseln

5. Gen. **Mascaria** Angas.

?arborea Cr. et Fisch.	.	.	Madagaskar.
crocea Sow.	.	.	Mauritius.
litterata Morel.	.	.	Madagaskar.

6. Gen. **Heteropoma** Mlldff.

aries Mlldff.	Cebu, Philippinen.
concavospirum Mlldff.	Südostluzon.
cornu	"	"	,	.	Siquijor.

euspirum	„	.	.	.	Südostluzon.
fulvum	Quadr.	et	„	.	Mariannen.
glabratum	„	.	.	.	"
meridionale	„	.	.	.	Cebu.
microconus	Quadr.	et	Mlldff.	.	Nordluzon.
philippinense			„	.	Mittelluzon.
pyramidalatum			„	.	Mindanao, Leyte, Katanduanes
pyramis	Quadr.	et	„	.	Mariannen.
quadrasi			„	.	"
tuberculatum	Quadr.	et	Mlldff.	.	"
turritum	„		„	.	"

7. Gen. **Adelomorpha** Tapp. Can.

acanthoderma	Tapp.	Can.	.	Neu Guinea.
bicarinata	Mts.	.	.	Ambon, Seram.
brazieri	Cox.	.	.	Upolu.
carinulata	Mts.	.	.	Buru, Mollukken,
horrida	Hedley	.	.	Brit. Neu Guinea.
laeta	Mlldff.	.	.	Deutsch „
levis	Pfr.	.	.	Salomonen.
liratula	Mts.	.	.	Molukken.
macgregoriae	Hedley (Otopoma)			Neu Guinea.
novae hiberniae	Q. et Gaim.			Bismark-Archipel..
pumila	Tapp.	Can.	.	Arfakberge, Neu Guinea.
pygmaea	Sow.	.	.	Bismarck-Archipel.
rugatella	Tapp.	Can.	.	Aru Inseln.
tristis	„	„	.	Brit. Neu Guinea.
tunicata	„	„	.	Arfakberge, Neu Guinea.

8. Gen. **Gonatorhaphe** Mlldff.

daucina	Pfr.	Salomonen.
incisa	Hombr.	et	Jacq.	.	.	Ruk, Karolinen.
macgillivrayi	Pfr.	(charminion Hutt.)	.	.	.	Neue Hebriden.

- liberata Mouss. Viti.
recluziana Pfr. Neue Hebriden.
stricta Mouss. Viti Levu.

9. Gen. **Quadrasiella** Mlldff.

- ammonitella Mlldff. Ponape, Karolinen.
clathrata Q. et Mlldff. . . . Mariannen.
mucronata " " . . . "

10. Gen. **Diadema** Pse.

- biangulatum Pse. Bitutaki, Hervey Inseln.
carolinarum Mlldff. Ponape, Karolinen.
var. pyramis Mlldff. " "
var. turrita " " "
ciliatum Mouss. Oneata.
parvum Pse. Atiu, Rarotonga, ? Raiatea.
solutum Mlldff. Ponape, Karolinen

11. Gen. **Electrina** Gray.

- succinea Sow. Opara.

12. Gen. **Bourciera** Pfr.

- fraseri Pfr. Ecuador.
helicinaeformis Pfr. "

b. Schistopelmata.

12. Familie Cyclostomatidae.

a. Subfamilie Cyclotopsinae.

1. Genus **Cyclotopsis** Blfd.

- conoidea Pfr. (spurea Sow.) . Seychellen, Mauritius.
montana Pfr. Südindien.
ornata G. Aust. Sokotora.
radiolata Mts. "
emistriata Sow. (fasciata (Hutt.) Vorderindien.

- spurca Grat. (nec Sow.) Bombay, Malabar.
subdiscoidea Sow. (rusticum
Pfr., pfeifferi Gray, aratum
Bens.) Orissa, Indien.
trailli Pfr. Madras.
-

- ? dubia Morelet Mayotte.
? filicum „ Anjouan.
? granum „ Mayotte.
? horrida „ Anjouan.

b. Subfamilie Cyclostomatinae.

2. Genus **Lithidion** Gray.

- bentii Edg. A. Smith Sokotora
depressum Sow. ?
desciscens Pfr. Sokotora?
lithidion Sow. (sulcatum Gray.) Yemen.
marmorosum G. Austen Sokotora.
niveum Petit Yemen? (Madagaskar)?
souleyetianum Petit (para-
doxum Pfr.) Abd-el-Goury.

3. Genus **Otopoma** Gray.

- balfouri G. Austen Sokotora.
bentianum Melv. Hadramaut.
clathratulum Recluz Sokotora, Yemen?
var. socotranum G. Aust. „
clausum Sow. Yemen.
complanatum G. Aust. Sokotora.
consimile Melv. et Psby. Hadramaut.
dhofarense Melv. et Psby „
guillaini Petit Makdischu (Mogadoxo), So-
maliland.
hadramanticum Melv. et Psby. Hadramaut.

hinduorum Blsd.	Kattiawar, Vorderindien.
naticoides Recl.	Sokotora.
var. austeni Bgt.	"
obtusum Pfr.	Sansibar?, Cap Guardafui.
philippianum Pfr.	?
turbinatum G. Aust.	Sokotora.

3. Genus *Tropidophora* Troschel.

a. Subgen. *Eutropidophora* n.

abeillei Grat.	Madagaskar.
alternans Pfr.	"
articulata Gray (filosum Sow., terverianum Grat.)	Rodriguez.
aspera Pot. et Mich. (harvey- anum Sow.)	Madagaskar, Diego Suarez.
balfouri G. Austen	Sokotora.
balteata Sow.	Madagaskar.
barclayana Pfr.	Mauritius.
belairi Petit	Madagaskar.
betsiloënsis Edg. A. Smith	"
bicarinata Sow.	"
bipartitum Morelet	Rodriguez.
boivini Petit	Nossibé.
brevimargo Mouss.	Madagaskar.
calcarea Sow. (sulcatum Lam. nec Drap.)	Mossambique (subfossil), Deutsch-Ostafrika.
caldwelliana Nev.	Mauritius (subfossil)
var. sublaevis Nev.	"
var. sexcarinata Nev.	"
campanulata Pfr.	Madagaskar.
carinata Born (tricarinata Sow. nec Müll.)	Mauritius.
var. unicolor Pfr.	"

<i>carinifera</i> Sow. (spectabile Pet.)	Madagaskar.
<i>chromium</i> Morelet	"
<i>congener</i> Edg. A. Smith	"
<i>consanguinea</i> Sow.	"
<i>creplini</i> Dkr.	Sansibar.
<i>cuvieriana</i> Petit	Nossi-Mitziu an Nordmadagaskar.
<i>de Burghiae</i> Rve.	Madagaskar.
<i>deliciosa</i> Fér.	" Diego Suarez.
<i>deshayesiana</i> Petit	" "
<i>dissotropis</i> Morelet	Madagaskar.
<i>duponti</i> (Robillard) Crosse .	Mauritius.
<i>erronea</i> Nev. (<i>unicolor</i> Pfr. ex parte, nec <i>unicolor</i> Pfr. 1851).	Madagaskar.
var. <i>subunicolor</i> Nev.	"
var. <i>subocclusa</i> "	"
var. <i>subligata</i> "	"
<i>euchilus</i> Pfr.	"
<i>eustola</i> Cr. et Fisch. . ,	"
<i>filostriata</i> Sow. . ,	"
<i>formosa</i> Sow.	"
<i>freyi</i> Bttg.	Nossibé.
<i>kieneri</i> Pfr.	Madagaskar.
<i>letourneuxi</i> (Ancey) Bgt. (zanguebaricum Pfr., non Petit, cambieri Bgt.)	Deutsch- und Britisch- Ostafrika (nicht Sansibar).
var. <i>leroyi</i> Bgt.	Deutsch-Ostafrika.
var. <i>stuhlmanni</i> Mart.	" "
<i>lienardi</i> Morelet	Mauritius.
<i>lirata</i> Pfr.	?
<i>macareae</i> Petit	Madagaskar.

madagascariensis Gray (duisa-	
bonis Grat.)	Madagaskar.
mauritiana H. Ad.	Mauritius.
michaudi Grat. (carinatum Sow.	
nec Born)	Abd-el-Goury.
monileata Morelet	Mayotte.
multifasciata Grat.	Madagaskar.
nigrotaeniata Bttg.	Nossi-Cumba.
obsoleta Lam.	Madagaskar.
occlusa Moerch	"
orbella Lam., (lamarckii Petit, variabile Fér.)	?
paulucciae Cr. et Fisch. . . .	Madagaskar.
perspectiva Sow.	"
principalis Pfr.	"
pulchella Sow.	"
pulchra Gray (ortix Val., arthurii Grat., seychellarum Pfr.) . .	Seychellen.
rugosa Lam. (cinctum Sow.) . .	?
scalata Mouss.	Madagaskar.
semilirata Morelet	Mayotte.
socotrana G. Austen	Sokotora.
sowerbyi Pfr. (megacheilus Sow.)	Comoren.
stumpffi Bttg.	Nossibé
tricarinata Müll.	Mauritius (subfossil, Nevill).
trissotropis Morlet	"
virgo Pfr.	Nossibé
unicarinata Lam. (fulvifrons Sow.)	Madagaskar.
unifasciata Sow.	"
verticillata Morelet	Mauritius.
virgo Pfr.	Madagaskar, Diego Suarez.
vittata Sow.	"
zonulata Fér.	?

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Dreissigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel zweimonatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn Dr. W. Kobelt in Schwamheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von R. Friedländer & Sohn in Berlin zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn D. F. Heynemann in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Neue *Helix*-Arten aus Montenegro.

Von

Dr. W. Kobelt.

1. *Campylaea (Dinarica) moratschensis* n.

T. aperte et pervie umbilicata, depressa, convexo-orbicularis, solidula, haud nitida, ruditer costellato striata, lineolis spiralibus impressis hie illic sculpta, sculptura spirali sub vitro quoque haud conspicua, lutescenti-albida, fascia lata supramediana nigro-castanea duabusque zonis dilutis castaneo-fuscis supra et infra ornata, in speciminiibus vivis epidermide tenui fuscescente induta. Spira convexo-conica, sutura distincta, linearis. Anfractus 5 convexi, celeriter sed regulariter crescentes, ultimus haud dilatatus,

fere teres, antice deflexus. Apertura diagonalis, lunato-subcircularis, fasciis translucentibus; peristoma simplex, obtusulum, tenuiter labiatum, marginibus conniventibus, minime junctis, margine supero strictiuseulo, externo et basali expansis, breviter reflexis, columellari ad insertionem vix dilatato, patulo.

Diam. maj. 27, min. 24, alt. 14,5 mm., diam. apert. obl. 13:11 mm.

Hab. Moraca, Montenegro.

Die kleinste mir noch vorgekommene Form der Pouzzi-Gruppe, durch den stielrunden, nicht verbreiterten letzten Umgang von montenegrina anscheinend gut geschieden. Man könnte viel eher an eine Verwandschaft mit den Campyläen vom Parnass denken. Es liegen mir vier gleiche Exemplare vor, aber auch die Zwischenformen bis zur typischen montenegrina, als deren Untervarietät wir sie somit zu betrachten haben. Ich hoffe die Gruppe Dinarica in einem der nächsten Iconographiehefte eingehend behandeln zu können. Die Fundortsangabe Moraca, soll wohl das Moratscha-Thal, das Gebiet des östlichen Quellflusses des Drin, bedeuten.

2. *Euomphalia (?) floerickei n.*

Testa aperte umbilicata, umbilico intus mox coactato, depresso convexa, solida, nitidula, ruditer et irregulariter costellato-striata, sub vitro malleolata et hic illic lineis brevibus impressis spiralibus signata, albida, sed plerunque fascia lata supera et altera latiore basin totam occupante, fasciam periphericam et indistinctam subsuturalem tantum relinquentibus ornata. Spira convexo-conica. Anfr. 6 convexi, primi lentissime, sequentes celerius accrescentes, ultimus subteres, ad suturam levissime planatus, antice vix brevissime deflexus. Apertura obliqua, ovato-rotundata, sat

lunata, intus fuscescenti-vinosa; peristoma tenue, acutum, intus subremote albolabiatum, marginibus vix conniventibus, basali et columellari reflexiusculis. —

Diam. maj. 15, min. 13, alt. 9 mm.

— — 17, — 14, — 10 mm.

Hab. Moraca, Montenegro.

Steht den Abruzzenformen des Formenkreises der *Helix orsinii* nahe und ist eigentlich nur durch die stärker ausgeprägte Lippe von denselben verschieden. Andererseits erinnert sie aber auch wieder an manche kaukasische *Fruticocampyläen*, doch ist diese Ähnlichkeit weniger in die Augen fallend. Das Vorkommen dieser Gruppe im montenegrinischen Bergland gewinnt ein besonderes Interesse durch das Auftreten zweier *Pomatia* in derselben Gegend, welche zweifellos ihre nächsten Verwandten auch in mittelitalienischen Formen der *Helix ligata* haben.

3. *Pomatia dormitoris* n.

Testa exumbilicata, globosa vel globoso-conoidea, solida, sat ruditer striata, sculptura spirali nulla, griseo-vel lutescenti-albida, epidermide tenui lutescenti induta, fasciis 5 sat latis subinterruptis fuscis, secunda et tertia confluentibus cincta. Spira convexo-conoidea apice convexo, laevi, mediocri; sutura impressa. Anfractus $4\frac{1}{2}$ convexit, celeriter sed regulariter crescentes, ultimus magnus, rotundatus, antice arcuatim descendens, circa insertionem columellae impressus. Apertura obliqua, lunato-circularis, intus leviter fusco suffusa fasciis translucentibus, albolumbata; peristoma rectum, obtusum, album, marginibus levissime conniventibus callo tenuissimo translucido junctis, externo medio producto, columellari arcuatim ascendente, albo, fornicatim reflexo, appresso, umbilicum omnino claudente. —

Alt. 34, diam. maj. 34. min. 31 mm.

Hab. ad montem „Dormitor“ Montenegri.

Im Habitus etwas an die Gruppe der obtusalis er- aber doch näher mit den mittelitalienischen Formen der ligata verwandt, aber von Helix secernenda in jeder Beziehung gut verschieden.

4. *Pomatia kolaschinensis* n.

Testa subobtecte vel obtecte perforata, globoso-conica vel subconica, solidula, parum nitens, ruditer striata, striis ad suturas costiformibus, sub epidermide tenuissima fuscescente griseo-albida, fasciis 5 angustis parum distinctis cincta. Spira convexo-conica apice acutulo, laevi. Anfractus 5 convexi, celeriter ac regulariter crescentes, sutura impressa discreti, ultimus antice longe descendens sed vix deflexus. Apertura modice obliqua, subcircularis, medio-criter lunata, intus pallide vinosa fasciis translucentibus; peristoma rectum, tenuiter albidolabiatum, marginibus supero et columellari subparallelis vix conniventibus, callo ere inconspicuo translucido junctis, externo medio leviter producto, columellari oblique ascendente, albido-rosaceo, supra dilatato, fornicatim reflexo, umbilicum obtegente sed plerumque rimam relinquente. —

Alt. 34, diam. maj. 35, min. 29 mm.

Hab. Kolaschin, Montenegro; (in dem Quellgebiet der zur Drina fliessenden Tura, also im Donaugebiet).

Eine sehr merkwürdige Form, die Beziehungen zu lutescens, pomatia und ligata hat, aber den schmalbänderigen mittelitalienischen Formen der letzteren (Icon. Fig. 1043) doch wohl am nächsten steht.

5. *Pomatia vladika* n.

Testa magna, exumbilicata, inflato-globosa, solidula parum nitida, ruditer costellato-striata, costellis infra suturam majoribus, sculptura spirali infra suturam tantum conspicua, lutescenti-fusca, fasciis fuscis quinque parum

distinctis, secunda et tertia confluentibus. Spira conica, apice sat magno, obtusiusculo, laevi; sutura impressa, subcrenulata. Anfractus $5\frac{1}{2}$ celeriter sed regulariter crescentes, superi convexiuseuli, inferi convexiores, ultimus magnus, rotundatus, antice leniter descendens. Apertura diagonalis, lunato-circularis, intus albido-fuscescens fasciis obscure translucentibus; peristoma obtusulum, expansum, extus et ad basin brevissime reflexum, late hepatico limbatum, marginibus conniventibus, columellari arcuatim ascendente, hepatico, supra dilatato, appresso, ad insertionem sulco superficiali cincto.

Alt. 50, diam. maj. 50, min. 44 mm.

Hab. Moraca, Montenegro.

Eine höchst merkwürdige Art, welche Hel. pomatia und lucorum verbindet. Ich bringe sie wie die anderen beschriebenen Arten im Schlussheft des achten Bandes der neuen Folge der Iconographie zur Abbildung.

Eine neue Jacosta.

Von

H. Rolle.

Jacosta andrewi n.

Testa late et infundibuliforme umbilicata, depresso lenticularis, solida, haud nitens, tricarinata, undique ruditer et confertim costellato-striata. Spira deppressa, apice vix prominulo. Anfractus 5— $5\frac{1}{2}$, embryonales laeves, convexiuseuli, sequentes distincte carinati, ad carinam compressi, infra suturam tumidi, penultimus et ultimus torulo distincto prominente subsuturali muniti, ultimus ad peripheriam carina utrimque compressa distinctissima et circa umbilicum carina altera vix minus distincta, extus sulco definita munitus, interstitio plano: sutura distincta, subirregularis.

Apertura irregulariter rhomboideo-piriformis, ad peripheriam valde sinuata, intus canaliculata; peristoma tenue, intus tenuiter sed distincte labiatum, margine collumellari angulum distinctum cum basali formante, dein dilatato

Diam. maj. 11, min. 9,5, alt. vix 5 mm.

Hab in monte Chrysostomo ins. Cyprus.

Eine neue Zonites.

Von

Dr. W. K o b e l t.

Zonites cilicus n.

Testa late et fere perspectiviter umbilicata, depresso globoso conoidea, solidula, haud diaphana, nitida, irregulariter ruditerque striata, in anfractibus superis distincte, in ultimo minus distincte granulata, infra peripheriam laevior, intescenti-brunea, obscure fasciata, circa umbilicum pallidior. Spira convexo-conica, supra late obtusata, apice parvo. Anfractus 6—6½ lente ac regulariter crescentes, embryonales subtilissime granulosi, plani, sequentes convexiusculi, carinadistincta suturam impressam sequente insignes, ultimus vix dilatatus primum subangulatus, demum fere regulariter rotundatus. Apertura obliqua, lunata, fere circularis; peristoma tenue, acutum, intus vix levissime labiatum fauibus coerulescentibus, basali arcuato, ad insertionem vix dilatato.

Diam. maj. 34, min. 27,5, alt. 13, diam apert. obl. 12,5 : 13,5 mm.

Hab. Giosna prope Mersina Ciliciae; leg. Rolle.

Von mir bei der Bearbeitung von Rolles Ausbeute übersehen. Es ist bis jetzt die am weitesten östlich vorgeschobene Form der Gattung Zonites; sie schliesst sich namentlich durch die abgestumpfte Spira an meinen Z.

rollei aus Lykien an, weicht aber in Färbung, Skulptur, Grösse und Aufwindung vollständig ab. Das mir vorliegende Exemplar ist ein Unicum unter allen Zonites, die ich noch gesehen habe, dadurch, dass es schon auf den oberen Windungen dunkle Bänder trägt, welche (nach einer Verletzung) auf der Unterseite der letzten Windung in eine ganz ausgesprochene Bänderung übergehen, ganz analog wie man es manchmal bei Limnäen beobachtet. Ich werde das Exemplar in dem neunten Band der neuen Folge der Ikonographie mit einigen anderen kritischen Zonites-Formen zur Abbildung bringen.

Literatur.

Proceedings of the Malacological Society of London,
Vol. III, No. 2.

- p. 80. da Costa, S. J. Remarks on some species of Bulimulus sect. Drymaeus and descriptions of new species of Land-Shells from Bolivia, Ecuador, and the U. S. of Colombia. With pl. 6. — Neu Drymaeus plicato-liratus p. 80 t. 6 fig. 1, Bogota; — Dr. hidalgoi p. 80 t. 6 fig. 2, Ecuador; — Dr. smithii p. 81 t. 6 fig. 8, Bogota; — Dr. zizzac p. 81 t. 6 fig. 5, Caucathal; — Dr. malleatus p. 82 t. 6 fig. 7, La Paz, Bolivia; — Dr. lucidus p. 82 t. 6 fig. 4; — Dr. tigrinus p. 82 t. 6 fig. 6; — Spiraxis virescens p. 82 t. 6 fig. 10; — Cyclophorus rosenbergi p. 82 t. 7 fig. 9, Cachabi, Ecuador; — Strophocheilus (Eurytus) sub-irroratus p. 83, mit Holzschnitt; — Str. (Eur.) doliarius p. 84 desgl.
- p. 85. Dall, W. H., Note on the Anatomy of Resania Gray, and Zenatia Gray.
- p. 87. Woodward, Martin F., on the Anatomy of Mulleria dalyi Smith.
- p. 93. Moore, J. E. S., Descriptions of the Genera Bathanalia and Bythoceras from Lake Tanganyika. (Bath. howesi, im Thier mit Typhobia verwandt, im Gehäuse von den jurassischen Amberlya kaum zu unterscheiden; — Bythoc. iridescens, anatomisch mit Tanganyicia verwandt, beide höchst eigenthümliche Formen aus einer Tiefe von 6--700 Fuss).
- p. 95. Pilsbry, Henry A., Phylogeny of the Genera of Arionidae.

Hidalgo, J. G., Obras malacologicas. — In Memor. Real. Acad. Ciencias de Madrid vol. XIV. — Atlas. Entrega 2, 2½--3.

Enthält weitere 74 Tafeln Philippinischer Landschnecken in sorgfältiger Ausführung. —

Webb, Wilfred Mark, the Nonmarine Molluscs of Essex. -- Reprinted from the Essex Naturalist 1897 vol. X p. 27—48 und 65—81. —

Eine sehr sorgfältig gearbeitete Lokalfauna mit zahlreichen Detail-Fundortsangaben. Die Provinz wird in drei Unterabtheilungen zerlegt Südwest-, Central- und Nord-Essex. Im Ganzen werden 110 lebende und 15 fossile Arten aufgeführt, von letzteren sind 6 in England ausgestorben. Die Gesammtzahl der englischen Arten beläuft sich auf 140+7. —

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 1897 Part. III.

- p. 357. Pilsbry, Henry A., new Achatinidae and Helicidae from Somaliland. — Neu *Achatina chrysoleuca*, *Limicolaria donaldsoni*, *vanattai*, *Helicella (Lejeania) chionobasis*. —
- p. 360. — —, New Australian Mollusks. Die Gattung *Tatea* T. Woods wird besprochen, 3 sp. aufgeführt und abgebildet. Neu *Adeorbis sigaretinus* p. 363 t. 9 fig. 4—6, Rockhampton; — *Corbula coxi* p. 363 t. 9 fig. 1—3.
- p. 365. Pilsbry, H. A., and E. G. Vanatta, Descriptions of two new species of *Cerion* (*fordii* nebst var. *submarmoratum*, fig. 1—4; und *pillsburyi* fig. 5, beide von den Bahamas).
- p. 465. Pilsbry, H. A., and Benj. Sharp, Seaphopoda of the San Domingo Tertiary. Neu *Dentalium cossmannianum* p. 467 t. 10 fig. 11 t. 11 fig. 10, 11; — *D. callioglyptum* p. 468 t. 10 fig. 10, 12 t. 11 fig. 21; — *D. tryoni* p. 468 t. 10 fig. 5—9 t. 11 fig. 22; — *D. gabbi* p. 470 t. 10 fig. 6, 7, 13, t. 11, fig. 1—2; — *D. pyrum* p. 472 t. 11 fig. 6—7; — *D. praecursor* p. 472 t. 11 fig. fig. 12—14; — *Cadulus phenax* p. 472 t. 11 fig. 23—24; — *C. elegantissimus* p. 473 t. 11 fig. 28—30; — *C. depressicollis* p. 473 t. 11 fig. 25—27; — *C. colobus* p. 474 t. 11 fig. 17—20. —
- p. 477. Pilsbry, H. A., new Brazilian Streptaxidae. Neu *Str. helios* p. 477, — *Str. tumulus* p. 478; — *Str. capillosns* p. 478, Bahia; — *Str. decussatus* p. 479.
- p. 480. — —, Additional Note on the Gastropod Genus *Tatea*. —

- p. 503. — —. Descriptions of two new Forms of *Perideris* (*kobelti* n. = *sauleydi* Kob. nec Joann., und *sauleydi* var. *normalis*).

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1898 Part. I. —

- p. 57. Dall, W. H., Synopsis of the recent and tertiary Psammobiidae of North America (schon besprochen).
p. 67. Pilsbry, H. A. and E. G. Vanatta, Anatomical Notes on certain West American Helices. — *Glyptostoma* steht völlig isolirt. Von Epiphragmophora werden erörtert *veitchii*, *pandorae*, *areolata*, *stearnsiana* und *guadalupiana*.

Simroth, Dr. H., über die Gattung Limax in Russland.

Aus Ann. Mus. Zoolog. St. Petersburg 1898.

Es werden 20 Arten aufgeführt; davon neu: *Limax turkestanus* aus Turkestan; — (*Heynemannia*) *daghestana* aus Daghestan; — *H. ananowi* vom centralen Kaukasus; — *H. caucasica* vom Kasbek; — *H. amalioides* von Gudauo an der grusinischen Militärstrasse; — *Limax colchicus* von Ordubad am Araxes. — *L. simplex* vom See Tabizschuri; — *L. valentini* vom Chula-Pass in Adscharien; — *L. baeri* unsicherer Fundortes; — (*Lehmannia*) *retowskii* von Sephanos bei Trapezunt.

Journal de Conchyliologie. Vol. 46. 1898 No. 1.

- p. 5. Crosse, H., Note sur quelques Mollusques terrestres des îles Philippines encore peu répandus dans les Collections. — Beschäftigt sich mit den Chloraea der regina-Gruppe und *Anixa garibaldiana*; *Chl. laurae* Gude, *coerulea* Milde und *garibaldiana* var. *calva* sind abgebildet.
p. 15. Bayay, A., Coquilles nouvelles provenant des récoltes de M. L. Levay dans le Haut-Mekong pendant la campagne du Massie (1893-95). Neu *Amphidromus laosiensis* p. 15 t. 2 fig. 1; — *Paludina simonis* p. 17 t. 2 fig. 3; — *Pal. lagrandieri* p. 18 t. 2 fig. 4.
p. 20. Crosse, H., Additions à la Faune malacologique terrestre et fluviatile de la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances. (Drei von Hartmann beschriebene *Helicina*).
p. 22. Mayer-Eymar, C., Descriptions de Coquilles fossiles des terrains tertiaires inférieurs (Suite). — Beschrieben und abgebildet werden *Ostrea schweinfurthi*, *sickenbergeri*, *Crassatella junkeri*, *puellula*, *Diplodonta Adamsi*, *Corbis kabirensis*, *Isocardia avellana*, *Tellina zittelli*, *Scalaria impar*, *Chenopus artini*, *lorioli*, *Pseudoliva cometi*. —

Martini-Chemnitz, systematisches Conchylien-Cabinet.

Lfg. 436. Aplysiacea, von S. Glessin.

437. Auriculacea, von Kobelt.

Drouët, Henri, Unionides du Bassin de la Seine. Avec une planche double. Extrait des Mémoires Académie Dijon, Ser. 4, tome 7. — 86 p. gr. 8°.

Neu *Unio ruginosus* p. 49 fig. 8; — *U. valens* p. 50 fig. 5; — *U. lepidulus* p. 60 fig. 7; — *Pseudanodonta albica* p. 85 fig. 2. — Weiterhin sind noch abgebildet *Unio occidaneus* fig. 1; — *Pseudanodonta servaini* fig. 3; — *Anodonta journei* fig. 4; *Unio plebeius* fig. 6. — Von besonderem Interesse ist das Vorkommen von *Unio sinuatus* vom Einfluss der Aube ab.

Möllendorff, Dr. O. F. von, Ergänzungen und Berichtigungen zum dritten Bande: die Landmollusken. — In Reisen im Archipel der Philippinen von D. C. Semper, Bd. VIII. — Wiesbaden, Kreidel, 1898. Mit 4 Tafeln.

Wir begrüssen mit Freuden, die Fortsetzung des wichtigen Semper-schen Werkes über die Landmollusken der Philippinen aus der Feder des vor allen dazu berufenen Verfassers. Das vorliegende Heft behandelt zunächst die Agnathen und hier tritt der Einfluss des langjährigen Wirkens des Verfassers auf den Philippinen am schärfsten hervor. Während es noch nach Semper's Reisen für ausgemacht galt, dass der Archipel der Philippinen zwar ungemein reich an grossen, aber arm an kleinen Arten sei, hat Möllendorff unterstützt durch den von ihm dazu angeleiteten Quadras und einige tagalische Sammler einen ganz ungeahnten Reichthum kleiner Arten nachgewiesen. Von der Gattung *Ennea*, die früher nur durch eine Art vertreten wurde, sind jetzt nicht weniger als 36 Arten bekannt, bis auf die zweifellos eingeschleppte *Huttonella bicolor* sämtlich der Untergattung *Diaphorella* angehörend, welche ausserdem noch einen Vertreter in Südost-Borneo und zwei in Hinter-indien (Moulmein und Tenasserim) hat; ihr Verbreitungszentrum liegt im Archipel der Kalamianes zwischen Paragua und Mindoro. Sämtliche Arten sind abgebildet. Zum erstenmal beschrieben wird *Ennea kobelti* p. 29 t. 3 fig. 4. von den Kalamianes. — Weiterhin enthält die Lieferung noch *Vitrinoidea* mit 4, *Vitrinopsis* mit 7 und *Vitrinocoma* mit 12 Arten, von denen 8 auf Luzon entfallen; auch sie sind alle abgebildet.

Kobelt, Dr. W., Rossmässlers Iconographie, Neue Folge, achter Band, Lfg. 3—4. Wiesbaden, Kreidel, 1898.

Neu oder zum erstenmal abgebildet sind *Anodonta bactriana* Rolle fig. 1418—19; — *Tachea lenkoranea* var. *caspia* fig. 1421; — *Macularia flattersiana* Ancey fig. 1422; — *Mae. kebiriana* Pall. fig. 1423; — *Xerophila buslimiana* Pollon. fig. 1429, Tripolis; — *Patula aranea* Parr., fig. 1439, Sicilien; — *Patula?* *carpetana* Hid. fig. 1455, Sierra de Guaderama; —

Ihering, Dr. H. von, As Especies de Ampullaria da Repùblica Argentina. In Annales Mus. Nac. Buenos Aires Tomo VI p. 47—52.

Neben *Asolene platiae* werden sieben Arten unterschieden: *Ampullaria megastoma* Sow. = *neritoides* d'Orb.; — *scalaris* d'Orb. = *angulata* Jay = *bridgesi* Rve.; — *gigas* Spix = *insularum* d'Orb. = *vermiformis* Rve. = *canaliculata* Hupé nec d'Orb.; — *canaliculata* d'Orb. (nec Lam.) = *haustum* Rve., inclusive *d'Orbigniana* Phil. = *immersa* Rve. und *australis* d'Orb.; — *pulchella* Anton = *crassa* d'Orb. nec Swains. = *roissiy* d'Orb.; — *spixii* d'Orb. = *zonata* d'Orb. nec Spix; — *cornu arietis* L. —

Bucquoy, E., Ph. Dautzenberg et G. Dollfuss, les Mollusques marins du Roussillon. Tome II Fase. 13 (Schluss).

Das werthvolle Werk über die Meeresmollusken Südfrankreichs wird mit dieser Lieferung zum Abschluss gebracht. Das conchyliologische Publicum hat allen Grund, den Verfassern für dasselbe dankbar zu sein. Wir empfehlen unseren Lesern besonders die allgemeinen Bemerkungen über die geographische Verbreitung am Schlusse des Werkes.

Jacobi, A., Japanische beschalte Pulmonaten. Anatomische Untersuchung des im zoologischen Museum der Kaiserlichen Universität in Tokio enthaltenen Materiales. I. Pulmonaten. — Sep. Abz. aus Journal of the College of Science, Imperial University, Japan, Vol. XII P. I.

Wir behalten uns eine eingehende Besprechung dieser Arbeit für eine der nächsten Nummern vor.

The Journal of Conchology. Vol. IX. M. 4.

p. 97. Melvill, J. Cosmo and R. Standen, Notes on a collection of Marine Shells from Lively Island, Falklands, with List of Species. Als neu beschrieben werden: *Lachesis euthrioides*

- p. 98 t. 1 Fig. 9: — *Gyanium falklandicum* p. 104, t. 1 Fig. 12: — *Thracia antarctica* p. 105 t. 1 Fig. 13. —
p. 106. Stubbs, A. G. Observations on abnormal specimens of *Planorbis spirorbis* and other freshwater shells at Tenby With pl. 4.
p. 113. Standen, R. Notes on the Land-Mollusca of Grange-over-Sands. Lancashire.
p. 115. Melvill, J. Cosmo, on *Latirus armatus* Ad. — Der Fundort Californien ist sicher irrtümlich: die Art ist identisch mit *Chascan maderensis* Wats. und stammt aus Makaronesien.
p. 120. Marshall, J. F., Additions to British Conchology (Cont.)

Standen, R., Irish Field Club Union, Kenmare Conference.

Mollusca. In the Irish Naturalist, September 1898.

In den hochinteressanten Distrikten von Kenmare und Killarney, dem lusitanischen Teile Irlands wurden, trotz ungünstiger Witterungsverhältnisse 62 Arten gesammelt, darunter *Geomalacus maculosus*, welcher die Fähigkeit zeigte, sich durch eine Öffnung von 2 mm Durchmesser hindurchzupressen, und die auch am Originalfundort, in dem schwer zu findenden Crineum oder Crinoglaea-Teich sehr seltene *Limnaea involuta*, von der bei mehrstündigem Suchen nur sechs lebende Exemplare gefunden wurden.

Kleinere Mittheilungen.

Kimakowicz, tritt in Mitth. Siebenb. Verein f. Naturk. 1897 p. 85 der durch Wagner vorgenommenen Eintheilung der siebenbürgischen *Daudebardia* in die Sektionen Carpathica und Libania entgegen. Libania langi hat im ausgewachsenen Zustand (bei 5, 9 mm. Durchmeser) keinen Wandeallus mehr und *Carp. jickelii* hat 1½ Embryonalwindungen und einen starken, zahnartigen Wandeallus. Damit werden allerdings die von Wagner angegebenen Unterschiede der beiden Sektionen hinfällig.

Einen gelungenen Ansiedelungsversuch mit einer Hochgebirgs-schnecke hat Cavaliere Napoleone Pini in Mailand vorgenommen. Er hat die auf die Hochhäuser des Valvestino beschränkte *Campylaea gobanzi* Erfld. an dem Monte Gedeno bei Esino (oberhalb Varenna am Comer See) ausgesetzt und die Schnecke hat sich seit nunmehr zehn Jahren dort erhalten und vermehrt.

Helix niciensis habe ich in ihrem Verbreitungsgebiet vergeblich an Mauern und Felsen gesucht und schlieslich zu meiner Überraschung im Thal der Nervia bei Bordighera an Oelbäumen gefunden, und zwar nicht unten am Stamm, sondern hoch oben, leider für mich oft unerreichbar, die jungen Exemplare an die Blätter angekittet, ganz wie unsere *Helix nemoralis* im Nachsommer.

Ko.

Zonites gemonensis Fer. habe ich in der Pini'schen Sammlung in prachtvoll grossen Exemplaren von Sion (Sitten) im Rhonethal gesehen. Dieses weit ausserhalb des eigentlichen Verbreitungsgebietes der Art gelegene Vorkommen scheint noch nicht veröffentlicht zu sein: bisher war der westlichste bekannte Fundort das Thal des Chiese nördlich (Val buona) und südlich (Val Sabbia) vom Idrosee. Eine Verbindung der beiden Fundorte wäre, da weder Adami am Iseosee noch die zahlreichen lombardischen Forseher an den anderen Alpenseen einen *Zonites* gefunden, nur durch das malakologisch noch völlig unbekante Valtellin möglich. Nachforschungen dort oder im Rhonethal wären sehr erwünscht.

Eine höchst merkwürdige Beobachtung an *Limnaea peregra* veröffentlicht A. G. Stubbs im Journal of Conchology. Schnecken aus einem Teich, welcher auch auffallend viele Monstruositäten von *Planorbis spirorbis* aufwies, verliessen in der Gefangenschaft ihre Schalen und krochen frei umher; sie blieben in diesem Zustand einen bis anderthalb Tage am Leben, bedeckten sich aber dann mit einer Art Schimmel und gingen zu Grund. Der Beobachter hat die Thiere ohne Schale manchmal auch im Freien beobachtet, aber immer nur in demselben Teich, hat auch niemals bei Limnaeen aus anderen Gewässern, die in denselben Gläsern gehalten wurden, ein freiwilliges Verlassen der Gehäuse beobachtet. Er möchte deshalb annehmen, dass eine Krankheit, deren Folge auch der mehlthauartige Pilz ist, die Ursache bildet. Dass Gehäuseschnecken ohne Schale herumkrochen, habe ich einmal bei *Helix aperta* in der Nähe von Palermo beobachtet, leider aber damals das Thier nicht mitgenommen.

Lebende Exemplare von *Clausilia coerulea* var. *birugosa* Parr. sind von B. E. Wright nach einer Mittheilung von Lionel E. Adams bei Petersfield in Hants, England gefunden worden. Wahrscheinlich handelt es sich um eine absichtliche Aussetzung und ich möchte hier wieder einmal darauf hinweisen, dass jeder Conchologe, welcher solche Ansiedelungsversuche vornimmt, es auch nicht unterlassen

sollte, davon Mittheilung zu machen. In derselben Nummer des Journal of Conchology wird auch das Vorkommen von *Helix limbata* bei Belmont, Co. Down erwähnt; hier dürfte es sich um eine unbedachte Einschleppung mit Zierpflanzen handeln.

Succinea oblonga ist noch einer Mittheilung von Welsh im Irisch Naturalist p. 225 in grösserer Anzahl an der Mündung des Roughty River unter ausgeworfenem Seetang gefunden worden.

Necrologie.

Die systematische Conchylienkunde hat einen schweren Verlust zu verzeichnen. Am 7. August d. J. starb auf einem Landgut in Argerville bei Vernou (Seine-et-Marne) der Eigentümer und Leiter des Journal de Conchyliologie Hippolyte Grosse im Alter von 71 Jahren. Seit nahezu vierzig Jahren hat er seine ganze Arbeitskraft und reiche Mittel seiner Zeitschrift gewidmet und sie auch in der für Systematik so ungünstigen Neuzeit auf ihre Höhe gehalten. Er hat auch für ihre Zukunft gesorgt; sie wird von dem seitherigen Mitherausgeber Henri Fischer in Verbindung mit den Herrn Dautzenberg und G. Dollfuss geleitet, ganz in der gewohnten Weise weiter erscheinen.

Am 25 September 1898 starb in Saint-Germain-en-Laye im Alter von 78 Jahren Gabriel de Mortillet, dem unsere Wissenschaft eine Reihe schätzbarer Beiträge verdankt. Er war im Museum in Genf angestellt, und seine Arbeiten über die Mollusken-Fauna Savoiens und des Leman-Beckens sind noch heute mustergültig. Später nahm er eine Stellung als Geologe der italienischen Eisenbahnen an und gab in Mailand eine Zeitschrift unter dem Titel „Revue scientifique italienne“ heraus, der indessen nur ein kurzes Leben beschieden war. Im Jahre 1868 wurde er nach Saint-Germain als Direktor des dortigen Museums berufen, und befasste sich in den letzten Jahrzehnten vorzugsweise mit prähistorischen Forschungen

P. Hesse.

Ueber den Lebenslauf unseres am 11. April 1898 zu Würzburg verstorbenen Mitgliedes und Mitgründers Prof. Dr. Fridolin von Sandberger entnehmen wie der am 11. Mai in Würzburg von dem Rektor Prof. Pryn gehaltenen Gedächtnissrede folgende Angaben:

Carl Ludwig Fridolin von Sandberger ward ge-

boren am 22. November 1826 zu Dillenburg in Nassau, erhielt seine wissenschaftliche Vorbildung auf dem Gymnasium zu Weilburg, an das sein Vater als Professor versetzt worden war und besuchte dann die Universitäten zu Bonn, Heidelberg, Giessen und Marburg, um dort unter der Leitung von Männern, wie Bischoff, Brönn, Leonhard-Bunsen und Liebig mineralogische, paläontologische und chemische Studien zu machen. Nachdem er im Jahre 1846 mit neunzehn Jahren zu Giessen sich den Doctorgrad erworben hatte begann er im folgenden Jahr zusammen mit seinem Bruder Guido die Herausgabe eines grösseren Werkes über die Versteinerungen des rheinischen Schichtensystems in Nassau, das später mit dem Wollaston'schen Preise gekrönt wurde. Im Jahre 1849 sehen wir ihn als Sekretär des Nassauischen Vereins für Naturkunde, drei Jahre darauf als Inspektor des schönen naturhistorischen Museums zu Wiesbaden. Aus dieser Stellung schied er zu Anfang des Jahres 1855, um an dem damals in hoher Blüthe stehenden Polytechnikum in Karlsruhe die Professur der Mineralogie und Geologie zu übernehmen. In der Karlsruher Zeit fällt die Abfassung seines zweiten grösseren Werkes, „die Conchylien des Mainzer Tertiärbeckens“, das in den Jahren 1858—63 erschienen ist. 1863 wurde er als Nachfolger des Mineralogen Rumpf nach Würzburg berufen. Damit begann für ihn eine neue Periode fruchtbarster Thätigkeit. Vor allem wandte er sich dem Studium der fränkischen Trias zu und machte als der erste die geologischen Verhältnisse Unterfrankens der wissenschaftlichen Welt bekannt. Die von ihm geordnete und im alten Universitätsgebäude aufgestellte unterfränkische Lokalsammlung wird für alle Zeiten ein ruhmvolles Denkmal seiner Thätigkeit bilden. Hier entstand auch seine dritte grössere, in den Jahren 1871—76 unter dem Titel „die Land- und Süßwasserconchylien der Vorwelt“ erschienene und später mit der goldenen Cothenius-Medaille gekrönte Arbeit. Hier endlich verfasste er seine fundamentale Arbeit „über die Erzgänge“, von zahlreichen kleineren Arbeiten nicht zu reden. Seine angestrengte wissenschaftliche Thätigkeit hielt ihn nicht ab auch für die allgemeinen Interessen der Hochschule zu wirken, sowohl im Senat, dem er acht Jahre angehört hat, wie in der Fakultät, deren Dekan er zweimal gewesen ist.

„Als Lehrer nicht minder bedeutsam denn als Forscher, hat Sandberger nicht nur durch seine privaten akademischen Vorlesungen in hohem Grade anregend gewirkt, sondern auch durch seine Publica und sonstigen öffentlichen Vorträge das Interesse an der heimathlichen Boden- und Gesteinkunde in weiteren Kreisen erweckt.“

Der heimischen Conchyliensfauna hat er stets das Interesse bewahrt, sowohl Nassau als Unterfranken verdanken ihm wichtigere faunistische Arbeiten; für Nassau hat er in Verbindung mit Karl Koch die eigentliche Grundlage für die Kenntniss der Molluskenfauna gelegt.

Neues Mitglied:

Wilfred Bendall, London, 77 Baker Street, W.

Eingegangene Zahlungen:

Naturhist. Museum, Oldenburg, Mk. 12.— : Senckenbergische Gesellschaft, Frankfurt a. M., Mk. 24.— : Wagner, Wiener Neustadt, Mk. 12.— : Zoologisches Museum, Kiel, Mk. 18.— : Prof. A. Döring, Cordoba, Mk. 150.— : W. Bendall, London, Mk. 18.—

Anzeige.

Als Sonderabzug aus Band XXIV, Heft 3, der **Abhandlungen der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft** erschien soeben:

Wiegmann, F. (Jena), Landmollusken.

(Stylomatophoren). Zootomischer Teil. 4^o.
276 S. Mit 11 Tafeln. Preis M. 12.50.

Es handelt sich um die Darstellung der von Herrn Professor Kückenthal auf dessen Reise im malayischen Archipel gesammelten Landmollusken.

Zu beziehen durch die

Verlagsbuchhandlung von
M. Diesterweg in Frankfurt a. M.

 Der beiliegende Prospekt des Herrn H. Frühstorfer in Berlin wird der geneigten Beachtung der Leser empfohlen.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwalmheim a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben 15. Dezember 1898.

b. Subgen. Aeroptychia Crosse et Fischer.

- aequivoca* Pfr. Madagaskar.
manicata Cr. et Fisch.
metableta "
notabilis Edg. A. Smith

c. Subgen. Ligatella Martens.

(*Rochebrunia* Bgt.)

- aequatoria* Morel. Tabora, Westafrika.
alluaudi Dautzbg. Diego Suarez.
anceps Marts. Deutsch-Ostafrika
 var. *liederi* Marts. "
anoglypta Morelet (1895, nec.
 1890). Gran Comoro.
aplustris Sow. Madagaskar.
auricularis Gray (*candidum*
 Sow.) ?
bewsheri Morel. Rodriguez.
caflra Beck ? Südafrika.
casta Pfr. Madagaskar.
castanea Pfr. "
chlorotica Pfr. "
cincinnus Sow. Yemen.
citrina Sow. ?
comorensis Pfr. Comoren.
conica G. Austen Sokotra.
coquandiana Petit Madagaskar.
delmaresti Ancey Deutsch-Ostafrika.
desmazuresi Crosse Rodriguez.
encaustica Rve. ?
foveolata Melv. et Psby. Südafrika.
fulvescens Sow. Madagaskar.
fuscula Pfr. Yemen.
goudotiana Sow. Madagaskar. (Natal?)

grisea Pfr.	Madagaskar.
haemastoma Ant.	Mauritius, Round Island.
var. fimbriata Lam.	"
var. major Nev.	"
var. semisculpta Nev.	"
var. undulata Sow.	"
var. philippi Grat.	"
var. rodriguezensis Crosse	Rodriguez.
hanningtoni Sow.	Aequatorialafrika.
hartvigiana Pfr.	Südafrika.
hildebrandti Mrts.	Anjouan.
humbloti Morelet	Comoren.
icterica Sow.	?
insularis Pfr.	Natal.
isabella Pfr.	Madagaskar.
johnsoni Smith	"
kraussiana Pfr.	Natal.
ligata Müll (affine Sow.)	„, Sambesigebiet.
lineata Pfr.	Natal?
listeri Gray	Mauritius.
microchasma Pfr.	Madagaskar.
moreleti Kob. (anoglyptum Morelet 1890 nec 1885)	Westafrika.
moulinsii Grat. (desmoulinsii Sow.)	Madagaskar.
multilineata Jay (flexilabrum Sow., flavilabre Petit).	"
polita Sow.	?
polyzonata Sow.	Gran Comoro.
pyrostoma Sow. (haemastoma Grat. nec Anton)	Madagaskar, Mayotte.
sarcodes Pfr.	"
seabra H. Ad.	"
seychellensis Nev.	Seychellen.

sinuata Pfr.	Madagaskar.
striatula Pfr.	?
sublirata Pfr.	?
suffusa Sow.	Madagaskar.
tenuis Sow.	?
transvaalensis Melv. et Psby.	Transvaal.						
tubularis Morelet	Madagaskar.
tubulum Rve.	?
vacoënsis Dup.	Mauritius.
vesconis Morel.	,	Madagaskar.
vexillum Sow,	Diego Suarez.
var. consocia Fér.	"	"
vitellina Pfr.	"
xanthochila Sow.	"
zanguebarica Petit (nec Rve. nec Pfr., parvispirum Pfr. teste Smith.)	Sansibar, Ostafrika.	
zonata Petit	Madagaskar.

4. Genus **Guillainia** Crosse.

grata Petit (tricolor Pfr.)	.	.	Abd-el-Goury.
-----------------------------	---	---	---------------

5. Genus **Ericia** Moq. Tand.

(*Cyclostoma* Lam., autt. ex parte, *Cyclostomus* Montf.,
Pfr. ex parte).

adjuncta Mouss.	Tenerife.
canariensis d'Orb.	Canaren.
var. raricostata Woll.	"
var. inaequalis Woll.	"
costulata Zgl.	Südosteuropa, Kaukasus.
elegans Müll.	Süd- und Mitteleuropa.
var. bourguignati Mab.	Frankreich.
— astea Bgt. (= subelegans Bgt.)	"

— physeta Blg.	Frankreich.
— sicula Kob.	Sizilien.
— appennina Monter.	.	.	M. Cassino.		
fascicularis Pfr.	?
glauca Sow.	Kleinasiens.
hyrcana Mls. (caspicum Mouss.)					Talysehgebiet.
laevigata Webb et Berth.	Canaren.
lutetiana Bgt.	Frankreich.
melitensis Sow.	Malta.
olivieri Sow.	Syrien.
sulcata Drap.	Küsten des tyrrhenischen Meeres.
var. multisulcata Pot. et Mich.					Sizilien.
— sicula Sow.	"
— aegusina Monter.	Favignana.
— tenella Sow.	Sizilien.
— reticulata Zgl.	"

6. Genus **Tudorella** Fischer.

ferruginea Lam.	Balearen.
-----------------	---	---	---	---	-----------

7. Genus **Leonia** Gray.

mammillaris Lam. (voltzianum Mich.)	Südspanien, Oran.
serobiculata Mouss.	Südmarokko.

13. Familie **Licinidae.**

1. Genus **Jamaicia** C. B. Ad.

ancmala Ad.	Jamaica.
moussoniana Ad.	"

2. Genus **Licina** Gray.

evoluta Rve. (subaspera Sow. decussata Humphr.)	Corail, Haiti.
labeo Müll. (rugosa Browne)					Jamaica?

lineina	Born.	(dubia	Gmel.	.	
	borni	Pfr.)	.	.	Jamaica.
percrassa	Wright	.	.	.	Cuba.
reeeveana	Pfr.	(<i>C.</i>	decussatum	.	
	Sow.	nee	Lam.)	.	Antillen.
rete	Weinl.	.	.	.	Jeremié, Haiti.
rollei	Maltz.	.	.	.	Haiti.
var.	violacea	Maltz.	.	.	"

3. Gen. **Choanopoma** Pfr.

acervatum	Arango	.	.	.	Cuba.
alatum	Pfr.	.	.	.	" (Santiago).
arangianum	Gdl.	.	.	.	"
auricolum	Gdl.	.	.	.	"
bebini	Acango	.	.	.	"
bertini	Maltz.	.	.	.	Nord-Haiti.
var.	gracillima	Maltz.	.	.	"
blandii	Weinl.	.	.	.	Haiti.
chittyi	Ad.	.	.	.	Jamaica.
daudinoti	Gdl.	.	.	.	Cuba.
decoloratum	Gdl.	.	.	.	"
decussatum	Lam.	.	.	.	Puertorico, Vieque.
eburneum	Gdl.	.	.	.	Ostcuba.
fimbriatum	Sow.	.	.	.	Jamaica.
fragile	Gdl.	.	.	.	Guantanamo, Cuba.
gabbi	Grosse	.	.	.	San Domingo.
gonavense	Weinl.	.	.	.	Gonave, Haiti.
granosum	Ad.	(nodulosum	Ad.)	Jamaica.	
billianum	Ad.	.	.	.	"
var.	aculeosum	Ad.	.	.	"
var.	amandum	Ad.	.	.	"
interruptum	Lam.	(ambigua			
	Desh.)	.	.	.	"
jiguanense	Pfr.	.	.	.	Cuba.

kobelti Maltz.	Haiti.
laceratum Weinl.	San Domingo.
lachneri Pfr.	Cuba.
latius Weinl.	San Domingo.
lima Ad.	Jamaica.
var. blandianum Ad.	"
lincina L.	"
lincinellum Lam. (compressum Wood).	Haiti.
majusculum Morel. (maustum Pöey)	Cuba.
minium Gdl.	"
mite Pfr.	Jamaica.
moreletianum Crosse	San Domingo.
newcombi Crosse	"
occidentale Pfr.	St. Martin bei Guadelupe.
perplicatum Gdl.	Cuba.
pisum Ad.	Jamaica.
var. virgineum Ad.	Cuba.
pretrei d'Orb.	"
puertoplatense Pfr.	Haiti.
pulchrum Wood	Jamaica.
putre L.	Ost-Cuba.
sauvallei Gdl.	West-Cuba.
scabriculum Sow. (amabile Pfr.)	Jamaica.
senticosum Shuttl.	Puertorico, Vieque.
serraticosta Weinl.	Haiti.
smithianum Pfr.	"
sordidum Gdl.	Cuba.
spinulosum Ad.	Jamaica.
storchii Pfr.	Cuba.
strictecostatum Maltz	Haiti.
sulculosum Fér.	St. Barthelemy, Vieque.
sunichrasti Crosse	Tehuantepek
tractum Gdl.	Cuba.

- | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|------------|
| <i>troscheli</i> Pfr. | . | . | . | . | . | . | West-Cuba. |
| <i>tryoni</i> Arango | . | . | . | . | . | . | Cuba. |
| <i>uncinatum</i> Arango | . | . | . | . | . | . | " |
| <i>yaterasense</i> Pfr. | . | . | . | . | . | . | " |
| <i>yunquense</i> Pfr. | . | . | . | . | . | . | " |

a. Subgenus *Rolleia* Crosse.

b. Subgenus *Blaesospira* Crosse.

- echinus* Wright. Cuba.
humboldtianum Pfr.

c. Subgenus *Xenonoma* Crosse.

- hystrix* Wright Cuba.

4. Genus *Ctenopoma* Shuttlew.

- | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|----------|
| <i>argutum</i> Pfr. | . | . | . | . | . | Cuba. |
| <i>bahamense</i> Shuttl. | . | . | . | . | . | Bahamas. |
| <i>bilabiatum</i> d'Orb. | . | . | . | . | . | Cuba. |
| <i>blaini</i> Gdl. | . | . | . | . | . | " |
| <i>bryanti</i> Pfr. | . | . | . | . | . | Bahamas. |
| <i>bufo</i> i-fr. | . | . | . | . | . | Cuba. |
| <i>campbelli</i> Ad. | . | . | . | . | . | Jamaica. |
| <i>coronadoi</i> Arango | . | . | . | . | . | Cuba. |
| <i>coronatum</i> Poey | . | . | . | . | . | " |
| <i>deficiens</i> Gdl. | . | . | . | . | . | " |
| <i>denegalum</i> Poey | . | . | . | . | . | " |
| <i>dominicense</i> Pfr. | . | . | . | . | . | Haiti. |
| <i>echinatum</i> Gdl. | . | . | . | . | . | Cuba. |

enode Gdl.	Cuba.
garridoianum Gdl.	"	
honestum Poey (rugelianum Shuttle.)	"
immersum Gdl.	"
jeannereti Pfr.	"
nigriculum Gdl.	"
nobilitatum Gdl.	"
nodiferum Arango	"
nodulatum Poey	"
perspectivum Gdl.	"
pulverulentum Wright	"
rotundatum Poey	"
rugulosum Pfr. (clathratulum Gld., verecundum Poey)	Florida.
sculptum Gdl.	"
semicoronatum Gdl.	"
torquatum Gut.	"
torreianum Gdl.	"
undosum Gdl.	"
van-nostrandi Arango	
wilkinsoni Ad.	Jamaica.
var. modesta Ad.	"
wrightianum (Gdl.)	Arango	Cuba.				

5. Genus **Diplopoma** Pfr.

architectonicum Gdl.	.	.	.	Cuba.
----------------------	---	---	---	-------

6. Genus **Adamsiella** Pfr.

chlorostoma Sow.	.	.	.	Demerara.
chordata Pfr.	.	.	.	Cuba.
cinnamomea Pfr.	.	.	.	?
grayana Pfr. (obseura Gray, concentricum Ad., serri- ferum Ad.)	.	.	.	Jamaica.

- ignilabris Ad. Jamaica.
intermedia Ad. ,
irrorata Gloyne ,
mirabilis Wood (decussatum
Ad.) ,
miranda Ad. (mirabile Sow.
nec Wood) ,
monstrosa Ad. ,
moribunda Ad. ,
pearmanaeana Chitty (longi-
collis Pfr.) ,
pinguis Pfr. ?
pulchrior Ad. (binneyana Ad.) Jamaica.
variabilis Ad. (articulatum
Sow., mutatum Ad.) . . . ,
xanthostoma Sow. ,

14. Familie Cistulidae.

I. Genus **Cistula** Gray.

- acerbula Morel. Guatemala.
agassizi Charp. Cuba.
agrestis Gdl. ,
aguadillensis Pfr. Puerto Rico.
antiguensis Shuttl. Antigua.
arctistria Pfr. Cuba.
ariensis Guppy Trinidad.
bilabiata Pfr. (livida Mke.) . . Cuba.
capillacea Pfr. Haiti.
catenata Gld. (limbifera Mke.,
semiproducta Gray.) . . . Cuba.
cinclidodes Pfr. Haiti.
confusa Pfr. ?
var. delatreana Pfr. . . . ?

consepta Mts.	Puertorico.
cumulata Pfr.	Cuba.
echinulata Wright	"
grateloupi Pfr.	Yukatan.
gruneri Pfr.	Honduras.
illustris Poey (truncatum Pfr.,						
candeanum Sow., delatre-						
anum Poey).	Cuba.
inculta Poey.	"
interstitialis Gdl.	"
jimenoi Arango	Cuba.
kuesteri Pfr.	Honduras.
largillierti Pfr.	Yucatan.
lineolata Lam.	Puertorico.
lugubris Pfr.	Jamaica, Anguilla
mackinlayi Gdl.	Cuba.
mitra Weini.	Haiti.
mordax Ad.	Jamaica.
osberti Tristr.	Guatemala.
pallida Pfr.	? Cuba.
platychila Pfr. (latilabre Pfr.						
nec d'Orb.)	?
pleurophora Pfr.	Honduras.
presasiana Gdl.	Cuba.
procax Poey	"
radiosa Morel. (ottonis Tristr.)						Guatemala.
radula Pfr.	? Cuba.
raveni Crosse	Curassao.
rigidula Morel.	Guatemala.
riisei Pfr.	Puertorico
rostrata Pfr.	?
rufilabris Beck (bilabre Mke.)						St. Croix.
sagittifera Ad.	Jamaica.
sauliae Sow.	"

scabrosa Humpbr. (*rugulosum*

- | | | | | | |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------|
| Sow. nec Pfr.) | . | . | . | . | Providence. |
| tamsiana Pfr. | . | . | . | . | Venezuela. |
| thoreyana Phil. | . | . | . | . | Bolivia. |
| trochlearis Pfr. (chiapasense
Gr. et Fisch.) | . | . | . | . | Mexiko. |

2. Genus **Chondropoma** Pfr.

- | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------|
| <i>abnatum</i> Gdl. | . | . | . | . | . | Cuba. |
| <i>adulterinum</i> Pfr. | . | . | . | . | . | Haiti. |
| <i>andrewsae</i> Ancey | . | . | . | . | . | Honduras. |
| <i>angustatum</i> Pfr. | . | . | . | . | . | ? |
| <i>aspratile</i> Morel. | . | . | . | . | . | Ecuador. |
| <i>assimile</i> Gdl. | . | . | . | . | . | Cuba. |
| <i>biforme</i> Pfr. | . | . | . | . | . | Turks Inseln. |
| <i>blandum</i> Pfr. | . | . | . | . | . | Haiti. |
| <i>blauneri</i> Shnrtl. | . | . | . | . | . | Puertorico. |
| <i>brownianum</i> Weinl. | . | . | . | . | . | Haiti. |
| <i>canaliculatum</i> Gdl. | . | . | . | . | . | Cuba. |
| <i>candeanum</i> d'Orb. | . | , | . | . | . | " |
| <i>canescens</i> Pfr. (<i>confertum</i> Poey) | . | . | . | . | . | " |
| <i>caricae</i> Pfr. | . | . | . | . | . | Haiti. |
| <i>cirratum</i> Wright | . | . | . | . | . | Cuba. |
| <i>cisnerosi</i> Arango | . | . | . | . | . | " |
| <i>claudicans</i> Poey. | . | . | . | . | . | " |
| <i>cordovanum</i> Pfr. | . | . | . | . | . | Mexiko. |
| <i>crenimargo</i> Pfr. | . | , | . | . | . | Cuba. |
| <i>crenulatum</i> Fér. (<i>guadeloupense</i>
Pfr., <i>nodulosum</i> Jay.) | . | . | . | . | . | Guadelupe, St. Martin, Maria
Galante. |
| <i>cumanense</i> Pfr., | . | . | . | . | . | Cumana, Venezuela. |
| <i>deceptor</i> Arango | . | . | . | . | . | Cuba. |
| <i>decurrens</i> Poey. | . | . | . | . | . | " |
| <i>delatreanum</i> d'Orb. | . | . | . | . | . | " |

dentatum Say (lineolatum Ant.,	
crenulatum Pfr., auberianum	
Moerch).	, Südflorida.
diaphanum Pfr.	— ?
dilatum Gundl.	Cuba.
discolorans Wright	"
dissolutum Poey.	"
dunkeri Arango.	"
egregium Gundl.	"
emilianum Weinl. (marinum Rve.)	Haiti.
erectum Gundl.	Cuba.
ernesti Pfr.	"
eusarcum Pfr.	Haiti.
excisum Gundl.	Cuba.
fovealum Gundl.	"
gundlachi Arango	"
var. solare Pfr.	"
gutierrezi Gundl.	"
hamlini Arango.	"
harpa Pfr.	? Cuba.
hemiotum Pfr.	Haiti.
hjalmarsoni Pfr.	Turks Ins.
igneum Rve.	?
incrassatum Wright.	Cuba.
integrum Pfr.	Antillen.
irradians Shuttlew.	Cuba.
jucundum Pfr.	?
juliensi Pfr.	Sombrero, St. Martin.
kisslingianum Weinl.	Haiti.
iaetum Gutierrez	Cuba.
latilabre Orb.	"
latum Gundl.	"
lindenianum Weinl.	Haiti.

litturatum Pfr.	Haiti
loweanum Pfr.	"
magnificum Sallé	"
marginalbum Gundl.	Cuba.
moestum Shuttl. (hellenicum Gray, charpentieri Shuttlew)	"
navassense Tryon	Navassa.
neglectum Gundl.	Cuba.
newcombianum Ad. (troscheli Pfr., swiftianum Newc.)	St. Thomas.
newtoni Shuttl.	Puertorico.
obesum Mke.	Cuba.
ottonis Pfr. (petricosum Morel.)	"
oxytremum Gundl.	"
perlatum Gundl.	"
petitianum Pfr.	Haiti.
pfeifferianum Poey.	Cuba.
pictum Pfr. (sagra d'Orb., maho- gani Gld.)	"
plicatulum Pfr.	Venezuela
poeyanum Orb.	Cuba.
pudicum Orb.	,
puncticulatum Pfr.	Antillen.
rawsoni Pfr.	Inagua. Bahamas.
revinctum Poey.	Cuba.
revocatum Gundl.	"
rubicundum Morel.	Guatemala.
rufopictum Gundl.	Cuba.
sagebieni Poey.	"
salleanum Pfr.	Haiti.
santacruzense Pfr.	St. Croix.
scobina Gunel.	Cuba.
scripturatum Weinl.	Haiti.
semincanum Morel.	Fichteninsel bei Cuba.
tappanianum Ad.	"

semilabre Lam. (glabratum

Rve.)	Bahamas.
sericatum Morel.	Cuba.
shuttleworthi Pfr.	"
simplex Pfr.	Haiti.
sinuosum Wright.	Cuba.
solidulum Gundl.	"
subangulatum Mts.	Guatemala.
subauriculatum Pfr.	Cumana (Venezuela)
subreticulatum Pfr.	Haiti.
var. sericea Maltz.	"
swifti Shuttlew	Puertorico.
tenebrosum Morel.	Cuba.
tenuiliratum Pfr.	"
terebra Pfr.	Portorico.
textum Gundl.	Cuba.
tortolense Pfr.	Tortola.
truncatum Wiegm.	? Mexico.
turritum Pfr.	?
unilabiatum Gundl.	Cuba.
venezuelense Pfr.	Venezuela.
vespertinum Morel.	Chiapas, Mexiko.
vignalense Wright.	Cuba.
violaceum Pfr. (bilabratum	
Rve.)	"
weinlandi Pfr.	Haiti.
var. malleata Crosse	"
yucayum Presas	Cuba.

3. Genus **Tudora** Gray.

abtiana Pfr.	Cuba.
adamsi Pfr.	Jamaica.
aguileriana Arango.	Cuba.
ambigua Lam. (interrupta	

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| <i>Reinh.. albescens</i> Weinl.) | . | Haiti. |
| <i>armata</i> Ad. . . . , . . . | . | Jamaica. |
| <i>augustae</i> Ad. (<i>nitens</i> Rve.) | . | " |
| <i>aurantia</i> Wood (<i>versicolor</i>
Pfr., <i>carneum</i> Mke.) | . | Bonaire. |
| <i>avena</i> Ad. | . | Jamaica. |
| <i>barklyana</i> Chitty | . | " |
| ? <i>chemnitzii</i> Wood. | . | ? |
| <i>columna</i> Wood (<i>quinquefasciata</i>
Ad.) | . | Jamaica. |
| <i>costata</i> Mke. | . | ? |
| <i>dislocata</i> Baird. | . | Jamaica. |
| <i>excurrens</i> Gdl. | . | Cuba. |
| <i>fascia</i> Wood. (<i>proxima</i> Ad.) | . | Jamaica. |
| <i>secunda</i> Ad. | . | " |
| <i>griffithiana</i> Ad. | . | " |
| <i>lurida</i> Gdl. | . | Cuba. |
| <i>maritima</i> Ad. (<i>petrarum</i> Rang) | . | Jamaica. |
| var. <i>aurora</i> Ad. | . | " |
| <i>megachila</i> Pot. et Mich. (simile
Gray, <i>cancellatum</i> Mke.,
<i>rорidum</i> Parr., <i>proteus</i> Beck) | . | Curassao. |
| <i>moreletiana</i> Petit (<i>disjunctum</i>
Morel.) | . | Fichteninsel bei Cuba. |
| <i>mutica</i> Ad. | . | Jamaica. |
| <i>nobilis</i> Pfr. | . | Haiti. |
| <i>papyracea</i> Ad. | . | Jamaica. |
| <i>pauperata</i> Ad. | . | " |
| <i>planospira</i> Pfr. | . | Mexiko. |
| <i>pupiformis</i> Sow. | . | Haiti, Anguilla. |
| <i>pupoides</i> Morel. (<i>ovatum</i> Pfr.) | . | Cuba, Fichteninsel. |
| <i>quaternata</i> Lam. | . | Gonvales, Haiti. |
| <i>shepardiana</i> Ad. | . | Jamaica. |
| <i>simulans</i> Ad. | . | " |

tappaniana Ad.	Jamaica.
umbricola Weinl.	Jeremié, Haiti.
wrighti Pfr.	Cuba.

4. Genus **Colobostylus** Gr. et Fisch.

albus Sow.	Jamaica.
aminensis Sow.	Haiti.
banksianus Sow.	Jamaica.
var. hyacinthina Ad.	"
bronni Ad.	"
var. fuscolineata Ad.	"
chevalieri Ad.	"
crenulosus Ad.	"
dentilobatus Weinl.	Haiti.
dissectus Sow.	?
fallax Pfr.	St. Croix.
habichi Weinl.	Haiti.
heynemanni Pfr.	Ost-Cuba.
humphreyanus Pfr.	(Cistula	
picta Humphr.)	Jamaica.
hydii Weinl. (rude Rve.)	. .	Bahamas.
jayanus Ad.	(solidum Ad.,	
histrio Pfr.)	Jamaica.
lamellosus Ad.	"
rangelinus Poey.	Cuba.
rectus Gdl.	"
redfieldianus Ad.	Jamaica.
retrorsus Ad.	"
roemerii Pfr. (arquesi Arango)	Cuba.	
rollei Weinl.	Haiti.
saccatus Pfr.	Jamaica.
saxorum Weinl.	Haiti.
semidecussatus Pfr.	Trinidad.
sericinus Ad.	Jamaica.

89102062957



B89102062957A

